











# PRAXEOS MEDICAE VNIVERSAE PRAECEPTA

AVCTORE

IOSEPHO FRANK

IOANNIS PETRI FILIO, AVGVSTISSIMO IMPERATORI ET TOTIVS  
ROSSIAE AVTOCRATORI A CONSILIIIS STATUS, EQVITE ORDINIS  
ST. ANNAE, ST. WLODIMIRI, THERAPIAE SPECIALIS ET CLI-  
NICES IN CAESAREA VNIVERSITATE VILNENSI PROFESSORE  
EMERITO, PLVRIMARVM ACADEMIARVM ET SOCIETATVM  
MEDICARVM SODALI.

---

## PARTIS SECVNDAE

EDITIO ALTERA EMENDATA ET AVCTA.

---

### VOLVMINIS PRIMI SECTIO SECVNDA, FASCICVLVS PRIOR

CONTINENS

DOCTRINAM DE MORBIS COLUMNAE VERTEBRALIS  
ET SINGVLORVM NERVORVM ALIISQVE EX VARIIS  
SYSTEMATIS NERVOSI PARTIBVS ORTVM  
HABENTIBVS.

---

L I P S I A E

SVMPTEBVS BIBLIOPOLII KUENIANI

MDCCCXLI.





---

## LECTORI.

---

**U**troque munere, et incepta persequendi et editiones repetendi, urgetur hujus operis autor celeberrimus. Quum vero, ne hoc opus egregium et fructuosissimum, ex votis propriis et omnium desideriis mox perficiendum, prolatetur, alterum negotium obire haud posset; de voluminibus denuo edendis me adiit, quod maximae mihi est laetitiae summoque decori. Nam, translato archetypo in sermonem patrium (VII adhuc prodire tomi) rationem operis ac institutionem bene cognitas habere et novae editionis curae probasse non imparem sentit me autor. Et ipse fateri adigor, nisi translationis utilitati sedulo collegissem, autoris optatis simul respondere me non potuisse; nam innumerabilia exstant facta et argumenta, quae medicorum sedulitati debet scientia!

Quantas habeam gratias fautori amico, qui acceptum negotium dedit simulque re et consilio juvit; quanti eum verear et collegas, qui opus ejusdem praestantissimum cognoverint: eo testari studebam, ut quae ad rem spectarent non omitterem, sed caute etiam agerem, ne opus foret nimis fustum atque prolixum et vix unquam ad autorem quem non legissem provocarem et lectorem delegarem — verbo, ut omnes, quae mihi erant vires intenderem, ne in labore conficiendo aemulus deessem JOSEPHI FRANKII, qui simplex est et brevis, ut Hippocrates, atque candidus et veritatis cultor, ut Sydenhamus.

Quocirca lector benevole quae damus accipe et vale!

Scrpsi Lipsiae a. MDCCCXL.

Dr. G. CHR. G. VOIGT.

DE MORBIS  
C O L U M N A E  
VERTEBRALIS.

---

Frank Prox. II, 1. 2. 1.

A



---

## CAPUT I.

### *De morbis columnae vertebralis in genere.*

---

#### §. I.

#### *Doctrinae limites, dignitas et literatura.*

1. Sicuti fundamenta doctrinae morborum D. limites. encephali in capitibus de cephalaea, encephalitis et hydrocephalo jecimus, illius autem complementum pro tractatu apoplexiae, catalepseos et vesaniarum reservavimus; ita fundamenta doctrinae morborum columnae vertebralis in capitibus de rhachialgia, rhachialgitide et hydrorhachitide jecimus, illius autem complementum pro tractatu de paralyti, tetano et variis convulsionum generibus reservamus. Quemadmodum enim exercitium facultatum animi a cerebro regitur, sic musculorum illud a medulla spinali.

2. Quanti hinc columna vertebralis in oeco- D. digni- nomia corporis humani sit momenti, patet. taa. Ac re quidem vera, si perpendamus specum vertebralem, capiti, trunco et pelvi ut fulcrum insertum, vertebrae cervicales, dorsales, lumbares et sacrales omne, quod inter encephali basin et coccygis os intercedit, spatium occupare, ac simul cum membranis, meningum propaginibus, me-

#### 4 DE MORBIS COLUMNAE VERTEBRALIS

dullam, pretiosissimam cerebri continuationem, amplecti et tueri, — ex hac autem medulla nervorum seriem intercostalem undique locupletantem proficisci atque tali pacto ipsa illa medulla iterum cum cerebro ac tandem cum gangliis et visceribus thoracis, abdominis et pelvis nexu artissimo jungi et praeterea in medullam spinalem nervos largiri diaphragmati <sup>1)</sup>, partibus genitalibus <sup>2)</sup>, vesicae urinae <sup>3)</sup>, sphincteri ani <sup>4)</sup>, extremitatibus superioribus <sup>5)</sup> et inferioribus <sup>6)</sup>, musculis occipitis <sup>7)</sup>, colli <sup>8)</sup>, nuchae <sup>9)</sup>, dorsi <sup>10)</sup>, lumborum

- 1) Nervorum cervicalium paris quarti ramus anterior, ramo paris tertii junctus et nervi dorsales inferiores.
- 2) Nervus spermaticus externus ex primo et secundo pari nervorum lumbalium; ac nervus pudendalis communis ex nervis sacralibus tribus inferioribus ortum ducentes.
- 3) Quatuor nervi sacrales ad plexum hypogastricum formandum concurrunt, et directe quoque vesicam adeunt.
- 4) Ex ramis parvulis nervorum sacralium ultimorum.
- 5) E plexu brachiali quatuor nervi cervicalibus inferioribus et primo dorsali originem debente.
- 6) 1. *Nervus cruralis* ex ramis anterioribus secundi, tertii et quarti nervi lumbaris. 2. *Nervus obturatorius* ex secundo et tertio nervo lumbari. 3. *Nervus ischiadicus* ex plexu ischiadico, qui ex connubio quarti et quinti nervi lumbaris; primi, secundi et tertii nervi sacralis emergit, et 4) *Nervus cutaneus anterior* ex pari secundo et tertio nervorum lumbalium.
- 7) Nervorum cervicalium par primum, secundum, tertium et quartum.
- 8) Potissimum par primum et quartum nervorum cervicalium.



borum<sup>11)</sup>, pectoris<sup>12)</sup>, abdominis<sup>13)</sup>, et universo paene systemati dermoideo<sup>14)</sup>; — sique perpendamus vertebrae et partes annexas, singulis causis morborum ossium, cartilagineum et ligamentorum obnoxias esse, — membranas medullam spinalem cingentes, mala quotquot sunt cum cerebri meningibus aliisque membranis communia agnoscere<sup>15)</sup>, — ipsamque medullam spinalem veluti pulpam nerveam in genere pati, — atque spatium exstans inter vertebrae et duram matrem, inter duram matrem et arachnoideam (ligamentum denticulatum formantem) et inter arachnoideam et piam matrem, iisdem aerumnis ac reliquae corporis humani cavitates subijci, — ac postremo vasa sanguinea et lymphatica specus vertebralis sua agnoscere mala, — si, inquam, haec omnia perpendamus; morborum corporis humani nullibi fontem uberiores quam in columna vertebrali exstare, fateri adigemur.

### 3. Quam-

- 9) Ramus posterior pars quinti nervorum cervicalium.
- 10) Par sextum, septimum et octavum nervorum cervicalium, rami posteriores nervorum dorsalium et sacralium.
- 11) Nervi bini dorsales inferiores.
- 12) Par quartum nervorum cervicalium et nervorum dorsalium rami anteriores.
- 13) Nervi duo ultimi dorsales et nervi lumbares.
- 14) P. II, Edit. alter. Vol. I. Sect. I. Cap. 1. §. III. 60.
- 15) „Im Ganzen treffen wir bei den verschiedenen Affectionen der Wirbelsäule und des Rückenmarks, wie auch МВЕКК richtig behauptet, dieselben an, die wir am Schedel und Hirne wahrnehmen.“ C. WENZEL, l. citand. p. 63.

## 6 DE MORBIS COLUMNAE VERTEBRALIS

D. literatura.

3. Quamobrem semper in ea versati sumus opinione, nil magis medicorum plebem a principibus in arte omni aevo distinxisse, quam ignorantio vel notio morborum columnae vertebralis. Atque hic ad GALENUM, stupendum de morbis spinae scriptorem <sup>16)</sup>, provocamus, qui medicos deplorat <sup>17)</sup>, quatenus pharmaca ipsis partibus a paralyti correptis, et nequaquam, ut deberent, locis, ex quibus nervi has partes adeuntes oriuntur (columnae scilicet vertebrali), admovent. Ipse vero GALENUS elementa doctrinae de morbis spinae ex HIPPOCRATE hausit <sup>18)</sup>. Quanta enim divisenis in morbis istiusmodi dignoscendis fuerit sagacitas, quaevis fere operum pagina ostendit <sup>19)</sup>. CELSUS doctrinam huc spectantem maxime chirurgiae debuit <sup>20)</sup>. Praeter HIPPOCRATEM, GALENUM et

16) Ed. Chart. de locis affectis L. I. C. 6. p. 7. L. II. C. 6. L. III. C. 8. 10. L. IV. C. 3. 4. 6. L. V. C. 3. L. VI. C. 4. De usu partium L. I. C. 16. T. IV. p. 299. De nervorum dissectione C. I. T. IV. p. 231. De motu musculorum L. I. C. I. T. V. p. 364.

17) De locis affectis. Lib. V. Cap. 4. p. 35. a. Lib. IV. Cap. 4. p. 5. a.

18) In librum HIPPOCRATIS de articularis commentaria IV. Ed. Chart. T. XII.

19) Praedict. L. II. 2. C. 26. Ed. Lind. T. I. p. 506. De articularis C. 37. p. 793. C. 38. p. 794. C. 43. p. 799. 800. C. 46. p. 803. C. 48. p. 805. C. 50. p. 807. De intern. affectionib. Edit. KENN. T. II. p. 452. („Medulla spinalis potissimum reslocatur“ etc.).

20) De medicina L. V. C. 2. p. 266. C. 26. N. 17. Ed. Targae p. 270. L. VI. C. 13. p. 525. L. VIII. C. 14. p. 525.

et CELSUM, de morbis columnae vertebralis inter antiquos bene meruerunt ARETAEUS<sup>21)</sup>, ALEXANDER TRALLIANUS<sup>22)</sup> et PAULUS AEGINETA<sup>23)</sup>. Quorum auctorum doctrinis nil plane a posteris ad restaurationem anatomiae usque additum est. Tunc autem structuram medullae spinalis magis magisque illustrarunt BARTHOLINUS<sup>24)</sup>, BLASIUS<sup>25)</sup>, VIKUSSENS<sup>26)</sup>, HUBER<sup>27)</sup>, MONRO<sup>28)</sup>, FROTSCHER<sup>29)</sup>, LUDWIG<sup>30)</sup> et GALL<sup>31)</sup>. Nihilominus praxis medica parum inde lucri accepit. Quo tempore enim chirurgia auctores classicos de morbis spinæ POTT<sup>32)</sup> scilicet et PALLETTAM<sup>33)</sup> celebrabat, multa-

21) *Diasturnorum Lib. I. C. I.*

22) *De Art. Med. L. I. C. 16.* 23) *Lib. 6. C. 117. p. 336.*

24) *Anatom. renovat. Lib. III. C. 3.*

25) *Anstome medull. spinal. et nervorum iade provenient. Amstel. 1662.*

26) *Nevrographie universalis. Lugd. 1681.*

27) *Progr. de medulla spinali. Goett. 1739. De medulla spinali, specist. de nerv. ab ea provenient. commentatio. Goett. 1741.*

28) *Observat. . . on the nervous system. Edinb. 1783. Vers. germ. Lips. 1787.*

29) *De medulla spinali, ejusque nervis. Erlang. 1788. Recus. in Ludwigs script. neurolog. min. T. IV. p. 70.*

30) *Icones anatomicae. Lips. 1789. Tab. I.*

31) *Anatomic et physiologie du système nerveux. Paris. Tab. 1. 2.*

32) *Remarks on that kind of palsy of the lower limbs, which is frequently found to accompany a curvature of the spine etc. Lond. 1779. Vers. germ. (quauctor): Bemerk. üb. diej. Art. d. Lähmungen d. untren Gliedmassen,*

## 8 DE MORBIS COLUMNAE VERTEBRALIS

multaque opuscula de vertebrarum luxationibus <sup>34)</sup>, fracturis <sup>35)</sup> et carie <sup>36)</sup> possidebat; medici praeter obser-

*welche man häufig bey e. Krümmung des Rückgrats findet.*

<sup>34)</sup> Leipz. 1786.

33) *Anatomisch-patholog. Beobacht. üb. d. mit Lähmung verbund. Krümmung des Rückgrats. A. d. Ital. Tübing.* 1794.

*Ejusd. sulla cifosi paralytica. Mediolan.* 1786.

34) A. PARÉ, *oeuvres*, L. XVI, chap. 17. FAER, HILDANUS, obs. cent. V. p. 458. FRIDERICI, diss. de contorsione vertebr. Jen. 1668. G. BONET, *sepulchr.* Lugd. 1700. T. III. L. V. P. 1V. C. III. p. 371. ZITTMANN, *med. for.* Lips. 1706. Cent. IV. cas. 5. DEGGELER, diss. de luxatione vertebr. Altorf. 1707. SWIFTEN, *comment.* T. I. p. 53. B. D. MAUCHARY, de luxat. nuchae. Tüb. 1747. J. L. PETIT, *tr. des malad. des os.* T. I. p. 109. CUKNOTT, diss. sistens casum subluxat. vertebrae dorsi cum fractura complicatae, duodecima demum hebdomade funestae, Argent. 1761. SCHAARSCHMIDT, *med. chir. Nachr. Th.* 3. p. 339. C. G. LUDWIG, Progr. de luxat. vertebr. colli a medico forensi circumspicte disquirenda. Lips. 1767. v. *Advers. Pract.* II. Vol. 2. p. 253. MURRAY, de spinae dorsi luxat. Ups. 1780. v. *Abh. d. Schwed. Aerzte.* 1. B. p. 159. BÖTTCHER, v. d. *Krankh. d. Knochen.* Bd. 2. p. 110. Act. Soc. med. Hafn. Vol. II. HARRUP, *N. med. journ. Lond.* Vol. 1. P. 4. PREISS, in: *Salzb. med. chir. Ztg.* 1792. Bd. 3. p. 29. SOHNHERRING, *Bemerk. üb. Verrenk. u. Bruch d. Rückgrats. Berl.* 1793.

35) C. G. LUDWIG, progr. de paraplegia ex fract. vertebr. colli. Lips. 1767. et l. c. Vol. III. p. 507. Cfr. MORGAGNI, de sed. et caus. morb. Epist. LVI. Art. 35. BÖTTCHER, l. c. p. 212. LANOTTE, *chirurg. observ.* p. 348. SOHNHERRING, l. c. F. W. NEIGENFIND, *Krankheitsgesch. ein. Mensch., dem ein R.W. zerbrochen war;* in: MERSINNA, *Journ.* 1802. Bd. 2. St. 3. p. 325. PREISS, *Beob. ein. am 6. Tage tödl. abgelaufen. Bruchs des letzt. R.W.-Leins;*

observationes de morbis medullae spinalis in operibus anatomiae pathologicae<sup>37)</sup>, et in tractatibus de spina bifida<sup>38)</sup> et paralysi<sup>39)</sup> obvenientes, plane nil exhibere potuerant; donec I. P. FRANK<sup>40)</sup> tanti argumenti dignitatem viriliter, doctissimeque inculcaverit, nosque maxime ad inflammationem medullae spinalis, a VALERIOLA non plane ignoratam<sup>41)</sup>, multorum sane morborum chronicorum scaturiginem, attentos reddidit. Secuti sunt innumerabiles fere scriptores<sup>42)</sup>.

## §. II.

in: LODER, *Journ.* 1803. Bd. 4. St. 2. p. 282. AMELUNG, *Fall u. Fract. d. 12. R.W.-Beins*; in: HUFELAND, *Journ.* 1804. Bd. 20. St. 4. p. 21.

36) HENAU, diss. an ab ictu, lapsu, nisuve, quandoque, vertebrarum caries. Paris. 1742. FABR. HILDANUS, cent. V. obs. 66. BANG in: *Auswahl a. d. Tagebüch. d. K. Krankenhaus.* 1783. 1. Jun.

37) P. I. ed. alter. Vol. I. Sect. 1. §. IX. 2. §. X. 5.

38) Cap. IV. §. XVII.

39) Cap. XII.

40) Orat. de vertebr. column. in morb. dignitate. Ticin. 1791. v. *Abh. f. pr. A.* 15. Bd. p. 260.

41) Obs. medic. Lib. V. p. 304.

42) S. G. VOSSEL, *Handb. d. pr. Arz. Th.* 4. Stend. 1795. p. 32—35. (ed. alter. 1816—20). PORTAL, obs. sur la nat. et le trait. du rachitism. ou de courbure de la colonne vertébr. Par. 1797. Vers. germ. (qua utor). Lips. 1798. AUTHENRIETH, diss. obs. laes. medul. spin. Tüb. 1811. MUSSY, hist. de quelq. affect. de la col. vertébr. Par. 1812. NIEL, sur l'espine. v. CORVISART, *journ. de méd.* Par. 1812. SCHWALZ, *Diagnost.* in Tab. 2. Aufl. Dresd. 1812 (4. Aufl. 1826). Tab. 57. GATTIER DE CLAUDRY in: HARLESS, n. *Journ. d. angl. med. chir. Lit.* Bd. 9. St. 2. BAYNTON, an account of a successful method of

## 10 DE MORBIS COLUMNAE VERTEBRALIS

### §. II.

#### *De morbis cum peculiari columnae verte- bralis affectione.*

Genera-  
tim.

1. Priusquam autem ad ipsam doctrinam vi-  
tiorum columnae vertebralis perveniamus, gene-  
ratim

*treat. diseases of the spine. Lond. 1813. GORDON, diss.*  
*de morbo vertebr. Edinb. 1813. LATOUCHE in: HARELSS,*  
*l. c. Bd. 7—8. TH. COPELAND, obs. on the sympt. and*  
*treat. of the diseased spine. Lond. 1815 et 1823. Vers.*  
*germ. duae Lips. 1819 prodierunt, KILIAN (qua utor) et*  
*K. HESSH. COLLINGWOOD in: The Lond. med. and phys.*  
*journ. 1816. Vol. 36. RACCHETTI, della struttura, delle*  
*funzioni e delle malattie della midolla spin. Milano 1816.*  
*BRADLEY, obs. on a stridulous affect. of the bowels, and*  
*on some varieties of spinal disease. Lond. 1818. HORN, Archiv*  
*1823. St. 1. p. 49. St. 2. p. 405. J. L. CASPER, üb. d.*  
*Verletz. d. Rückenmarks. Berlin 1823. CH. BELL, obs.*  
*on the injur. of the spine and the thighbone. Lond. 1824.*  
*EDW. HARRISON in: Lond. med. and phys. journ. 1824.*  
*Fol. I. Apr. Mai, et; pathol. and pr. observ. on spinal dis-*  
*eases, etc. Lond. 1827. BOYLE, a tr. on moxa applicable*  
*... with some gener. observat. on spin. diseases. Lond. 1824.*  
*G. B. OLLIVIER, tr. de la moelle épinière et de ses ma-*  
*lad. Par. 1824. 1827 (qua utor), 1837. Vers. germ. J. RA-*  
*DIUS, Leipz. 1824. C. WENZEL, üb. d. Krankh. am Rückgr.*  
*Mit 8 Kupfertaf. Hamb. 1834. Fol. PETRONELLI, réflex.*  
*sur quelq. lésions de la moelle épin. Montp. 1826. FACHS*  
*in: Ephém. de Montp. 1827. WITTFELD, Full cin. organ.*  
*R. M. Kr. in: HORN, Archiv. 1827. St. 3. p. 478. J. AUER-*  
*CROMBIE, pathol. and pr. research. on diseases of the brain*  
*and the spinal cord. Lond. 1828. Third. ed. 1834. Vers.*  
*germ. G. v. D. BUSCH. Bremen 1829 (prima hujus operis*  
*elementa in: The Edinb. med. and surgic. journ. 1818 et*  
*19. Vol. 14 et 15 continentur et versa sunt a Fr. DE*

ratim in morbos, quibus peculiaris columnae vertebralis affectio familiaris est, oculi ictum conji-  
cimus. 2. Febres

BLOIS, Bonn. 1821). F. HUTIN in: *N. bibl. méd.* 1828.  
Jan. Fév. CALWEIL in: *Journ. des progrès.* 1828. XII.  
VALPRAU, Zerstörung u. Missbild. des Rückenmarks und  
ihre Einflüsse in: HARLESS, *n. Jahrb.* Bd. 12. St. 2. p. 91.  
J. HINTENBERGER, Beiträge z. d. Rückgr.-Krankheit. in:  
Salzb. med. chir. Ztg. 1828. Bd. 3. N. 54. Ejusd. Rück-  
grathekrankheit, unter d. Form v. Kindbettfieb. u. d. febr.  
nerv. Sydenh. in: HUFELAND, *Journ.* 1830. St. 2. p. 53.  
W. WALLACE, ein Fall, welcher die Folgen ein. Zer-  
trennung des R. M. zwischen dem 3. u. 4. Rückenwirbel  
beim Mensch, erläutert, in: *N. Samml. auserles. Ab-  
handl.* 1829. Bd. 12. St. 3. p. 522. M. SCHLESINGER, ein  
Beitrag z. Lehre v. d. R. M. Krankh. in: HECKER, *lit.  
Annal.* 1829. Mai. p. 74—102. HOFER, Geseh. ein. merk-  
würd. Krankh. des H. Gehirne u. Rückenmarks, nebst  
dem Sectionsbefunde; in: HUFELAND, *Journ.* 1829. Decbr.  
p. 79—93. HEUSSNER, merkwürd. Fülle v. R. M. Krankh.  
in: CASPER, *Repertor.* 1830. Bd. 27. II. 3. R. A. STAFFORD, a  
tr. on the injur., the disease, and distortion of the spine.  
Lond. 1832. J. W. ARNIM, ein. Beobachtg. als Beitr.  
z. Lehre üb. die Krankheiten d. Rückenwirb.-Säule; in:  
*Oesterr. med. Jahrb.* 1833. Bd. 5. p. 444. W. B. FRAEN-  
KEL, üb. Gelenkkrankh. u. insbesondere üb. d. Krankh.  
d. Wirbelsäule, in: GRAHVE u. W. *Journ.* 1833. Bd. 19.  
p. 565. M. ROCHOUX, rech. sur l'apoplexie et sur plusieurs  
autres malad. de l'appareil cérébro-spin. Par. 1833. E. ENG,  
Beobacht. üb. mehr. der symptomat. Krankheitsform.,  
welche bei Empfindlichk. ein. gröss. od. klein. Stelle d.  
Wirbelsäule vorkommen, in: RUST, *Magaz.* 1834. Bd. 41.  
H. 2. p. 195 et Bd. 44. H. 1. 2. J. B. FRIEDRICH, d. neuest.  
Erfahr. u. Ansicht. üb. d. Krankh. des R. M. in: SCHMIDT,  
*Jahrb.* 1834. Bd. 3. p. 229. H. P. ROBERTS, Fall ein.

## 12 DE MORBIS COLUMNAE VERTEBRALIS

Febres. 2. *Febres intermittentes* plerumque frigore a *lumbis per spinam assurgente*<sup>1)</sup> ordiuntur, quaeque, dum ut *perniciosae tetanicae et epilepticae* decurrunt, affectionis inflammatoriae medullae spinalis suspicionem movent<sup>2)</sup>. Fonticulis lateribus spinae

Krankh. des R. M. ex: Lond. med. gaz. 1834. Vol. 13. March 22. in: SCHMIDT, Jahrb. 1835. Bd. 5. p. 168. L. M. REY, sur la pathogén. de quelq. affect. de l'axe cérébro-spin. etc. Par. 1834. S. ANNAN in: The Americ. journ. of med. sc. 1837. Maj. ZHUBER, eine organ. Krkh. d. Rückenz., welche sich vorzüglich als nervöses Hüftweh aussprach, in: Oesterr. med. Jahrb. 1837. Bd. 13. p. 568. NISSE, Beitr. z. d. Krankh. d. R. M. Gebilde, in: PFÄFF, Mittheil. a. d. Geb. d. Med. Altona 1837. II, 9 u. 10. p. 1—61. F. FALGHE, diss. de morb. nonnull. med. spin. cognitione. Berol. 1837. PH. SAUPE, diss. de mollitiei med. spin. pathologia. Berol. 1837. J. LUSKE, diss. de cognoscend. medullae spin. ejusq. membran. morb. Berol. 1838. J. S. WAUGH, the science of the cerebro-spinal phenomena. Lond. 1839. Samml. z. Kenntniss d. Gehirn- u. R. M. Krankheit. Stuttg. 1839. 2. Hft. (praepremis de myelitis dissert). ANDRAL, Vorles. üb. d. Krankh. d. Nervenheerde. A. d. Fr. v. FR. J. BEHREND. Lpz. 1839. L. W. MAUTHNER, Gesch. ein. merkwürd. Krankh. des R. M. bei einem Kinde; in: HUPFELD, Journ. 1839. St. 3. p. 37. (hypertrophia cerebri et medullae spinalis). PH. HUNTING, Untersuch. z. Pathologie d. Rückenmarks, in: NASSER-GOTTSCALK, Samml. d. Gehirn- u. Rückenmarks-Krankheit, Bd. 1. II. 1.

1) P. I. ed. alter. Vol. I. Sect. I. Cap. II. §. XXII. 2.

2) Cfr. cap. XII et XIV. E casibus, ab E. ENZ (RUST, Mag. 1835. Bd. 44. St. 1.) allatis (quatuor ad hemitritaneum pertinens), febres intermitt. medullae spinalis affectione complicatas esse aut ex illa provenire posse, sufficienter



spinae lumbalis appositis, typum febris quartanae rebellis debellavimus. *Febris nervosa acuta* ut plurimum *lumborum dolore* invadit \*), qui dolor quo magis saevit, eo graviores morbum indicat \*). Neque aliter res in *febre nervosa lenta Huxhami* se habet \*). In utraque febre frictiones spirituosae secundum spinae curriculum institutae, periclitantem vitam haud raro restaurant \*). *Febres rheumaticae*, quo magis involucra medullae spinalis, imprimis circa cervicem laedunt; eo graviores esse solent \*).

## 3. Quum

alucet. C. F. MAILLOT (*tr. de fièvres ou irritat. cérébro-spin. intermitt. d'après les obs. rec. en France, en Corse et en Afrig. Par. 1836*) medullae spin. plam matrem illis febrib. defunctorum plane injectam, nec non medullam ipsam mollitam, invenit. SEIDLER, febr. intermitt. mit Rückenmarksentzünd. complicirt, in: *Med. Ver. Ztg.* 1837. N. 17. C. KREMER (*Beobacht. u. Unters. üb. d. Wechselfeb. Aach. 1837*) febris intermittens symptomata medullae spinalis affectionibus, ex organo, ab illa nervos accipiente, morbozo pullulantibus, adscribit et dolorem vertebrarum dorsi primarum symptoma febris intermittens pathognomonicum accipit. Cfr. DELPACH, *infra* (*orthopaedia*) citand.

3) 1. l. ed. alter. Vol. I. Sect. 2. cap. V. §. XXI. 2. Has febres recidivas esse, monet ENZ, l. c.

4) l. c. 10. De febre Glascoviae regnante et affect. inflamm. cerebri et medullae spin. stipata, lege SYM in: *the Edinburgh. med. and surg. journ.* 1818. N. 55. E. ENZ (l. c. et *Ibid.* 41. II. 2. p. 195) monet, ex nimis loco sensibili medullae spinalis et columnae vertebralis febres nervos exire posse.

5) l. c. 4. 6) l. c. 42.

7) Casum refer' J. HINTERBERGER (*Heidelb. klin. Annal.*

## 14 DE MORBIS COLUMNAE VERTEBRALIS

Exanthemata et impetiginosa.

3. Quum cutis a spina nervos maxime accipiat \*), conditiones illius morbosae in febribus e. c. *peticulae*, *ecchymomata*, a labefactione principii nervei medullae spinalis repeti possint. De miliaribus ex medullae spinalis laesione ortum trahentibus jam monuimus \*). Et *zoster* hemiplegiarum instar, dimidium tantum corporis latus, et quidem plerumque a spinae dimidio ad lineae albae dimidium occupans, ac gravibus quandoque symptomatibus, ut anxietate, lipothymia, stipatus, forte nexum cum affectione medullae spinalis habet. *Variolarum* contagium primos effectus in medullam spinalem exercere, dolor dorsi et lumborum stadium invasionis comitans, indicat, qui dolor, quo major est, eo graviores morbum designat <sup>10</sup>). *Leporam*, morbum scilicet cutis systemati nervoso infensissimum, maxime medullam spinalem aggredi, symptomata, quibus stipatur <sup>11</sup>), docent: sensus scilicet formicationis, anaesthesia tactus, major coeundi

1829. *Ibid.* 5. II. 3. p. 428) febris atrocissimae et letalis. „Die dura mater spinalis war röthlich, an den Austrittsstellen der untern Nerven schwürzlich; die pia mater in dem Halswirbelkanale weiss mit hellrothen strotzenden Gefässen durchwebt, im untern Theile hell- u. dunkelroth“ etc.

8) §. 1. N. 2. (14) Cfr. Cap. XIII. §. LXVII. De induratione textus cellulosi.

9) P. I. ed. alt. Vol. II. Sect. 2. Cap. VIII. §. XLVII. 2. (19)

10) *Ibid.* Vol. III. Sect. 1. Cap. IV. §. XXI. 2. (16).

11) *Ibid.* Vol. III. Sect. 2. Cap. XX. §. LX. 6.

coëundi potentia <sup>12)</sup>, et torositatis musculorum amissio. In plica omnes systematis nervosi inter partes medullam spinalem quam maxime pati, dictum est <sup>13)</sup>, ac pluries iterum comprobandi adveniet opportunitas. Praevio lapsu super spinam dorsi, plurimos tumores steatomatosos super cutem extremitatum, praecipue superiorum, evolutos conspeximus.

4. *Vocem et functiones respirationis* <sup>14)</sup> et *circuli sanguinis* haud raro a vitiis medullae spinalis <sup>Morbi laryngis et pectoris.</sup> laedi, jam GALENUS docuerat <sup>15)</sup>; plurinaque a nobis in medium proferenda raucedinis, dyspnoeae, motusque abnormis cordis <sup>16)</sup> exempla confirmabunt. Neque id mirum videbitur perpendenti nervum accessorium WILLISII cum vago, laryngeos

emit-

12) Vide infra N. 6.

13) L. c. Cap. XXII. §. LXXIII, 5.

14) „Die Beschwerden in der Respiration, die wir als Folge der Affection des Rückgraths sehen ... bezeichnen im Ganzen den Uranfang dieses Uebels.“ WENZEL, l. c. p. 275. v. casum, a WALLACE, l. c., relatum.

15) De locis affectis L. V. C. 3. Ed. Chart. T. 7. p. 482. „... in spinalis medullae affectibus, quomodo respiratio laedatur, thorace proprio affectu nequaquam laborante, ad vel nervo quopiam a spinali medulla procedente, vel spinali medulla ipsa.“

16) In corpore defunctae magna respirandi difficultate cum dolore in cordis regione, palpitatione vehementi, irregulari et diffusa, nil reperiebatur, quam pars medullae cervicalis inferior plane emollita, in substantia medullari sanguis fluidus limpidusque, vasa membranorum turgida et arachnoidea opaca. Ex *Archiv. gén. de méd. Fév.* 1834 in: FROBER, *Notiz. Bd.* 41. N. 4. p. 64.

## 16 DE MORBIS COLUMNAE VERTEBRALIS

emittente, arctissime jungi, *diaphragma* et *musculos thoracem moventes*<sup>17)</sup>, nervos a pari quarto cervicalium et a ramis anterioribus nervorum dorsaliū accipere<sup>18)</sup> et *cor* a nervo intercostali utpote nervum cardiacum superficiale aliosque ramos cardiacos suppeditante et ad plexum cardiacum formandum maxime concurrente, potenter regi; de quo argumento praeter GALENUM<sup>19)</sup> legi inerentur VERNAY<sup>20)</sup>, MORGAGNI<sup>21)</sup>, ELLER<sup>22)</sup>, ZINN<sup>23)</sup>, LE GALLOIS<sup>24)</sup>, BRODIE<sup>25)</sup>, EVER. HOME<sup>26)</sup>, RACCHETTI<sup>27)</sup>, C. F. BELLINGERI<sup>28)</sup>, A. C. BOCK<sup>29)</sup>, C. BELL<sup>30)</sup>,

17) In casu memorabili ab A. SHAW (FRONHEF, *Notiz. Bd. 41. N. 14. p. 217*) allato musculi externi, qui unacum diaphragmate inspirationi inserviunt, solummodo respiratoris munere fungentes paralytici erant, in caeteris autem corporis motibus vim contractivam incolumem servabant.

18) De vi cerebelli et medullae spin. in respirat. legatur JON. GROSS, in *Annals of Philos. by THOMSON. Lond. 1815. Febr.*

19) De locis affectis. L. III. C. 10. p. 20. 21.

20) DU HAMEL, R. Sc. Acad. Hist. L. 3. S. 5. C. 2. N. 1.

21) Op. c. Epist. III. N. 3.

22) De morbis acutis 224.

23) Exp. circa corpus callosum in LUDWIG script. neurolog. minor. T. IV. p. 123.

24) *Expér. sur le principe de la vie, notamment sur celui des mouvements du coeur et sur le siège de ce principe. Paris 1812.* Minoris momenti objectiones a WILSON PHILIPP adversus LE GALLOIS experimenta factas habeo (*the Lond. Med. Repos. Vol. V. 1816. Jan.*).

5) *Philosoph. Transact. J. 1812.*

26) *Philosoph. Trans. 1815. P. I. p. 91.* 27) Op. c. v. 229. 233.

8) De medulla spin. nervisq. ex ea prodeuntib. etc. Aug. Taur. 1823. Vers. germ. H. KAULLA. Stuttg. 1833.

29) *Darst. d. Gehirns, Rückenmarks u. d. Sinneswerkz Lpz. 1824.*

C. BELL <sup>30</sup>), ROMBERG <sup>31</sup>), WILLIAM et DANIEL GRIFFIN <sup>32</sup>), J. MARSHALL <sup>33</sup>); E. ENZ <sup>34</sup>), MARSHALL (HALL <sup>35</sup>),

30) *An exposition of the natural syst. of the nerves of the hum. body.* Lond. 1824. 1830. 1837. Vers. germ. v. M. H. ROMBERG. Berl. 1832. *Append. to the papers of the nerves.* ib. 1827. *On the nervous circle which connects the voluntary muscles with the brain,* in: *Philosoph. Transact.* 1826. p. 163—173 (Autor celeberrimus „respiratory nerves,” i. e. apparatus nervorum in medulla spinali radicans et organa respirationi dicata gubernantium describit).

31) *Neuropathologische Stud.* in: *Rust Mag.* 1830. Bd. 32. H. 2. p. 281—309. H. 3. p. 473—494. et in: CASPER, *Wochenschr.* 1836. N. 19. 25. 38. 1837. N. 45 (epitoma Belliana propriis cum observationibus. Nervi respiratorii, corpus olivare inter at restiforme exsunt, sunt: N. facialis, glossopharyngeus, lingualis, vagus, accessorius, phrenicus et respiratorius externus. Accessorio musculus sterno-cleido-mastoideus et trapezius, respiratorio externo serratus magnus anticus at phrenico diaphragma funguntur. Altera ex parte inspiratio musculis, qui medullae spinali nervos debent; expiratio vero non nisi medulla spinali musculos abdominis contrahente perficitur. Sunt ergo nervi respiratorii in conservanda vita maximi momenti, ut autor sat luculenter enucleavit).

32) *Observ. on functional affect. of the spinal cord and ganglionic syst. of nerves, in which sympathetic, nervous, and imitative diseases are illustrated.* Lond. 1834 (praecipue de medullae spinalis ejusdemque nervorum irritatione morboza disserunt).

33) *Pract. observ. on diseases of the heart, lungs, stomach, liver etc. occasioned by spinal irritation: and on the nervous syst. in general, as a source of organic disease. Illustrated by cases.* Lond. 1835 (Multos affert morbos, ex affectione medullae provenientes, s. c. octo casus morborum).

Frank Prax. II. 1. 2. 1.

B

## 18 DE MORBIS COLUMNAE VERTEBRALIS

HALL<sup>34</sup>), H. SMITH<sup>35</sup>), R. D. GRAINGER<sup>37</sup>), G. W. MÜXTER<sup>38</sup>) et ARNOLD<sup>39</sup>).

Morbi abdominis.

5. Sicuti vero musculi thoracis agendi vim a nervis medullae spinalis accipiunt; ita et musculi abdominalis<sup>40</sup>). Affectiones eorum chronicae, ple-

rum-

cordis vasorumque majorum; sex cas. phthisis pulmonalis; duos asthmatis etc.)

34) l. c. in: *Rust Mag.* 1836. *Bd.* 44. *St.* 1 (Tussim et oppressionem pectoris saepissime medullae spinalis affectionis symptomata esse. Phthisin pulmonalem haereditariam non raro irritatione medullae spinalis provocari; ut fratres GRIFFIN jam admonuerunt).

35) *Memoirs on the nervous system*, Lond. 1837 (opus maximi pretii, praecipue quoad systema excitomotorium s. vim illius medullae spinalis partis et quorundam nervorum, a cerebro non dependentium). Cfr. ejusd. *Ueb. d. reflectirende Function d. verlängert. R. M.* ex: *Philos. transact.* P. 2. p. 635. in: *MÜLLER Archiv* 1834. *II.* 4. p. 374—384.

36) *Untersuch. d. Ansicht. v.* CHARL. BELL, *üb. d. anat. u. phys. Eigenschaft. d. R. M.* ex: *Americ. Journ.* 1837. *Aug.* in: *SCHMIDT, Jahrb.* 1838. *Bd.* 20. p. 9. (decedit in singulis a BELLIO, quod vix, na vix quidem probamus).

37) *Obs. on the struct. and funct. of the spinal cord.* Lond. 1838. (assentit HALLIO).

38) *Vers. ein. neuen Theoris d. Verrichtung. d. Gehirns u. Nervensyst.* etc. *Lpz.* 1838. (perlustrat, modo HALLII, motus irritatione reflexos).

39) *Unters. im Geb. d. Anat. u. Phys.* 1. Bändch.: *üb. d. Bau d. Gehirns u. R. M.* Zür. 1839.

40) §. [I. N. 2. (13.) Post multos labores sub ardentibus solis radiis vir, habitans Lezano, in dolorem incidit spiniae inter ultimam vertebra dorsalem et primam lumbalem ad costas lateris dextri extensum, qui jam per annum saevit. Aeger dumtaxat pedibus insistere aut corpore

rumque a spina originem ducunt, ac saepe nimis cum morbis viscerum subjacentium confunduntur<sup>42)</sup>. Verisimile quoque est motum peristalticum intestinorum a medulla spinali nervi intercostalis ope gubernari<sup>43)</sup>.

6. Nervi vesicae urinariae<sup>44)</sup> et partium ge-  
Morbi pel-  
vis.

B 2

ni-

erecto incedere potest, dum manus utrinque aut costis spuritis aut inferioris abdominis partibus super inguina vehementer admovet: aliis anim antrosum cadit.

41) J. MARSHALL, l. o. tales casus, et quidem quatuor hepatis morbis, totidem dyspnoeae, unum cardialgiae atrocissimae etc., omnes in medulla spinali radicales, affert.

42) RACCHETTI l. c. p. 231. A. COOPER (treat. on dislocat. and on fract. of the joints. Lond. 1822. Second edit. 1823), de affectibus laesionum traumaticarum circa columnam vertebralem dissens, illis adscribit: „distention of the intestinal canal; and connected with this we have to observe the remarkable flaccidity of the abdominal muscles.“ WUNDERLII observationes extra dubium ponunt, digestionis organa a medulla spinali affici. Addit autor l. c. p. 275: „In der Folge wird es deutlich, dass der gestörte Einfluss der Nerven auf die Organe, die zum Schlingen erforderlich sind, zur Steigerung dieser Beschwerden (alimenta sumendo) beiträgt.“ Et p. 277: „dass die Bauchmuskeln in ihren Verrichtungen gestört, ihre Wirkungen auf den Darmkanal mehr oder weniger beeinträchtigt sind; dass darum dem Darmkanale keine beschränkende Einwirkung seiner krankhaften Ausdehnung entgegensteht.“ J. HINTERBERGER, l. o. quatuor observationes huc spectantes affert. In Cholerae intestinorum affectiones et ex medulla spinali oriri, quis est, qui dubitet? Cfr. HINTERBERGER, cap. III. §. XI. 2. citand.

43) §. 1. N. 2. (3.)

## 20 DE MORBIS COLUMNAE VERTEBRALIS

*nitidum* \*<sup>4</sup>) quum a medulla spinali proveniant, in difficultatibus urinae \*<sup>5</sup>), impotentia virili, sterilitate \*<sup>6</sup>), flore albo \*<sup>7</sup>), chlorosi, graviditate \*<sup>8</sup>),  
abor-

41) Cfr. WALTHER, Tab. nerv. thorac. et abdom. Tab. I. II.

45) „Diese Erscheinung (urinae retentio et incontinentia) scheint durch ein Gesetz, dem die Nerventhätigkeit unterworfen ist, erklärt werden zu können, nämlich dass ein gewisser Grad von Druck oder Reiz Krampf oder Convulsionen erzeugt, ein höherer Grad desselben aber Kraftverlust oder Lähmung veranlasst.“ WALLACH, l. c. G. CH. OESTERLEN, Beobacht. ein. gänzl. Zerreis. d. fibrösen Gebilde d. Wirbels, nebst ein. Bemerkung über paralytische Urinanhaltung, in: Heidelb. klin. Annal. Bd. 8. II. 3. p. 407 (ischuria, etsi urinae vesica repleta).

46) E. HARRISON, on the influence of disturbed spin. nerv. ... as cause of sterility in both sexes; in RHEN, the monthly gaz. of pr. med. N. 1. Ejusd. an essay on the powerfull influence of the spinol nerv. over the sexual organs etc. Lond. 1831. Domusculum inter, insectorum dorso affixum, eorumque ovaria consensum esse, fertur, N. act. acad. nat. cur. Vol. XII. P. II.

47) Anonymus, in RHEN l. c. 1831. Jan. p. 21. operis JEWELL (pr. obs. on leucorrhoea. Lond. 1831.) rationem reddens, monet: „This variety of fluor albus I have generally traced to morbid excitement of the nerves of the lumbar portion of the spine, frequently occasioned by irregularity in the vertebrae.“

48) De graviditatis effectu in medullam spinalem disserit FR. L. MEISSNER (SIBBOLD Journ. 1828. Bd. 7. p. 372) et enarratis quatuor casibus lethalibus (= myelitis), concludit p. 390: „Es ist noch weit natürlicher, wenn die Schwangerschaft einen unmittelbaren Einfluss auf die Plexus hypogastrici, sacrales u. den Plexus coccygeus äussert, die nämlich genau mit dem untern Theile des Rücken-



abortu, gonorrhoea, et in tabe dorsali ad columnam vertebralem continuo respiciendum esse patet.

7. Enimvero in *tabe*, quam *dorsalem* vocant, Morbi tabifici. non solum, sed et in aliis plurimis tabis speciebus<sup>49)</sup> suspicionem originis morbi e specu vertebrali haud vilipendendam ducimus. Non quidem ut antiquam illam hypothesin atque a HALLERO<sup>50)</sup> et MORVANO<sup>51)</sup> refutatam, nervos principium nutriendi largiri, recoquere satagamus; sed propterea quod nutritionis processum, praeter cerebrum, nervi vagi ope, quammaxime a medulla spinali pendere existimamus. Notum enim est arterias imi ventris, officinae scilicet chyli, undique a nervis ab intercostali potissimum provenientibus circumdatas esse<sup>52)</sup>, — reproductionis opus in animalibus omnis generis directam cum evolutione medullae spinalis agnoscere rationem<sup>53)</sup>, — et columnae vertebralis laesiones *atrophiā* partium, ex loco affecto nervus accipientium, commitari.

#### 8. Quod

*marks zusammenhängen.*<sup>54)</sup> Jam prius STIMOLD (*Handb. z. Erkenntn. u. Heil. d. Frauenzimmerkrankh. Frankf. 1823. 2. Aufl. p. 237*) de hoc argumento disseruit. Myelitis acutae casum, illa ex causa exortae, offert J. S. ROSKENTHAL in: HORN, *Archiv. 1834. St. 4. p. 565.*

49) J. MARSHALL, l. c., quinque casus tabis mesentericae offert.

50) *Elem. physiol. T. IV. p. 404.*

51) *On the nervous system. Cap. 24. Edinb. 1785.*

52) RACONETTI l. c. p. 430.

53) *Idem, ibidem. p. 431.*



## 22 DE MORBIS COLUMNAE VERTEBRALIS

Morbi ex-  
tremita-  
tum.

8. Quod quidem atrophiae genus nullibi crebrius, quam in *extremitatibus*, praecipue *inferioribus* obvenit, quae propterea partes quammaxime affectionibus *paralyticis*, *teticis* aliisque generis *convulsivi* et *contracturis* ex vitio spinae pullulantibus subjiciuntur.

### §. III.

*De rerum positionibus evolutioni morborum columnae vertebralis faventibus.*

Genera-  
tim.

1. Verum ut morborum e columna vertebrali originem trahentium causae cognoscantur, rerum positiones, spinae labefactioni faventes, generatim ad trutinam vocandae sunt:

Laesiones  
externae.

2. Primum inter illas occupant locum *laesiones externae*. Spectant huc: res foetus tergum in utero ferientes, mala infantes portandi ratio, joca gymnastica, inprimis ante complementum, corporis suscepta<sup>1)</sup>, punitiones dorso inflictae<sup>2)</sup>, por-

1) Probe id notent fautores exercitii illius gymnastici, quod Germani *das Turnen* vocant.

2) Ex verberatione, saltem ex ictibus dorso inflictis, milites saepissime morbis spinae laborant. Nullibi vero affectio spinae evidentior est, quam in hominibus quibus poena *Knut* inflicta fuit. Vilnae quinque cadavera homicidarum, quingentis ictibus *Knut* interfectis, quorum homicidarum duo, sub ipso poenae curriculo, reliqui vero paucis elapsis inde horis, praevia retentione alvi et urinarum, animam exhalaverunt, examini subjeci. Livida et nigra erat postica trunci superficies. Sub integumentis dorsi cruor extravasatus ad quinque et ultra pollicum

portatio ponderum super capite<sup>3)</sup>), violentiae externae luxationes<sup>4)</sup> et fracturas<sup>5)</sup> vertebrarum producentes, concussio spinae saltu vel lapsu ex alto<sup>6)</sup>),

ab

altitudinem conspiciebatur. Musculi propinqui friabiles erant, meningeae et medulla spinalis rubrae, extravasato aëroso cruento circumdatae ac ecchymomatibus notatae. Cor et aorta omnino sanguine orbata. „Von Schlägen auf den Rückgrath u. die Gegend des Kreuzbeines habe ich mehrmals diese Folgen (vertebrar. inflamm. et suppurat.) gesehen.“ WENZEL, l. c. p. 249. KILIAN (l. c. p. 62. N. 4) praeparatum attentione dignum militis ex ictu aclopeti in cervicem defuncti, describit.

3) e. c. rusticae at famulae montes vel scalas cum amphoris aqua repleta capiti impositis ascendentes, maxime vero bajuli Italici (*facchini*) gravissima, quae ab hominibus unquam portari vidi, pondera capite et dorso ferunt.

4) CRUYLHIER, *zwei Fälle v. allmährl. Druck (vertebris luxatis) aufs R. M.* ex ejusd. *Anat. pathol. livr. 25. pl. 4.* in: SCHMIDT, *Jahrb. 1839. Bd. 21. p. 47.*

5) VERIN *Splitterbruch des Heiligenbeins* in: HOLZNER *Hannöv. Annal. 1836. Bd. 1. H. 1. p. 32. sq.* (duo casus lethales),

6) In cadavere post lapsum ex altitudine sodecim pedum ad posteriora dia altero defuncti inveniebantur duae vertebrarum dorsi percussae, spina inflammata et medulla partia laesae continua. GIBSON u. JUL. *Mag. 1823. St. 6. p. 196.* WALLACH *Fall ein. Zerreiss. d. R. M.* ex: *Transact. of the soc. . . in Ireland. Vol. 5. N. 10. p. 196. Dublin. 1828.* in: GIBSON u. JUL. *Mag. Bd. 17. p. 188.* SANDRAS *üb. d. speziellen Zeich. d. Verletzung. . . u. R. M.* ex: *Journ. gén. de méd. 1829. Doct. in: ib. 1830. Bd. 20. p. 509.* HANKEL *Verletz. des Rgr. mit gänzl. Zerreiss. des R. M.* in: *Med. Ver.-Ztg. 1833. N. 2.* FRIEDRICH l. c. p. 236. MONTAULT, *üb. eine Commotio spinæ*, ex:

## 24 DE MORBIS COLUMNAE VERTEBRALIS

ab itinere super vias saxosas aut inaequales in carris <sup>7)</sup> instituto, porro nisus in ponderibus elevandis <sup>8)</sup>, laboribusque variis perficiendis.

Laesiones  
internae.

3. Columna autem vertebralis non solum per externas, sed etiam per *internas violentias* laedi potest. De anevrismatibus aortae <sup>9)</sup> et abscessibus <sup>10)</sup>

*Journ. hebdom.* 1836, *Mars.* N. 11. in: DIEFFENBACH *Ztschr.* 1836. *Bd.* 2. p. 374. MERDOUSIE in: *Journ. gén. des connoiss. méd. prat.* 1836. T. 3. in: *Salzb. med. chir. Ztg.* 1837. *Dezbr.* 4. J. BRENNER v. FELSACH commot. cerebri et medullae spin. in: *Oesterr. med. Jahrb.* 1837. *Bd.* 13. p. 157. VOIGT *südl. Verletz. d. untern Theile des Rgr.* in: *Med. Ver.-Ztg.* 1837. N. 33. p. 164. F. BEUSH *Fall v. R. M.-Verletz.* in: HUFFLAND *Journ.* 1839. *St.* 3. p. 3. B. BRODIE, *pathol.-chir. Beobacht. üb. d. Verletz. des R. M.* ib. p. 20.

7) In Lithuania divites et nobiliores, itinera velocitatis causa in carris (vulgo *bryczka*) instituere minime pudet, quae itinera instituendi ratio, si contra consuetudinem accidat, saepe gravibus columnae vertebralis vitis ansam praebere exuperior. Affectionis exemplum columnae vertebralis ex itineribus continuis et defatigantibus exortae habet WENZEL, l. c. p. 253.

8) „Das Aufheben und Tragen schwerer Lasten auf dem Rücken.“ WENZEL, l. c. p. 248.

9) HODGSON, v. d. Krankheit, d. Arter, u. Ven. A. d. Engl. v. CORNEWAIN. *Hannov.* 1817. p. 20 (vertebrae lumbales ex aneurysmate destructae; altero in casu vertebrae 3. 4 et 5. dorsi ex cordis hypertrophia). WENZEL l. c. p. 249. *Beobacht.* 20. TH. MOLISON, *Fall ein. Aneurysma d. Aorta, verbunden mit ein. Krankh. d. R. M.* ex: *Transact. of the med. and s. soc. of Edinb.* Vol. 3. P. I. p. 173. in: *N. Samml. auserles. Abhandl.* 1829. *Bd.* 12. *St.* 2. p. 265. (Et corpora quatuor vertebrarum laesa, et medul-

bus<sup>10)</sup> musculorum, imprimis psoae<sup>11)</sup>, loquimur, ut frequentibus morborum columnae vertebralis caussis<sup>12)</sup>.

4. Si  
 lan spinalis portio colore ac consistentia ex aneurysmate degenerata). J. MARSHALL l. c. (in introductione duos casus refert). *Sehr selten. Fall v. Aorten-Aneurysma, welches das R. M. durchbohrte.* FROBIEP Notiz. 1837. Bd. 4. N. 4. (Aneurysm, ovi gallinaei magnitudine, corpus vertebrae tertiae et quartae dorsalis perforaverat; medullam nervorumque spinae radices anteriores compresserat).
- 10) WENZEL l. c. p. 253 ejusdem observationes, OIL. CH. BELL, appendix etc. l. c. (abscessus nichae destruxerat ligamentum vertebrae cervicalis secundae transversum, quo medulla oblongata laesa).
- 11) *The New England Journ. of med. and surg.* 1816. Vol. 5. BEDINGFIELD, *Compend. of med. practic.*
- 12) Nec silentis praetereundi sunt alii tumores omnis generis, aut extra aut intra vertebrae exorti, istas medullamque spinalem comprimentes (MORON, ex *N. bibl. méd.* 1827. Mai, in: FROBIEP Notiz. 1827. Bd. 18. N. 2), et destruentes (ROBERTS *Folgen v. Druck einer Geschwulst auf d. R. M.* (Medulla sub tumore inter 10 et 11. vertebrae dorsalem absorpta), ex *Lond. m. and s. j.* 1834. Vol. V. N. 107, in: SCHWABT, *Jahrb.* 1834. Bd. 2. p. 293); nec non ossicula in membranis medullae (MAYO, *outlines etc. Cap. V.* OTTO *Lehrb. d. pathol. Anat.* Bd. 1. p. 437. REY, l. c. obs. 5), aut ossis fragmenta (REY l. c. obs. 11 et 12); tubercula spinae (G. B. PALLETTA, *exercit. pathol. Mediol.* 1820. Cap. IX. art. 3. HORN, *markschwammige Tuberk. auf d. Wirbels.* in: *Archiv.* 1833. St. 4. p. 614. FRIEDMANN l. c. p. 235. A. NÉLATON *Unters. üb. d. Knochen-Tuberk.* ex: *Archiv. gén. de méd.* 1837. Fév. in: FROBIEP Notiz. 1837. Bd. 4. N. 13) et in medulla (DEVERNOY *Tuberkelbild. im Gehirn v. R. M.* in: *Med. Correspondz.-Bl.* 1833. N. 1. EAGER *Fall v. Tuberk. im R. M.* ex:

**Plethora.** 4. Si viam tortuosam, quam arteria vertebralis in epistropheo, in atlante et circa foramen magnum occipitis sequitur, perpendamus, palam fit, malam structuram primae et secundae vertebrae, aut congestiones aliaque impedimenta in cerebro itineri ulteriori cruoris obstare, unde *plethora* saltem ad vertebrae cervicales expectanda. Plethora quoque specus reliqui vertebralis expectanda; si aut obstructiones viscerum abdominalium, aut faeces et flatus intestina distendentes, aut uterus gravidus <sup>13)</sup>, aut nixus sub partu, impediant, quo minus aorta abdominalis sese, quo decet, modo per multiplices suos ramos in viscera ventris depleat. Hoc nimirum in casu, sanguis in parte thoracica aortae congestus, ut majori copia in arterias subclavias, arterias intercostales primas largientes, et in reliquas arterias intercostales immediate ex aorta provenientes irruat, oportet. Quod si accidat, plethora arteriosa columnae vertebralis inevitabilis est, cum cujusvis arteriae intercostalis ramus alter per foramina intervertebralia ad medullam spinalem perveniat, et cum arteriis spinalibus anastomosin habeat. Sciendum quoque hasce arterias anevrismatibus laborantes detectas fuisse <sup>14)</sup>. Porro: cum plurimae spe-

*Arch. gén. de méd.* 1834. Avril, in: SCHMIDT, *Jahrb.* 1834. Bd. 4. p. 162. J. BRICHTEAU *cliniq. méd. de l'hôp. Necker etc. Par.* 1835.) etc.

13) De hoc argumento FRID. HOFFMANNUS legisse non poterit (Med. rat. syst. T. IV. C. I. Obs. 3).

14) MALACARNE *Encephalotomia nuova univ.* Torino 1780.

specus vertebralis venae sese in venas intercostales depleant, venae vero intercostales omnes, praeter primam (utpote sese plerumque in venam subclaviam deplentem) in venam azygos terminentur, vena autem azygos sanguinem in venam cavam descendentem evacuet; sequitur, singulas causas, quae huic evacuationi obstant (e. c. vitia pulmonis et cordis dextri), plethoram venosam (vulgo haemorrhoidalem <sup>14</sup>) specus vertebralis necessario jure gignere debere. Quae omnia si perpendas, quantum detrimentum medulla spinalis ex suppressis menstruis, haemorrhoidibus aliisque haemorrhagiis capere debeat, facile intelliges <sup>15</sup>).

5. Rustici, hortulani, alique labores antror-  
sum flexo corpore sub radiis solaribus exercentes, <sup>Calor, frigus.</sup>  
morbis gravibus columnae vertebralis obnoxii sunt. Iisdem morbis subjiciuntur, qui hiemali tempore tergum vel prope caminum, vel adversus fornacem torrere solent <sup>17</sup>). Ex opposita plane causa <sup>18</sup>) ad columnam vertebralem multum viatores patiuntur, quibus ventus frigidus tergum continuo  
alli-

15) WENZEL, l. c. p. 251. 21. Beobachtung.

16) De plethora specus vertebralis lege MORGAGNI Op. c. Ep. LXII. 6. GAUTHIER et CLAUBRY in: Journ. gén. de la soc. de Méd. à Paris. v. HARLESS Journ. d. anal. Liter. 9. Bd. 2. St. Cfr. DÜRR in: HUFELAND'S Journ. 26. Bd. 2. St. p. 86. sq. S. G. VÖGEL Hdb. d. pr. AW. in capite: v. d. Rückenmarksentzündung. HUNTIN l. c.

17) Sic sexus imprimis sequior in Lithuania, per horas bene multas fornacis calefacto dorso adhaeret, sibi que gravia mala attrahit.

18) ENZ, GRIFFIN ll. cc.

## 28 DE MORBIS COLUMNAE VERTEBRALIS

allidit, item homines aestuante corpore alvum foras aut in latrinis male custoditis, deponentes. Milites, aliique, qui pileo rotundo amplo (causiâ) orbatî sub coelo pluvioso frigidoque iter instituunt, per aquam ab occipite ad cervicem, dorsum et lumbos depluentem, in morbos imprimis rheumaticos columnae vertebralis incidunt <sup>19</sup>). Sic iterum HIPPOCRATIS sententia <sup>20</sup>), qua frigus maxime medullae spinali infensum declaratur, se sustinet, quod eo facilius intelligitur, cum nervi cutis maxime e medulla spinali profisciscantur.

**Motus.**

6. Nec effectum *motus effreni* in columnam vertebralem reticebimus. Enim vero non solum equi hac ex causa facile in tetanum conjiciuntur; sed et homines, uti exempla *cursorum*, ante curruum principum quondam volitantium, docent <sup>21</sup>). Interea et hic extrema inter se confluant. Enim vero *decubitus* supinus diuturnus, imprimis convalescentium, vulneratorum in nosocomiis haud parum ad morbos columnae vertebralis excitandos conferre videtur <sup>22</sup>).

**Vena.**

7. De partium genitalium cum columna vertebrali nexu, jam monuimus <sup>23</sup>). HIPPOCRATES dixit-

19) ELIAS ENGHOLM *Handb. d. Kriegshygiene*. Leipz. 1818.  
(Vir egregius exposcit, ut galeae militum (*tschakko's*)  
postrorsum umbraculo nucham custodiente munitae sint).

20) Aph. V. 18. A. 9.

21) Memorabile hujus generis exemplum VALSALVA observavit, referente MORGAGNIO Op. c. Ep. II. 20. 2. 3.

22) BERRA Op. c. v. HARLESS l. c. p. 17. 23) §. II. N. 6.



dixerat<sup>24)</sup>: „Dorsalis tabes a medulla fit. Corripit autem maxime recentes sponso et veneri deditos.“ Ast praeter seminis jacturam<sup>25)</sup>, ipsa jam *pubertas* ita in medullam spinalem, uti *dentitio* in cerebrum, imperium exercet<sup>26)</sup>.

8. Inter animi pathemata *timor* et *terror* maximum in medullam spinalem exercere videntur imperium. Animi pathemata.

9. Praeter contagia, de quibus supra dictum Venena. est<sup>27)</sup>, et *venena* medullae spinali haud parcent. De veneno *upas antiar* et *ticuté*, nec non de *coriaria myrtifolia* id demonstratum videtur<sup>28)</sup>; de *plumbo*<sup>29)</sup>, *hydrargyro*<sup>30)</sup>, *secale cornuto*<sup>31)</sup>, *strychno nuce*

24) De morb. L. II. C. 49. Edit. Lind. T. II. p. 75.

25) C. A. TOTT *chron. Myelitis u. Tabes dors. ex pollutionibus*, in: *Allg. med. Annal.* 1838. N. 31. p. 487. Tab. dors. ex onania, ib. p. 484. HEUSSNER l. c. cas. 2 (ex onania paralysis extremitat. infer.).

26) Cfr. Cap. X. §. XLVIII. *chloroscos*, utpote morbi, saepe evolutionis periodum concomitantis, symptomata, pallor scilicet cutis, palpitatio cordis, retentio menstruum, impotentia motus, optime ex effectione columnae vertebralis explicari possunt.

27) §. II. 2. 3.

28) SCHNELL Diss. veneni *upas antiar* vires exhibens. MEYER in: GRAEFE u. W. Journ. 1829. Bd. 13. St. 3. p. 380. ROUX in: Lond. med. and phys. j. 1829. Apr. MEYER et v. ESENBECK in: HUFELAND Journ. 1829. Apr. p. 43. WILDBERG Mag. f. d. ger. Arz. 1832. Bd. 1. p. 311. C. J. MULDER in: POGENDORF Annal. d. Physik u. Chemie. 1838. N. 7. p. 414.

29) Cfr. Cap. XII. §. XIII.

30) Cap. II. §. VIII.

31) Cfr. Cap. XIV.

### 30 DE MORBIS COLUMNAE VERTEBRALIS

*nuce vomica* <sup>32)</sup> et de *cortice angusturae* <sup>33)</sup>, vix dubitandum.

Metastases.

10. Nec rarum est metastases ex variolis, morbillis <sup>34)</sup> et ex blennorrhoea urethrali, ad columnam vertebralem contingere.

Rhachitis, syphilis, scorbutus et lues.

11. Superesset de *rhachitide*, *arthritide*, *scorbuto* et *syphilide*, ut caussis morborum columnae vertebralis, mentionem injicere, verum cum diatheses hujusmodi maxime *systemati osseo columnae spinalis*, scilicet *vertebris*, infensae sint, et *paralysin* vel *hydropathicam chronicam* socias agnoscant, illorum doctrinam, quatenus ad praecoxos medicae imperium spectat, infra <sup>35)</sup> exponere decrevimus.

#### §. IV.

*Quando affectio columnae vertebralis argui possit; et quomodo illius examen pathologicum instituendum sit.*

Suspiciamus affectionem columnae vertebralis.

1. Quamvis ad affectionem columnae vertebralis arguere saepe haud arduum sit, nempe si vel aeger locum morbo detentum ipse exacte designat, vel si medicus morborum cum peculiari

co-

32) OLLIER in: *The Lond. med. reposit.* 1823. Vol. 19. Jun.

SEGALAS in: MECKEL, *Archiv f. d. Phys.* 1823. Bd. 8. H. 2.

BOUILLAUD *Vergift. durch d. N. F.*, ex *Journ. hebdom.*

1834. N. 12. in: SCHMIDT *Jahrb.* 1834. Bd. 3. p. 162.

33) ENNETT in: *HUFELAND Journ.* 1817. Nov. p. 109.

34) POUTEAU *oeuvres posthumes. Vol. I.* HUFELAND *Journ. d. pr. Heilk.* 3. Bd. §. 181.

35) Cap. III. et XII.

columnae vertebralis affectione apparentium<sup>1)</sup> et rerum positionum peculiari modo evolutioni morborum columnae vertebralis faventium<sup>2)</sup> probationem habeat; attamen exempla non desiderantur adeo obscura, ut neque sedes doloris, neque forma morbi, neque causae praegressae, lucem accendant, nisi aliae etiam in auxilium deducantur indagationes<sup>3)</sup>. Sciendum enim est, in morbis spinae sedem doloris non semper ad locum affectum, sed aliquando in parte remota accusari<sup>4)</sup>, e. c. ad costas, ad musculos abdominales, ad coxas, ad extremitates. Generatim suspicamur, morbum originem ex columna vertebrali trahere: 1°. si aeger iis in partibus patiatur, quae nervos ex determinato medullae spinalis loco accipiunt; — 2°. si morbus multifariis stipatur symptomatibus, quorum nexus aliter vix intelligi possit, nisi ad originem communem tot nervorum, quot ex medulla spinali pullulant, respectus habeatur; — 3°. si morbus stante corpore augmentum capiat, eoque horizontaliter decumbente imminuatur<sup>5)</sup> aut vice versa<sup>6)</sup>; — 4°. si aeger corpus ex uno in aliud  
latus

1) §. II.

2) §. III.

3) De diagnosi J. B. FAIRBANKS l. c. p. 229—231 legimus non poenitebit.

4) RACCHETTI pulchre de hoc argumento disseruit l. c. p. 284. sq. HINTERBERGER, GRIFFIN, ENG II. cc.

5) COPLAND, op. c.

6) Quamvis enim cum COPLANDO admittam generatim morbos a spina venientes, sub corporis positione horizontali evidenter imminui, attamen et exceptiones vidi, ubi

## 32 DE MORBIS COLUMNAE VERTEBRALIS

latus convertendi difficultatem experiatur; — 5°. si sensus et motus <sup>7)</sup> praecipue laesi sint; — 6°. si abscessus externi ad spinam aut thōracem appareant <sup>8)</sup> — et 7°. si symptomata horis matutinis leviora, progrediente die, eadem ratione, qua aeger magis magisque defatigatur, invalescant <sup>9)</sup>. Quoad diagnosin et causas morborum columnae ver-

scilicet morbus decumbente aegro magis saeviebat, quod ex calore lecti majorem affluxum humorum ad columnam vertebralem attrahente repeterem.

7) Ex SANDRAS (*Journal. gén. de méd.* 1829. *Déc.*) paralysis inter omnia medullae spinalis affectionis symptomata primum est. PARÉ (*de la paralysie. Liv. 9. p. 313*) dixerat, capite non affecto paralysis extremitatum inferiorum sine causa externa exortam e medulla spinali provenire.

8) Post abscessum integumentorum ossis sacri Lisfranc inter folia arachnoideae totius medullae spinalis ad quartum cerebri ventriculum usque pus invenit. v. ALBERS in: *Heidelt. klin. Annal.* 1828. *Bd. 4. Suppltheft 1. p. 143.* BOUVEROT Sr. HILTING, abscessum externum inter et affectionem columnae vertebrales internam sympathiam videt, contenditque, pus, in spina productum semper semperque unam eandemque viam eligere ad exteriora. v. FROHN'S *Notiz.* *Bd. 43. N. 14. p. 215.*

9) Ex physiologia notum est, hominem, praesertim juvenem, matutinis horis, constanter quidquam longiorem esse, quam ubi cubitum petierat, quod phaenomenon per elasticitatem cartilaginum intervertebraliū mane adhuc vigentem, vespere autem jam depressam, explicatur. Qua concessa explicatione, sequitur, quod morbi, qui ex compressione nervorum, inter vertebrarum interstitia exeuntium, oriuntur, horis matutinis minus, gravius vespertinis urgere debent, — atque sic aliquando in praxi observare licet.

vertebralis, hae quandoque adeo per longa temporis intervalla, ab effectibus separantur, ut nexum invenire perarduum sit. Sic lapsum in dorsum effectum, paralytin vesicae urinariae, post quatuor demum annos exseruisse observavimus. Praeterea accidit saepe, quod plurimae caussae morborum columnae vertebralis inter se connubium ineant, quo in casu, si una illarum tantum innotuerit, effectum intelligere vix possumus. Sic levissimus ictus, spinae prius omnino sanae inflictus, vix aut ne vix quidem detrimentum affert, secus autem, si vertebra jam antea vitio rhachitico, scrophuloso, aut venere contaminata fuerit. Postremo effectus laesionum spinae non semper per notiones neurologicas nobisque hucusque notas, saltem primo intuitu, explicatur. Sic impotentiae virilis e spina proficiscentis causam in columnae vertebralis portione lumbari vel sacrali quaereres, — ast saepe incassum, cum ea plerumque ad basin occipitis vel ad initium nuchae quaerenda sit<sup>10)</sup>. Incontinentiam urinae ex affectione tertiae vertebrae *dorsalis* observavimus, quod iterum cum origine nervorum vesicae urinariae nequaquam cohaerere videtur.

2. Rebus ita se habentibus nil ad diagnosis <sup>Examen</sup> morborum spinae illustrandam restat, quam <sup>columnae</sup> ~~exa-~~ <sup>vertebra-</sup> ~~men~~ <sup>lis.</sup> *columnae vertebralis*. Quoties hinc vel minime latentis vitii spinae habes suspicionem, partem de morbo suspectam, nunc stante, nunc decumbente aegro

10) Cap. II. §. VII. N. 1.

Frank Prax. II. 1. 2. 1.

### 34 DE MORBIS COLUMNAE VERTEBRALIS

aegro examina. Quaevis vertebra speciatim tactu et visu investigetur, et quidem nunc descendendo nunc ascendendo per columnam vertebralem. Etiam si pars affecta saepe neque tumorem neque aliud signum externum exhibeat, tamen plerumque a rudiori tactu dolet<sup>11)</sup>. Praeterea egregium et a nobis pluries confirmatum criterium CORRELAND fortuito detexit<sup>12)</sup>. Consistit illud in spongia aqua fervida imbuta, cum qua super cutim secundum longitudinem columnae vertebralis decurritur. Quousque calor sic ad vertebrae sanas applicatur, aeger nil nisi sensum caloris percipit; quo primum autem vertebra morbo ipsa detenta, vel partem affectam includens, tangitur, intolerabilis ardor persentiri solet. Caeterum et hic exceptiones inveniuntur, inprimis si corpus vertebrarum affectum sit<sup>13)</sup>. Spinam dum examini subjicis, ne unquam *clavicularum*, *costarum* et *sterni* obliviscaris, partium scilicet, quarum conditio-

nes

11) „Man führe den Finger an den Vorsprüngen der Dornfortsätze abwärts u. wenn man auf eine empfindliche Stelle stößt, so hat man den Sitz des Leidens gefunden.“ ANDRAL, l. c. p. 809.

12) Op. c.

13) Est, cui ANDRAL (l. c.) pergit: „Die Methode, mit einem in warmes Wasser getauchten Schwamme über die Dornfortsätze zu fahren, um die empfindliche Stelle als den Sitz des Uebels ausfindig zu machen, hat kein befriedigendes Resultat geliefert,“ et KIESER (klin. Beiträge. Lpz. 1834. Abschn. 3) hoc remedium diagnosticum incertissimum nominat.

nes abnormes saepe indicium vitiorum spinæ largiuntur.

3. In difficili arte specum vertebralem dissecandi, tyrones praecipue exercendi juxta praecepta a CASSEBOHM<sup>14</sup>), ACKERMANN<sup>15</sup>), ORCHY<sup>16</sup>), anonymo<sup>17</sup>), AUTENRIETH<sup>18</sup>), CRUSIO<sup>19</sup>), FLKISCHMANN<sup>20</sup>), HESSELBACH<sup>21</sup>), WILDBERG<sup>22</sup>), RITGEN<sup>23</sup>), ARAL<sup>24</sup>), STAUPA<sup>25</sup>), anonymo<sup>26</sup>), MENDE<sup>27</sup>), C 2 Bock<sup>28</sup>),

- 14) *Anweis. z. anat. Betracht. d. m. K., herausgeg. v. BALDINGER. Berl. 1769. p. 662.*
- 15) *Tabell. Uebers. b. gerichtl. Leichenöffnung. Lpz. 1801.*
- 16) *Anweis. z. gesetzmäss. u. ziel. Leichenöffn. Prag 1802.*
- 17) *Anat. pathol. Anweis. f. ger. Wundärzte. Stendal 1804.*
- 18) *Anleit. f. ger. Aerzte. Tübing. 1806.*
- 19) *Anweis. f. ger. Aerzte. Götting. 1806. p. 107.*
- 20) *Anleit. f. forens. u. poliz. Untersuch. Erlang. 1811.*
- 21) *Anleit. f. gesetzmäss. Leichenöffn. Würzb. 1812. p. 34.*  
Ed. altera: *Handb. f. ger. Aerzte u. Wundärzte b. gesetzmäss. Leichenöffnungen. Giess. 1819. p. 60.*
- 22) *Anweis. z. ger. Zerglieder. Berl. 1817. et: Lehrb. d. ger. A. W. Erfurt 1824. §. 904. p. 521.*
- 23) *Handb. b. gesetzmäss. Leichenöffn. Giess. 1819.*
- 24) *CASPHE Characterist. d. französ. Med. etc. Lpz. 1822. p. 424. et FROBIEF Notiz. 1829. Bd. 26. N. 7. p. 112 (de novo rhachitomo et nova spinam aperiendi methodo sermo est). Cfr. J. L. C. SCHROEDER VAN DER KOLK in Samml. auserles. Abh. 1829. Bd. 12. St. 4. p. 688.*
- 25) *Anweis. z. ger. u. pathol. Unters. m. Leichname. Wien 1827. p. 218. (aperit spinam ab anteriori parte, corpora vertebrarum dissecando).*
- 26) *Anleit. z. ger. med. Unters. m. Leichname. Ofen 1829.*
- 27) *Ausführl. Hdb. d. ger. Med. Lpz. 1829. Th. 5. p. 379. §. 2401. sq.*

### 36 DE MORBIS COLUMNAE VERTEBRALIS

BOCK <sup>28)</sup>, B. HEINE <sup>29)</sup>, WAGNER <sup>30)</sup> et PITZNER <sup>31)</sup> tradita. Infinitum interest, assiduis industriis et sedulis exercitiis dexteritatem in dissecanda columna vertebrali acquirere. Vidimus rhachiotomiam anteriorem et posteriorem manu concinna et pari perspicuitate perfici.

#### §. V.

#### *De prognosi et cura.*

Genera-  
tim.

1. *Prognosis et cura* morborum columnae vertebralis, quin res in doctrina de morbis systematis nervosi generali traditas <sup>1)</sup> repetamus et argumenta in speciali doctrina tradenda anticipemus, vix expositionem generalem admittunt. Sufficiat hinc meminisse:

Prognosis.

2. quod spectat ad *prognosin*; morbos columnae vertebralis maxime subdolos et fraudulentos esse, — minimos eorum gradus, nisi vitae <sup>2)</sup>, saltem sensui motuique insidias struere, — atque

28) *Ueb. ger. Section. d. m. K. etc. Meiss.* 1830.

29) Serrulam ad spinam apte aperiendam construxit. *FACRIEP Notiz.* 1830. *Bd.* 28. *N.* 15.

30) Prosector Scholae Viennensis. Ut STAUPA et ANAL columnam vertebralem ab anterioribus aperit, corpora vertebrarum dissecando. Methodus laudatur v. W. HORN *Reise in Rücksicht auf med. u. naturw. Institute. Berlin* 1831. *Th.* 1. p. 265.

31) *Leitfad. b. ger. Leichenöffnung. Landsh.* 1833.

1) P. II. ed. alter. Vol. 1. Sect. 1. c. 1.

2) VHELPRAU, l. c. ex observationibus propriis concludit, laesiones medullae spinalis ipsas graviores certis sub circumstantiis non lethales esse.



periculum eo magis adesse, quo nobiliora in consensum trahantur organa, quoque altiori in loco spina affecta sit; summum periculum urgere, si morbus sedem suam figat prope medullam oblongatam, videlicet prope spatium, quod inter primos nervos cervicales et ultimam par nervorum cerebri intercedit <sup>3)</sup>, quo scilicet in loco, nisi cum GALLIO vitae organon, saltem illius centrum admittimus:

3. quod spectat ad *curam* in morbis columnae Car. vertebralis, pro re nata, methodus variis diathesibus, ex quibus morbi ii pullulant, accommodata, locum obtinet. Vigente diathesi inflammatoria, indicata *venae sectio*, plerumque e saphena, fit. Evacuatio cruoris localis in aegrotis delicatioribus, potius *hirudinum* quam *cucurbitularum scarificantium*, utpote nimis irritantium, ope instituitur. In morbis indolis rheumaticae, scrophulosae, rhachiticae, praemissa si opus fuerit methodo antiphlogistica, efficacissima auxilia sunt *vesicatoria*, *fonticuli*, et magis etiam *setacea*, utpote facilius circa columnam vertebralem firmanda. Nec *causticum*, tum *actuale* <sup>4)</sup> tum *potentiale*, in malo rebeli negligendum. Praeterea, prout vel *vertebra* vel *meninges*, vel ipsa *medulla*, patiuntur, pharmaca magis vel in ossa, vel in membranas, vel in pulpam nerveam agentia eliguntur; hinc vel *radix rubiae tinctorum*, *gummi resina asae foetidae*, *extractum*

3) HUBER l. c. §. 5. p. 5. RACCHETTI l. c. p. 187.

4) CH. HEIBERG, l. citando.

### 38 DE MORBIS COLUMNAE VERTEBRALIS

*tractum pampinorum vitis viniferae, acidum phosphoricum, murias calcis, aqua calcis, — vel calomel, unguentum oxydi hydrargyri grysei (et praeter luem venereum) — vel flores arnicae montanae, herba chenopodii ambrosioidis, strychnos nux vomica<sup>5)</sup>, camphora, et electricitas<sup>6)</sup>. Quae singula vix quid praestare valent, nisi debita<sup>7)</sup> positionis corporis studeatur<sup>7)</sup>. Generatim quamvis vertebrae, non ita ut cranium, operationes chirurgicas ferre videantur<sup>8)</sup>; attamen in morbis columnae vertebralis permultum auxilia mechanica<sup>9)</sup>.*

VR-

- 5) De virtute medicatrice N. v. loquitur OLLIVIER (l. c. p. 838. et sq.), qui et *Acidum hydrocyanicum* laudat (p. 842). Pericula, in nosocomio Berolinensi (*Charité*) instituta docent, strychnino totum systema nervorum, praecipue medullae spinalis irritari et alternari. Contrindicari debilitate corporis et vi vitali exhausta. *Rust Magaz.* 1836. Bd. 46. St. 1. BURDACH *Beitr. z. Wirk. d. Strychnine* in: *Med. Ver.-Ztg.* 1838. N. 19. histor. morb. 2.
- 6) H. EARLE (*Journ. of sc., lit. and arts. Lond.* 1822. Vol. 13. p. 96) galvanismi effectum salutarem in spinas morbis sanandis vehementer laudat. — *Electropunctura* commendata est, atque adhibita, a STRANDBO autem infausto cum successu. *Ex Giorn. erit. di med. anolit. Milano* 1827. Setobr. in GRAEFE u. W. *Journ.* 1828. Bd. 11. H. 4. p. 646.
- 7) Cap. XII. §. LXIV.      8) CAROLUS BULL l. c.
- 9) „Die Heilung der Krümmungen durch Werkzeuge wurde seit kurzem eine so allgemeine Angelegenheit der Aerzte u. Nichtärzte, dass es unmöglich ist, die Geschichte aller Heilversuche mitzutheilen.“ WENZEL l. c. p. XII. Autor mechanicarum auxiliorum utilitatem negare, nec ultra extollens, eos casus designat (p. 440—450), in quibus cura per illa tentari et sperari potest.

valent; nisi, quod ab *orthopaedia* <sup>10)</sup>, haud cau-  
tissime

- 10) Tamporibus jam remotissimis ipse HIPPOCRATES alique medici ad spinae vertebralis curvaturas minuendas atque sanandas usi sunt auxiliis mechanicis, e G. COOPMANN (disput. med. de cyphosi. Franquer. 1770. p. 31) descriptis recensitisque, quorum maxima pars plus damni quam utilitatis attulit. Posteri haec instrumenta emendarunt, nove invenerunt et generatim ite construxerunt, ut aut extendendo corpus distortum, aut premendo, aut tandem utroque simul sanandi scopo inserviant, ut est videre prae ceteris ex: FR. GLISSON de rachitide seu morbo puerili, qui vulgo *the rickets* dicitur. Lond. 1612. Heg. Com. 1682. N. ANDRY *l'orthopédie ou l'art de prévenir et de corriger dans les enfans les difformités du corps. Par.* 1741. 2 Vol. Vers. germ. Berl. 1744 et 1762. LE VACHER, *nouv. moy. de prév. et de guérir la courbure de l'épine*; in: *Mém. de l'ac. r. de chir. Par.* 1768. T. 4. p. 596. ISENFLAMM *pract. Anmerk. üb. d. Knochen. Erlang.* 1782 p. 217. SCHULDRAKE, *essay on the var. caus. and effects on the distorted spine etc.* Lond. 1783. G. F. VERNEL *descript. de plus, nouv. moy. mécan. propr. à prév., borner et même corriger dans cert. cas les courb. latéral, et la tort. de l'épine du dos. Orbe en Suisse* 1788. Cfr. *Mém. de Lausanne. T. 3. N. 35.* D. VAN GESSCHER *Anmerk. over de Wangestalt, der Ruggrat etc. Amsterd.* 1792. Vers. germ. J. G. WEWERTZER. Gött. 1794. J. G. SCHMIDT *descript. machinae ad gibbositat. minuendas atque sanand.* Marb. 1794. Vers. germ. Leipz. 1796. PORTAL l. c. JACOWITZ, *üb. d. glüchl. Kur ausgewachs. Person.*, in: *Oekon. Nachr. d. Gesellsch. in Schlesien. Bd. 4. p. 413.* K. S. BRAUNERT *diss. hist. machinar. ad gibbosit. sanand.* Hal. 1798. F. FRILER *de spinae dorsi incurvat. eorumq. curat.* Norimb. 1807. B. G. N. SCHREGER *Vers. ein. nüchtl. Streckapparat. f. Rückgrathgekrümmte.* Erl. 1810. — Quo circiter ex tempore instituta sic dicta ortho-

## 40 DE MORBIS COLUMNÆ VERTEBRALIS

orthopaedica (ex ὀρθός, rectus, et παιδίον, infans) proficisciebantur, et quidem primum, ni fallimur et si forte VARNER (sur l'établissement pour le traitem. des enfans affligés de difformités osseuses, érigé à Orbe en Suisse par feu Mr. le profess. VARNER et contin. par son neveu et élé SACCARD) excipiamus, Lipsiae a J. CH. JUNG (üb. Verkrümm. d. m. K. u. eine rationelle u. sichere Heilart derselb. Lpz. 1810 et 1816. Ejusd. d. Kunst, d. Verkrümm. d. Kind. z. verhüt. u. d. entstand. sicher u. leicht z. heil. ib. 1816.), quem mox J. G. HEINE, Würzburgi (Nachr. v. d. gegenwärt. Stande d. orthopäd. Instituts in Würzb. ib. 1821. Ejusd. Geschichtl. Darstell. d. Begründ. d. orthopäd. Carolinen-Instit. etc. ib. 1824. Ejusd. Hausord. d. orthopäd. Instit. ib. 1826. Ejusd. Allgem. Bemerk. üb. Orthopäd. in: PIERER, Annal. 1826. II. 1. p. 121. Ejusd. Verzeichn. d. system. Bestand. des Modell.-Cabinets im Carolin.-Instit. z. Würzb. etc. ib. 1827, et J. G. Heine nach sein. frühern Lebensverhältniss. u. sein. Bild. in d. chir. Mechanik . . . . z. orthopäd. Heilkunst. von ihm selbst geschildert. ib. 1827.) et multi alii inter omnes fere gentes eruditas secuti sunt. Quorum institutorum nonnulla nominasse sufficiet: Parisiis a MILLI primum 1822 fundatum, cui nunc BLOUVIER et DUVAL praesunt (G. KRAUSS in: Med. Ver.-Ztg. 1837. N. 5, et F. J. SACHS, Berl. med. Centralztg. 1838. N. 45. p. 889.); a MAISONABLE cum DUPAU et BELLANGER (C. A. MAISONABLE, üb. d. Deformität d. Wirbels ex ejusd. journ. de cliniq. 1825. cah. 1. in: FROISSE, Notiz. 1825. Dezbr. p. 327 et 350. Ejusd., BELLANGER et DUPAU, journ. élin. sur les difformités, sur la mécaniq. etc. Par. 1828. Ejusd. orthopédie élin. sur les difformités dans l'espèce hum. Par. 1834. T. 1 et 2. Extract. germ.: d. Verkrümmung. des Rgr. u. deren Heilung v. E. MAISONABLE, übers. v. E. MARTINY. Quedlinb. u. Lpz. 1837); a PRAVAZ 1826, cum J. GUÉRIN (C. G. PRAVAZ méthode nouvelle pour le traitem. des déviations de la colonne vertébr., précédée d'un exam. critiq. des divers moy. employés

employés par les orthopédistes modernes. Par. 1827. Ejusd. mém. sur l'orthopéd. Par. 1830. Cfr. *Summar. d. Neuest. u. Wissenwürdigst. a. d. gesamm. Med. Lpz. 1835. Bd. 11. p. 113.* Idem disserit de apparatus orthopaedicis in: SCHMIDT, *Jahrb. 1834. Bd. 2. p. 385.* et gymnasticam, ut remedium prophylacticum (somascétique) et curativam laudat in: *Mém. de l'ac. roy. de méd. Par. 1833. T. 3. fasc. 1. Gaz. méd. 1833. Jan. et Févr. porro: Etabliss. orthopéd. in: Bulet. des sc. méd. 1826. N. 5. p. 141. GUÉRIN in: Journ. des connoiss. méd. pr. et de pharmacol. Par. 1835. Févr. Cfr. FROHIER, *Notiz. 1835. N. 1008.*); a TAVERNIER et HOSSARD (G. KRAUSS, l. c. p. 890). MORLAI a F. HUMBERT (FODÉRÉ, mém. sur les incurvat. morbid. de la colonne, épinière qui peuvent être redressées par des moy. mécan. et sur la maison établie à Morlay, pour y remédier de cette manière, in: *Journ. complém. du Dict. d. sc. méd. 1824. T. 17. tab. 71. p. 193. SOOETTYN in: Arch. gén. de méd. 1824. Octbr. Lit mécan. pour remédier aux vices de conformat. et particulièrement aux déviations de la colonne vertébr. Bull. des sc. méd. 1825. Août. p. 359. Fundator hujus instituti et instrumentum ad curvaturas spinæ dimetiendas invenit: Ejusd. de l'invention et de l'emploi de l'hygomètre etc. Ligny 1834. Ejusd. père et fils de l'emploi des moy. mécan. et gymnastiq. dans le traitem. des difformités du syst. osseux. Bar le Duc et Paris. 1831 et 1834). LUGDUNI a JAL (Rapport fait à la soc. de méd. de Lyon sur l'établiss. orthop. dirigé par M. JAL. Lyon 1826). PROPE MONTIEM PASSULANUM a J. DELPICH (sur l'art, appelé orthopéd. in: *Revue méd. 1827. Juil. p. 5. Octbr. p. 5. 1828. T. 1. Ejusd. de l'orthomorphie par rapport à l'espèce hum. ou ... sur les causes, les moy. de prévenir et guér. les princip. difform. et sur les véritables fondemens de l'art orthopéd. Par. 1829. Vol. 2. Vers. germ. Weimar. 1830. Idem in: Bull. des sc. méd. 1829. p. 420. et *Revue méd. franc. et étrang. 1829. Novbr. p. 213. Ejusd. et TRINQUIER, obs. clin. sur les difform. de la taille et des membr. Par. 1834).* — BEROLINI a. 1823***

a HAMMER

## 42 DE MORBIS COLUMNAE VERTEBRALIS

a HAMMER (RUST, *Mag.* 1832, *Bd.* 38, *H.* 2, p. 251.); a. 1835 ab A. KRÜGER (Berlin, *med. Centralztg.* 1839, *N.* 26, p. 516). Cannstadii 1829 a J. HEINE (ejusd, *Erster Bericht* in: SCHMIDT, *Jahrb.* 1835, *Bd.* 5, p. 134, *Schwäbischer Mercur.* 1832, *April.* *N.* 106. Ejusd, *Orthopäd. Heilanst.* zu Cannst., 1. u. zweit. öffentl. Ber. Cannst. 1834 et in: *Würtemb. med. Correspondenzabl.* *Bd.* 3, *N.* 40. Ejusd, *dritter Ber.* in: SCHMIDT, 1. u. 1836, *Bd.* 12, p. 95. Ejusd, *viert. Ber.* ib. 1838, *Bd.* 20, p. 91). *Stuttgardias* 1835 a BLUNHARDT (ejusd, *die orthopäd. Anstalt in Stuttg. u. Bemerkung.* üb. d. Behandl. d. Seitenkrümmung. des Rgr. in d. Seitenlage, in: *Würtemb. med. Correspondenzabl.* *Bd.* 6, *N.* 11. et *Bd.* 9, *N.* 15). Prope *Aquisgranum* a KRAMER (K. G. NEUMANN in: Berlin, *med. Centralztg.* 1838, *N.* 45, p. 940). — *Lomani* (KLOS, *Ztg. f. d. gesamte Med.-Wes.* Lpz. 1829, *N.* 18, p. 271). — *Holmiae* 1827 a ACKERMANN (FRORUP, *Notiz.* 1829, *Bd.* 25, *N.* 16). — *Moscae* a MANDILÉNY (inst. orthop. fondé et dirigé par . . . Mosc. 1839). — *Hagae Comitum* a HEINE (J. L. CASPER, *krit. Repert.* 1832, *Bd.* 32, *H.* 1. Ejusd. *Copie ein. Briefes* üb. *Orthopäd.* Haag 1834. Cfr. *Summar. d. Neuest. u. Wissenswürdigst. a. d. gesamt. Med.* 1836, *Bd.* 3, p. 215—217). — *Pesthini* ab A. SCHOPFF (ejusd. *Popul. Andeut.* üb. *Scropheln*, engl. *Krankh.* etc., bestimmt für d. orthopäd. Heilanst. u. Gymnast. Ofen 1836. Ejusd. *Ueb. d. Pesther orthopäd. Heilanst.*, ihre wissenschaftl. Grundl. u. das damit verbundene gymn.-pädagog. Erziehungsinst. f. körperlich schwache Jugend. in: *Oesterr. med. Jahrb.* 1838, *Bd.* 16, *St.* 1. *Institutum inundationis fluminis interit*), aliisque (Lubecae, Jenae, Lipsiae, Hamburgi, Hannoverae, Lugduni Batavorum, Hafniae et Augustae Taurinorum). — *Basin scientificum*, huc usque desideratum, nostri aevi studii debet ars orthopaedica, quamvis institutis illis provocatis et nimis plus multiplicatis ad ludum jocumque exaggeratis et fallacis mendacisque (BOUVIER et GUHRIN: *Täuschung u. selbst Betrug*

in Beziehung auf Orthopädie; in: FROBER, *Notiz*, 1835. Bd. 46. N. 14. p. 217, exempla afferunt) profanetam emendatione et perfectione valde indigere, fateri edigamur. Nam paucis exceptis primi institutorum fundatores praesidesque, nec non alii orthopaedistae, minus in rebus medicis quam arte mechanica versati in eo peccarunt, quod solummodo inveniendis applicandisque machinis et instrumentis, saepe nimis compositis et incongruis sanandi scopum attingere studuerint et, conditiones deformationum spinæ dynamice vilipendentes, quae vix nisi dynamicis remediis effici possunt, unica mechanicis peragere voluerint. Tandem vero, nervorum vasorumque influxa corpus humanum distorqueri (CH. BELLY ROMBERG, LACHAISE, DELPECH), e. c. nervorum inspiratorum oeconomia turbata diversissimas trunci curvaturas effici posse (L. STROMMEYER, *üb. Paralyse d. Inspirationsmuskeln*, Hannov. 1836.), edocti et, praeter curvetnam spinæ habituelem, et muscularem, nec non osseariam et dyscrasicam occurrere (HEIDENREICH), experti; verbo, aetiologia ex principiis medicis culte et, quae, corporis dispositione data, ex gravitatis et ponderis legibus systema osseum et fibrosum de loco et statu dimoveri (SHAW): quae, dico, mala haereditario-connata et haereditario-oriunda (SIEBENHAAR); — corporis evolutio praecox (WAGNER); — educationis modernae et vivendi rationis vitia (SHAW), mala consuetudo, prava corporis positio et negotia incongrua (FRAENKEL); — nutritio spinæ et partium constituentium impedita, vitiosa (WENZEL, KRÜGER), et passiva, ut articularum affectionis sequelae (FRAENKEL); — musculorum dorsi debilitas et antagonismus perturbatus et inaequalis (GÜNTHER *üb. d. Verhältnisse d. Muskeln d. rechten Seite zu denen der linken bei d. geschlängelten Krümmung d. Rgr.* in: PFÄFF, *Mittheil.* 1836. II. 9 et 10, WENZEL, BARTHEL, DELPECH, SHAW, DODS); — sanguinis congestio nimis ad spinam et ejus partes, inflammatio, suppuratio, emollio,

#### 44 DE MORBIS COLUMNAE VERTEBRALIS

litio, gangraena, caries et aliae affectiones atque degenerations primariae (BARTHEL) et secundariae cartilagineum intervertebraliū (DELPSCH cartilagineum inter secundam et tertiam vertebrem cervicalem in paroxysmis fabris intermittēntis intumesci videbat, unde praeter alias deformitates deviatio secundaria in regione dorsali et lumbari contigit) et ossium spinarum, nec non partium ad eam pertinentium et vicinarum (WENZEL, HEIDENRICH, OUVARD, BARTHEL); — quaeque tandem dyscrasia universalis aliorumque organorum morbi (HEIDENRICH, FRANKEL, KRÜGER), et rheumatismus, arthritis, rachitis, scrophulosis, syphilitis, psora, herpes, pedum sudor suppressus (WENZEL, WAGNER) etc. valeant, rite cognititis, dubitamus, quin illae causae earumque sequelae machinis et apparatus artificialibus tollendae et abigendae sint, nec speramus, ea indicationibus: dispositionem spinarum ad deviationes extinguendi (WENZEL) et corporis constitutionem emendandi atque musculos roborandi (SHAW, KRÜGER, WAGNER, DUFUYTREN, COULSON, R. HEINE); — momenta causalia, quotquot sint, debilitandi removendique (LACHAISE, R. HEINE); — morbos concurrentes, ex quibus deformitas localis pullulat, inquisitos sanandi (LACHAISE, KRÜGER); — partium affectarum harmoniam interruptam et aequilibrium sublatum, ineitando processum dynamico locali restituendi; — deformitatem reducendi et quidem sine caeterarum partium earumque functionum ullo detrimento, etc. responsura fore. Est quidem medela deformitatum, de quibus agitur, et mechanica et dynamica; et in ea versamur opinione, illam nil nisi auxilium, hanc vero remedium esse. Quibus ex causis auctores majores et moderatores usum apparatusum mechanicorum restrinxerunt eosque, qui corpori humano nimiam vim inferunt, rejecerunt. Haec omnia elucet ex operibus, quae sequuntur: J. MACARTNEY, *obs. on curvatur. of the spine. Dublin* 1817. et in: *The Lond. med. and phys. journ.* 1824. Nouv. W. MALACON, de nova machina Graeciana, distortionib.



sionib. spin. dorsi sanand., nec non disquisit. deformitat. istar. Berol. 1818. BORRELLA, *cenzi d'ortopedia*, in: *Mem. della R. acad. delle sc. di Torino* 1821, T. 26. W. T. WARD, *pract. obs. on distorsion of the spine*. Lond. 1822. J. SHAW, *on the nat. and treatm. of the distorsions, to which the spine and the bones of the chest are subject*. Lond. 1822. Vers. germ. Weimar. 1825. Ejusd. *Engravings illustrative of a work on the nat. and treatm. of the distorsions to which the spine etc.* Lond. 1824. Ejusd. *Observat. on the causes and early sympt. of defects in the form of the spine etc.* Lond. 1827. et in: *The Lond. m. and phys. journ.* 1827. March. Cfr. HORN, *Archiv.* 1827. H. 2. p. 297. et GRAEFH u. *W. Journ.* 1828. Bd. 11. St. 1. p. 137. T. JARROLD, *an inquiry into the caus. of the curvatur. of the spine, with suggest. as to the best means of preventing, or when formed, of removing the later. curvatur.* Lond. 1824. R. W. BAMPHIELD, *an essay on curvat. and diseas. of the spine, includ. all the forms of spin. distors.* Lond. 1824. Vers. germ. FR. J. SIEBENHAAR. Lpz. 1830. MERAT, *notes sur les moy. employés par le Dr. Leythof, méd. à Lubeck, pour redresser les os déviés de leur direction naturelle*, in: *N. bibl. méd.* Par. 1824. Octbr. et *Bullet. des sc. méd.* 1825. Juin, p. 135. *Orthopédie in Berlin*: HUFELAND, *Journ.* 1826. März. p. 117. DUFOUR, *sur l'art de prévenir ou de corriger les difformités du corps, désigné sous le nom d'orthopédie*, in: *Revue méd.* 1827. Nouv. N. 11. p. 283. C. LACHAISE, *précis physiol. sur les courb. de la col. vertébr. Exposé des moy. de prévenir et de corr. les difformités de la taille, particul. chez les jeunes filles, sans le secours des lits mécan. à extension*. Par. 1827. Vers. germ. F. J. SIEBENHAAR. Lpz. 1829. AMOROS *obs. sur l'ouvrage du Dr. Lachaise etc.* Par. 1827. Idem: *Heilung ein. Rgr.- u. Rippenverkrümm.* in: BROUSSAIS, *annal.* 1831. Mai, v. SCHMIDT, *Jahrb.* 1835. Bd. 5. p. 219. F. W. HEIDENREICH, *Orthopäd. od. üb. d. Werth d. Mechanik u. Heil. d. Verkrümm. am m. Leibe.* Berl.

## 46 DE MORBIS COLUMNAE VERTEBRALIS

- Berl. 1827. 2. Abth. d. Verkrümm. d. Wirbels, ib. 1831.  
 Ejusd. Werth d. Orthopäd., in: HUCKER *Annal.* 1830.  
 Apr. p. 430. Cfr. *Salzb. chir.-med. Ztg.* 1830. Bd. 2. N. 34.  
 Beilage p. 147. Ejusd. Orthop. u. orthop. Behandl., in:  
 GRAEF u. W. Journ. 1833. Bd. 19. St. 3. p. 362. BRENIUS,  
 Gesch. d. Behandl. d. Verkrümm. am m. K. in: M. MARCUS,  
 ärztl. Notiz. Moskau 1827. Th. 1. BLÖMER's Streektstuhl,  
 beschrieb. v. E. GRAEF, Journ. 1827. Bd. 9. CHR. HEINBERG,  
 Versfahr. b. Rgrth-Verkrümm. in: GERSON u. JUL. Mag.  
 1826. Jul. Aug. p. 81. WAGNER, üb. d. zweckmäss. Be-  
 handl. d. am häufigst. vorkomm. Rgr.-Verkrümm., in:  
 HOEN, Archiv. 1828. Septbr. Octbr. p. 663. J. P. QUVERARD,  
 méditat. sur la chir. prat. . . . et d'orthopédie. Par. 1828.  
 Cfr. HUFELAND, Journ. 1832. Juni p. 62. CH. L. MOUR-  
 QUÉ, considérat. gén. sur l'utilité des bains de mer dans  
 le traitem. des difformités du tronc. Par. 1828. C. F. BAR-  
 THLS, üb. d. Behandl. d. Seitenkrümm. d. Rgr. in: GRAEF  
 u. W. Journ. 1829. Bd. 12. II. 3. p. 386. F. J. BIRKENHAAR,  
 üb. d. acut. Verdreh. d. Wirbels, ib. p. 408. Ejusd. Zur  
 Lehre üb. d. Erblichk. . . in Bezug auf Orthopäd. insbe-  
 sondere, ib. 1831. Bd. 16. H. 4. p. 521. Ejusd. Die orthopäd.  
 Gebrech. d. m. K. od. Anweis., d. Verdrehung. u. Ver-  
 krümm. d. Rumpfes . . . zu verhüt. od. frühzeit. z. erken-  
 nen. Dresd. 1833. ZIMMERHANN, üb. eine neue Maschine  
 z. Heilg. d. Rgrth.-Krümm. in: GRAEF u. W. Journ. 1829.  
 Bd. 12. II. 1. p. 149. Ejusd. Die Verkrümm. des Rückgr.  
 . . . nebst d. neuest. vorzügl. Hülfsm. dageg. Lpz. 1830.  
 F. BIRD, Heil. ein. Verletz. d. Rgr., die das Entstehen  
 ein. Buckels drohete, in: GRAEF u. W. Journ. 1829. Bd. 12.  
 H. 3. p. 479. A. MAYER, d. orthopäd. Anstalt. etc. Würzb.  
 1829. J. LAVOND, recherch. prat. sur les principal. diffor-  
 mités du corps hum. et sur les moy. d'y remédier. Par. 1829.  
 C. G. MERRY, de spinae dorsi distorsionib. . . . adject.  
 novar. machin. a Langenb. invent. descript. Göt. 1829.  
 Traitm. de la courb. latér. Bull. des sc. méd. 1829. Juill. p. 57.  
 A. BRAUN, a tr. on deformat. . . . of the nat. and treatm.  
 of

of the princip. distort. and contract. of the spine. Lond. 1830. 2. edit. 1833. *Bulletin des sc. méd.* 1830. Mars. p. 453. L. KÜGGER, ein Wort üb. d. Verkrümm. d. Rgr. u. deren Behandl. mittelst Maschinen, in: HOEN, Archiv. 1831. Jul. Aug. p. 645. MENDE, in: Gemeinsame deutsche Ztschr. f. Geburtsh. 1831. Bd. 6. H. 1. p. 76. J. v. VERING, üb. d. Anwend. mechan. Vorricht. z. Heil. d. Krümm. des Rgr., in: FISCHER, allg. med. Zig. 1831. N. 17. B. CH. VOGEL, üb. Erkenntnisse u. Heil. d. Rgr.-Verkrümm. Nürnberg. 1832. J. SYME, the principles of surgery. Edinb. 1832. W. B. FRAENKEL, üb. d. Gelenkkrankh. u. insb. üb. d. Krankh. d. Wirbels., in: GRAEVE u. W. Journ. 1833. Bd. 19. St. 4. p. 565. S. HARR, pract. obs. on curvatur. of the spine. Lond. 1833. Ed. altera: pr. obs. on the cause, and treatm. of curvat. of the spine, with ... a means of preventing the disease, and etching and descript. of an apparatus for the correction of the deformity. ib. 1838. G. HUME WREATHENHEAD, a. tr. on rickets, ... a plate and description of an improved reclining couch for the distorted. Lond. 1836. ROCHETTA, méthode du poids céphalique. in: *Revue méd.* 1834. et FROST, Notiz. Bd. 40. N. 21. p. 336. Cfr. SCHMIDT, Jahrb. 1835. Bd. 6. p. 104. F. L. E. MELEBY, manuel prat. d'orthop. ou traité élémentaire sur les moy. de prévenir et de guérir toutes les difformités du corps hum. Par. 1836. R. HEINE, d. Wunde, das Bücken u. d. Heben geg. Rgr.-Krümm. in: RUST, Mag. 1836. Bd. 46. H. 2. C. WING, üb. Harrison's Behandl. d. Wirbelverkrümm. ex: *The Lancet* 1836. Oct. p. 386, in: DIERFVENDACH, Ztschr. 1837. Bd. 4. p. 480. W. COLEMAN, on deformit. of the chest and spine illustr. by plates. Lond. 1837. 2. edit. 1839. (prima edit. 1836). A. M. BERNARD RIOFREY on the advantag. of exercise in some spin. deviat. Lond. 1837. VALLIN, de la torsion qui accompagne constamm. les déviat. latér. d'épine, ou nouv. méthode de traiter les déviations de la taille. Nantes 1837. L. STROEMER, Beiträge z. operativ. Orthopädie, od. Erfahr. üb. d. sub-

## 48 DE MORB. COLUMN. VERTEBR. IN GEN.

tissime adhibita<sup>1)</sup>), maxime timemus, deformitates externae, cum damno longe graviori viscerum, corrigentur.

d. subcutane Durchschneidung verkürzt, Muskeln u. Sehnen. Hannov. 1838. J. F. DIEFFENBACH, ein. Bemerkung. üb. d. Orthopädi. in Frankr., in: Hamburg. Ztschr. 1838. Bd. 8. H. 1. WERNER, med. Gymnastik, mit 100 Figur. Dresd. u. Lpz. 1838. F. A. FORKE, organ. Methode, die Verkümm. d. Wirbels. in d. Blüthenjahr. zu behandeln; in: HOLSCHEER, Hannöv. Annal. 1838. Bd. 4. H. 1. p. 36. sq. (fonticulis, irritantibus in lateribus spinæ, et hydriodato ferri, externe et interne adhibito, omnes spinæ deviationes se sanasse, docet respuitque machinas orthopaedicas).

11) Exemplo SCHÖNER (l. c.) aliorumque paucorum.

## CAPUT II.

### *D e r h a c h i a l g i a .*

#### §. VI.

#### *Definitio, sedes.*

Definitio. 1. *Rhachialgia*<sup>1)</sup>) est dolor, haud raro periodicus, e columna vertebrali emanans, sine febre.

Sedes. 2. Rhachialgia sedem figit ad cervicem, ad dorsum, ad lumbos, ad os sacrum, et ad plurimas ha-

1) Sciendum nomen *rhachialgiae* aliis pro *colica pictorum* designanda inservisse. E. c. ASTRUC, quaest. med. an morbo colicae pictorum, rectius *rhachialgia dicto*, venae sectio? Paris 1750.

harum partium simul \*). Occupat ipsa nunc totum spinæ ambitum, nunc unum tantum illius latus (*Hemi-rhachialgia*).

## §. VII.

*Symptomata. Caussae.*

1. *Rhachialgia cervicalis* dolore plerumque <sup>R. cervicalis.</sup> gravativo, quasi a pondere imposito, ad nucliam insignitur. Dolor iste ad occiput, ad faciem \*), ad dorsum, et ad brachia extendi solet. Graviori in casu socia illi sunt: rigor colli vel inflexio morbosæ capitis \*), susurrus aurium \*), impotentia virilis \*), vocis extinctio \*), torpor vel motus in-

VO-

2) G. TH. PLASS, diss. de doloribus spinæ dorsæ. Berol. 1837.

1) Mense novembri 1818. virgo in clinico meo decubuit, cui lignum magnâ vi super occiput et nucliam cecidit. Palpebras apertas tenendi experiebatur difficultatem, quod ex nervi nexu occipitalis magni (aperi secundo nervorum cervicalium) cum nervo temporali (a ramo tertio paris quinti) repeterem. Præterea aderant vomitus, pulsus ad 40 ictus, et torpor brachiorum. Quævis morbus jam e sex mensibus duraverit; convaluit sub usu hirudinum ad occiput et nucliam, cucurbitularum scarificantium ad dorsum, eccoproticorum, et fonticulorum ad latera cervicis.

2) *Obstipitas gibbosa SAUVAGNI* quodammodo huc spectat. Interea baud opus est, ut ipsæ vertebrae colli afficiantur, nam et simplex medullæ spinalis et musculorum affectio idem phaenomenon producit. Cfr. cap. XII. §. LX. 6.

3) Familiare hoc symptoma, imprimis rhachialgiae cervicalis hæmorrhoidalis et plicose, per nervum auricularem magnum, a paris tertii nervorum cervicalium ramo sexto, repeto.

4) Jam HIPPOCRATES dixerat (De genitura liber, Cap. II. Frank Præx. II. 1. 2.).

D

voluntarii brachiorum <sup>6)</sup> aut digiti annularis et auri-

p. 53. in: HALLERI art. med. princip. T. II. De aere, aquis et locis lib. cap. XI. p. 29. ib. T. I.) laesiones basis cranii *impotentiam virilem* generare; quod die 5. mensis maji 1818 in judaeo 40 annorum confirmatum habui. Vir enim iste post ictum ad nucham, dolorem circa sextam et septimam vertebrae colli reliquentem, *illico omnem coeundi facultatem amisit*. Nec vox, nec barbas crescendi modus in hoc aegro mutationem avidantem subierunt. Sed id peculiare erat, quod aeger sub motu scapularum vel spontaneo vel voluntario, *flatuum explosionem* experiebatur (*verisimiliter ramus, quem per sextum nervorum cervicalium nervo intercostali suppeditat, hic sceasam ludebat*). Laesiones vertebrarum cervicalium infra basis cranii effectum *impotentiae virili* contrarium producere videntur; sic saltem ex *pollutionibus* hominum, qui laqueo suspenduntur, quorumque vertebrae cervicis a carnicibus luxantur, concluderem.

- 5) GALLENUS jam docuit (de symptom. caus. L. I. C. 5. p. 16.) quod omnibus his, quibus medulla spinalis ad collum laeditur, *vox deficiat*. Die 2. martii 1817. juvenem feminam ex phthisi tuberculosa pulmonali amisit. Haec jam ante hujus morbi evolutionem vocem extinctam exhibebat, quod a tuberculis pulmonum, nervum recurrentem comprimantibus, repetii. Verum cum aegra haemorrhoidaria, continuo de cervicis dolore conquesta sit, ac duos ante mortem dies rigorem colli, et ultimis vitae horis tetanum experta fuerit; causam potius in medulla cervicali, utpote nervum accessorium Willisii largiente, cujus ramus internus laryngi providet, quaererem. Vere anni 1818. virum athleticae constitutionis mania furibunda periodica haemorrhoidali laborantem curavi. Aeger mihi paroxysmi adventum ex eo rite praedixit, quod *raucedine* laborare incipiebat; qua adventante, doloreque habituali occipitis exasperato, malum erumpere solebat. Quomodoque

auricularis<sup>7)</sup>, pandiculationes, oscitationes, motus abnormes cordis cum sensu angustiae ac plerumque sensus specificus debilitatis, ac si gravis morbus vel ipsa mors immineret<sup>8)</sup>.

2. *Rhachialgia dorsalis, notalgia aliorum*<sup>9)</sup> R. dorsalis. symptomatibus multifariis comitatur. Hujusmodi sunt: respiratio impedita, anhelans, suspiriis profundis intercepta<sup>10)</sup>, angustiae, cruciatus ad hy-

## D 2 po-

res sa habeat, anatomici et physiologi dicant, num ex eo, quod laesa medulla spinali potentia coeundi at vox detrimentum capiant, nexus partium genitalium cum larynge explicari possent. Forte et barbae evolutio ex nervis cervicalibus cutis faciei partim providentibus explicanda foret.

6) Vide cap. X. §. XLVIII. N. 2.

7) Hoc symptoma an. 1815. in mercatore equorum rhachialgia cervicali crudeli, quae ex cephalaea ortum ducebat, adfecto, observavi.

8) Quocunque fare in morbo, qui dolore nuchae, praesertim gravativo, stipatur, aeger peculiare genus debilitatis experitur, cujus nuper aegra mihi rationem reddidit, dicendo „ita me habeo urgente hoc dolore, ac si jam mortis portiunculam mecum ferrem.“

9) A Gr. *Nῶρος*, dorsum, et *ἄλγος* dolor. SWEDIAUR nov. nosol. method. systema. Vol. I. p. 439. Halae 1812.

10) An. 1813. peculiarem respirandi difficultatem in virgine observavi. Aegra sat expedita loquens omni sexagesima horae parte semel bisve aërimonam interrompere, et profundam inspirationem veluti suspirium instituere coacta erat. Ut causam ipsa, quod solita fuerat tergum fornaci calido per horae multas admovere, accusaverat. An. 1817. puellam duodecim annorum cum initio cyphoseos tertianae et quartae vertebrae dorsalis curavi, quae etiam profunda suspiria ducere coacta erat, ac praeterea cutim brachio-

pochondria praesertim sub costis spuriis <sup>11)</sup>, constrictio musculorum abdominalium, conversio corporis ex uno in aliud latus plane impedita <sup>12)</sup>, difficultas sedendi, surgendi, deambulandi nisi antrorsum flexo corpore, alvus tarda, urinae emittendae nisus creber, saepeque eam retinendi im-

po-

rum lividam, palpitatioem cordis et emaciationem exhibebat. Medicorum alter tubercula pulmonis, alter vitium cordis suspicabatur. Cognita propius morbi sede, hirudines primum, dein fonticulos ad latera ventrerum affectarum, apponere jussi, concessa diata lactea ordinataque suspensione corporis ope brachiorum loco altiori affixorum. Mense novembri 1818. pro foemina in auxilium ductus fui, quae cum ante annum in curru incommodo iter super viam asperam instituisset, ob cruciatum ad latus dextrum thoracis domum semiviva attigit. Mox vena sauciabatur cum lavamine magno, at relicto dolore ad dorsum ad costas spurias lateris dextri, quarum tertia a propria cartilagine veluti separata intus conversa reperta est. Aegra eandem respirandi difficultatem, ut memoratae virginis, experiebatur et praeterea crebras oscitationes et aliquando singultum, uti videtur ex irritatione diaphragmatis. Cum ipsa ad removendam costam affectam aut potius illius cartilaginem nullam operationem idoneam admittere voluisset, simplex applicita est fasciæ, laminam metallicam in spatium inter hepar et costas, quousque fieri licuit, intrusam sustinens, cum conspicuo egrae levamine.

- 11) Pluries hepar et lienem immerito accusavi, priusquam dolorum istiusmodi originem ex medulla spinali cognoverim.
- 12) Aegrorum unus mihi fassus est, se potius surgere atque iterum cubitum petere, quam inter decumbendum grave onus ex uno in aliud latus sese convertendi suscipere.



potentia<sup>13)</sup>, emaciatio imprimis extremitatum inferiorum, cutis eas obducentis anaesthesia, et flacciditas musculorum gastrocnemiorum.

3. Quae dictae cutis et extremitatum inferiorum conditiones, frequentius etiam in *rhachialgia lum-*<sup>R. lumbe-  
lis et sa-  
cralis.</sup>  
*bali* (osphyalgia<sup>14)</sup>) et *sacrali* observantur<sup>15)</sup>.

Quo

13) Virgo nobilis ex Russia alba, viginti annos nata, junctis pedibus super scamnum saltans, illico dolorem inter scapulas persequitur, quem vero flocci pependit. Elapso nonnullorum mensium curriculo, ea sine nota causa, respirandi difficultas, paulo post urinae incontinentia, crurumque debilitas et macies. Quibus malis farraginem remedium medici opposuerunt, at incassum. Aegra taedio affecta, Vileam an. 1816. petiit mensaque curae se commisit. Quamvis morbi historiam enarrando de dolore inter scapulas jam vix conquereretur; attamen probe partem examinare voluit. Nullum quidem reperiit tumorem, ad vertebra tertiam dorsalem radiorem respuebat attactum. Quod symptoma, cum primae morbi causa, saltu scilicet, componendo, totum malum ex affectione columnae vertebralis repetiit. Quae de causa applicitis duobus fonticulis, ad latere vertebrae affectae, exhibitis interne, muriae calcis et arnica, commendatoque decubitu supino per maximam diei partem, primum respirandi difficultas, dein urinae incontinentia, tandem crurum imbecillitas et postremo eorum macies evanuerunt. Virgo elapsis sex mensibus domum sana petiit, serius adhuc incolumis vivit, quamvis gravissime animi pathemata ferre debuisset.

14) A Gr. ὀσφύς, lumbus, ἄλγος, dolor. HAUFF, einige Bemerk. üb. d. gewöhnliche Kreuzweh (lumbago et rhachialgia); in: Würtemb. med. Correspondenzbl. 1837. N. 7.

15) Vir quadreginta annorum vitam sedentariam degens, haemorrhoidarius, anno 1818. consilium meum pro dolore vehementi ab ultimis vertebra lumbalibus ad medium

Quo in morbo praeterea obvenire solent formatio, frigus, concussio electrica, crurum imbecillitas <sup>16</sup>), urinae difficultates, pertinax alvi obstructio et impotentia ad coitum.

Causae.

4. *Causae* rhachialgiae sunt: vertebrarum luxatio <sup>17</sup>), fractura <sup>18</sup>), caries <sup>19</sup>), violentiae

EX-

osis sacri descendente petiit. Dolor ille jam a decem annis plus minus percipitur, verum a vesicatorio ante biennium parti affectae imposito, vehementer euctus est. Ex eo tempore excessit anaesthesia cutis crura obtegentis et tante quidam, ut neque frictioem ope pectinis setacei raditer susceptam persentiat. Extremitates inferiores (sunt aegri verba), veluti lignaeae percipiuntur. Musculi illarum edmodum flaccidi, et gressus infirmus. Urinae evacuatio difficilis, quandoque involuntaria cum alvi obstructione pertinaci. Formosae uxoris ad latus nunc impotens jacet. Curam ab eccoproticis et hirudinibus inchoavi. Serius fenticulos lateribus spinae edmovere curavi, aegro quam maxime hucusque sublevato.

16) „Die untern Extremitäten steif, der Gang schleppend“ (io rhachialgia nervosa). HAUFF l. c.

17) Cfr. cap. I. §. 1. N. 3 (34). Praeterea NEWMANN obs. d'une luxat. des vertèbr. cervic., ex *Med. repositor.* in: *Journ. de méd. chir. et pharm.* Décembre 1815. p. 362. TEILLAT ibid. 1816. Mars. BRIDGEMAN op. c. EHRLICH *chirurg. Beobacht.* Lpz. 1815. Obs. 25. (casus memorabilis, in opere commendatione digno). A. E. SCHURKE diss. de luxat. sponteo. atlantis et epistrophei. Berol. 1816. MISENDORF in *Rust Mag. Bd. 12. St. 2.* p. 413. CASPER ib. *Bd. 14. St. 3.* *Rust Arthrokakologie.* Wien 1817. §. 105 sq. (cum extensa huc spectante literatura). PALLETTA exercitat. patholog. Mediol. 1820. BOYER *Abb. üb. chirurg. Krankh. A. d. Französ.* v. TEXTOR, *Bd. 4.* p. 96. A. COOPER a tr. on dislocat. and on fractur. of the joints. Lond. 1822.

externae spinæ illatae, ut lapsus, ictus, concus-

Ed. alter. 1823. p. 539. WENZEL, l. c. p. 338—357. P. v. WALTHER, üb. d. Verrenk. d. Halswirb. nach eigen. Beobacht. in: GRAEF u. W. Journ. Bd. 3. p. 197. Unvollk. Verrenk. d. Halswirb. in: RUST, Mag. 1824. Bd. 16. St. 3. p. 420. Beobacht. ein. Verrenk. des 2. Lendenwirb. in: HORN, Archiv. 1825. St. 3. p. 469. Subluxat. d. Halswirb. in: RUST, Mag. Bd. 20. St. 1. p. 156. J. CLOQUET, Beobacht. ein. Luxat. d. Wirbels, welche mit Fractur complicirt war u. geheilt wurde. FROBIEP, Notiz. 1826. N. 322. Dislocat. des Kreuzb. in: HORN, Archiv. 1827. St. 6. p. 1096. (13). TYRRELL, Aussägung d. Bogens u. d. Dornfortsatz. d. 12. R. W. (quae cum prima lumbali luxata fuit), ex The Lancet. 1827. Vol. 11. p. 685, in: GIBSON u. JUL. Mag. 1827. St. 2. LAWRENCE, üb. d. Dislocat. d. Wirb. ex: Med. chir. transact. 1827. Vol. 13. in: HORN, Archiv. 1828. H. 1. p. 163. Ejusd. Selten. Fall ein. vollkomm. Verrenkung d. 4 Halswirb. ohne Bruch, in: FROBIEP, Notiz. 1827. Bd. 17. N. 11. et Hamburg. Mag. 1828. H. 2. p. 536. SIMMONS, luxat. column. vertebr., in: GRAEF u. W. Journ. 1829. Bd. 11. H. 2. p. 314. CANNON, tödl. Fall ein. luxat. nuchae spontan. ib. H. 4. p. 623. BARELY, Halswirb.-Verrenk. in: FROBIEP, Notiz. 1828. Bd. 19. N. 20. MEYER, luxat. vertebr. dorsal in: Verhandl. d. med. chir. Gesellschaft. des Kant. Zürich. 1828. p. 60. J. F. RAUCH, diss. de vertebr. cervical. luxat. Berol. 1828. J. A. PITTSCHAF, anluxat. vertebr. colli; in: HUPFELAND, Journ. 1829. St. 3. p. 63. LINDBLIN, Heil. ein. ... spontan. Verrenk. d. Rückenwirb. in: GRAEF u. W. Journ. 1830. Bd. 14. H. 3. p. 449. Bullet. des sc. méd. 1830. Nouv. p. 273. M. MOMMERT, Subluxat. einig. Rück.- u. Lenden-Wirbel, in: SIBBOLD, Journ. 1831. Bd. 10. St. 3. p. 529. (2). SKIFFERT, üb. d. prognost. Bedeutung u. d. therapeut. Behandl. d. Halswirbelverrenkung, in: RUST, Mag. 1831. Bd. 24. H. 3.

II. 3. p. 419. OLIVIER, *Luxat. d. Cervicalwirb.*, ex *Archiv. gén. de méd.* 1830. T. 4. Decbr. in: FRORIEP, *Notiz.* 1831. Bd. 29. N. 11. p. 172. SCHNEIDER, *Ferrenk. ein. Rückenwirb.* in: *Heidell. klin. Annal.* 1831. Bd. 7. II. 3. *Halswirbelverrenk.* in: RUST, *Mag.* 1832. Bd. 37. II. 2. p. 280. (7). SCHULZE, *Subluxat. d. Atlas*; in: *Med. Ver.-Ztg.* 1832. N. 8. *Luxat. des Rgr. ex Edinb. med. and surg. j.* 1832. April in: FRORIEP, *Notiz.* N. 731. CASPER, *Luxat. des Epistroph.* v. *Atlas*; in *ejusd. Wochenschr.* 1833. N. 9. p. 161. BURDACH, *geheilte Subluxat. d. 3. Halswirb.* ib. N. 18. p. 380. J. SYME, v. *freien Stücken eintretende Luxat. d. Cervicalwirbelb.* in: FRORIEP, *Notiz.* Bd. 34. N. 5. *Ejusd. Luxat. d. Rgr.* ib. M. A. VANHEDDEGHEM, *Beobacht. ein. vollständ. Ferrenk. d. Wirbels.*, ex *Gaz. méd.* 1834. Févr. N. 6. in: GHERSON u. JUL. *Mag.* 1835. St. 1. p. 150. SÉDILLOT, *Beobacht. ein. plötzl. Luxat. d. Epistroph.*, ex: *Gaz. méd.* 1833. T. 1. N. 63. in: ib. p. 153. A. J. SPENSER, *Ausrenk. d. Zahnfortsatz. d. Epistroph.* auf d. 3. Halswirb. ex *The Boston med. and surg. j.* 1834. Vol. 10. N. 11. in: ib. St. 3. CHAILLY, *Luxat. d. 5. R. W.* in: SCHMIDT, *Jahrb.* 1835. Bd. 6. p. 123. DUPUYTRON, v. d. *Luxat. d. Wirb. u. d. Krankheit.*, welche mit ihr verwechselt werden können; ex *ejusd. klin. chir. Vortr.* im *Hôt. Dieu z. Paris. Für Deutschl. bearb. v. v. BECH u. LEONHARDI.* Lpz. 1834. Bd. 1. St. 15. in: SCHMIDT, *Jahrb.* 1835. Bd. 7. p. 227. *Luxat. d. 3. Halswirb.* in: FRORIEP, *Notiz.* Bd. 46. N. 3. p. 48. W. THOMSON, *Fall v. freiwill. Luxat. d. Vertebra dentata.* in: SCHMIDT, I. c. Spptb. 1. 1836. p. 110. A. SHAW, *Dislocat. d. letzt. Rwirb. ohne Verletz. d. R. M.-Fuact.* in: DIRFFENBACH, *Ztschr.* 1836. Bd. 2. II. 2. p. 240. *Ejusd. Fall v. Rgr.-Verletz. (dislocatio vertebrae dorsii ultimae et lumbalis primae)*, ex: *Lond. m. gaz.* 1836. March. in: SCHMIDT, *Jahrb.* 1837. Bd. 14. p. 56. G. DORRANCE, *ein Fall v. Ferrenk. u. Bruch des Rgr. ex Americ. joura.* 1835. Aug. in: SCHMIDT, *Jahrb.* 1837. Bd. 14. p. 56. ELKENDORFF, *Ferrenk. ein.*  
Hals-

- Halswirb. in: CASPER, *Wochenschr.* 1837. N. 25. MEYER, *Luxat. d. 5. Halswirb.* in: HENKE, *Ztschr.* 1837. p. 337.
- J. N. EISELY, luxatio nuchae (duo casus) in: *Oesterr. med. Jahrb.* 1837. Bd. 15. St. 1. p. 53. GALIAY, Arthrit. cervical. u. Luxat. spontan. atloides - occipital. etc. ex *Bull. de thérap.* T. 15. p. 372. in: SCHMIDT, *Jahrb.* 1839. Bd. 22. p. 330. STEPH. S. STANLEY, *Verrückung d. Halswirbel;* ex *The Lancet* 1839. Febr. 23. p. 786. in: HUFFLAND *Journ.* 1839. St. 3. p. 19.
- 18) C. HILL, *surg. observat., being a quart. report of cas. treat. in the Middlesex hosp. Lond.* 1816. et: *Beobacht. üb. Brüche u. Verrückung. des Rgr.,* in: *Rhein. Blätt.* Bd. 2. St. 2. p. 79. F. HADCK, *diss. sist. obs. de fract. stern et vertebrae.* Lips. 1816. PALLITT, l. c. p. 231—238. e p. 319. COOPER, l. c. p. 548. WENZEL, l. c. p. 335. JEFFREY, *Fälle v. Bruch. d. Rgr.* in: *FORSTER, Notiz.* Bd. 15. N. 3. p. 39. A. W. OTTO, *Brüche d. Wirbel.* in *ejusd. seltene Beobacht. Berl.* 1824. *Erster Absehn.* 7. DOM. BRANCA, *sopra la rottura dell' osso del collo;* in: *OMODI, ann. univers.* 1827. Gennaj. p. 29. (fractura processus odontoides). LISFRANC, *Beobacht. ein. Bruch. d. Rw.* in: *GERSON u. JUL. Mag.* 1827. H. 4. *EjUSD. Heil. d. Knochenbr. d. Ws.* in: *GRAEVE u. W. Journ.* 1829. Bd. 12. H. 3. *EjUSD. Fract. des Rgr.* ex: *Gaz. méd.* T. 3. in: SACHS, *Berl. med. Ztg.* 1832. N. 13. REVEILLON, *Halswirbelbr.,* ex *Journ. gén. de méd.* 1827. Mars. in: *GRAEVE u. W. l. c. Fractur d. Wirbel;* ex *Nouv. biblioth. méd.* 1829. in: BEHREND, *Journ.* 1830. H. 4. p. 32. SMITH, *Fract. d. Dornfortsätze dreier Wirbel;* ex *The N. Amer. med. and surg. J.* 1829. in: *FORSTER, Notiz.* 1830. Bd. 26. N. 5. LAWRENCE, *Fall v. Bruch d. Rw.* in: *GERSON u. J. Mag.* 1830. H. 1. p. 134. *Revue méd.* 1830. Decr. p. 372. KREMER, *Bruch d. Steissbeins, Ursache langjühr. Nervenleid,* in: *Med. Conversationsbl.* 1830. N. 12. p. 93. BRECHT, *Fall ein. Heil. ein. Bruches d. Ws.* ex *ejusd. la cliniq.* 1829. N. 23. in: *GERSON u. J. Mag.* 1831. H. 1. *RODENUS, Bruch*

*Bruch d. We. u. d. Brustb., wobei das Leben noch 54 Stunden bestand*, in: *Badische Annal. f. d. gee. Heilk.* Karlsruh. 1831. Bd. 4. H. 1. p. 92 (4.). QUAIN, *Tod in Folge v. Fractur d. Halswirbel unter merkwürd. Umständen*, in: *BEREND, allg. Repertor.* 1833. N. 11. p. 171. J. AVBRWEG, *diss. de fractur. complico. praecip. corpor. vertebr.* Berol. 1834. JAMES (duo casus dubii) ex *Lond. med. Gaz.* 1834. Vol. 1. Jan. 1. in: SCHMIDT, *Jahrb.* 1834. Bd. 3. p. 337. R. FROBINF, *ein selten. Fall v. Fract. d. 2. Lendenwirb.*, in: *Med. Ver.-Ztg.* 1835. N. 4. W. J. THOMAS, *Fall v. Bruch d. 4. Halsw. mit R. M.-Erweichung*, ex: *Monthly archiv.* 1834. Maj. in: SCHMIDT, *Jahrb.* 1835. Bd. 6. p. 306. E. H. LAUTH, *Fract. d. Wirb. d. Halsgeg.*, in: SCHMIDT, *Jahrb.* 1835. Bd. 6. p. 377. Ejusd. *Bruch d. R. Wirbels.* ex: *Mém. de l'ac. r. de méd.* 1835. T. 4. in: SCHMIDT, l. c. 1836. Bd. 12. p. 366. B. PHILIPPS, *Fall ein. Fract. des Atlas*; ex *Lond. med. gaz.* 1836. March. in: DIEFFENBACH, *Ztschr.* 1836. Bd. 2. H. 2. p. 238. et in: FROBINF, *Notiz.* 1837. Bd. 2. N. 18. Idem: *Bruch des Atlas u. d. process. odontoides ohne plötzlichen Tod*; in: HUPFLAND, *Journ.* 1839. St. 3. p. 15. R. STAFFORD, *Fall ein. Fract. u. Dislocat. des 11. u. 12. R. W.* ex ibid, in: DIEFFENBACH, *Ztschr.* l. c. p. 240. DUGONJON, *Fall ein. Fractur d. 5. Halswirb.* ex *Journ. hebdom.* 1836. Juin. N. 23. in: DIEFFENBACH, l. c. 1836. H. 3. p. 120. D. L. ROGER, *Fract. d. We. mit Depression d. Process. spinos.* ex *Americ. journ.* 1835. N. 31. in: SCHMIDT, *Jahrb.* 1837. Bd. 13. p. 197. GRASS, *Bruch d. 2. R. Wirb.* in: *Med. Ver.-Ztg.* 1837. N. 33. p. 164. HIRAN A. PROUT, *Bruch d. 5. Halswirb. ohne Verrank. des Knochenkörp.* ex *Americ. journ. of the med. ec.* 1837. Novbr. in: FRICKS u. OFFENH. *Ztschr.* 1839. Bd. 10. H. 1. p. 117.

- 19) J. BOUILLAUD *obs. de phlegmas, et de carie des vertèbr. cervic. suiv. de quelq. réflex. sur la malad. décrite par les auteurs sous le nom de mal vertébral*; in *Journ. compl.* T. XX. N. 78. Decbr. 1824. A. W. OTTO l. c. VIII (corpora

cussio<sup>20)</sup>, compressio e. a. per indamentam fibularium, perversa puerorum sedendi ratio, inprimis scribendo, delineando, medicamenta irritantia spi-

pora vertebr. colli 4. et 5. absorpta). SCHNEIDER merkwürd. Rgr.-Krümmung durch Keuchhusten (caries vertebrae colli), in *Heidelsb. klin. Annal.* 1831. Bd. 7. II. 3. p. 476 (19). M. JACHA d. Entzünd. d. Wirbb., ihre Art. u. Ausg. in *Knochenfr. u. Congest.-Abscesse.* Erlang. 1831. STANNIUS Fall v. Communication ein. durch Caries entstand. Höhle in d. Körp. d. Wirbelb. mit d. Bronchien, in *CASPER Wochenschr.* 1834. N. 37. CONSTANT doppelte Caries vertebralis; plötzlicher Tod in Folge d. Luxat. des Hinterhauptbein. auf d. Atlas, in *SCHMIDT Jahrb.* 1835. Bd. 6. p. 111. BOUSSET St. HILAIRE üb. d. symptom. Abscesse, welche die Entblöss. u. Caries d. Wirbs. begleiten etc. ex *Revue méd.* Nov. 1834. in *SCHMIDT* l. c. p. 139. DUPUYTREN Caries d. Wirbs. in ejusd. *klin.-chir. Vortr.* l. c. St. 6. in *SCHMIDT* l. c. Bd. 7. p. 224. FLANDIN (cartilag. atlantis et epistroph. caries) in *SCHMIDT* l. c. Bd. 7. p. 371. J. F. KRIST, *Heelk. Mengeling.* Utrecht. 1835. (caries ossis coccygis ex gangraena a decubitu). J. SYME, Caries d. Atlas u. Epistropheus, Dislocat. d. Process. dentat., ex *Edinb. m. and s. j.* 1836. Jan. in: DIHVENBACH, *Ztschr.* 1836. Bd. 2. II. 2. p. 239. FRICKS, Caries d. Wirbels. ib. Bd. 1. p. 9. LIND, induratio glandulae prostaticae mit Caries d. Kreuzb., ein seltener Krankheitsfall; in: PABST, *allg. Ztg.* 1837. N. 29. VOTOT, tödl. Verletz. d. untern Theiles d. Rgr. (caries processus spinosi et transversarii trium vertebr.); in: *Med. Ver.-Ztg.* 1837. N. 33. CAUVILHIER, Krankh. d. Halswirbelkörper mit Druck auf das R. M. ex ejusd. *Anat. pathol. Livr.* 25. in: FROHNP, *Notiz.* 1837. Bd. 2. N. 20. (suppuratio et caries).

20) Cfs. esp. I. §. III. 2. (2). Frequentia rhachialgiae exempla in veredariis obveniant.

spinae prope nimis admota <sup>21</sup>), nisus in brachiis extendendis <sup>22</sup>), in ponderibus elevandis, sub sal-  
satione <sup>23</sup>), plethora <sup>24</sup>) potissimum haemorrhoi-  
dalis, aut a menstruorum suppressione <sup>25</sup>), caloris  
vel frigoris acrioris vis columnam vertebralem  
adficiens, animi pathemata <sup>26</sup>), venus nimia, ona-  
nia, castitas <sup>27</sup>), pubertas <sup>28</sup>), graviditas <sup>29</sup>), rha-  
chitis, scrophula, rheuma, arthritis et lues, dum  
vel vertebrae, vel meninges, vel medullam ipsam  
laedunt <sup>30</sup>), de quo argumento plurima infra.

## §. VIII.

- 21) Cfr. 3. (15.). In hominibus, quorum spina a vitio rhe-  
chitico venereo aut a plethora detinetur, vesicatoria elie-  
que emplastra irritantis, caute nuchae et inter scapulas  
applicari debent. Nemo enim de effectibus externae irri-  
tationis in partem jam alioquin morbosam spondere pot-  
est. Ex simplici inter scapulas sacrificetione, paralysis  
brachii ortum duxit. (FAHR. HILDBERG Cent. V. obs. 71).
- 22) e. c. apud lotrices lintee altiori loco extendentes, vel  
alias femines, dum vela ad fenestras suspendunt.
- 23) Cfr. N. 2. (13).
- 24) OLLIVIER l. c. obs. 61. p. 505. obs. 66. p. 529.
- 25) OLLIVIER, l. c. obs. 59. p. 499. HAUFF, l. c. (apud  
feminas tres statuit rhechialgiae formas, quarum causa  
menstruatio est).
- 26) RIRDLIN millenarius 110. HAUFF, l. c. In femine 50  
annorum.
- 27) Coitus et pollutiones [transitoriam rhachialgiam lumba-  
rem saepe auferunt.
- 28) Lumbos tum meribus tum feminis circa epocham pu-  
bertatis dolere lippie et tonsoribus notum est.
- 29) LOESIUS consil. N. 31.
- 30) Quod et de pedum sudore enpresso valet. Cfr. obs.  
19. apud WINKEL, l. c. p. 245.



## §. VIII.

## Diagnosis.

1. Rhachialgiam pro dolore, e spina verte-<sup>Genera-</sup>  
brali sine febre emanante definivimus<sup>tim.</sup> 1). Sequitur  
inde, dolores, qui ad spinam quidem percipiun-  
tur, ex ea autem non emanant, aut qui e spina  
quamvis emanent, febre stipantur, neutiquam ad  
rhachialgiam revocandos esse. A rhachialgia hinc  
generatim distingui debent rheumatismus acutus  
cervicis, dorsi et lumborum<sup>2)</sup>, ac illius exitus  
et in specie aegritudines quotquot *doloribus sym-*  
*ptomaticis* cervicis, dorsi et lumborum, insigni-  
untur. De istis speciatim.

2. *Rhachialgiam cervicalem* aliquando morbi<sup>R. cervi-</sup>  
*faucium et oesophagi* mentiuntur, eamque plus vice<sup>calia dis-</sup>  
simplici tum in *angina* tum in *dysphagia* obser-<sup>tingitur.</sup>  
vavimus. Interea non obliviscendum, posse hujus-  
modi morbos ita rhachialgiam post se trahere  
(dum scilicet vertebrae cervicis aggrediuntur ac  
vaginae medullae et medullae ipsi infensi fiunt<sup>3)</sup>);  
sicuti

1) Quum tractatus de dolore capitis in compendiis therapiae  
specialis civitatis jus obtinuerit, ut etiam illi doloris ver-  
tebrarum locus concedatur, nihil obstat.

2) P. 1. ed. ult. Vol. III. S. 2. cap. XXX. §. CV. N. 4. 7. 8.

3) Ao. 1796. virum valde emaciatum in nosocomio civico  
Vindobonensi (cujus tunc medicus primarius constitutus  
eram) cum ulcere faucium syphilitico, antiquo, admodum  
foetente, neglecto curavi, qui praeterea de torpore bra-  
chiorum conquerabatur. Illico medico secundario Dr.  
WIRTS edixi; ma de carie vertebrae cervicalium vix  
dubitare. Deerat adhuc dolor nuchae, post duos tantum

sicuti rhachialgia, praesertim ea, quae e carie vertebrarum cervicalium oritur, anginam excitasse visa est \*).

R. dorsalis distinguatur.

3. *Rhachialgia dorsalis* simulatur a morbis partis posticae *pulmonum*, forte et a vitiis, parum adhuc intellectis *ductus thoracici* \*), et certissime ab iis *pancreaticis* \*) et *aortae*.

R. lumbalis distinguatur.

4. *Rhachialgia lumbalis* itidem cum vitiis *aortae* \*) (caeterum rhachialgiam ex carie vertebrarum

meninges secutus, quo accedente extemplo paralysis brachii sinistri et tardius dextri oriebatur. Repentine praedicta mors, tot eorum finem imposuit. Secto cadavere corpora vertebrae cervicales tertiae, quartae, quintae, carie erosa, deteximus. Erosio vaginam medullae cervicis inflammatae attingebat. Talem *cariem* heud vero *mercurii* effectum sistere contendit MATTHAE: *an inquiry into the hist. and nature of the disease produced in the human constitution by mercury, with obs. on its connex. with Lues venerea*. Lond. 1811. 2. edit.

4) *Angina vertebralis Hippocratis*. v. Aph. S. III. N. 26. et prorrhetic. L. I. GALENUS de loc. aff. L. IV. C. 3. AETIUS tetrab. II. Serm. 4. C. 47. PAUL. AEGINETA L. III. C. 27. RUET I. o. Cfr. P. III. Vol. I. Sect. 2. cap. III. §. VII.

5) *Nec non ventriculi*. Cfr. CRUVEILHIER, *üb. d. Rückenschmerz u. sein. therapeut. Werth*, ex *Bullet. de therap.* T. 12. p. 386. in: SCHMIDT, *Jahrb.* 1838. Bd. 17. p. 273. Idem autor edmonet: cum mala organorum pectoris abdominisque frequenter cum dolore in aliquo spinae loco conjuncta sint (quem locum „*point dorsal*“ vocat), remedia therapeutica hic sunt dirigenda ut medendi scopus celerius et securius attingatur.

6) *BONET sepulcr.* L. III. S. 22. Obs. 25. (abscessus).

7) Ao. 1815. pusillum de saevo vertebrarum lumbalium dolore conquerentem curavi. Aegra morbum a gravi pon-

brarum saepe sociam agnoscentibus<sup>9)</sup>) confundi potest. Confunditur interdum cum morbis renum e. c. eorum volumine aucto<sup>10)</sup>), calculo<sup>11)</sup>) et cum affectionibus lienis<sup>12)</sup>) et cum *neuralgia ischiadica*.

5. *Rhachialgia sacralis* cum morbis uteri<sup>13)</sup>), *R. sacralis* *distingui-*  
et intestinorum, praesertim *intestini recti*<sup>14)</sup>), ut-  
tur.

pote

dare ao. 1812, sub vehementissimo terrore, elevato repetebat. Crura imbecillima fuerant atque frigebant. Jam rhachialgiam lumbarem eorum habere credideram, cum tamen abdominis examen de aneurysmate aortae descendentes nullum dubium reliquerit. Nisi hoc in casu et vertebrae jam cariosae fuerint at in nervos spinales extremitatibus inferioribus prospicientes egerint, crurum imbecillitas et frigus, defectui circuli sanguinis ex aorta aneurysmatica, in arterias iliacas et crurales, adscribendi videntur.

8) Caries, vel saltem devastatio, vertebrarum ex aneurysmatibus aortae tam frequens est, ut rarissimo haec aneurysmata sine essis illis invenerim. Cfr. MORGAGNI Op. c. Ep. XVIII. 25. Ep. XXVI. 5. WRIKARD *verm. med. Schr.* 2. B. p. 37. BAILLIE op. c. ed. SOMMERBRINGII p. 17. WALTER *anat. Museum* 2. Bd. p. 113. MIANOWSKI *Pamiętnik towarzystwa Lekarskiego Wileńskiego. T. I.* 1818. I. 191.

9) COWPER in *Philosoph. transact. N. 222. v. LAMEN* *aus-*  
*erl. Abh. I. B.* p. 178.

10) Qui pro quovis renum calculo, immerito pro lumbagine declarato, auram nummum excolperet, brevi temporis spatio dives evaderet.

11) BOWEN l. c. Sect. 22. Obs. 30.

12) Cum aegrotantes scirrhus uteri laborantes praecipuis de dolore lumborum querelas faciant, eo reliqua symptomata minus molesta saepe vix aut ne vix quidem innotent; medicus non satis expertus facile in errorem ducitur.

13) Intestini recti angustatio et scirrhus, saltem ingruenta

pote dolores ad os sacrum excitantibus, nisi ad reliqua symptomata respiciatur, confundi possit.

Indoles  
rhachial-  
giae.

6. Determinatâ praesentiâ et sede rhachialgiae; illius *indoles traumatica, inflammatoria, rheumatica, arthritica, gastrica, rhachitica, scrophulosa, scorbutica, syphilitica, plicosa, nervosa*, determinanda est.

R. trau-  
matica.

7. *Rhachialgia traumatica* examine aegri, praesertim de anamnesticis, rite instituto, communissima invenitur. Cum vero rhachialgiae saepe crurum imbecillitate stipentur, ne lapsum utpote symptoma morbi, pro caussa habeamus, cavendum. Ad rhachialgiam traumaticam et illum spinæ dolorem illamque deformationem columnæ vertebralis, cui *actio perversa musculorum* ansam porrigit<sup>14)</sup>, revocamus. *Diagnosis specialis luxationis, et fracturae vertebrarum chirurgiae* sistit objectum, quod tamen non impedit, quo minus de una luxationis forma, utpote sub adspectu morbi ad imperium medicinae spectantis obveniente, quaestionem instituamus: loquimur *de luxatione spontanea vertebrarum superiorum colli*.

Rh. a lu-  
xatione  
spontanea  
vertebra-  
rum supe-  
riorum  
colli.

8. *Quæ rhachialgia ex luxatione scilicet spontanea*

morbo, præter alvi obstructionem vix aliud symptoma quam ossis sacri dolorem excitant.

14) Legatur de hoc argumento PORTAL op. in capite præcedente citat. p. 132. GOUCEY *chirurgie* p. 166. TULPIUS observ. L. IV. C. 5. BONET sepulchret. anat. de convuls. observat. 35. LORRY de melancholia p. 115. SAUVAGES nosologia. T. I. p. 437. LIEBTAUD hist. anat. T. II. et Journ. de Trev. 1722.

*spontanea vertebrarum superiorum colli (spondylarthrocace cervicalis)*, jam HIPPOCRATI<sup>15)</sup>, GALENO<sup>16)</sup>, AETIO<sup>17)</sup>, et PAULO AEGINETAЕ<sup>18)</sup> nota, a recentioribus, tum medicis tum chirurgis, fere praetervisa, a RUSTIO<sup>19)</sup> vero et discipulo ejus<sup>20)</sup> graphice descripta, a dolore colli, noctn, tempore humido, frigido sub deglutitione aut profunda inspiratione saeviente, orditur. Examinatis cavitatibus oris et faucium nil detegitur morborum. Urget autem dolor lateris unius colli, a flexione capitis, scapulam versus, invalescens. Dolor huiusmodi, potius tensivus quam pungens, a larynge usque ad cervicem, quin immo ad scapulam lateris adfecti extenditur. Loca dolentia intuitu nil morborum exhibent, at compressa regione, qua atlas occipiti et epistropheo jungitur, aegrotus dolorem vehementem percipit. (Finis primae periodi). Auctis sensim sensimque, praesertim sub capitis motu, indicatis symptomatibus, rauco, rigor colli et reclinatio capitis versus scapulam, lateri prius dolenti oppositam, plerumque dextram<sup>21)</sup>, faciem deorsum spectante, superveniunt. Quae symptomata, postquam per hebdomadam vel mensium nonnullorum spatium duraverunt, malorum

appa-

15) Aphor. Sect. 3. N. 26. Proorrhelicor. L. I.

16) De locis affectis L. IV. c. 3.

17) Tetrabibl. II. Serm. 4. C. 27.

18) L. III. C. 27.

19) Op. c. p. 76. §. 112. (tredecim huius morbi vidit exempla).

20) SCHUECK I. c. Tract. de luxat. spont. vertebr. colli super. Berol. 1816.

21) Sedes morbi, teste RUST, longe saepius in latere cervicis sinistro I. c. p. 78.

Frank Prax. II. I. 2. 1.

apparens levamen observatur. (Finis secundae periodi). Enim vero non solum dolores remittunt, sed et capitis motus liberior evadit. At brevi post difficultas deglutiendi, alta voce loquendi et profunde respirandi redeunt. Dolor terebrans occipitis et nuchae continuo saevit, propagaturque usque ad frontis regionem. Jam vero caput ad latus alterum, ut plurimum sinistrum, cum sensu intolerabili ponderis reclinatur <sup>22)</sup>). Decubitus, excepto quodammodo in dorsum, undique difficilis, quivisque motus, socio cruciatu, physiognomiae aegroti peculiarem characterem inprimente <sup>23)</sup>, absolvitur. Caput non nisi manuum auxilio suffultum elevari potest. Sub motu nuchae hinc inde stridor <sup>24)</sup>. Accedentibus susurru aurium, temulentia, vertigine, spasmis, convulsionibus, paralyti, praesertim extremitatum superiorum <sup>25)</sup>, aphonia, sputis purulentis, sudoribus colliquativis, aeger post mensium nonnullorum curriculum, nisi benefica natura in primis morbi stadiis anchylosi salutari succurrat <sup>26)</sup>, vel febre lenta consumitur, vel, et saepius quidem, derepente moritur. *Cadavera* <sup>27)</sup> exhibuerunt: pus inter oesophagum et vertebrae colli, pharyngem exulceratam, periosteum et ligamenta prope atlantem et

22) Cfr. C. XII. §. LX. 7. De paralyti colli.

23) Rust (op. c. Tab. VII) talem imaginem exhibet.

24) „Ein Knarren und Reiben der obersten Halswirbelbeine.“

Rust l. c. p. 80.

25) Cfr. §. LX.

26) Rust l. c. p. 81. §. 118.

27) Rust p. 80. §. 117.

et epistropheum consumpta, processus condyloideos et odontoideum carie detentos<sup>28)</sup>, foramen occipitale angustatum, meninges lividas, perforatas, substantiam cerebri et medullae spinalis degeneratam, arterias vertebrales erosas, sanguinem fundentes, et extravasatum puris in cavitate pectoris.

9. *Rhachialgia inflammatoria* plerumque ad <sup>R. inflammatoria.</sup> cervicem et ad lumbos cum sensu gravativo obveniens, a rerum conditionibus, sanguinis affluxum ad spinam promoventibus inprimis a potu liquorum spirituosorum, a calore et alvi obstructione invalescit. Menstruantibus<sup>29)</sup>, gravidis, haemorrhoidariis, aut amenorrhoeâ laborantibus communissima est.

10. Dolor in *rhachialgia rheumatica* sedem <sup>R. rheumatica.</sup> saepe mutans, acutus percipitur; residet potissimum in ligamentis vertebrarum, ad earum periosteum, in meningibus, nec parcat ipsi medullae. Ibi, sub erectione vel flexione trunci augetur; hic continuus est ac plurima organa, nervos a spina accipientia<sup>30)</sup>, in consensum trahit. Subjiciuntur illi homines morbis nervosis caeterum non subditi, ut rustici et milites.

R 2

11.

28) ibidem Tab. V. fig. 1 et 2. Tab. VI. fig. 1 et 2.

29) HIPPOCRATES CONCER. praenot. N. 541. 548. Charter. T. VIII. p. 885. Cfr. P. II. ed. alt. Vol. I. Sect. 1. c. I. §. III. 52. OLLIVIER, l. c. p. 499. obs. 59.

30) Illorum nervorum optimam notionem accipies ex sequenti opere: A. C. Bock d. R. M. - Nerv. nach ihr. ganz. Verlaufe, Vertheil. u. Verbind., nebst Abbild. derselb. auf 1 Kpftaf. Leipz. 1827.

R. arthritica.

11. *Rhachialgia arthritica*, a BARTHEZ <sup>31)</sup> pulchre descripta, praesertim homines aetatis mediae et senes, quorum columna vitio rhachitico, scrophuloso, traumatico haemorrhoidali labefactata quondam fuit, aggreditur. Magnam cum rhachialgia rheumatica alit similitudinem, praeter sedem, quam sibi libenter ad dorsum eligit. Recens morbus periodice recurrere et a repentinis atmosphaerae mutationibus augeri solet; antiquior spinam recurvat. Quamvis caussa arthritica ipsam medullam spinalem afficere possit, quod illius induratio <sup>32)</sup> testari videtur; attamen plerumque vertebrae carie inficit <sup>33)</sup>, ligamenta earum anteriora longa et brevia veluti cornea, nec non cartilaginea, ob depositum ad eas phosphatum calcis, osseas reddit, ita ut lubricum amittant et veluti anchylosi <sup>34)</sup> laborantes motui obstant. Quanta inde

31) *Abhandlung üb. die Gichtkrankheiten. A. d. Franz. Berlin 1803. 2. Th. p. 86.*

32) HARDERII apilerium obs. LVIII. I. P. FRANK l. c.

33) Negat quidem id BARTHEZ, at immerito, uti ex LIEUTAUDII, MORGAGNI et PORTALII observationibus elucet. (v. PORTALI l. c. p. 129).

34) *Acta N. C. T. VIII. obs. 124. G. FLEISCHMANN Leichenöffnungen. Erl. 1815. §. 91. p. 255 sq* (casus memorabilis verae anchylosis vertebrarum dorsalium cum ossificatione fasciae longitudinalis anterioris. Vertebrarum corpora in latere dextro perfecte coalita erant, in sinistro substantiae cartilagineae quid comparuit). J. CLOQUET *Ankylose d. Wirbels*, in FRÉRIER *Notiz. Bd. 5. N. 8. p. 127* (omnium vertebrarum anchylosis, non cartilagineum ossificatione, sed periostei incrustatione ossearia effecta.



inde nervorum spinalium, qui prope locum affectum decurrunt, compressio fiat, alibi <sup>34)</sup> docebitur. Hic monuisse sufficiat, in diagnosi rhachialgiae arthriticae maxime ad morbos praegressos et ad habitum aegri, nec non ad alia diatheseos arthriticae signa <sup>35)</sup> respiciendum esse. Inter illos herpes aliaeque impetigines praepostere fugatae, quarum caussa ad vertebrarum cartilagine coniecta est, commemorari merentur.

12. *Rhachialgia gastrica* pro symptomatice *R. gastrica*, haberi posset, nisi saburrae et flatus tubum intestinalem distendentes, re ipsa congestionem in specu  
ver-

Corpora vertebrarum solummodo in dextro latere ankylosi laborabant). A. W. OTTO *selt. Beobacht. z. Anat., Phys. u. Pathol. Berl.* 1824. I. Abschn. VIII (ankylosis primae — quartae vertebrae colli inter se et cum osse occipitis). RETZIUS in RUST *Repertor.* 1823. BJ. 21. II. 2. p. 258 (omnes posteriores vertebrarum dorsi partes ankylosi affectae continuum constituebant). J. H. CH. TREMPERT *lib. d. Ankylose des Steissbeins etc. Gött.* 1836. SEBASTIAN *lib. Ankylose, ex Tydschr. voor nat. Geschied, en Physiol.* 1836. St. 3. in SCHMIDT *Jahrb.* 1838. Bd. 18. p. 203 (analysis casuum 38 ankylosis spinae). LARREY *Beschreib. ein, durch d. vollkomm. Ankylose des Kopfes mit dem ersten Wirbel u. fast aller Knochen des Stammes, so wie durch die sonderbare Bildung d. Wirbels. u. d. Brust merkwürd. Skelets; ex La presse méd.* 1837. Mars. N. 23. in SCHMIDT *Jahrb.* 1838. Bd. 18. p. 69. STEPHAN S. STANLEY *case of perfect ankylosis of the super. cervic. vertebr. to each other etc.* in: *The Lancet* 1839 Febr. 23. p. 786. v. HUFELAND *Journ.* 1839. St. 3. p. 19. (ankylosis perfecta primarum quatuor vertebrarum cervicalium).

35) Cap. XII. §. LXII. N. 4.

36) v. cap. de arthritide.

vertebrali sanguinis ansam porrigerent; quo sub respectu rhachialgia gastrica speciem rhachialgiae inflammatoriae constituit. Ab ista valde rhachialgia gastrico - verminosa differt, qua vigente muscoli columnam vertebralem ambientes, vehementer convelluntur, ac sub magnis cruciatibus *cyphosin transitoriam* excitant<sup>37)</sup>.

R. rhachitica et scrophulosa.

13. *Rhachialgia rhachitica et scrophulosa* a PORTALIO<sup>38)</sup> illustrata, vix rite intelligenda nisi doctrina rhachitidis et scrophularum alibi tradenda<sup>39)</sup> praemissa fuerit, ex vertebriis profisciscitur, spongiosis, asperis, cruentis<sup>40)</sup>, compressis, suppuratione<sup>41)</sup>, carie, mollitie et anchylosi detentis. Columna vertebralis ut plurimum inde incurvatur. Curvor vel retrorsum (*cyphosis*), vel ad latera (*scoliosis*), vel antrorsum (*lordosis*), contingit<sup>42)</sup>. Doloris parum hoc rhachialgiae genus

37) PORTAL l. c. p. 135. 38) Op. c. 39) P. III. S. 2.

40) PORTAL l. c. p. 42.

41) VOIGTEL *Handb. d. pathol. Anatomie*.

42) Spina curvata caeteris organis plus minusve imperat et corpus humanum vario modo format disponitque. Praeprimis curvorem, prima juventute antea perfectam corporis evolutionem exortum et praegrandem, samper sequitur statura minor et minima. Craniū, amplioris quam par est, pars facialis minus perfecte constructa comparet, quam pars cerebralis; foramen magnum apud omnes curvatos magis antrorsum promotum oblique positum; facies brevis arctaque, cachectici coloris; cutis jam ante aetatis annum trigagesimum quadragesimumve rugosa. Organa viri sexualia praegrandia, potentiora (WENZEL, l. c. p. 328). Pelvis deformatae, paucis exceptis in scoliosi et cyphosi. Extremitates superiores justam longitu-

nus producit, at eo facilius paralysi ansam prae-  
bet<sup>43</sup>).

dinena superant; inferiorum famur justo brevius, tibia autem longior quam par est. (Cfr. M. STERN *üb. d. körperl. Veränderung., welche d. Rgr.-Verkrümmung. begleiten*; in FROBIEF *Notiz. Bd. 39. N. 3. p. 39—48*). Quibus externis et interna conveniunt. Spina curvata medulle tenditur flectiturque; cavitates pectoris et abdominis angustantur, earum organa et systema gangliosum praeannuntur et fungentes turbantur; quo fit, ut, quamvis, illis deformitatibus tarde procedentibus, curvati sat bene valeant, normalis evolutio et nutritio corporis quodammodo impediatur. — Cognoscimus vero columnae vertebralis deformitates earumque sequelas partim ex cap. I. §. I. 3. (42). §. V. 3. (10). citatis, partim ex sequentibus tractatibus: ROLFENCK *diss. de artic. dolorib., gibbositate etc.* Jen. 1637. TULPIUS *obs. med. L. III. cap. 1. misera virginis gibbosae conditio.* WEDDEL *diss. de gibbere.* Jen. 1684. PLATNER *pr. de iis qui ex tubercul. gibbosi sunt.* Lips. 1744. HALLER *pr. gibbi descript.* Gott. 1749. SWAGERMAN *Verhandel. van het waterhoofd, en 'andere gebreeken der ruggegraant.* Amsterd. 1767. COOPMAN l. c. PORTAL *hist. de l'anatom. et de la chirurg. Par. 1773. T. V. p. 96. et l. c. C. H. A ROY de scoliosi, L. B. 1774.* HARTMANN *diss. efficacie gibbositatis in mutandis vascor. directionib.* Francof. 1778. WILKINSON *phys. and philos. essays of the distort. of the spine.* Lond. 1783. DONNER *diss. de gibbositate.* Goett. 1785. REYNBERS *de scoliosi ejusq. caus. et sanat.* Gron. 1787. PH. JONES *essay on crookedness or distortion of spine.* Lond. 1788. CROULANT *de cas palvium spinarumq. deformatar., quam adject. nonnull. annotat. descript. exhib. etc.* Lips. 1818. P. CH. OLIVIER *essai sur l'anatom. et les vices de conformat. de la moëlle épinière de l'homme.* Par. 1823. BAMFIELD in *The Lond. med. and phys. journ.* 1823. Vol. 49. et l. c. J. SHAW *further obs. on the lateral or serpentine curvature of the*

bet<sup>43)</sup>. Socia agnoscere solet vitia systematis glandularum lymphaticarum, hepatis et mesenterii<sup>44)</sup>. 14.

*spine*. Lond. 1825 et l. c. A. MEYER *Scoliosis, durch Einreib. v. Cantharidentinktur geheilt*; in FÄHRREICH u. HUSKELBACH *Beitr. z. Nat.- u. Heilk.* Nürnberg. 1827. Bd. 2, p. 156. OUYRARD l. c. (enumerat omnes curvaturas species). C. F. TORTUAT *pract. Beitr. z. Therapie d. Kinderkrankh.* Münster 1829 (*Scoliosis grandis cum deformato osse ischii dextri sanata mercurio sublimato*). SCHNEIDER *merkwürdige Rgr.-Krümmung durch Keuchhusten*; in *Heidelb. klin. Annal.* 1831. Bd. 7. II. 3. A. GORIACUCHI diss. de incurvationibus columnae vertebral. abnormib. Vindobon. 1831. FLEISCHMANN *ungewöhnl. Krümmung d. Wbzs.* in *Berlin. med. Ztg.* 1832. N. 26 (Casum, non minus memorabilem, habet SACHERO in *Annal. univ. di med.* 1830). M. STERN diss. de gibbosis nonnulla. Berol. 1833. Idem *anat.-physiol. Bemerk. üb. Rgr.-Krümmung.*, in MÜLLER *Archiv* 1834. II. 3. p. 225—267. et l. c. D. C. SIMON *coup d'oeil sur les princip. caus. actuel. des noeuds de nerfs et des difformités de la taille de jeun. person.* St. Petersburg. 1834. E. W. DEFFIN *on the nat. and caus. of lateral deformity of the spine*. Lond. 1834. CHASSAINGAC *Bemerk. z. Anat., Phys. u. Pathol. d. Würfels, ex Archiv. gén.* 1834. Mars. in SCHMIDT *Jahrb.* 1834. Bd. 3. p. 277. A. COMBE *the principles of physiology, applied on the preservat. and to the improvement of physical and mental educat.* Lond. 1834. Cap. 4 et 5. L. STROEMER *üb. Paralyse*, l. c. IX. Beobacht. Ueb. d. Verhältnisse der Scoliose z. Rhachitis. E. J. KÖNIG, *neueste (?) Andeutg. Ab. d. Seitwärtelkrümm. des Rgr. etc.* Stuttg. 1837. FENR, *Nutzen des inn. u. äuss. Gebr. des braun. Berg. Leberthrans bei einem an der Kyphosis leidend. 8jähr. rhachit.-scrophulös. Knaben*; in POMMER *schweizer. Ztschr.* 1838. Bd. 3. H. 1.

43) Cap. XII. §. LXII. N. 4.

44) PORTAL l. c. p. 53.

14. *Rhachialgiam dari scorbuticam nemo im-* R. scorbutica.  
*perii diatheseos scorbuticae in systema ossium*  
*memor, mirabitur. Dolores ad lumbos praecipue*  
*urgentes ab initio fugaces sunt et noctu aucti<sup>45)</sup>.*  
*Superficies externa vertebrarum affectarum vix a*  
*norma deflectit. Verum corpora vertebrarum po-*  
*rosa, excavata, collapsa, consumta, non sine lae-*  
*sione medullae ipsius, reperiuntur<sup>46)</sup>.* *Diagnosis*  
*rhachialgiae, de qua loquimur, ex signis et aetio-*  
*logia scorbuti desumitur. Mercurii abusus hic*  
*sibi locum vindicare videtur<sup>47)</sup>.*

15. Longe vero saepius in rhachialgiis ipsa R. syphili-  
*syphilis accusanda est. Dolor ut plurimum ad* L. lica.  
*vertebras dorsii et lumborum praecipue noctu et*  
*ab attactu urget; locus affectus et tumore insigni-*  
*tur, qui dolorem praecessisse est visus<sup>48)</sup>.* *Co-*  
*lumna vertebralis aliquando miros in modos in-*  
*curvatur, scilicet nunc antrorsum, facie humum,*  
*nunc retrorsum, vultu coelum versus spectante<sup>49)</sup>.*

Extre-

45) Idem ibidem, p. 83.

46) BERTII *osteologie. T. III.* p. 86. PORTAL l. c. p. 88, 19.

47) Virum a. 1818. Vilnae exaravi, qui notae diatheseos scorbuticae ex mercurii abusu exhibebat. Praeter ossium generales dolores, et vertebrae, ultima scilicet dorsalis atque prima lumbalis, dolebant. Abdomen praeterea quasi cingulo comprimi videbatur. Regimen antiscorbuticum at imprimis radices sarsaparillae decoctum dolores quotquot erant debellavit. Cum idem vir serius pulverem antispasmodicum rubrum STANLEY summisset, pauca quae in eo ob cinnabarem invasitur, mercurii dosis ossium omnium dolores revocavit.

48) PORTAL l. c. p. 3.

49) Idem ibidem, p. 4—6.

Extremitates spasmis, anaesthesia, convulsionibus tentantur. Nutritionis opus multum vigente febricula hectica laeditur. Cadaverum enim sectiones hominum ex rhachialgia syphilitica defunctorum, mensenterii glandulas et hepar simul infarctu laborasse, docuerunt<sup>50</sup>). Vertebrae detectae sunt carie erosae, cerae instar molles, corporique sustinendo impares, ita ut adulti, infantibus fere similes facti, facile concidant. Specus, quo loco vertebrae affectae sunt, angustatur, repleturque sero viridescente<sup>51</sup>).

**R. plicosa.** 16. *Rhachialgia plicosa* totam columnam vertebralem detinere solet. In viro generalem vertebrae dorsum ankylosin vidimus. Cutis tergum cooperiens admodum tensa et extenuata est, unde processus spinosi facillime numerari queunt. Plurimi constrictionem, cinguli instar abdomen detinentem, queruntur. Aeger sub repentinis atmosphaerae mutationibus maxime patitur. Extremitates praecipue inferiores progrediente morbo contractura afficiuntur. Generatim plurima plicae symptomata, ex affectione medullae spinalis explicari possent, qua de causa operae pretii erit, columnam vertebralem in cadaveribus plicosorum examini subicere.

**R. nervosa.** 17. *Rhachialgia nervosa* ex medullae spinalis primaria affectione, ut plurimum ex venere nimia, et onania oritur. Dolor vel nucham vel lumbos<sup>52</sup>),  
con-

50) Idem ibidem. p. 5. 10.

51) Idem ibidem. p. 5.

52) HAUFF (l. c.) aëfert casum rhachialgiae lumbalis nervo-

concessis remissionibus, occupat. Eo vigente oestrus venereus in exhaustis licet aegrotis sub repetitis pollutionibus diurnis et nocturnis accenditur<sup>53)</sup>. Credimus immo nisum inconsuetum ad venerem, praesertim tenera adhuc in aetate, saepe *symptoma* potius, quàm causam morbi spinæ esse, de quo argumento alibi plura<sup>54)</sup>. Rhachialgia nervosa transitoria et hystericis familiaris est, immo malorum multiplicitas, quam in omnibus corporis partibus accusare solent, affectioni medullæ spinalis praecipue tribuenda videtur.

## §. IX.

*P r o g n o s i s.*

1. *Principiis obsta!* Quod quidem praeceptum <sup>Genera-</sup> nullibi habet majus momentum, quam in rhachial-<sup>tim.</sup>gia, quae pro varia sua sede et indole varia ea-que gravissima mala portendit.

2. Morbi generis nervosi alias incomprehen-<sup>Rhachial-</sup>sibiles, puta paralysis, tetanus, convulsiones, <sup>gia trau-</sup>chorea Sti Viti, etc., probe intelligerentur, si <sup>matica.</sup>doloris levioris, quondam ex transitoria columnae vertebralis laesione orti, ratio haberetur. Ex parva enim causa gravissima pullulare solent mala. 3.

sae, nec ab haemorrhoidibus, nec a menstruatione anomala, sed, ut videtur, a nimia caudae equinae sensibilitate effectae.

53) Viram 24 annorum mense novembri 1818. vidi, qui sub insultu rhachialgiae nervosae lumbalis penem retractum ac rigidissimum exhibebat.

54) P. IV. cap. de tabe dorsali.

R. inflam-  
matoria et  
rheumati-  
ca.

3. Nulla vero *rhachialgiae* species periculum inagis urgens agnoscit, quam *inflammatoria et rheumatica*. Illa ob metum, ne vasa sanguinea praeter modum distenta rumpantur<sup>1)</sup>; haec ob timorem ne caussa rheumatica in involucra medullae saeviens, extravasatum specus serosum inducat. Utroque in casu *apoplexiam columnae vertebralis* cruentam vel serosam expectandam esse, clare patet. Quodsi hujus apoplexiae in speciali capite non tradamus doctrinam, ratio in eo quaerenda est, quod omnes huc spectantes notiones in capitibus de rhachialgitide, hydrorhachitide et de paralysi aliunde tradere cogimur<sup>2)</sup>.

4.

- 1) OLLIVIER l. c. obs. 61 (ruptura vasor.), 62. 64. 66.
- 2) Interea conferantur: OLLIVIER l. c. chap. 6. PUTIN *apoplexie de la moëlle épîn.*, in *N. Bibl.* 1828. Jan. Févr. v. HECKER *lit. Annal.* 1829. Apr. *Apoplexia spinalis*; ex *N. Bibl.* 1829. Noubr. in HORN *Archiv.* 1830. St. 6. MONOD et CRUVEILHIER in KALISCH *med. Zig. des Aus-land.* 1833. N. 16. ELSASSER in SCHMIDT *Jahrb.* Bd. 10. p. 324 (8). C. G. SACHERO *Gesch. ein. Apoplexie d. Rückenmarks*; ex *Repertor. del Piemonte*, 1834. Ottbr. Noubr. in SCHMIDT *Jahrb.* Bd. 9. p. 309. GRISOLLE *Apoplexie u. Erweichung d. R. M.* ex *Journ. hebdom.* 1836. N. 10. in SCHMIDT *Jahrb.* 1836. Bd. 11. p. 31. CLESS *apoplex. sanguin. cerebr. et spinalis*; in *Würtemb. med. Corresp.-Bl.* 1837. Bd. 7. N. 51. EVERY KENNEDY *Beobacht. üb. Hirn- u. R. M.-Apoplexie*; ex *Dublin Journ.* 1837. Jan. in FROBER *Notiz.* 1837. Bd. 2. N. 3. A. M. HORNUNG *apopl. spinal. sanguin.*; in *Oesterr. med. Jahrb.* 1837. Bd. 12. St. 4. p. 594. Idem *apopl. spinal. serosa*; ib. p. 595. TRESEN *unvermuthet plötzl. Todesfälle u. deren auffallende Sectionsergebnisse*, in



4. *Ipsa rhachialgiae arthriticae descriptio*, R. arthritica et gastrica.  
quid

HOFELAND, *Journ.* 1837. St. 12, Fall 9. PH. HURTIN, l. c.  
*Apoplexie des R. M.* — Apoplexia spinalis aut rarissimo  
occurrit, aut potius crebrius non cognoscitur. Quae ex-  
stant observationes morbi et necroscopicae haec docent  
Horripilat aegrotus, inquietus et caducus est repentine;  
conqueritur de dolore, saepe vehemensissimo in uno  
alterove spinæ loco. Caput fervescit, facies rubet, al-  
buginea injecta est, pupilla contracta, sitis plerumque  
magna, urinae interdum cruentae, sensus et animi facul-  
tates incolumes, excepta voce: nam semper aphonia ma-  
gis minusve perfecta adest, nec non deglutendi et respi-  
randi difficultates, vigiliae, cutis temperatura normalis,  
pulsus rhythmico normalis aut parum acceleratus, plausus  
durus aut mollis, tensus et pulsus cutaneo non dissimilis  
(*stadium congestionis*). Progredientibus respirandi et de-  
glutiendi difficultatibus paralysis observatur extremitatum  
superiorum et inferiorum, vesicae urinae et intestini  
recti, unde urinae et faecum exitus iuscius; sensuum  
functiones laesae, coma, stridor dentium, ex sede morbi  
trismus aut convulsiones extremitatum et, accedentibus  
aepe febre et apoplexia cerebrale, mors (*stadium exsu-  
dationis*). *Necroscopia*: Venae columnae vertebrae san-  
guis atro turgidae, substantia vertebrarum fusca, textura  
cellulosa, membranosa et partim medullae substantia  
rubrae quasi injectae et haec emollita; extra membranas  
nec non in medullae substantia sanguinis coagulati et seri  
extravasati; nervi medullae spinalis injecti; capitis cavi-  
tas plerumque normalis: raro vasa injecta et serum atque  
sanguis extravasatus. — *Causae* apoplexiam cerebralem  
excitantes (P. II. ed. alt., Vol. I. S. I. C. V. §. XXVI.  
1 et 2) partim et huc spectant. Addimus tantummodo  
portationem ponderum gravium in dorso et omnia, quae  
columnae vertebrae plathorae favent: nam causa pro-  
xima congestio est sanguinis et extravasatio intra spinem

quid timendum sit, testatur. Interea et minores ejusdem mali gradus exstant, vidimusque haud paucas rhachialgias indolis arthriticae, quae excitatis, dum vigeabant, multifariis symptomatibus nervosis, inprimis ad extremitates inferiores, hora somni <sup>1)</sup>, per urinam sedimento arthritico instructam, perque sudores, aut diarrhoeam placide terminabantur. Idem de *rhachialgia gastrica* quam maxime transitoria valet.

Rh. rachitica et scrophulosa.

5. Prognosis *rhachialgiae rachiticae* et *scrophulosae* ex tractatu de paralyti magis magisque palam fiet. Jam vero illius descriptio, quanto periculo stipetur, satis ostendit.

Rh. scorbutica, syphilitica et plicosa.

6. *Rhachialgia scorbutica* haud aliter, quam inter homines egenos, caussis scorbuticis diu obnoxios obvenit, et dum cariem vertebrarum sociam habet,

et ejusdem organa. — *Diagnosis* est difficilis. J. P. FRANK primus differentiam apoplexiam inter cerebralem et spinalem statuit, quae sensuum animique facultatum integritate ab illa distinguitur, nec non pulsu sic dicto spinali et loco spinæ, aut nuchæ et inter scapulas, aut crucis, aliquo valde dolente. — *Prognosis* est infausta, crebrius cito lethalis, aut transit morbus, facultatibus animi illaesis, in paralytin insanabilem. Febris accessoria, saltim si symptomata cephalica adsint aut redeant, non bonum est signum, ut his exparti sumus. — *Cura*: Remedia interna et externa, contra apoplexiam cerebralem (l. c. §. XXIX.) commendata, incassum adhibita sunt, quod nec minus de hirudinibus, cucurbitulis cruentis, apispasticis et moxa, ad spinam applicatis, valet: sublevarunt, non sanaverunt morbum.

3) P. II, ed. alt. Vol. I. Sect. 1. c. VIII, §. XXXVIII, 1 (1).

habet, vix spem sanationis relinquit. Idem de *rhachialgia syphilitica* valeret, nisi etiam in pro-  
vecto morbo specificâ medendi ratione veluti mi-  
racula operarentur \*). Utinam idem de *rhachialgia*  
*plicosa*, prognosin a plica \*) desumente, dicere  
liceret!

7. Quamvis caussa *rhachialgiae nervosae* mi- R. nervo  
nus materialis, quam caussae reliquarum *rhachial-* <sup>6a</sup>  
*giarum* videatur, attamen nisi malum transitorium  
sit, cura multis difficultatibus \*), in tractatu de  
epilepsia et de tabe dorsali enucleandis premitur.

### §. X.

#### C u r a.

1. Modus vitiis gravissimis columnae verte- Genera-  
bralis medendi, praecipue in tractatu de cyphosi <sup>tim.</sup>  
paralytica exponetur; qua de caussa hic solum  
therapia *rhachialgiae*, utpote simplicis doloris spi-  
nae, expectanda est \*).

2. Curam vertebrarum luxationis, fracturae C. rh. tra-  
et diastaseos chirurgiae derelinquendo, adversus <sup>maticae.</sup>  
*rhachialgiam traumaticam* recentem commenda-  
mus

4) PORTAL l. c. p. 13. 5) P. I. ed. alt. Vol. III. S. 2. c. XXII.  
§. LXXIV.

6) In femina, de qua HAUFF (l. c.), diversissimae medendi  
methodi adhibitae sunt, ast incassum. Omnibus medica-  
mentis remotis aegrotâ melius se habet.

1) De cura in genere censet HAUFF (l. c.), sanguinem sta-  
gnantem lenibus eccoproticis, sulphure, et sanguinis ex-  
tractionibus localibus removendum esse, et commendat  
remedium palliativum: Pannus laneus triplex aut quadru-  
plex complicatus et in regionem lumbalem impositus ferro  
calefacto (*Biegeleisen*) laevigatur.

mus in plethoricis et robustis hominibus *venae sectionem* et quidem in affectione vertebrarum cervicis ac dorsi, e brachio, in illa lumborum et sacralium e pede. Peracta phlebotomia ad *hirudines*, duodecim, viginti, circa vertebrae dolentes applicitas confugiendum. Super partem affectam *aquam frigidam*, cum salibus refrigerantibus, aut acetate plumbi, linteorum complicatorum ope applicamus. Simul alvum *eccoproticis* apertam tenemus, imperatâ severâ dietâ, conciliatâque aegroti *positione horizontali ac summa quiete*. Nec rhachialgia traumatica senescens hirudines semper respuit, quae si morbum non auferrent, illico ad *fonticulos* ad latera vertebrae affectae confugiendum foret, exhibito intus infuso *florum arnicarum*. Vertebrae *vix terebrationem* ut cranium admittere videntur<sup>1)</sup>; interea vel ad hanc sub iisdem rerum positionibus, sub quibus *cranii trepanatio* indicatur, conclamato caeterum in casu, sine scrupulo confugeremus. Luxationi spontaneae vertebrarum protractae, *causticum potentiale* lateribus nuchae admovetur. In primis stadiis *hirudines* et *fonticuli*. Praeterea latente labe quadam, pharmaca ad vitium scrophulosum, arthriticum, venereum eradican-<sup>2)</sup> dum, idonea<sup>3)</sup> administranda sunt.

C. rh. in-  
flamma-  
toriae.

### 3. *Rhachialgia inflammatoria*, magis etiam, quam

- 2) CAROL. BELL l. c. Quam audeam, a CLINN propositam operationem TYRRELL bis, infausto autem eventui, instituit. *V. The Lancet*, 1827. *Fol. XI*, p. 685. GIBSON et JUL. *Mag.* 1827. *St. B.* p. 356. *FRONIER Notiz. Bd. 4, N. 1.*
- 3) REUT l. c.

quam traumatica, methodum exposcit antiphlogisticam. Nec una hîc valere solet *phlebotomia*, sive *hirudinum* applicatio. Primâ nempe applicatione istorum ad partem affectam operatâ, alteram libenter circa ani vasa instituimus, inprimis si morbus in haemorrhoidariis, aut amenorrhoeâ laborantibus obveniat. Caveamus hîc a linimentis acribus, a sinapismis et a vesicatoriis circa spinam admotis; quatenus haec in majorem cruoris copiam ad partem affectam determinant. Contra vero scopo revulsivo, irritantia extremitatibus ad moveri possunt, alvo simul ecoproticis subductâ. Spinae fotum frigidum vix et nonnisi per transennam admoveamus. Verum, saltem noctu, aegro positionem in alterutrum latus, lecto pelle alcis vel alia obducto, conciliamus.

4. Methodus vix indicata et *rhachialgiae* C. rh. rheumaticae. quadrat; enim vero solummodo fracto omnino impetu inflammatorio morbi, ad *diapnoica* et *vesicatorium*, leviori in malo, lateribus vertebrae affectae admotum, aliâs illi ipsi superimpositum, confugere licet. Nec *balnea tepida*, *vapores aquæ* vel *sulphurei* \*) omitti debent. Quod si causa rheumatica jam *collectioni liquoris extravasati* in specu vertebrali ansam dederit; secundum regulas alibi tradendas \*) incedendum foret.

5. *Rhachialgiae arthriticae* in limine *evacuationis sanguinis*, saltem *locales*, opponendae. C. rh. arthriticae.

#### Prae-

4) DE CARRO: *Observations pratiques sur les fumigations sulphureuses*. Paris, 1819.

5) Cap. IV. §. XIX. N. 7.

Frank Prax. II. 1. 2. 1.

F

Praeterea omnia, ut dicunt, colatoria adaperita tenenda sunt, quo scopo *electuarium lenitivum* ad vespertas, et decoctum *stipitum solani dulcamarac* mane inserviunt, non neglectis *balneis acribus* pedum, vel *universalibus sulphureis*. Porro vita sedentaria cum moderato corporis motu commutanda. Conducunt praeterea *frictiones* cum panno laneo, vaporibus *succini*, *mastichis*, *benzoes* imbuto, mane et vespere secundum columnae vertebralis curriculum institutae. Spinae rigiditati *emollientia topica*, *unguentum ex axungia porcina* cum *acido nitrico*, aut *phosphorico*, *emplastrum saponis* vel *diaphoreticum Mynsichti*, *balnea vaporis*, *embrocatio*<sup>6)</sup> opponuntur; quae si non juvarent, sine temporis jactura ad *fonticulos* circa locum affectum institutos confugiendum est.

C. rh. gastricae.

6. Cum *rhachialgia gastrica* saepius plethoram spinalem sociam agnoscat<sup>7)</sup>, illius curam *hirudinibus* circa vertebrae dolentes ordimur. Novae autem congestiones *resolventium*, *eccoproticorum* et *carminativorum* usum exposcunt. *Vermes anthelminthici* expelluntur.

C. rh. rhachiticae et scrophulosae.

7. Experientia multiplici edocti sumus, et *rhachialgiae rhachiticae* atque *scrophulosae* *hirudines*, circa spinae partem affectam applicitas, convenire. Praeterea cum, praesenti in morbo, viscera abdominalia plerumque simul labefactata sint<sup>8)</sup>, caute alvum sollicitamus, caute inquam,

ne

6) KAUSER lib. d. *Anwend. d. Douche*; in *HUYBLAND Journ.* 1824. St. 3. p. 33. Embrocatio aquae calidioris.

7) §. VIII, 11.

8) Ibidem. 12.

ne latentem forte inflammationem glandularum meseraicarum provocemus. Si rhachialgia, sine omni vertebrae tumore obveniat, et aeger infantibus delicatis adnumeretur, *fonticulos* nequaquam lateribus spinae, sed potius ad *brachia* admoveamus. Quam maxime enim interest, omnia quae columnam vertebralem irritare possent, evitare. Qua de caussa et indumenta fibularia, quibus orthopaediae addicti curvorem columnae vertebralis avertere aut corrigere student, cum PORTALIO <sup>9)</sup> aliisque <sup>10)</sup> non nisi cautissime admittimus. Contra vero modicum corporis motum, in aëre libero, rusticano, choreas, palaestram, maxime vero *nationem*, simplici *balneo frigido* longe anteponendam, commendamus. Victus esto praecipue vegetabilis cum carne juniorum animalium. Nisi aegri alvi obstructione laborant, potus ex *glandibus quercus roboris tostis*, vernali tempore *succi recenter expressi herbarum boraginis officinalis, veronicae beccabungae, hederæ terrestris* conducunt. Rx fonte pharmaceutico semel bisve de die vasculum semis decocti radicis vel *rubiae tinctorum*, vel *inulae helenii*, et ad noctem exiguae at diu continuatae doses *aethiopis antimonialis* <sup>11)</sup> vel *muriatis calcis* adhibentur. Ad spinam, doloris iam iam expertem, firmandam, *frictiones tergi* ope *uni calidi, alcohol camphorati, spiritus formica-*

F 2 rum,

9) L. e. p. 47—68. 10) Cfr. cap. I. §. V. 3 (10).

11) Non pudet pharmacum istud a grano dimidio ad granum spatio nychthemeri ipsis adolescentibus exhibere.

*rum, mastichis, roris marini vel alia jure proponuntur.*

C. rh. scorbuticae et syphiliticae. 8. Cum *rhachialgia scorbutica et syphilitica* methodum generalem scorbuto et syphiliti mendi, exposcant, therapia illarum in aliis hujus operis locis, quaerenda est <sup>12)</sup>).

C. rh. plicosa. 9. *Rhachialgia plicosa* curam variam in variis aegris exposcit, ac vix alia quam palliativa obtinetur. Robustis et succi plenis *cucurbitulae scarificantes* loco dolenti, et *hirudines* ano admotae, *eccoprotica* ex salibus refrigerantibus cum *sulphure*, et *balnea marina* conducunt. Debilibus prosunt decoctum radicis *inulae helenii*, herbae *vincae pervincae*, stipitem *solani dulcamarae*, extractum *daturae stramonii*, *emplastra aromático-narcotica* ad partem dolentem, ne dicamus de auxiliis evolutionem trichomatis elicientibus <sup>13)</sup>).

C. rh. nervosa. 10. *Rhachialgia nervosa* ex nimia venere vel onania, *balnea subfrigida*, praesertim *marina*, et usum extracti *cinchonae*, *florum salis ammoniaci martialium*, et maxime *camphorae* <sup>14)</sup> exposcit. Generatim conducunt *balnea tepida*, frictio *spinnae* cum *laudano liquido Sydenhami* et *aethere*, cum *oleo hyoscyami nigri cocto*, cum *balsamo vitae Hoffmanni externo*, atque intus, lenia amara, ut extractum *fumariae officinalis*, *cardui benedicti*,

12) P. II. Vol. II. Sect. 2. C. de scorbuto. P. IV. Vol. II. Sect. 1. cap. de syphilide.

13) P. I. ed. alter. Vol. III. Sect. 2. C. XXII. §. LXXV. 2.

14) Ad granum unum hora somni.



*dicti, maxime vero decoctum florum arnicae montanae, vel radicis inulae helenii, nec non infusum chenopodii ambrosioidis.*

11. Quantum in cura *rhachialgiae* ad *com-* Cerb. comp-  
plicata.  
*plicationes* et ad conditionem peculiarem aegrotantis respiciendum sit, ille intelliget, qui haud ignorat: fieri posse, ut homo, cujus columna vertebralis in infantia a rhachitide labefacta fuit, serius violentias illius externas patiat, ut inde magis magisque male tractata spina, ingruentibus annorum curriculo vel arthritide vel syphilitide vel utraque simul, haec mala maxime in locum jam prius affectum irrumpant majoremque ad eum cruoris affluxum determinent, atque sic *rhachialgiam* producant, quam pueret quidem *rhachitico-traumatico-arthritico-syphilitico-inflammatoriam* nuncupare, quaeque tamen non sine respectu tot tantarumque complicationum curanda foret!

### CAPUT III.

#### *De rhachialgitide.*

##### §. XI.

##### *Definitio, litteratura.*

1. *Rhachialgitis* dicitur inflammatio medullae spinalis et meningum eam ambientium, febre, Definitio.  
do-

dolore spinæ et affectionibus multifariis partium, ab illa nervos accipientium, stipata <sup>1)</sup>).

Litteratur.  
za.

2. Praeter auctores, qui de morborum doctrina columnæ vertebralis in genere bene meruerunt <sup>2)</sup>); *rhachialgitidis* illam excoluere: HAEFFNER <sup>3)</sup>), BERGAMASCHI <sup>4)</sup>), BREHA <sup>5)</sup>), HEER <sup>6)</sup>), DESFRAY <sup>7)</sup>), GOELIS <sup>8)</sup>), DZONDI <sup>9)</sup>), BARBAROUX <sup>10)</sup>), M. FUSK <sup>11)</sup>), K. L. KLOHSE <sup>12)</sup>), CLOT <sup>13)</sup>), PARENT-DUCHATELET et L. MARTINEZ <sup>14)</sup>), PINKEL <sup>15)</sup>), ROMBERG <sup>16)</sup>), SONNEKALB <sup>17)</sup>), L. WOLFF <sup>18)</sup>), SIBERGUNDI <sup>19)</sup>),

WETZ-

1) STENON. *Myelitis* (= *Muslöt medulla*), *notiaomyelitis*, (= *vertebræ ad dorsum pertinens*), *spinitis*. GRÆK. *Rückenmarksentzündung*. ITAL. *Rachialgitide*.

2) Cap. I. §. I. 3.

3) Diss. de medull. spin. inflamm. Marb. 1799.

4) Osservaz. sulla infiammaz. della spin. midoll. e delle sue membrane. Pav. 1810. Sulla mielitide stenica e sul tetano, ib. 1820.

5) Della rachialgit. cenni patol. v. *Atti dell' Acad. ital. delle scienze, lett. ed arti*, Vol. I. Livorno 1810. Vers. germ.

J. CH. HARLESS. Nürnb. 1813.

6) Diss. de inflamm. medull. spin. Erlang. 1813.

7) Diss. essai sur le spinitis. Par. 1813.

8) Salzbg. med.-chir. Zeitg. 1815. N. 85.

9) Ueb. Nervenentzünd., insonderh. üb. Entzünd. des R. M. Halle 1816. p. 120. sq.

10) Diss. de medullae spin. inflamm. Taur. 1818.

11) D. R. M.-Entzünd. Hamb. 1819. 1825. 1832.

12) Diss. de myelitis. Hal. 1820.

13) Recherch. sur le spinitis. Montp. 1820.

14) Recherch. sur l'inflamm. de l'arachnoïde cérébr. et spin. Par. 1821. Cfr. OMODINI, ann. 1825. Vol. 25. p. 402. Vol. 36. p. 186. 1826. Genn. p. 72.

15) Beobacht. üb. R. M.-Entzünd. in HORN Archiv. 1822. St. 3.

16) Arachnoiditis spinal. ib. 1823. St. 1. p. 68.

WETZLER<sup>20)</sup>, G. F. FRIEDRICH<sup>21)</sup>, DESPORTES<sup>22)</sup>,  
BRIERRE<sup>23)</sup>, P. GASSAUD<sup>24)</sup>, J. B. MÜLLER<sup>25)</sup>,  
J. HINTERBERGER<sup>26)</sup>, JAHN<sup>27)</sup>, DRESSER<sup>28)</sup>,  
SCHMIDT<sup>29)</sup>, STEGMANN<sup>30)</sup>, BEHR<sup>31)</sup>, ALBERS<sup>32)</sup>,

J. AL-

- 17) Eine eigenthüml. u. ganz besondere Krankh. des R. M.,  
nebst ein. Bemerk. üb. d. Entzünd. desselb. in *Zeitschr.  
f. Nat.- u. Heilk. Dresd.* 1823. Bd. 3. H. 1. p. 65.
- 18) Beobacht. ein. chron. Entzünd. d. R. M. Hamb. 1824.
- 19) Beobacht. ein. Myelit. epidem., in *HARLESS rhein. Jahrb.*  
1824. Bd. 7. St. 2. p. 79.
- 20) Fall v. chron. R. M. Entzünd. in *HARLESS l. c.* 1824.  
Bd. 9. St. 2. p. 85.
- 21) Diss. de myelitis. Berol. 1825.
- 22) Note sur l'inflamm. de la moelle épinière, considérée  
comme cause de diverses affect. de la poitrine et de l'ab-  
dom., in *Revue méd. Fév.* 1825. Cfr. *OMOIDI ann.*  
1826. Febr. p. 377.
- 23) Fall ein. beobacht. Myelitis; ex N. biblioth. 1826. 5. in  
*HUCKER lit. Ann.* 1827. Octbr. p. 165. (4).
- 24) Obs. sur deux cas d'inflamm. de la moelle rhachidienne,  
précéd. de quelq. reflexions sur cette malad., in *N. bibl.  
méd. Par.* 1828. Mars. German. in *FRONIER Notiz.* 1828.  
Bd. 20. N. 19. p. 297.
- 25) Sopra una forma particolare di rhachialgit. acuta che  
attacca a preferenza i fanciulli; in *OMOIDI ann.* 1828.  
Agost. p. 258.
- 26) Abhandl. üb. d. Entzünd. d. R. M. etc. Linz 1831. et in  
*Med.-chir. Ztg.* 1832. Bd. 2. N. 31—35.
- 27) Bemerk. üb. d. Entzünd. d. R. M. etc. in *HORNBAUM  
med. Convers.-Blatt.* 1831. N. 1. p. 2. N. 2. p. 9.
- 28) Hydrocephal. acut. mit nachfolg. Myelitis; in  
*HORNBAUM l. c.* 1832. N. 10. p. 73.
- 29) R. M.-Entzünd. u. der. Folgen; in *RUST Mag.* 1832.  
Bd. 37. H. 2. p. 262, et *HUFELAND Journ.* 1833. St. 2. p. 130.
- 30) Myelit. lumbal. chronica; in *HORN Archiv.* 1832. St. 5.

J. ALEXANDER <sup>33</sup>), FUCHS <sup>34</sup>), J. B. FRIEDREICH <sup>35</sup>), C. F. BELLINGERI <sup>36</sup>), SCHREYER <sup>37</sup>), CLESS <sup>38</sup>), WINTERNITZ <sup>39</sup>), RÖSCH <sup>40</sup>), BARTELS <sup>41</sup>), C. TIALE <sup>42</sup>), ANDRAL <sup>43</sup>), NIESE <sup>44</sup>), S. ANNAN <sup>45</sup>), H. J. MALETIUS <sup>46</sup>), BONORDEN <sup>47</sup>) et passim citandi.

## §. XII.

- p. 306. cfr. ejusd. *Merkwürdige Folgen ein. Falles*; in ib 1828. St. 2. p. 306 (6).
- 31) *Entzünd. des verlängert. R. M.* in CASPER *Wochenachr.* 1833. N. 9. p. 163.
- 32) *D. Entzünd. d. hart. Haut d. R. M.* (perimeningitis med. spin.) in GRAEFE u. W. Journ. 1833. Bd. 19. II. 3. p. 347.
- 33) *Ein Fall v. R. M.-Entzünd.* ex Lond. med. gaz. X. in *Summar. des Neuest. a. d. in- u. ausl. Med.* 1853. Bd. 5. p. 83.
- 34) *Myelitis*, in *Heidelb. klin. Annal.* 1833. Bd. 9. II. 1. p. 50.
- 35) *Ueb. d. Entzünd. d. R. M.* in SCHMIDT *Jahrb.* 1834. Bd. 3. p. 231. sq.
- 36) *Beobacht. v. Myelit., nebst physiol.-pathol. Beobacht. üb. diese Krankh.* Ex OXOIDEI ann., in FROBIEP *Notiz.* 1834. Bd. 51. N. 1.
- 37) *R. M.-Entzünd. (myelitis)*; in CLARUS u. RADIUS *Beitr. z. pr. Heilk.* Bd. 2. p. 353.
- 38) *Zwei Fälle v. Myelitis*; in ejusd. 6. *Jahresber. v. Würtemb. Med.-Correspond.* Bl. 1831. N. 12-15.
- 39) *Diss. de myelotide.* Viadob. 1834.
- 40) *Wirbelentz., Spinitis.*; in *Allg. med. Ztg.* 1835. Juli.
- 41) *Myelo-meningitis*, in ejusd. *Jahresber.* in RUST *Mag.* 1836. Bd. 47. II. 1.
- 42) *Diss. de notio-myelit. et notio-meningit.* Paduae 1836.
- 43) *D. Entzünd. des R. M.* Aus d. *Vorles.* im J. 1836. in *Analekt. d. speciel. Pathol. u. Therap. v. H. BREZSLER u. J. JACOBSON.* Berl. 1838. Bd. 1. H. 6. p. 804.
- 44) *A. d. Entzünd. d. medulla spinal. selbst.* B. d. Ent-

## §. XII.

*Symptomata. Necroscopia. Caussae.*

1. Nisi rhachialgitis a caussis traumaticis ex-Symptomata.  
citetur (quo in casu morbus e columna vertebrali emanat), aut occulte et chronice<sup>1)</sup> decurrat; febre  
annunciatur, eo vehementiore, quo junior et sensibilibior est aegrotus. Febris ista plerumque cum  
horrore ingruit, subsequente aestu magno (praesertim ad spinam), remissiones horis matutinis concedente. Pulsus creber, contractus, durus, variabilis, diu noctuque aequali micat modo. Maxime anxietas jactationibus extremitatum comitata urget. Generatim adspectus aegri gravem morbum indicat, conspicua virium jactura insignitum. Eo magis debilitas percipitur, quo propior dolor

cer-

zünd, d. R. M.-Häute. C. die Entr. d. knöchernen Scheide  
d. R. M. in PRAYR Mittheil, Jahrg. 3. 1837. H. 9 et 10.

45) Bemerk. üb. R. M. - Reizung u. Entzünd. ex The Americ.  
ric. j. of the med. sc. 1837. Mai. p. 85-102. in DIEB-  
FENDBACH Ztschr. 1837. Bd. 6. H. 1. p. 109.

46) Diss. de myelitide. Königsb. 1837.

47) Arachnitis spinalis d. Kinder; in Med. Ver.-Ztg. 1837.  
N. 10.

1) KIRKE Fall ein. Myelitis extensa chronica, in W. STRUBINZ  
Sanitäts-Hptber. 1836. HUBINGER myelitis chronica, in  
SCHMIDT Jahrb. 1836. Bd. 11. p. 91. BACH chron. R. M.-  
Entzünd. in Oesterr. med. Jahrb. 1837. Bd. 15. St. 1. p. 140.  
ULRICH chron. Entzünd. des R. M. in CASPER Wochenschr.  
1838. N. 9. C. A. TOTT chron. Myelit. in Allg. med. An-  
nal. 1838. N. 31. p. 487 et 89. HOLSCHNER chron. Entzünd.  
des R. M. u. seiner Häute, in Hannov. Annal. 1838.  
Bd. 3. H. 2.

cervici est. Nisi aeger ad tenerrimos infantes pertineat, dolorem <sup>2)</sup> pro re nata acutum, pungentem, ardentem, gravativum, distendentem, pulsantem, nunc (sat raro) per universum spinae decursum <sup>3)</sup>, nunc (longe frequentius) ad unam tan-

2) „Aus allen mitgetheilt. Krankheitsgeschichte, geht hervor, dass der Schmerz im Rückgrathe bei jeder Form sich fand.“ J. HINVENBERGER l. c. p. 191.

3) Quanta angustiae rhachialgitidam totam spinam comprehendentem comitentur, sequens casus, quem ut luculentissimum hujus morbi exemplum exponimus, docet. Centurio militum 42 annorum, temperamenti sanguineo-cholerici, affectionibus arthritico-haemorrhoidariis obnoxius, liquoribus fermentatis minime parcens, suscepto vehementi refrigerio die 2. Mart. 1819 horis vespertinis in horripilationem, subsequente calore urante, stolo lumborum dolore, incidit. Noctis curriculo dolor a lumbis ansum ad occiput usque extenditur, continua vi crescens ad desperationem usque. Advocat postridie hora quinta matutina, a consternata familia, aegrum veluti rabidum vix amplius coercere apta. Ejulans anxiusque ille super abdomen decumbebat, brachiis et cruribus ad latera extensis. Interrogato aegroto, quid doleat, universum, intersecta loquela, respondit corpus. Palpebras, inquit, a se invicem deducere nequeo, cruciatus immanis dentes quotquot sunt et maxillas detinet, quarum inferiorem vix movere possum, dolor ardens et pulsans ab occipite per totam spinae curricula propagatur, extremitates et praecipua inferiores sensu destituuntur, concutiantur, pectus perstringitur adeo vehementer, ut spiritum ducere nequeam, molestissimam abdominis contractionem, tantamque virium prostrationem percipio, ut in articulo mortis me versari persuasus sim. Alvus clausa, urina excreta, pulsus obscurus, mollis, ad centum; cordis motus vehement. Calor urans. Declarato morbo pro rhachialgitide

tantum illius partem, dorsum vel cervicem, accusat. Dolor iste haud semper a corporis motu<sup>4)</sup> augetur<sup>5)</sup>. Nec aegri omnes immobiles et recte decumbunt. Plurimos enim curvato potius trunco<sup>6)</sup>, cruribus retroflexis, decussatis, calcibusque podici appropinquatis, vel super abdomen decumbere, vidimus. Alii extremitates inferiores vehementer dolentes ne movere quidem possunt<sup>7)</sup>. Infantes quandoque capite pulvinaribus fortiter adpresso, pedi-

rheumatico-arthritica, spatio nycthemeri venae sectionem ex pede ad libram, hirudines duodecim circa occiput, et totidem cucurbitulas scarificantes ad latera spinæ simul cum decocto tamarindorum et salibus mediis tanto cum successu adhibui ut aeger paucorum dierum spatio sanitati restitutus fuerit. Maxime venae sectio singula mala infregit: ea enim peracta, idico palpebrarum et maxillarum motus cum extremitatum sensu rediit, dolore ad spinam multum imminuto. (*Quam morbi historiam OLLIVIER l. c. obs. 74. p. 602 sq. affert.*)

4) Sed in dorsum decumbente. KLONK l. c. p. 32. WOLFF l. c. p. 14.

5) *Dolorem spinæ a motu corporis hoc in morbo constanter augeri, uno ore docent auctores, at vero pluries contrarium observavi.* (Et ANDRAL l. c. p. 808. dicens: „In einigen Fällen wird der Schmerz durch Körperbewegung gesteigert, in andern hingegen nicht.“) Doloris sub motu augmentum ad rheumatismum acutum musculorum spinam obtegentium vertebrarum earumque ligamentorum potius, quam ad rhachialgitidem proprie dictam spectat.

6) WOLFF l. c. p. 29, in aegrotō, memoratu digno, observavit: „Streben nach gekrümmter Lage des Körpers.“ OLLIVIER l. c. obs. 95.

7) KINNE l. c. (paralysis extremitatum). In BENNET (l. c.) aegrotō virus retrogradiendi memorabilis est.

pedibusque lecti fulcro admotis, repetitis vicibus truncum, prosiliente abdomine, motu, opisthotonum minitante, sublevant. Fere omnes ad lecti fundum corruunt; et si brachiis nutricis insedere coguntur, caput et verticem reclinant. Crinis et muscoli colli nunc flaccidi nunc rigidi <sup>8)</sup>), unde caput pro re nata vel pendulum est vel reclinatum. Saepe muscoli colli uno in latere relaxati, in alio contracti sunt, quo fit, ut caput versus scapulam alterutram reclinetur <sup>9)</sup>). Multis sternum adeo elevatur, ut collo vix amplius comparente, mentum attingat. Facies, excepto nasi apice, rubet, ac infantes quantum patiantur, indicat. Oculi vel undique motu rotatorio agitantur, vel fixi sunt. Caeterum oculi praeter splendorem, in febribus familiarem, nil morborum exhibent. Pupillam infantum hic angustatam esse, non conspeximus. Plurimi raucedine laborant <sup>10)</sup>). Sitis inexplebilis aridas fauces excruciat. In virgine ex ictu inter scapulas in lethalem rhachialgitidem dorsalem cum extravasato seroso cruento vertebrarum, conjecta, ipsum *aquae horrorem* observavimus <sup>11)</sup>). Ipsa haec

aegra

8) In corpore defunctae contractiones spasticae et dolentes musculorum colli flexorum lateris sinistri una cum masticandi, deglutendi respirandique difficultatibus, J. ARRIGHI arachnoideam medullae cervicalis, nec non piam matrem et partem substantiae inflammatae vidit. OMIDDI ann. 1830. Decbr.

9) FOLKTTI refert exemplum. v. OMIDDI ann. 1825. Noubr.

10) Hoc symptoma in infante quatuordecim mensium cum Doctore experto. Vilmensi Barankiewicz vidi.

11) Ann. 1812 in Clinica Vilmensi. De hydrophobiae sym-



aegra de sapore admodum ingrato ad linguae radicem, nec non de faucium constrictione conqueratur. Generatim lingua albo muco obtegitur. Respiratio saepenumero anhelans est <sup>12)</sup>. In recens natis costas a contractione musculorum thoracis intus tractas, sterno elevato et protuberante, plus vice simplici conspexisse licuit. Eorum nonnulli aërem cum magno nisu attrahunt, oscitant, et anguntur <sup>13)</sup>. Tussis et sputa nulla nisi accidentaliter. Pusiones continuas edunt ejulatus, raucos, aut tacite gemunt. Motus cordis <sup>14)</sup> et diaphragmatis <sup>15)</sup> laboriosi. In infantibus non minus quam in adultis, muscoli abdominales saepe ita contracti sunt, ut segmentum transversum pectus a ventre separet. Nonnulli vomunt <sup>16)</sup>, omnes aut diarrhoea <sup>17)</sup> aut pertinaci alvi obstructione <sup>18)</sup> laborant.

ptomatibus referunt. OLLIVIER I. c. p. 705. JAHN, BENN II. cc. Deglutationem difficilem videntur. OLLIVIER I. c. obs. 77, ANDRAL I. c. 811. aliique. I. SCHWABER (182

12) OLLIVIER I. c. obs. 80, 81. ANDRAL I. c. p. 813. ANNECROMBIE I. c.

13) Peculiare convulsionum infantilium genus cum indicata respirationis difficultate incipiens et de quo I. CLARK loquitur (*Commentary on some of the most important diseases of child*, Lond. 1815.) ex medullae spinalis inflammatione proficisci videtur. I. 18. 08. 07. 06. 0. I. 1815. 01. 182

14) OLLIVIER I. c. obs. 79.

15) De diaphragmatis affectione loquitur ANDRAL I. c. p. 813, et ex SCHREIBER observationibus diaphragmatis nervi in myelitis afficiuntur. Y. WITTENBERGER Beitr. z. gesammte Nat. u. Heilk. Prag 1836. II. 1.

16) BRUNN I. c. OLLIVIER I. c. obs. 83. ANDRAL I. c. p. 811.

rant. Urina pauca saniosa, cruenta <sup>15</sup>), saepe cum repetito nisu deposita, aliàs diu retenta <sup>20</sup>). Adulti quandoque fornicationem variarum partium accusant <sup>21</sup>). Brachia et crura veluti ab ictibus electricis hinc inde convelluntur <sup>22</sup>). Qui motus convulsivi interdum universum corpusprehendunt <sup>23</sup>). Aegra, de qua supra mentionem injecimus, ranarum experimentis galvanicis subjectarum instar convellebatur. Brachia motibus automaticis tentantur; saepe thoraci, vix non semper partibus genitalibus, admoventur. In nonnullis aegrotulis sola manus morbi vim denuntiabat <sup>24</sup>). Vidimus enim

17) OLLIVIER l. c. obs. 82. ALEXANDER l. c. HORNUNG l. citand. p. 589.

18) OLLIVIER l. c. obs. 68. 71. CLESS, ANDRAL, KIERN l. c.

19) HIPPOCRATES de morb. Ed. Lind. L. II. C. 22. T. II. p. 110. Cfr. RACCHETTI l. c. p. 360. Talem urinam non vidimus. Aegrola, de qua KIERN (l. c.), urinas foetidissimas emittebat.

20) ALEXANDER l. c. OLLIVIER l. c. obs. 68. 71. 84.

21) OLLIVIER l. c. obs. 91. („Fourmillement“). KIERN l. c. („Ameisenkriechen in den Gliedmassen“).

22) „Bisweilen kündigt sich die Krankheit durch convulsivische Bewegungen an, so dass sie leicht mit Chorea wechselt wird.“ ANDRAL l. c. p. 807. OLLIVIER l. c. obs. 76. 88.

23) OLLIVIER l. c. obs. 79. 80. 81. KIERN l. c.

24) „Engourdissement des doigts ou des orteils“ OLLIVIER l. c. obs. 86. 90. 95. „Stupeur et refroidissement de la main droite“ ib. obs. 92. „Froid et engourdissement dans le doigt indicateur, qui s'étendent ... au membre entier“ etc. ib. obs. 93. „Gefühl von Erstarrungen in den Fingerspitzen“ BACH l. c.

enim in rhachialgitide pollicem intus conversum, digitos nonnullos peculiari modo flexos, omnes inter se admodum distantes<sup>24</sup>). In adultis cuncta corporis membra tremore detenta conspeximus<sup>25</sup>). In aliis paralytica urgent symptomata<sup>27</sup>). Cutis undique sudore diffluit et quandoque vel miliari- bus vel hydroa sudamine cooperitur<sup>28</sup>). Nisi mature succurratur, symptomata hydropis acuti spinæ, infra describenda<sup>29</sup>), succedunt.

2. Cranio a specu vertebrali separato serum<sup>Necrosco-</sup>  
cruentum, purulentum, prosilit. Sedes illius nunc<sup>pia.</sup>  
inter vertebrae et meninges<sup>30</sup>), nunc inter me-  
nin-

25) Memorabile hujus generis exemplum (mense Mart. 1818 in pusione unius anni civis Vilaensis filio vidi. Aderat febris et caput reclinatum. Parentes mortem praedicebant, cum alter eorum infans, praevia tali manuum conditione convulsus, perierat. At vero hirudinibus vix cervici applicitis manus in ordinem compositae fuere et infans convaleuit.

26) Cfr. cap. VII. §. XLIII. N. 1.

27) SCHAEFER in HUYBLAND *Journal* 1815. *Octobr.* p. 71. BERGMASCHI l. c. p. 30 et 50. HAEKES l. c. p. 289. WOLFF l. c. p. 20. (myelitis incipiebat paralyti). OLLIVIER l. c. obs. 75. 78. et plures. NISSE l. c. cas. 1. 2. 6. 8. „Zuweilen wird nur ein Finger gelähmt, worauf denn später die andern Finger von Lähmung befallen werden, die später den ganzen Arm afficirt“ ANDRAL. l. c. p. 807. 810. 814. BRIERE l. c. (paralysis extremitatum lateris dextri), etc.

28) Odorem gas hydrothionici in morbo provectioni praeter PH. A. FISCHER (*d. Kinderpraxis im Findelhause etc. Götting.* 1831) nemo percepit.

29) Cap. IV. §. XIX.

ninges et medullam<sup>31)</sup>, nunc ubique locorum, ita ut specus inundationem coram habere dixeris<sup>32)</sup>. Observata praeterea fuere: periosteum vertebrarum erosum<sup>33)</sup>, vertebrae friabiles<sup>34)</sup> et quandoque carie<sup>35)</sup> detentae: meninges extenuatae<sup>36)</sup>, longe vero saepius, ut vidimus, incrassatae<sup>37)</sup>, rubellae<sup>38)</sup>, materie puriformi obductae<sup>39)</sup>, cum ossificatione magnitudinis seminis cucumeris<sup>40)</sup>, cum punctulis cartilagineis cretae instar albis<sup>41)</sup>,  
me-

30) BERGAMASCHI l. c. 1820. p. 33 et 45. OLLIVIER l. c. obs. 81.

31) BERGAMASCHI l. c. p. 35. 43. 53. ARKROGRIE l. c. OLLIVIER l. c. obs. 72.

32) HINTERBRÄGER l. c. („der Hirbalkanal war so mit schwarzem Blute überfüllt, als sei eine Blutergussung geschehen“). BONORDEN l. c.

33) BERRA l. c. obs. I. p. 30. BERGAMASCHI l. c. 1820. p. 32.

34) DEZONDI l. c. p. 236. BRIENRE l. c. (inferior pars columnae, a vertebra dorsali nona, spongiosa).

35) WOLFF l. c. p. 31. GASSAUD l. c. (os sacrum cariosum). J. BOUILLARD l. c. OLLIVIER l. c. obs. 90. M. JÄGER et alii, cap. II. §. VII. 4 (19) cit.

36) BERRA l. c. obs. 3. p. 35.

37) BRIENRE l. c. ANDRAL l. c. p. 804.

38) OLLIVIER l. c. obs. 18. 72. HINTERBRÄGER, BEHR, HARTEL, ALEXANDER II. c.

39) BRIENRE l. c. et OLLIVIER l. c. obs. 70 (fluidum puriforme inter arachnoideam et pia mater). ALEXANDER l. c. HILSENBERG in RUST Mag. 1837. Bd. 50. H. 2. (pus inter duram matrem et arachnoideam totius medullae spinalis cum abscessu sub ponte Varol. communicans).

40) MORGAGNI op. c. Epist. XXV. Art. 9. OLLIVIER l. c. obs. 86. „Concretion albumineus“ in arachnoidea. ib. obs. 72. cfr. obs. 31.

41) SOMMERHING apud BAILLIE not. 524. OLLIVIER l. c. obs. 77. 86.

medulla punctis rubris notata<sup>42)</sup>, vasis veluti arte injectis<sup>43)</sup>, emollita<sup>44)</sup>, firmior<sup>45)</sup>, scirrhusa<sup>46)</sup>, lymphæ coagulabili<sup>47)</sup> vel gelatina tremula<sup>48)</sup> obducta; suppuratione detenta<sup>49)</sup>, variis in locis consumpta<sup>50)</sup> aut degenerata<sup>51)</sup>. Nervi ischiadici<sup>52)</sup> et crurales phlogosi correpti<sup>53)</sup>. Cerebrum

386-

- 42) Sic in aegra, de qua supra.
- 43) HARLESS l. c. p. 73. BOYER *tr. des malad. chir. édit. I.* T. 3. p. 494. BERGAMASCHI l. c. p. 38. OLLIVIER obs. 88. ANDRAL l. c. p. 804. BONORDEN l. c.
- 44) HALL l. c. ANDRÉOUBIN, HINTERBRUGEN, BRUNN II. cc. OLLIVIER l. c. obs. 75—84. 86—93. FROBERG *Notiz.* Bd. 38. N. 95. p. 235. RUST *Mag.* 1825. Bd. 20. H. 2. p. 376. ANDRAL l. c. p. 804.
- 45) Pluries vidi. BERGAMASCHI l. c. p. 33. 49. PINEL filii, obs. in MAGENDIE *journ. de phys. experim. et pathol.* T. 11. N. 3. ANDRAL l. c. p. 804. OLLIVIER l. c. obs. 82. 90. 91. 92. BRUNN, BONORDEN II. cc.
- 46) HARDER l. c. obs. 58. 47) BARTELS, ALEXANDER II. cc.
- 48) Sic in pluribus cadaveribus reperi.
- 49) BRUNN l. c. obs. 1. BERGAMASCHI l. c. p. 32. ANDRAL l. c. p. 804 (in casibus variis abscessus in medullae substantia).
- 50) FERRO *med. Arch.* 1800. 1801. PLOUQUET *Diss. exempl. singul. morbi paral.* Tub. 1806. CHAMSON DU MONTAUX *Krankengesch.* 3. Bd. N. 84. BELL *Edinb. new Comment.* T. 3. PERRAULT *J. de méd.* T. 6. p. 389. PORTAL *Cours d'anat. méd.* T. I. IV. RULLIER in FROBERG *Notiz.* Bd. 5. N. 8. p. 119. OLLIVIER l. c. obs. 83. 85. 92.
- 51) GAUTIER DU CLAUERY l. c. p. 129. WOLFF l. c. p. 30 sq. (in fungos duos medullares). SONNENKALB l. c. (in stoma).
- 52) BRUNN l. c. (n. ischiadicus emollitus). FUNK l. c. p. 32 („der ischiadische Nerve war sehr stark geröthet, lebhaft mit Gefässen durchwebt; die Nervenfäden stark in der Substanz roth“).
- Frank *Prax.* II. I. 2. 1.

saepe normale<sup>54)</sup>, aliàs inprimis cum cerebello inflammatum<sup>55)</sup>.

*Causae.*

3. In *aetiologia* rhachialgitudis tradenda, ad causas generales morborum columnae vertebralis, quibus potum aquae gelidae sub nisu in pondere elevando ingurgitatae addimus<sup>56)</sup>, respicere<sup>57)</sup>, rerumque positiones evolutioni rhachialgiae faventes<sup>58)</sup> in memoriam revocare sufficiet. Doctrina quidem rhachialgitudis infantum, ut causae, quae spinam foetus et recens nati ad inflammationem disponunt, enuclearentur, exposceret; verum cum enucleatio harum causarum cum pathologia hydrorhachitidis et spinae bifidae cohaereat, eam ad caput sequens remisimus<sup>59)</sup>.

### §. XIII.

#### *D i a g n o s i s.*

*Genera-  
tim.*

1. *Diagnosin rhachialgitudis* tradendo, sequen-  
tes

53) DZONDI l. c. p. 238.

54) BERGAMASCHI op. c. cas. 2. 3. 5. 7. FUNK l. c. p. 48 et multi alii.

55) RACCHETTI op. c. p. 372. 380. BERGAMASCHI l. c. *observ.* 8. p. 49. *observ.* 9. p. 53. OLLIVIER l. c. *obs.* 69. p. 566. *obs.* 76. p. 617.

56) Vetula, ab anno menstribus jam orbata, noctu siti excruciat, amphoram aquae gelidae repletam, ori admovendi gratia, elevavit, ac paullo post in rhachialgitudinem incidit, quae a nisu in pondere elevando vix repeti posset, cum segra tunc dolorem haud experta fuerit. Exatimarim potius columnam vertebralem hic a menstruorum cessatione plathora laborasse, quae per nisum ente esset, unde frigus oesophago, vertebrae tam vicino, applicitum, effectum deleterium in propinquam medullam exercuerit.

57) Cap. I. §. III. 58) Cap. II. §. VII. N. 4. 59) §. XVII. 1. 4.

tes se exhibent quaestiones: quaenam rhachialgiam inter et rhachialgitidem intercedit differentia? Estne rhachialgitis propagationis encephalitidis ad spinam effectus, aut morbus illius medullae et meningum primitivus? Primo in casu, quomodo morborum, de quibus agitur, *complicatio* cognoscenda, in altero, quomodo rhachialgitis ab encephalotide distinguenda? Porro: cum quibusnam aliis morbis possit rhachialgitis confundi? tandem quae sunt rhachialgitidis variae formae? Et postremo, rhachialgitis agnoscitne, aliarum inflammationum instar, differentiam quoad indolem?

2. *Quaenam rhachialgiam inter et rhachialgitidem intercedit differentia?* Eadem, quae inter cephalalgiam et encephalitidem stabilita est <sup>1)</sup>. Rhachialgitis a rhachialgia distinguitur.

Jam alibi (praemisso monito, *dolores* potius aliorum morborum *symptomata*, quam *morbos per se* sistere, nosque *doloribus* ut morbis commoditatis solum practicae causa varia capita dicasse <sup>2)</sup>), fassi sumus <sup>3)</sup>; morbos sub dolorum forma obvenientes saepe nil aliud quam *inflammationis occultae* esse effectum, nosque solum ob timorem, ne si quid *occulti* ut *reale* admitteretur, hypothesibus aditus pateret, *dolorem* ut rem facti potius, quam *inflammationem*, quatenus in aegro febre experte in partibus reconditis semper problematica est, pro morbo primario statuise. Quae cum ita sint, *febrem* et *acutum morbi curriculum* pro signis rhachialgitidis genuinis ac perpetuis decla-

G 2

ra-

1) P. II. ed. alt. Vol. I. Sect. 1. C. II. et III.

2) I. c. C. I. §. IV. 4.      3) I. c. C. III. §. XVI. 3.

ramus. Attamen per id in dubium vocamus maximam rhachialgiarum partem, *inflammationem chronicam* indolis arthriticae, rhachiticae, scrophulosae, scorbuticae, syphiliticae etc. pro causa agnoscere.

An rhachialgitis  
encephalitis  
effectum.

3. *Inflammationem cerebri et praesertim cerebelli ad medullam inprimis cervicalem propagari posse*, nisi HIRROCRATI ipsi, ubi de *sphacelismo cerebri* loquitur, saltem librorum Hippocraticorum auctoribus notum fuit<sup>4)</sup>. Praeterea id BORSIERI<sup>5)</sup>, I. P. FRANK<sup>6)</sup>, RACCHETTI<sup>7)</sup> et nostrae observationes confirmant. Imo, descriptio quam de *encephalitis cephalalgica* dedimus<sup>8)</sup>, quantum hoc in morbo medulla cervicalis patiatur, clare ostendit. Verum altera ex parte edocti quoque sumus, rhachialgitidem non absolute ex encephalitis repetendam esse. Praeter rhachialgiam traumaticam, de cujus ortu primitivo in specu vertebrali nemo dubitat, inflammationis medullae dorsalis et lumbalis certissima signa, sine omni encephalitis indicio, plus vice simplici invenimus. Diagnosin quidem, cum aegri convaluerint, necroscopiâ extra omnem dubitationis aleam ponere haud potuimus, interea tamen ad illam confirmandam rhachitidi medendi rationis successus sufficiat.

4.

4) De glandulis. Edit. LINDBER. C. 10. p. 420. „*alius morbus oritur ex defluxione capitis per venas in spinalem medullam.*“

5) Instit. med. pract. Vol. III. C. 6. §. 172. p. 238.

6) I. c.

7) I. c. p. 370.

8) P. II. ed. alt. Vol. I. C. III. §. XIV. 3.



4. *Complicationem encephalitidis cum rhachialgitide cognoscimus, ex connubio symptomatum istiusmodi morborum, inprimis vero ex dolore occipitis ad cervicem extenso, ex affectione palpebrarum* <sup>9)</sup>, *e vocis extinctione, brachiorum torpore, et motibus automaticis. Interim cavendum, ne propagationi inflammationis ad medullam spinalem, ea adscribamus phaenomena, quae sero in encephalo exsudato, ac ad columnam vertebralem defluenti adscribenda sunt.*

Complicatio encephalitidis cum rhachialgitide.

5. *Generatim autem encephalitidem a rhachialgitide distinguimus, quod ibi praesertim sensus et exercitium facultatum animi perturbantur, hic vero maxime motus musculorum, inprimis extremitatum. Nec aetiologiae lumen in diagnosi istiusmodi morborum negligendum est.*

Encephalitis a rhachialgitide distinguitur.

6. *Praeter encephalitidem, rhachialgitis confundi potest cum inflammatione pharyngis, mediastini posterioris, diaphragmatis, renum et cum rheumatismo musculorum dorsi et lumborum* <sup>10)</sup>, *maxime cum psoritide* <sup>11)</sup>. *Musculorum istiusmodi affectiones a rhachialgitide distinguuntur, quod in illis motus partium laborantium longe magis do-*

Rhachialgitis ab aliis distinguuntur morbis.

lo-  
9) Cfr. C. II. §. VII.

10) Inflammatio partis medullae sacralis cum haemorrhoidibus confundi potest, G. J. BLOSPFELD *Einig. üb. Witterungs- u. Krankheitsconstit. v. Riga* 1833. Mürz, in HUFELAND Journ. 1834. St. 6.

11) P. I. ed. alt. Vol. III. S. 2. C. XXX. §. CV. 8. TRUSCH *unvermuthet plötzliche Todesfälle u. der. auffallende Sections-ergebnisse*, in HUFELAND Journ. 1837. St. 12. Casus tertius huc pertinet.

lorificus est, quod contra thoracis et abdominis viscera minus in consensum trahuntur, quod anxietas non tanta animadvertitur, et in genere quod morbus ad aspectum gravem inflammationis medullae spinalis proprium, vix exhibet.

Rh. for-  
mae.

7. Rhachialgitis cum symptomatibus admodum multifariis stipetur<sup>12)</sup>, cumque inter ea plurima obveniant, quae magis quam febris et dolor spinæ in sensus cadunt, e. c. *tremor, convulsiones, tetanus, paralysis*<sup>13)</sup>; tirones in arte, symptomata ista terribilia saepe pro morbo primario habere et verum mali focum praetervidere, edocti sumus. Cui errori ut obviam eamus, sicuti varias encephalitidis formas stabilivimus<sup>14)</sup>, ita et varias *rhachialgitidis formas* stabiliemus dividendo scilicet *rhachialgitidem*, in *rhachialgicam, tremefacientem, convulsivam*<sup>15)</sup>, *teticam*<sup>16)</sup> et *paralyticam*. Quarum specierum peculiarem silentio praeterimus descriptionem, cum ea ex generali symptomatum rhachialgitidis enarratione desumi que-

12) §. XII. 1.

13) De his symptomatibus ALBERS (l. c.) speciatim disseruit.

14) P. II. ad. alt. Vol. I. Sect. 1. C. III. §. XIV. 2.

15) SCHMIDT l. c. HEUSINGER l. citand.

16) BETTAZZI in HERRND *Repert.* 1831, *Jul.* p. 127 (epiaitis chronica cervicalis cum tetano). ROSENTHAL in HORN *Archiv.* 1834, *St.* 4, p. 565 (myelitis acuta in tetanum transiens). RICHTER *Trismus u. Tetanus in Folge v. Entzünd. des R. M.* in *Med. Ver.-Ztg.* 1835. N. 15. PLITT l. citand. NURS l. c. 9. Fall. LIDERS (HURLAND *Journ.* 1829, *Bd.* 68. *St.* 4, p. 3 et sq.) tetanum saepe causam, non effectum myelitis esse contendit.

queat, cumque in capitibus de tremore, de epilepsia, de tetano et de paralysi, inflammationis medullae spinalis doctrinam ulterius prosequemur.

8. Sicuti encephalitis <sup>17)</sup> ita et *rhachialgitis*, <sup>Rh. indol.</sup> *variam* agnoscit *indolem*, *traumaticam* <sup>18)</sup>, *inflammatoriam*, *rheumaticam* <sup>19)</sup>, *gastricam*, *arthriticam* <sup>20)</sup> et *nervosam*, ne amplius de chronicis inflammationibus, *rhachialgiae* *scrophulosae* <sup>21)</sup>, *syphiliticae* <sup>22)</sup>, *reconditis* *caussis* <sup>23)</sup> loquamur. Sufficiat autem varias istas *rhachialgitidis* species indicasse, cum modus diagnosin earum construendi, ex doctrina generali morborum systematis nervosi <sup>24)</sup> et medullae spinalis <sup>25)</sup>, nec non ex ea *rhachialgiae* <sup>26)</sup> sponte eluceat.

## §. XIV.

17) I. c. §. XVI. 7—16.

18) A. M. VERRING *Beobacht. üb. Krankh. des R. M. nach äuss. Verletzung*, in *Rust Mag.* Bd. 22. H. 2. p. 263.  
ROBACH I. c. HORNUNG *myelit. traumat.* in *Oesterr. med. Jahrb.* 1837. Bd. 12. p. 581. ANNAN I. c.

19) J. v. VERRING *Heilart d. Gicht. Wien* 1832. Kap. 2.  
W. H. BERGER *kurz. Ber. üb. d. im J. 1834 im Zürch. Cantonhospit. . . behandelt. Kr.* in *POMMER schweiz. Ztschr.* 1836. Bd. 2. H. 2 (*spinitis cervicalis rheumatica*, frequentius ibi occurrens et valde saeviens). PLATT *ein Fall v. Myelit. rheumat.* in *d. Form ein. Tetanus mit Opisthoton. auftretend*, in *Allg. med. Ztg.* 1837. N. 22. HORNUNG *myelit. rheumat.* I. c. p. 584.

20) HORNUNG *myelit. arthritica.* I. c. p. 587.

21) HORNUNG *myelitis metastatica.* I. c. p. 589.

22) STEGMANN I. c. (*vertebrae ex dyscrasia syphilitica tumidae, ut causa myelitis*).

23) No. 2. 24) P. II. Vol. I. Sect. 1. C. I. §. IV. 13—24.

25) Cap. I. §. IV.

26) Cap. II. §. VIII. 6.

## §. XIV.

## P r o g n o s i s.

**Prognosis.** 1. Rhachialgitis praeter encephalitidis exitus <sup>1)</sup>, resolutionem videlicet, hydropem acutum, suppurationem, alios agnoscit; quos in mutata consistentia medullae spinalis et meningum eam ambientium nec non in extinctione principii vitalis illi adhaerentis quaerimus.

**Resolutio.** 2. Resolutionem rhachialgitidis expectare licet, si morbus non ex gravi quaedam laesione externa originem trahat, sique mature debita methodo curetur. Excepta enim rhachialgitide traumatica, reliquas morbi illius species, pro febribus rheumaticis, inflammatoriis, gastricis, arthriticis et nervosis habemus, quarum potissima vis medullae spinali et membranis eam involventibus incumbit, quod vel genio morborum regnantium, ob ignotas causas spinae infenso, vel praedispositioni columnae vertebralis ad morbos, vel noxis, in eam evidenter agentibus adscribimus. Ex quo patet, aliam esse inflammationis resolutionem, aliam febris crisin. Inflammationis resolutio quocunque tempore sub recta medela in aegris caeterum sanis obtinetur, dummodo ea adhuc quatenus inflammatio perstat, ac necdum unum alterumque exituum indicatorum socium adhibeat: alioquin enim res magis ardua est. Febris autem sua stadia decurrit atque ad acmen perducta, crisin genio proprio accommodatam plerumque per sudorem, urinam et haemorrhagias experitur. 3.

1) P. II. Vol. I. S. 1. c. III. §. XVII.

3. *Hydrops acutus* ut *exitus rhachialgiti-* <sup>Hydrops</sup>  
*dis* tractatum spectat. Quoties enim rhachial- <sup>acutus.</sup>  
*gitidis indolis rheumaticae* est, praesertim si in  
 scrophulosis, utpote systemate lymphatico labe-  
 facto instructis, indicat; toties exsudatio serosa,  
 seu seroso-purulenta, aut seroso-cruenta, ex  
 parte inflammata in partes vicinas, morbo etiamsi  
 neque multum provento, neque omnino vehemente,  
 expectanda. Ingruentem sub curriculo rhachial-  
 gitidis exsudationem arguimus: si dolor ex acuto  
 evadat obtusus, si symptomata prius irritationem  
 designantia nunc magis de stupore testentur, sique  
 nova plane phaenomena, affectionem spinæ sub  
 loco inflammationis designantia, ingruant. Com-  
 pertum enim habemus, extravasatum quo tenuius,  
 eo minus circa partem inflammatam haerere; sed  
 ob propriam gravitatem potius ad fundum co-  
 lumnæ petere, quod sine evolutione novae ma-  
 lorum catervæ nequam contingere posset.

4. Rhachialgitis traumatica et inflammatoria <sup>Suppura-</sup>  
 facillime in *suppurationem* transit, praesertim si <sup>tio.</sup>  
 dorsum et lumbos aggrediatur. Ea ingruente aegri  
 ex febribus gravissimis convalescere videntur, at  
 vero sub fallaci ista convalescentia vires non so-  
 lum non redeunt, sed magis magisque franguntur.  
 Hac etenim in *phthisi rhachialgica* aeger feбри-  
 cula, maximis sudoribus stipata, tentatur, de die  
 in diem magis magisque macilentus evadit, cute  
 veluti aliena extremitates inferiores circumdante,  
 do-

donec praevia plerumque vesicae urinariae aliarumque partium resolutione, crura prius paralytica, oedematosa fiant, gangraena afficiantur, et miser ad nates undique decubitu erodus, mente usque ad extremum compote, moriatur.

Mutatio  
consisten-  
tiae me-  
dullae et  
extinctio  
principii  
vitalis.

5. Cadaverum sectiones docent<sup>2)</sup>, *medullam spinalem* per inflammationis processum nunc *indurari*, nunc *emolliri*, nunc *erodi*, ac *meninges* saepissime *incrassari*. Qui rhachialgitidis exitus, cum ocyus serius, vel *contracturis*<sup>3)</sup>, vel *tremori*, vel *paralysi* ansam praebeant, horum morborum in doctrina magis magisque illustrabuntur. Hic vero adhuc de probabili causa mortis e rhachialgitide, de *extinctione* scilicet *principii vitalis medullae spinali adhaerentis*, quaestio injicienda. Hac enim ex causa praecipue infantes, rhachialgitide cervicali detenti, saepe mori suspicamur, quorum cadavera inflammationem siccam fere erysipelaceam prope medullam oblongatam exhibent, quique praecipitanter ac praevia magna virium jactura obire solent. Immo posse medullam spinalem sine praevia inflammatione principio vitali spoliari, casus quatuor hominum, qui ex arbore altissima humum cum ceciderint, derepente paralysi correpti fuere, eaque demortui *nil morbosus* in specu vertebrali obtulerunt, docere videntur<sup>4)</sup>.

Cae-

2) §. XII. 2.

3) Ut in puella tenera apud T. CONSTANT ex *Gaz. méd. de Par.* 1835. N. 5. in SCHMIDT *Jahrb.* 1836. Bd. 9. p. 102. OLLIVIER l. c. obs. 93, 94.

4) I. P. FRANK de colum. verteb. in morb. dignit. Opusc. delect. I. c. p. 30.

Caeterum cavendum, ne repentinam in rhachialgitide praesertim cervicali mortem, ibi dynamicae principii vitalis extinctioni adscribamus, ubi obitus causa in *haemorrhagia specus vertebralis* quaerenda est. Haemorrhagias enim hic uti in cerebro <sup>1)</sup> ex lento inflammationis processu oriri, ac *apoplexiam spinalem* producere posse, nentiquam dubitamus.

## §. XV.

## C u r a.

1. Rhachialgitidi medendi vix alias tradere possumus regulas, praeter eas, quae adversus inflammationes in genere <sup>1)</sup> et dolore columnae vertebralis in specie <sup>2)</sup> traditae fuere. Interea duo cum RACCHETTI <sup>3)</sup> praecipiemus *monita*.

Genera-  
tim.

2. Quae medullam cervicalem aggreditur inflammatio, saepe tantum producit virium lapsum, ut medicus minus expertus facile ab evacuationibus sanguinis abstinere, et ad usum remediorum vulgo excitantium dictorum confugere possit. Idem timendum foret, si inflammata medulla dorsali, tractoque in consensum corde pulsus fieret debilis, irregularis et intermittens. Quoniam vero istiusmodi debilitatis notae, re ipsa ex inflammatione proficiscuntur, inflammationis autem resolutio aliter quam per methodum antiphlogisticam viriliter administratam obtineri nequeat, clare patet, in hac methodo, nec in excitantium usu, auxilium quaerendum esse.

Monitum  
primum.

3.

5) P. II. ed. alt. Vol. I. S. 1. C. V. §. XXVII. 3.

1) P. I. ed. alt. Vol. I. S. 2. C. I. 2) C. II. §. X. 3) Op. c. p. 390 sq.

Monitum  
secundum.

3. Verum ne quid nimis! Quamvis enim methodum antiphlogisticam in primo rhachialgitudinis limine, tanquam sacram anchoram habeamus; attamen illius usum non indiscriminatim ad sequentia hujus morbi stadia extendendum esse censemus. Quo primum enim rhachialgitis non amplius ut inflammatio simplex, sed jam jam ut *inflammatio extravasato nupta*, occurrit, numquam quidem evacuatio cruenta localis omitti potest; at caute cum venae sectionibus incedendum. Qua de causa, in morbo provento, inprimis si evacuatio cruoris localis sine levamine fuerit, viriumque potius produxerit decrementum, indicatio *vasa lymphatica excitandi*, ut *humorem in specu vertebrali extravasatum absorbeant*, stabilitur. Cui indicationi satis faciunt *vesicatorium* amplum loco affecto superimpositum illiusve protracta suppuratio, porro *calomel*, vel, si diarrhoea obstaret, *unguentum oxydi hydrargyri grisci* lateribus spinae vel extremitatibus illinitum, et *florum arnicae decoctum*. Cum vero praeter indicationem, ut absorbeatur humor extravasatus, et altera praesto sit indicatio, *absorpti scilicet humoris eliminationem promovendi*, in rhachialgitide inflammatoria, rheumatica et alia quavis non traumatica, medici est, viam, per quam natura *crisin* absolvere nititur, eruere, nisunquē illius sustinere. Quamobrem febre ad maturitatem perducta, si signa critica \*) *sudorem* annuncient; lenia *diapnoica*, inprimis aliquid *acet-*  
ta-

4) P. l. ed. alt. Vol. I. S. 1. §. XVII. 4.



*tatis ammoniac liquidae*, arnicae decocto jungitur. Annunciata crisi per *urinam*, decoctum vel radicis *ononidis spinosae*, vel stipitem *solani dulcamarae*, propinandum. *Haemorrhagia critica*, ob vanum debilitatis futurae metum, neutiquam cohibenda<sup>5)</sup>. Viribus ad criseos opus adimplendum deficientibus, modicae *camphorae* et *subcarbonatis ammoniac* doses, nec non *clysteres* cum *oleo essentiali terebinthinae*<sup>6)</sup> magni faciendae sunt<sup>7)</sup>. Caeterum, quod sub tam deterrima rerum positione, aetas aegri bonaque illius constitutio non praestabunt, vix a pharmacis obtinebis: unde quocumque in casu a tumultuaria medendi ratione abstinendum erit<sup>8)</sup>.

## 4.

- 5) Menstruatione suppressa cucurbitalis cruentis et hiundinibus ad spinas lateris reiteratis vicibus applicatis provocata, myelitis periodica sanabatur. FALLOT ex *Journ. complém.* 1828, Fév. in *FRONIER Notiz.* 1828. Bd. 20. N. 17. Sic et KIENE L. C. (menstrua incompleta et parva erant).
- 6) R. Olei terebinthinae drachmem semis, mellis unciam unam, infusi florum chamomillae uncias sex. M. D. S. Clyster.
- 7) Vetule, quam supra memoravi (§. XII. 3 (56)), gravissima rhachialgitide mense Jan. 1819 in clinico meo laborans, undecima morbi die cassante derepente dolore colinae vertebrae, in paresin extremitatum inferiorum, cum summa virium jactura et pulsu filiformi incidit. Methodus indicata eam ex orci faucibus traxit, fugate simul parasi extremitatum inferiorum.
- 8) Vir in rabus medicis laicus contra myelitidem rheumaticam incipientem electricitatem adhibuit: adgrevescit morbus exemplo et puer, quatuordecim annos natus, diem supremum obit. *Мухомовъ, мѣрку. Wirk. d. Electricität*

C. phthi-  
seos spi-  
nalis.

4. *Phthisis spinalem* sanare non docebimus.

Verum tali morbo medico probe noto, aeger saltem id lucri obtinet, quod a tentaminibus therapeuticis inutilibus non excrucietur, quodque unicus scopus cruciatus leniendi et vitam protrahendi, praefigatur. Chirurgorum audacia, limites vix amplius agnoscens, forte loco affecto accurate noto, per *vertebrae terebrationem*<sup>9)</sup> puris effluxum promovere tentabit; quo in casu memores esse juvabit, in morbis medullae spinalis, minus quam in aliis, a vi naturae partes lacesitas resarciendi, expectandum esse.

## CAPUT IV.

### *De hydrorhachitide.*

#### §. XVI.

#### *Definitio. Divisio.*

Definitio.

1. **C**ollectio morbosa humoris serosi, purulenti, sanguinolenti in specu vertebrali, medullam spinalem sensim sensimque comprimendo paralyti, anaesthesiae, convulsionibus ansam porrigens, *hydrorhachitis* dicitur<sup>1)</sup>. 2.

*bei anfang. Myelitis; in Rust's Mag. 1828. Bd. 26. H. 3. p. 566.*

9) Cfr. C. II. §. X. 2 (2).

1) A Gr. ὕδωρ, aqua, et ῥάχις spina. SYNON. Hydrops

## DE HYDRORHACHITIDE CONGENITA. 111

2. Hydrorhachitidem, hydrocephali instar, in Divisio.  
*congenitam, chronicam, acutam et accessoriam*  
dividimus.

### §. XVII.

#### *De hydrorhachitide congenita.*

1. Hydrorhachitis cum tumore seroso a ver-Definitio.  
tebris fissis (*spina bifida*) prominente, in foetu  
per abortum, partum, vivo, demortuo, excluso,  
dicitur *congenita* <sup>1)</sup>.

2. *Exempla hydrorhachitidis congenitae* cum Scriptores.  
*spina bifida* innumerabilia sunt <sup>2)</sup>. 3.

spinæ dorsi, spinolæ, hydrocele spinalis. GERM. *Wasser-*  
*sucht des Rückgrates.* GALL. *Hydropisie de l'épine du dos.*  
ANGL. *dropy of the spine.* ITAL. *idro-rachitide.* POL.  
*Wodna puchlina stołu pasierzowego.* ROSS. ВОДЯНАЯ  
БОЛЕЗНЬ хребетного столба.

- 1) *Hydrorhachia dehiscens* I. P. FRANK l. c. p. 200. 208.
- 2) TULPIUS obs. med. L. III. C. 30. p. 230. T. XI. HOCH-  
STÄNDTER diss. de spina bifida. Altorf. 1703. v. HALLERI  
coll. disp. pract. T. VII. P. I. p. 285. RUTSCH obs. anat.  
chir. Obs. 34. fig. 36. obs. 35. 36. WEPFER de puella sine  
cerebro. Eph. nat. cur. Dec. I. Ann. 3. Obs. 129. p. 222.  
SALEMANN resp. ORTH diss. de quibusd. tumorib. tunica-  
tis externis. Argent. 1709. Z. PLATNER Progr. de spina  
bifida. Lips. 1734. MORGAGNI op. c. Epist. XII. XLVIII.  
50. GILG diss. de spina bifida. Vienn. 1754. in WASSER-  
BERG fascic. dissert. 3. LESKE *Auserl. Abh. aus d. philos.*  
*Trans.* 3. B. p. 260. HALLER elem. physiol. T. IV. p. 87.  
HUCK medic. observ. and inquir. Vol. 4. p. 40. LIBOTAUD  
observ. anatom. medic. Tom. II. obs. 179. p. 341. SANDI-  
FORT obs. anat. path. L. III. C. I. p. 9. Tab. II. — ejusd.  
Exercit. ac. L. II. p. 27. — Mus. anat. Vol. I. Sect. 7. p. 304.  
N.

- N. 15. 16. T. CXIV. B. VOCHT *anatom. chir. med. Beobachtungen*. Rostock. 1759. p. 414. HEURMANN *verm. Bemerk. u. Unters. d. ausüb. Arzneywiss.* Kopenh. 1765. I. B. p. 304. LUCAT *traité de l'existence de la nat. et des propr. du fluide des nerfs dans le mouv. muscul.* Berl. 1765. p. 52. Tab. III. HENKEL *neu. med. u. chir. Bemerk.* Berl. 1769. I. B. p. 1. PORTAL *Mém. de l'acad. des sciences. Ann.* 1770. 1771. ORHME *diss. de morb. recens natör. chir.* Lips. 1773. GERM. in *d. N. Samml. Abb. f. Wundärzte.* 3. St. p. 79. BÜTTNER *op. c.* (v. P. II. Vol. I. Sect. 1. C. IV. §. XX. 2 (16)). MAUCHART *Eph. nat. cur. cent. IX.* Obs. 38. p. 94. J. A. MURRAY *pr. spinæ bifid. ex malum oss. conformat. initia*, Goett. 1779. *Recos. in ejusd. oper.* Vol. II. p. 195. MOHRENHEIM *Beobacht. versuch. chir. Vorfälle.* Wien. 1780. I. B. p. 172. Tab. II. fig. I. N. 2. CAMPER *ab. d. Natur, u. Ursachen verschied. Wassersuchten.* In *Abb. f. pr. A.* XVI. B. p. 446. GREEVE *Beob. ein. betrüchtl. Spaltung d. Rückgr. ih. VIII. Bd.* p. 584. ACREL *Schwed. Abb.* X. B. p. 294. HULL *Mem. of the soc. of Manchest.* Vol. V. par. 2. p. 495. I. P. FRANK *epit. de cur. homin. morb.* L. VI. P. I. W. J. CAPPEL *de spin. bifida.* Helmst. 1793. LOEFFLER *vermischte Schrift.* Stend. 1801. p. 390. VOIGTEL *op. c.* I. B. p. 319 sq. OEBERTRUFER, STARCK *N. Arch.* 2. B. p. 654. N. 16. RICHTER *Anfangsgr. d. Wundarz.* 3. Bd. p. 239. SACHTLEHEN *Klinik d. Wassersucht.* Danzig 1795. p. 472. POSKOWITZ *Journ. f. Med. Chir. v. Geburtsh.* I. St. p. 176. HENRY *Journal de médecine.* T. XII. p. 138 FLEISCHMANN *de vitiis congen. circa thorac. et abdom.* Erlang. 1816. MUCKEL *Handbuch d. pathol. Anatomie.* I. B. p. 356. ASTLEY COOPER *some observations on spina bifida v. Med. chir. Trans.* Vol. II. p. 324. HORN *Archiv f. med. Erfahr.* 1816. 3. H. p. 447. HUFELAND *J.* 1817. 6. St. p. 80. OTTO *seltene Beobachtungen zur Anatomie, Physiologie und Pathologie gehörig.* Bresl. 1816. *Zweite Samml. Berlin* 1824. RACCHETTI *op. c.* p. 391. C. F. A. NITENDORF *diss.*

diss. de spinæ bif. cur. radicali. Berol. 1820. GILBERGMANN  
Beschreib. ein. sehr betrüchtl. Sp. bif., in Rhein. Jahrb. Bd. 6.  
St. 1. p. 41. Ein merkwürd. Beitr. zur Kenntniss d. Sp. bif. in  
FROBIEF Notiz. Bd. 13. N. 286. p. 345. Bd. 14. N. 12. p. 206.  
N. 14. p. 318. E. JONES v. ein. sonderbar gespalt. Rückgr. bei  
ein. 20jähr. Mädchen, in GERSON u. J. l. Mag. 1822. März.  
Apr. p. 345. J. LINDRAY Fall v. gespalt. Rückgr. b. ein.  
12jähr., ex Lond. med. reposit. 1825. Febr. in GERSON u. J. l. c.  
1826. M. Apr. p. 304. C. A. MAISONABLE Journ. de clin. 1826.  
v. FROBIEF Notiz. Bd. 14. p. 248 et 293. A. WY. IYER Fall v.  
gespalt. Rückgr., ex N. York med. and phys. Journ. T. 4.  
p. 321. in GERSON u. J. l. c. 1826. Nouv. Decbr. p. 438.  
MAYH. Fall v. Sp. bif. in HORN Archiv 1826. Jan. Febr.  
p. 170. H. G. POTTEROY diss. descript. eas. rariss. sp. bif.  
totalem et colum. vertebr. entrons. insigniter curvat. exhib.  
Ber. 1827. A. BUNDACH sp. bif., in Ztschr. f. Nat.- u. Heil.  
Dreßd. 1827. Bd. 5. St. 2. p. 293. F. L. PROBYN Heil. ein.  
gespalt. Rgr. durch Einstich ex The Lancet Vol. 11. p. 800.  
in GERSON u. J. l. c. 1827. Jul. Aug. p. 91. Idem Ein neuer  
Fall v. Heil. d. Sp. bif. durch wiederholte Punction, ex  
Med.-chir. rev. in FROBIEF Notiz. 1828. Bd. 20. N. 18.  
Ein Fall v. R. M.-Wassersucht u. andern Mißbild. ein.  
neugeb. Kind. ib. Bd. 22. N. 11. SCHNUR Sp. bif. an ein.  
neugeb. Kinde, in SIEBOLD Journ. 1828. Bd. 7. St. 3. p. 297.  
WARDROP Fall ein. Punction d. gespalt. Rückgr., ex The  
Lancet 1827. T. 13. p. 308. in GERSON u. J. l. c. 1828. März.  
Apr. p. 538. MARSA u. GROENOT-ST. HILAIRE, Notaphorus,  
in HECKER Lit. Annal. 1828. Maj. CHALMER durch Spin. bif.  
d. Kindes erworbene Geb. ex The Lancet 1828. Bd. 14. p. 698.  
in HORN Archiv. 1828. St. 6. SIEBOLD Beschreib. u. Abbildg.  
missgebild. Früchte, in ejusd. Journ. 1828. Bd. 8. St. 2. p. 449.  
HOEKHY Heil. ein. gespalt. Rückgr. durch d. Punction, ex the  
Lond. med. gaz. 1827. Decbr. in GERSON u. J. l. c. 1828. Bd. 16.  
Septbr. Octbr. D'OSTREPONT spin. bif. (duo esp.), in Gumpine.  
D. Ztschr. f. Geburtsh. 1829. Bd. 4. H. 4. p. 462. Idem in N.  
Ztschr. f. Geburtsh. 1824. Bd. 2. H. 2. p. 185. SPÖNGLI in

For-

- Verhandl. d. verein. ärztl. Gesellsch. d. Schweiz, Jahrg. 1828. Hälfte 2. Zürich 1829.* C. GRIESELICH *sp. bif.* in *Rust Mag.* 1831. *Bd.* 35. *H.* 2. p. 217. *N.* 11. J. KLIN *sp. bif.* in *Med. Jahrb.* d. Oesterr. Staat. *Neueste Folge.* *Bd.* 1. *St.* 4. p. 126. LOGAN *sp. bif.* in *FRORIEP Notiz.* 1832. *Bd.* 33. *N.* 22. HANKEL *sp. bif.* mit andern Bildungsfehlern, in *Med. Ver.-Ztg.* 1833. *N.* 15. C. F. BELLINGHRI *anat.-physiol. Untersuch. üb. d. Rückenmark u. s. Nerven,* übers. v. H. KAULLA. *Stuttg.* 1833. W. J. CLUMMENT ein Fall v. *sp. bif.*, bei welchem die Punction d. Geschwulst ... tödlich ablief, ex *Obs. in surg. and pathol. Lond.* p. 161. in *FRORIEP Notiz.* *Bd.* 36. *N.* 17. p. 163. J. DAWSON Fall v. *Sp. bif. b.* ein. Erwachs., ex *Transact. of the prov. med. and surg. assoc. Lond.* 1833. *Vol.* 1. in BEHREND *allg. Repert. d. ausl. Journalistik.* 1833. *IV.* *H.* 12. p. 214. *Med. Ztg. d. Ausland.* *Berl.* 1833. *N.* 68. *FRORIEP Notiz.* *Bd.* 40. *N.* 15. p. 233. et MÜLLER *Archiv.* 1834. *H.* 2. SCHNIDER Spalt. d. Rückgr. in CLARES u. RADIES *Beiträge.* 1834. *Bd.* 1. *H.* 2. p. 254. J. SCHMIDT *sp. bif. u. Folg. ihr. Punctur,* in HUFELAND *Journ.* 1834. *Jun.* p. 71. P. NEWBIDDING *probat. essay on spina bif.* *Edinb.* 1834. LEIDHARDT Fall v. *Sp. bif.* ex *Archiv. gén.* 1834. *Juill.* in SCHMIDT *Jahrb.* 1835. *Bd.* 5. p. 204. FR. DORFF *hydro-rhachitis,* in *Notiz. üb. d. K. Erziehungs- u. St. Petersb.* in *Med. pract. Abh. etc. Petersb.* 1835. *Bd.* 1. VERNET-LERWEN angeb. *Hydrocephal. mit Sp. bif.* ex *Annal. de méd. belg.* 1835. *fév.* in SCHMIDT *Jahrb.* 1836. *Suppl.* 1. p. 339. CRAWER *Sp. bif.* mit Klumpfüß. vergesellsch. in CASPER *Wochenschr.* 1836. *N.* 12. ROGNETTA *üb. d. chir. Behandl. d. einfach. Sp. bif.* ex *Bull. thérap. T. 8. L. 8.* in SCHMIDT *Jahrb.* 1837. *Bd.* 14. p. 199. BERGER *pathol.-anat. Unters. ein. Sp. bif.* in *Heidlb. med. Annal.* 1836. *Bd.* 2. *H.* 1. STEINRÜCK *Sp. bif.* bei ein. Erwachsenen, in CASPER *Wochenschr.* 1836. *N.* 51. C. SKINNER Fall v. *Sp. bif.* ex *Americ. journ. of the med. sc.* 1836. *Nouv.* *N.* 27. p. 100. in DIEFFENBACH *Ztschr.* 1837. *Bd.* 4. p. 534.

W.

3. *Symptomata hydrorhachitidis congenitae* Descri-  
bifaria sunt, alia scilicet, quae ad ipsam spinam,<sup>ptio.</sup>  
alia, quae ad reliquas corporis partes animadver-  
tuntur. Illa pro varia spinæ bifidæ sede varia  
sunt. Generatim huc spectant: debilitas, emacia-  
tio, paralysis extremitatum plerumque inferiorum,  
saepe intortarum, quandoque exulceratarum<sup>3)</sup>;  
impotentia ubera, ut decet, sugendi, resolutio  
sphincterum vesicae urinariae et intestini recti,  
respiratio stertorosa<sup>4)</sup>, anaesthesia, convulsio-  
nes<sup>5)</sup>. Ad ipsam quod attinet spinam, tumor  
conspicitur formae nunc globosae, bilobatae<sup>6)</sup>,  
nunc piriformis, quandoque basi amplâ instructus<sup>7)</sup>,  
quandoque pedunculo tenui adhaerens, magnitudinis  
a nuce juglandis, usque ad duos pugnos, interdum  
sub inspiratione tumens, sub expiratione sub-  
siciens<sup>8)</sup>. Eo explorato saepe spina divisa et ve-

H2 luti

W. FISHER üb. *Sp. bif.* ex *l'institut*, 1837. Juill. in  
FRORIEP *Notiz*, 1837. Bd. 3. N. 5. p. 79. at SCHMIDT *Jahrb.*  
1838. Bd. 17. H. 2. p. 195. WITTEK *Sp. bif. connata*, in  
*Med. Ver.-Ztg.* 1838. N. 49. p. 245. REBER üb. *Hydrorha-*  
*chia*. *Inauguralabh. Würzb.* 1838. — v. etiam *Commerc. Lit.*  
*Norimb. Ann.* 1741. hebd. 21. N. 1. *Miscel. nat. Cur. Dec.* I.  
*Ann.* I. Obs. 7. p. 36. *Ann.* III. Obs. 129. *Dec.* II. *Ann.* I.  
Obs. 158. p. 263. *Ann.* VI. Obs. 38. p. 143.

3) TREU l. c. p. 412.

4) LIRUTAUD *Synops. univ. pr. med.* T. I. p. 560.

5) SAUVAGES op. c. T. II. p. m. 497.

6) Exemplum evarratur a Dr. PNEWHURTON in *the Edinb.*  
*med. and surgic. journ.* 1821. July. N. 68.

7) Ut in monstro, a CHALMER l. c. descriptio.

8) *Journal de médecine et chirurgie.* T. XXIX. 7. 140. De  
quo phaenomeno OLLIVIER (l. c. p. 40 sq.) docte disserit,

luti duplex persentitur. Tumor haud raro integumentis communibus <sup>9)</sup>, nunc extenuatis <sup>10)</sup> (et ita quidem ut serum transluceat <sup>11)</sup>), nunc crassius <sup>12)</sup>, cooperitur. Aliàs integumenta communia deficiunt et dura mater in propatulo est <sup>13)</sup>. Quod sine vertebrarum defectu haud contingere posse, intelligitur. Triplex autem vertebrarum ille defectus est <sup>14)</sup>. Nunc enim 1° tota vertebra ita fissa est, ut corpus illius duas partes laterales exhibeat, — nunc 2° arcus vel imperfecte evoluti sunt, vel 3° inter se invicem saltem non conveniunt. *Prima signae fissae species*, a TULPIO <sup>15)</sup>, WEPFERO <sup>16)</sup>, SALZMANNO <sup>17)</sup>, CAMERARIO <sup>18)</sup>, TR.

ZWIN-

MONENS, tumorem sub expiratione tumore et vice versa. SINGER I. c. „die Geschwulst hob sich bei starker Expiration . . . u. senkte sich bei Inspiration.“

9) OLLIVIER I. c. p. 187.

10) MECKEL I. c. p. 337. „quand elle (la tumeur) a une certaine grosseur, les tegumens sont ordinairement amincis.“

OLLIVIER I. c. p. 184.

11) MORGAGNI I. c. Epist. XII. Art. 8.

12) HOCHSTÄDTER I. c. §. 67.

13) HENRY I. c. CAMPER rem ita semper se habere credidit (Diss. de hydr. in dies. X. Vol. II. p. 416.)

14) FLEISCHMANN I. c. p. 11.

15) Fissura omnium vertebrarum lumbalium solam peritoneo cooperiebatur.

16) Columna vertebralis ita fissa eret, ut omnia viscera, renibus non exceptis, in conspectum venirent.

17) Vacuum in tertie vertebra lumbali detexit.

18) Pollicem proprium per columnam vertebralem eo usque, quousque peritoneum id permittebat, cavitati abdominis introduxit.



ZWINGERO <sup>19)</sup> et FLEISCHMANN <sup>20)</sup> descripta, rarissime observatur <sup>21)</sup>. *Secunda species*, cujus exempla retulerunt GREWE <sup>22)</sup>, MORGAGNI <sup>23)</sup>, HULD et GILG <sup>24)</sup>, MAUCHART <sup>25)</sup>, HENRY et AFANUS <sup>26)</sup>, WENZEL <sup>27)</sup>, OTTO <sup>28)</sup>, frequentius occurrit. Frequentissima omnium *tertia est species*, ut ex observationibus RUTSCHII <sup>29)</sup>, ACKELII <sup>30)</sup>, aliorumque multorum <sup>31)</sup> elucet. *Sedes scri* varia est.

19) Corpore vertebrarum lumbalium divisa. Eph. N. C. cent. 7. obs. 29.

20) Corpore vertebrae ultimae dorsalis et primae lumbalis, laminam tenacem cartilagineam exhibebant.

21) MECKEL l. c. p. 358.

22) Processus vertebrarum quotquot sunt in ligementum osseum confluentes vidit, per quod tamen nervi spinales transiebant.

23) Partes inferiores vertebrarum lumbalium usque ad corpus depressas destructas reperit.

24) Vertebrae lumbales plane ad latera conjunctae erant.

25) Processus et arcus in embabus vertebris fissis desiderabantur.

26) Apud HOCHSTAEDTEN l. c. processus transversii fore omnino desiderabantur, et nec vestigium partium posteriorum vertebrarum aderet.

27) l. c. p. 367 (37) et obs. 56. Defectus omnium arcuum vertebrarum ossis sacri.

28) „An dem Skelette eines 4jähr. Kindes ist von dem 11. Rückenwirbel nur die rechte Hälfte vorhanden u. zwischen dem 10. u. 11. gleich einem Keile eingeschoben.“ l. c. Berlin 1824. 1. Absch. Pl.

29) Arcus inter se solum trium linearum spatium relinquebant.

30) Quamvis tumor pugnum adaequeret; tamen vertebra parvum foramen exhibebat.

est. Plerumque liquor extravasatus, aliquando pondus librae superans<sup>31)</sup>, inter membranam vascularem medullae et arachnoideam<sup>32)</sup>, rarissime inter duram matrem et vertebrae<sup>33)</sup>, invenitur. Indoles istiusmodi humoris est serosa, subcruenta, purulenta<sup>34)</sup>. Illius *analysis chemica* BOSTOKIO<sup>35)</sup> et MARCETO<sup>37)</sup> debetur<sup>36)</sup>. Medulla spinalis ipsa in loco, fissurae vertebrarum respondente, nunc plane deficit, nunc in substantiam aqueam soluta est, nunc tenuis, mollis, vel hydatidibus obsessa invenitur<sup>38)</sup>. Verum monentibus RUTSCH<sup>40)</sup>, CAM-

FER

31) ISENFLANN in *Archiv. gén. de méd.* T. 4. p. 299 (arcus posterior atlantis plane divinus).

32) SIEBOLD *chir. Tagebuch*, N. 59. JUKES in *London med. and phys. journ.* 1822. Febr. *Hamb. Mag.* 1822. März. Apr. p. 345. ROGNETTA l. c. p. 200 (3).

33) HENRY, ACHIL, MUCKEL l. c. p. 363. WENDEL l. c. p. 363 (4).

34) VROLIK l. c. Casum similem retulit LEBEL in *Misc.* N. C. Dec. 2, ann. 2. (1689).

35) HENRY l. c. SCHMIDT l. c. („eiterartige Jauche“). LEBERDÈRE l. c.

36) *The Edinb. med. and surg. Jour.* Vol. 2. 1806 (continent aquae 97,8; muriatis sodae 1,0; albuminis 0,5; mucii 0,5; et gelatinae 0,2).

37) SCHWEIGER *Journ. d. Chem.* 17. B. 1. H. p. 28.

38) Nec non LASSAIGNIO. *Journ. de chimie méd.* 1822. Juin, et apud OLLIVIER l. c. p. 194.

39) RUTSCH Obs. C. 34. GRUBE *Abh. f. pr. Aerzte.* 8. B. p. 589. HUEHMANN *med. Bemerk.* I. Th. p. 304. ACHIL *Schwed. Abh.* 10. B. p. 291. SANDIFORT *mus. anat.* Vol. I. p. 234. SCHMIDT l. c. („das R. M. war ganz zerstört“). HOFER in C. I. cit. (tota medulla molem albam, lacteam exhibebat).

PER<sup>41)</sup> et MECKEL<sup>42)</sup>, corruptio medullae spinalis saepe nonnisi apparens est<sup>43)</sup>; enim vero involucri illius dum a sero inter ea collecto extendantur<sup>44)</sup>, sequi necessario jure debet, ut etiam origines nervorum a se invicem distrahantur ac lacerati appareant<sup>45)</sup>. Nervorum hujusmodi plurimi fasciculi superficiei internae tumoris adhaerere visi sunt<sup>46)</sup>. Inter omnes autem *spinac regiones* nulla saepius finditur, quam *lumbalis*<sup>47)</sup>, circa

40) l. c. p. 38.

41) l. c. p. 416.

42) l. c. p. 366.

43) WANDROP, HANKEL, SREGER II. cc. (medulla in columbia).

44) Et longiora fiunt; e. g. in casu memorabili a J. DAWSON (l. c.) allato membranae medullae spinalis ex apertura inferiori ossis coccygis procedebant (nisi hernia fuerit durae matris medullae spinalis).

45) „Das Rückenmark war ganz zerstört u. nur noch die Ursprünge der Nerven zu sehen; die Rückenmarkshäute un-  
gemein verdickt.“ J. SCHMIDT l. c.

46) LE CAT l. c. p. 52. Tab. cit.

47) Inter 20. spinac bifidae casus, undecies malum ad vertebrae lumbales invenit OSERTHOFFER (l. c.). Similes observationes obveniunt apud TULPIUM l. c. p. 230. RUYSCH l. c. p. 45. BURG. Eph. nat. cur. Dec. II. a. b. p. 138. PORTAL *mém. de l'acad. des scienc.* 1770. p. 481. LUCHET Eph. nat. cur. Dec. II. An. 2. p. 363. HEURMANN l. c. LINK Act. nat. cur. Vol. I. p. 128. APINUS l. c. p. 487. SPIELNERBERGER Eph. nat. cur. Dec. I. a. 3. p. 161. RICHARD ROUX *Journ. de méd.* Vol. 29. p. 140. CAMPER diss. X. p. 412. STALPAART VAN DER WIEL obs. chir. cent. II. obs. 34. p. 368. MONRENNHEIM l. c. p. 172. CAVALLINI, ORTESCHI *Giorn. di med.* Vol. 8. p. 231. HUTCHINSON *new Lond. med. journ.* 1792. Vol. I. p. 338. MORGAGNI Ep. XII. THU N. Act. Nat. Cur. T. II. p. 394. SCHNADER obs. med. Dec. II. obs. 2. STOLL v. POSHWITZ l. c. MAUCHART Eph. Nat.

circa cuius phaenomeni causam plures exstant hypotheses<sup>48)</sup>. Sequitur regio *dorsalis*<sup>49)</sup>, plerumque tamen simul cum spina bifida lumbali<sup>50)</sup>. Posse enim spinam plurimis in locis simul<sup>51)</sup>, aut retam<sup>52)</sup> findi, multis confirmatur observationibus. Praeter locum fissum, cavum columnae vertebralis quandoque ultra limites extenditur<sup>53)</sup>, quod et de ipsa medulla spinali valet<sup>54)</sup>. Rarius spina

50-

CHU, cent. IX. X. obs. 38. RUTTY *Philos. Trans.* N. 113. 366. BUDGEN ib. HENKEL *Neue Bemerk. Erste Samml.* I. p. 1—10. SALEMANN l. c. §. 3. CAMERARIUS l. c. §. 4. BRUNER *Eph. nat. cur.* Dec. III, a. I. obs. 152. CRAMER l. c.

48) BUCHER de hydrops. p. 29. MECKEL l. c. p. 305 sq.

49) Septies vidit OBERSTUPFER l. c. p. 654.

50) HEUBERMANN l. c. p. 304. quatuor vertebrae superiores lumbales et duas vertebrae dorsales inferiores sciades invenit l. c. p. 304. GREENE vertebrae omnes lumbales in medio sejanctas detexit.

51) BIDLOUS exercit. anat. chir. Dec. II. p. 191. Tab. 3 et 4. PLATNER *Inst. chir.* §. 727. not. 2. RUTSCH *Thes. anat.* N. 8. KREKING *Specileg. anat.* Tab. 9. HAST spud ROSENSTRIN *Kinderarz.* 5. Aufl. p. 63. J. KEMIN in *Oesterr. med. Jahrb.* 1829. Bd. 1. St. 4. p. 136.

52) HUIJ *mém. de l'acad. de Dijon.* Vol. 2. FILLIÈRE in RICHTER *chir. Biblioth.* Bd. 6. p. 185. POTTHOF l. c. (exemplar, praeter ceteris memorabile, in Museo Harolinensi conservatur). MAKWA et GEOTTEOT - ST. HILAIRE l. c. (a vertebra colli quarta usque ad os sacrum spina fissa).

53) ACKER l. c. p. 291.

54) MORGAGNI *Epist.* XII. §. ult. TARDI *Comment. cit.* Nomb. 1741. APPIUS, HOCHSTÄDTER l. c. HUTCHINSON *New Lond. med. Jour.* Vol. I. p. 338. GRASHUTE l. c. MECKEL l. c. p. 354. Cfr. OLIVIER l. c. p. 176. 177. observationem a BACLAND et plures proprias additas.

solum ad collum finditur <sup>11</sup>); rarissime ad os sacrum <sup>12</sup>). Huc quoque evolutio massarum abnormium ad os sacrum observatarum spectare videtur <sup>13</sup>). Praeterea spina bifida cum aliis vitiis

con-

65) Viderunt OSWERTOFFER l. c. p. 654. CAMPER l. c. p. 412.

RUYSCH l. c. p. 43. SNIP, SWAGHMAN v. PORTAL l. c. p. 36. WENZEL l. c. 54. Beobacht. p. 362. OLLIVIER l. c. p. 147 et 185. CHALMER l. c. (a tertia colli vertebra ad primam dorsalem usque). GHIDELLA l. citando p. 225 (tumor in regione vertebrae sextae cervicalis). KLEIN l. c. (prima et secunda colli vertebra fuses una cum apertura in osse occipitis et tumore, portionem cerebri et medullam oblongatam includente).

66) Tamen observant ad infimam ossis sacri partem RUYSCH l. c. Obs. 35., CAMPER l. c. p. 412. et CH. VROLIK *idem. sur quëls. sujets intéressans d'anat. et de phys., trad. du Holland. par FALLOT. Amsterd. 1822. p. 76.* Ad medium illius ossis cum hydrocephalo tumorem observavit MEYER (Eph. N. Cur. Vol. I. Obs. 127) reliquis vertebrae illius. VOISIN in BÉDILLET *rec. périod. T. 21. p. 357.* WENZELII (l. c. p. 363) verba: „Am häufigsten kommt dieser Bildungsfehler ... am Kreuzbein ... vor,“ experientiae non conveniunt.

67) SAXTORPH (Collect. soc. Hafn. T. II. N. 4. p. 25) in foetu femineo inter crura saccum enormem quatuor libras aeri et hydatidas continentem, os sacrum retrorsum et anum antrosum pallentem invenit. GRUBER (*Medical Essays Vol. II. p. 1. N. 37. p. 361*) similem saccum sarcomatoseum detexit. BURCKHARDT (Act. Helv. T. VII. p. 108-11) deficientibus osse sacro et coccyge, saccum ab ultimis vertebrae lumbalibus pendentein vidit. SCHMIDT (*Sonderbare angeborene Misbild. eines Kind. weibl. Geschlechtes in HUYLAND Jour. 4. B. 3. H. St. 9.*), absente osse sacro corpore hydatiforme e coxis pendens, descripsit. MICHAEL (l. c. p. 373) columnam vertebralem ceterum ita constituta,

conformationis facile societatem init, e. c. cum hernia umbilicali<sup>54</sup>), cum vitiis intestinorum<sup>55</sup>), cum fissura<sup>56</sup>) vesicae urinariae<sup>57</sup>), cum atresia ani<sup>58</sup>), et defectu renis et testiculi unius<sup>59</sup>), cum imperforatione ani et fissura penis et scroti<sup>60</sup>), cum atresia ani et inversione viscerum thoracis et abdominis<sup>61</sup>), cum vitio intestini ilei, cujus finis membrum virile mentiebatur, ex quo urinae loco alvus excernebatur<sup>62</sup>), cum defectu multorum organorum<sup>63</sup>), cum appendice intestinorum

et

ad finem ossis sacri, saccum, ex dura matre constantem, conspexit. LOEFLER (*vermischte Schrift, Stend.* 1801. p. 380) fungum medullarem in osse sacro cum spina bifida; MOMBERT (*Siebold Journ.* 1831. *Bd.* 10. *St.* 3. p. 529) talem fungum in ossibus sacro et coccygeo. WENZEL l. c. 56. *Beob.* p. 368.

58) VOISIN *Jour. de méd.* T. XXI. p. 57. REVOLAT ib. T. XXVII. p. 373. SANDIFORT obs. anat. pr. T. 3. p. 1—41. PREUSS *Eph. N. Cur.* Vol. VIII. Opp. p. 128. MECKEL l. c. p. 679. SIEBOLD l. c.

59) VOISIN et REVOLAT. Renum et uretherum; HANKE l. c.

60) Et extroversione ut in casu a FIELITZ l. c., relato. REVOLAT l. c. p. 370.

61) VOISIN, DELFINI *opusc. accelti di Milano.* T. VI. p. 21—23.

62) SIEBOLD l. c.

63) ALBRECHT *Eph. nat. cur.* Dec. II. ann. I. obs. 83.

64) OELENR med. sil. set. obs. X. sp. I.

65) LAMARC in ROUX *Jour. de méd.* T. XXXIII. p. 516.

66) I. A. LOHENWEIN de monstruosa genitalium difformitate commentatio. v. *Mém. de l'Ac. Imp. des Sc. de St. Petersb.* T. VI. 1817.

67) DANIEL *Samml. med. Gutachten.* p. 276. C. J. M. LAN-  
WENBECK n. *Bibl. f. d. Chir.* 1827. *Bd.* 4. *St.* 3. p. 481.

et perforatione septi cordis<sup>68)</sup>, nec non hydrocephalo<sup>69)</sup> et talipedibus varis ac valgis<sup>70)</sup>.

4. Spinae bifidae *caussa* locata est in lae-  
sione<sup>71)</sup> aut situ insolito<sup>72)</sup> foetus in sinu matris,  
in vitiis uteri<sup>73)</sup>, in partu difficili<sup>74)</sup>, in sero ex-  
en-

N. 3 (defectus uteri, tubar. Fallop. et ovariorum). SIM-  
BOLD l. c. (defectus partium genitalium externarum, pro-  
statæ, vesicularum seminalium, organorum urinalium etc.).  
SPÖNDLI l. c. (plur. costar. defectus). HANKEL l. c.  
J. SACHERO in BREHEND Journ. 1830. II. 11. p. 258 (mon-  
stro, de quo et infra, genitalis anusque deficiebant). d

68) SANDIFORT et MECKEL l. c. p. 580.

69) FIDRIT med. Beobachtg. Cassel 1805 (spina bifida; ab  
ultimis vertebrae lumbalibus ad os coccygis usque, cum  
hydrocephalo). CLUTTERBUCK in The Lond. med. Repo-  
sitory. Edit. by UWINS, 1820. Vol. 13, N. 73. BURDACH l. c.  
J. DAWSON contendit (l. c.), hydrocephelum rarissime  
sine hydrorhachitide concomitante, hanc entem nunquam  
sine illo esse. VERHEYEN l. c. SINGER l. c. at  
alii; qui casus omnes adversus OBERHUPFER (STARK n.  
Archiv f. d. Gsk, 1801), hanc complicationem nunquam  
se vidisse, esse rentem, testentur.

70) CRAMER, HANKEL II. cc.

71) Lib. Hippocraticus de genitura, C. 8. ed. LIND, T. I.  
p. 132. sic habet: „Ac vero oblaesum in utero puerum,  
sentio aut contusum ex matris uterum gestantis plaga,  
aut ejusdem lapen, aut alio quopiam violento affectu me-  
tri accidente, vitiatum esse. Qua vero parte mater pla-  
gas acceperit, ea puer oblaeditur.“

72) HEURMANN l. c. p. 308. ORTH diss. de tumor. quibus-  
dam tunicat. v. HALLERI coll. disp. chir. T. 5. p. 420.

73) HIPPOCRATES eod. loc. (c. 9) ait: „Quum in utero  
juxta locum, in quo oblaesus est foetus, angustie fuerit;  
necesse est corpus, quod in angustia movetur, vitari  
juxta illum locum.“

encephalo, ventriculo scilicet quarto cerebri, ad spinam, vel inter membranas<sup>74)</sup>, vel per peculiarem canalem in medio medullae positum<sup>75)</sup>, defluente<sup>77)</sup>, in aquis vertebrae distendentibus<sup>74)</sup> et

74) MAURIT. HOFFMANN Eph. nat. cur. Dec. II. Ann. 5. obs. 208. ORTH l. c.

75) MORGAGNI Epist. XII. 12.

76) De hac antiqua GALENI (de HIPPOCRAT. et PLATON. decret. Lib. VII. C. 4. p. 276), COLUMBI et STEPHANI opinione lege PORTAL (l. c.) et RACCHETTI (l. c. p. 132—139), qui causalem istum, saltim ad cervicis initium minime negare audet; contra GALL (*Anat. et physiol. du syst. nerv. Sect. 2. p. 51*). MORGAGNI et multi alii post eum in medullae spinalis medio, saepissime in cadaveribus puerorum cum spina bifida aut hydrocephalo, causalem detexerunt. A. NONAT (*Archiv. gén. de méd. 1838. Mars. v. FROIER Notiz. 1839. Bd. 9. N. 1. p. 12—16*) exemplum luculentissimum refert, quod, causalem istam serosam in dubium vocare, vetat. Ex factis allatis concludit autor p. 15.: „*der bei Erwachsenen gefundene Canal in der Mitte des Rückenmarks ist gewöhnlich das Produkt eines pathologischen Processes... Die Ernährung, unter dem Einflusse dieses krankhaften Processes kann aber eine rückwärtige Bewegung machen u. so die verschiedenen Zustände wieder darstellen, welche das Rückenmark bei seiner Fötalementwicklung hindurchgeht.*“ Cfr. OLLIVIER l. c. p. 178.

77) Jam HIPPOCRATES dixeret (de locis in homine et libello de glandulis): „*fluit e cerebro humor per eures, oculos, palatum, in guttur et gulam, per venas in medullam spinalem.*“ Legantur de hoc argumento: SWIETEN comment. T. I. p. 273. GILS l. c. p. 17. HAHN Praelect. pathol. T. III. p. 646. PORTAL l. c. SAUVAGES nosol. method. T. II. p. m. 497. et GENGA (*Anatomia ceruica p. 284*). Ex illius observatione constat, tumorem capitis hydroce-



et quidem inprimis ad tergum, quatenus ibi minor, quam a lateribus resistentia impositorum musculorum et tendinum est<sup>78)</sup>, in mala ossium conformatione vitio venereo aut rhachitico adscribenda<sup>80)</sup>, interdumque ex animi pathematibus matrem gravidam excruciantibus repetenda<sup>81)</sup>, in nisu formativo abnormi<sup>82)</sup> et in asthenia virtutis vitalis, utpote quae opus nutritionis, et officium vasorum lymphaticorum dirigit<sup>83)</sup>. Quaevis istiusmodi opinionum pro re nata a veritate haud aliena esse videtur et certe una alteram haud excludit. Generatim tamen maxime MURRAYO adhaeremus, processum inflammatorium et hic non excludente<sup>84)</sup>.

5. Non omne columnae vertebralis in foetu *Diagnosis.*  
vitium pro spina bifida et hydrorhachitide illico  
de-

phalici subsedisse, cum ex aperto ad os coccygis tumore aque deflueret, seu ichor pallidus.

78) RUTSCH obs. med. chir. C. 34. p. 45. CASPER l. c. p. 112.

79) MORGAONI Epist. XII. 9.

80) ANDREAS MURRAY l. c. p. 195 (Docuit non esse hic solum cartilagineum defectum, quibus apophyses spinales cum vertebrae cohaerent, sed laterales vertebrae remotae osseae esse vel valde imperfectos et malee directionis, vel deesse plane cum ipsis apophysibus obliquis et transversis). Binorum prolium, cum spine bifida, ex eadem matre natorum, tertiana vero ex rhachitide tandem demortuae exemplum refert MICHAELIS (RICHTERS *Bibl. 6. B.* p. 134).

81) LORENWEINI casus id docere videtur l. c.

82) FLEISCHMANN l. c. p. 12.

83) RACCHETTI l. c. p. 414—416.

84) P. II. edit. alter. Vol. I. S. I. C. IV. §. XX. 4.

declarandum est. Enim vero praeter illud, de quo agitur, columna vertebralis et aliis haud paucis subiicitur vitiis *conformationis*. Spectant huc *medullae spinalis defectus*<sup>85)</sup>, plerumque<sup>86)</sup>, at non necessario<sup>87)</sup>, cerebri defectui junctus, quandoque

85) MECKEL I. c. p. 209, 221, 348. COPENLAND I. c. p. 8 (partis medullae inferioris defectus). OLLIVIER I. c. p. 134. VERHEYLEWEGEN I. c. („Rückenmark fehlte gänzlich“). NICHOLSON diss. de monstro humano sine trunco nato. Berol. 1837. Germ. in MÜLLER Archiv. f. Anat. 1837. Bd. 3.

86) SÉE *ib.* d. *Vitalité* p. 7. BUSCH *Beschr. zweier merkw. Missgeburten*. Marb. 1803. WRNZEL I. c. p. 363. OLLIVIER I. c. multis exemplis allatis (p. 136 sq.), ait (p. 143): „L'amyélie est concomitante de celle du cerveau. Constamment ce dernier organe manque quand la moëlle épinière n'existe pas, tandis que cette dernière peut exister sans qu'il y ait la moindre trace de cerveau.“ Porro: K. F. BURDACH in *Med. Ver.-Ztg.* 1833. N. 47 (defectus spinæ vertebralis ocephali). ESCHRICHT *Gesichtsverdoppelung mit Mangel an Gehirn u. R. M.* in MÜLLER Archiv f. d. Anat. 1834. II. 3. p. 268—272 („die Schädeldecke u. die ganze hintere Wand d. Wirbelsäule fehlen; weder vom Gehirne, noch vom Rückenmarke die geringste Spur“). A. Y. NICOL et R. D. ARNOLD *Missgeb. ohne Gehirn u. R. M.* ex *The Lancet* 1837. Noubr. 4. N. 740, in *Neue Ztschr. f. Geburtsk.* 1839. Bd. 7. II. 2. p. 309. SVITZER *Nachr. v. ein. weibl. Hemicephal.*, bei welchem ein Theil d. Unterleibseingeweide auf d. Rücken in einem Sacke zwischen dem Kopf u. Rgr. lag; in MÜLLER Archiv. 1839. II. 1. p. 35 („...mangelten Gehirn u. R. M. ganz u. gar.“ p. 38). Cfr. P. II. Sect. I. l. c. 6 (62).

87) Posse enim deficientis cerebro medullam spinalem omnino evolvi probant PROCHASKA ann. acad. f. 111. N. I et III. WERFNER Eph. nat. cur. Dec. I. Ann. 3. Obs. 206. МОН-

doque licet rarissime cum columnae vertebralis evolutione perfecta <sup>88</sup>), illius fissura <sup>89</sup>), abnormis latitudo <sup>90</sup>), excavatio <sup>91</sup>), situs extra specum vertebr-

RENHEIM *Wiener Beitr.* 2. Th. p. 314. MEKEL l. c. p. 549. A. SPESHA ex *Gaz. méd.* 1833. Janv. in *BEHRND Journ.* 1833. N. 3. p. 216 (in monstro vivente encephalon et mandulla oblongata deerant, medulla spinalis tenuior aderat). Docet PROCHASKA, quod si loco cerebri massa informis obveniet, medulla spinalis cum ea non semper cohaeret, et, e. c., circa tertiam vertebrae cervicalem incipit. Cfr. OLLIVIER l. c. p. 144 sq.

88) MERY *Mém. de l'ac. des sc.* 1701. p. 129. ANGELIN *Jour. de méd.* T. 35. p. 336. SAKTORPH *Gesamnte Schr. Kopenh.* 1803. *Samml.* 1. l. p. 477. MORGAGNI *Epist.* XX.

89) ZACCHIAS l. c. lib. 7. tit. 1. quaest. 9. §. 4. (Medulla spinalis plane duplex erat in foetu septem mensium). MANGET *Tb. anat. L. l.* p. 173 (casus primo similis). GRASHUIS *N. Samml. f. Wundärzte.* 10. St. p. 180 (fissura in foetu septem mensium circo os sacrum obveniebat). HULL l. c. p. 495 (medulla spinalis duos funes tanues, quorum quivis nervos unius lateris largiebatur, exhibebat). MALACARNE *Mem. della soc. Ital.* Vol. 12. P. 11. p. 173. (Foramen occipitale a septo perpendiculari in duas partes dividebatur, per quarum unam quamque medulla oblongata exibat, septem lineas infra conveniens!!) et MOHRENNHEIM *chir. Beob.* 17. p. 174. REIL *Archiv f. Physiol.* Bd. 11. p. 34 (corpus callosum bifurcatum). DUCIS in *Eph. méd. de Montp.* 1826. obs. 16 (pars medullae superior bifurcata). OLLIVIER l. c. p. 165. §. 2 et obs. 2 (medulla divisa).

90) MANGET l. c. TYSON *Philos. Trans. N.* 228. p. 533. UCCRELLI in *Arch. gén. de méd.* T. 5. p. 303 (hypertrophia medullae congenita). — Brevitas: MEYER in *Bull. des sc. méd.* 1826. Octbr. p. 116. — Longitudo vide supra, 3 (54).

tebralem<sup>91)</sup>; columnae vertebralis imperfecta evolutio<sup>92)</sup>, scilicet defectus vertebrarum<sup>93)</sup>, earum numerus major<sup>94)</sup>, arcus vertebrarum cum corpore non rite coalescentes<sup>95)</sup>, nec non vitia processuum<sup>96)</sup>,

ne

- 91) MORGAGNI l. c. ep. 12. sect. 2 et advers. anat. T. VI. obs. 14. p. 18. SANTORINI ib. BONET sepulchr. p. 395, addit. ad 8. 16. l. 1. obs. 12. PORTAL mém. de l'acad. des sc. 1772. p. 481. Anatom. méd. T. 4. p. 117. GALL. l. c. p. 145. RACCHETTI l. c. p. 133. NODAT l. c.

92) HARDER Apier.

- 93) VERM l. c. („das Kreuzbein hatte weder Canalis sacralis, noch foramina sacralia“). SACHERO l. c. (os sacrum et coccygis desiderabatur).

- 94) Vix unquam una alterave vertebrarum colli desideratur (MUCHEL l. c. p. 381). Contra vero saepe defectus unius vertebrae dorsalis aut lumbalis occurrit (idem, ib.). „Das Fehlen einzelner Wirbelbeine, das wir an den Halswirbeln nie, zuweilen an den Rücken-, am häufigsten an den Lenden- u. Kreuzwirbeln finden.“ WAGSEL l. c. p. 84. OLLIVIER (l. c. p. 147) autem in anencephalo solummodo sex vertebrae cervicales reperiebat; W. CAMPBELL (ex The Edinb. m. and s. j. 1830. N. 104. p. 107. in BERNARD Journalistik des Ausl. 1830. H. 8. p. 235) monstrum describit, cui omnes vertebrae colli deficiunt, et SCOUTETTEN (ex Pinetius N. 12 et 13. in MÜLLER Archiv f. d. Anat. 1834. H. 2) in monstro vertebrae colli desiderabat. BELLOC, BERNARD Journ. 1833. N. 10. p. 69 (gibbositas rara ex defectu vertebrae corporis 6. lumbalis). WARPROP l. c. (defectus partis mediae ossis sacri). YOUNG l. c. oss. tertius (vertebra lumbalis tertius deficiebat).

- 95) EUSTACHIUS oss. exam. p. 210. COLUMBUS de ra anat. L. XV. p. 484. LEVALLING obs. anat. rar. Fasc. I. p. 151. ACKERHANN lib. d. Körperl. Kernschadenh. d. Mannes u. Weibs. p. 49. Anmerk. K. OTTO Handb. d. path. Anat. p. 55. 96) BRILAND Eph. nat. cur. Dec. III. ann. 7. p. 278. VERM

ne dicamus de hominibus cauda instructis<sup>88</sup>). Potest vero ipsa spina bifida, sine collectione morbosa<sup>89</sup>)

seri

1. c. (arcum defectus). SVITZER l. c. p. 36 („d. *Arcus posteriores vertebrarum sowohl der vertebrae colli als dorsi u. lumborum u. des Os sacrum mangelten ganz u. gar*“).

97) HEBENETREIT de rarior. quibusc. oss. moment. Lips. 1740. p. 7. SANDIFORT obs. anat. posth. L. III. C. X. p. 135. ROSENHÜLLER de singul. et nativ. oss. corp. hum. varietet. Lips. 1804. p. 57. HANKEL l. c. (defectus processuum spinosorum). CLEMENT l. c. (def. proc. spin. vertebrae, lumb. quatuor). SEUGER l. c. (def. proc. spin. vertebrae, lumb. at ossis sacri etc.).

98) BARTHOLIN hist. anat. cent. VI. obs. 44. LOCHNER Misc. nat. cur. Dec. II. ann. 7. obs. 124. p. 230. KÖNIG ib. ann. 9. obs. 129. p. 223. BLANCARD Collect. phys. med. P. II. an. 1681. p. 290. ELSHOLZ de concept. tuber. et de puella monstr. Col. Brand. 1669. ROLOFFI mém. de l'ac. des sc. de Berl. 1761. p. 73. LABOURDETTE in SEDILLOT Jour. de méd. T. XXXII. p. 378. KRAKE phil. transact. N. 59. p. 160. MARTIN ein menschl. reifer Fötus mit einem 1½ Zoll lang. Schwanz, in HEUSINGER Ztschr. d. organ. Physik. 1827. Bd. 1. H. 5. p. 618. A. JACOB Bericht üb. eine sonderbare Production, welche, einem Schwanz ähnlich, an der Extremität d. Wirbels, ein. Mannes hing, ex Dublin Hosp. rep. Vol. 4. p. 571. in FRORIER Notiz. 1827. Bd. 19. N. 2. p. 24. Monstrosität ein. Mädchens, welches eine Art v. Schwanz hat, wie die dickschwänzigen Schaaf, ex Journ. d'Odesa in FRORIER Notiz. Bd. 24. N. 11.

99) Existencia enim liquidi cujusdam in specu vertebrali inter sanitatis confinia patefecit MACHENDIE („la moëlle spinère est donc dans toute son étendue plongée dans le liquide vertébral.“) note sur le liquide vertébral de l'homme et des animaux, Mém. lu à l'institut le 27. Decr. 1824, et ejus second. mém. in Journ. de phys. expér. et pathol. Frank Prax. II. 1. 2. 1.

seri in specu vertebrali exstare<sup>100</sup>), et vice versa<sup>101</sup>). Generatim nullum habetur hydrorhachitidis congenitae symptoma pathognomicum. Defecisse enim visa sunt, debilitas et emaciatio<sup>102</sup>), pedes intorti<sup>103</sup>) et paralysis extremitatum inferiorum<sup>104</sup>). Quamque tumor ad locum, ubi spina fissi est, ipsam medullam spinalem continet, sicque specimen *herniae* exhibet<sup>105</sup>). *Hernia*

au-

1827. Jan. Cfr. *Bullet. des sc. méd.* 1827. Mars. p. 216  
et GERSON u. JUL. *Mag.* 1827. M. u. Apr.

100) „Dass man nicht bei allen Rückgrathspalten, als beständige Erscheinung seröse Ergiessungen findet, beweist die Erfahrung.“ WENZEL l. c. p. 363, 364.

101) §. XVIII. N. 4.

102) AYLET (*Phil. Transact. Vers. Germ.* Vol. 3.) de recens nato narrat hydrorhachitide laborante, in quo tumor sub partu ruptus, quotidie aliquot uncias aquae cruentae largiebatur; infans erat ceterum *sanus et vividus*, agebat bene, sed nec guttam urinae reddebat. Nec artus inferiores erant paralytici. Die quinta e partu convulsiones accedebant subsequente morte. SEIGER (l. c.) „das Kind sah gesund aus, war ziemlich fett u. trank mit Appetit an der Mutter.“ WENZEL l. c. 55. *Beob.* p. 367. „das Kind war wohl genährt, belebt.“

103) „In permultis, inquit CAMPER (l. c. p. 62), mihi observare licuit pedes intortos non adfuisse.“

104) AYLET l. c. MORGAGNI *Epist.* XII. 16. RACCHETTI l. c. p. 398. JAWANDT *diss. obs. quaed. pr.* Gött. 1787. LOWAN l. c. (spina bifida incipiebat e vertebra lumbali secunda; medulla et nervi exinde tumidi erant, sed extremitatum inferiorum mobilitas et sensibilitas integrae).

105) Finem medullae spinalis cum involucri suo, per foramen vertebrae ultimae lumbalis in tumorem aquosum libere propendentem observavit MONRENNHEIM (RICHTER

autem *medullae* et sine spina bifida ex violentia  
externis oritur, uti videre est apud LECAT<sup>106)</sup>  
et FERRI<sup>107)</sup>. Talis hernia interdum potius *fungi*  
*medullae spinalis* nomen meretur<sup>108)</sup>.

6. Quousque foetus in utero delitescit, ebus- Prognosis.  
que hydrothachitis, etiamsi cum labe *medullae*  
*spinalis* juncta, vix aut ne vix quidem exercitio  
functionum, et incremento illius obstat. Secus  
autem absoluto partu. Tunc periculum morbi a  
loco, ubi columna vertebralis affecta est, nec non  
a mali gradu pendet. Spina bifida quo altior et  
amplior, eo periculosior, et vice versa. Genera-  
tim, quamvis infantes ea detenti primis vitae heb-  
domadibus e medio auferri soleant, exempla non  
desiderantur, ubi vitam protraxere ad menses  
septem<sup>109)</sup>, decem<sup>110)</sup> et quindecim<sup>111)</sup>, septem-  
decim<sup>112)</sup> quin immo ad annos quinque<sup>113)</sup>,  
octo<sup>114)</sup>, tredecim<sup>115)</sup>, quatuordecim<sup>116)</sup>, septem-

12 de-

*Bibl. 5. Bd. p. 761*), ut ergo hoc in casu hernia *medullae*  
*spinalis* adhaeret. Generatim autem hydrothachitidi con-  
genitae cum spina bifida, nomen herniae *spinalis*, quod  
illi LECAT imposuit (l. c.), non convenire sponte elucet.

106) l. c. p. 52. 107) Nov. act. nat. cur. 1791. T. VIII. N. 32.

108) PHILIPPS in the new Lond. med. Jour. 1792. Vol. I.  
p. 11. RICHTER *Bibl. XV. B. p. 77. VORSTÄL* op. c.  
I. B. p. 636.

109) GRASCHUIS l. c.

110) MORGAGNI *Epist. XII. 6.*

111) RUYCH l. c. obs. 36.

112) SEVERIN l. c.

113) ROSENSTERN *Anweis. u. Kehnheiten u. Kur d. Kinder-  
krankh. p. 659.*

114) ACRELL l. c. p. 255.

115) LINDSAY l. c.

116) TABU Nov. act. nat. cur. T. II. p. 296.

decim<sup>117)</sup>, octodecim<sup>118)</sup>, viginti<sup>119)</sup>, viginti octo<sup>120)</sup>, triginta octo<sup>121)</sup> et quinquaginta<sup>122)</sup>. Mors, praeviis convulsionibus, apertum, vel sponte, vel fortuito, vel artis ope, tumorem, plerumque cito<sup>123)</sup>, sequi solet. Verum et hic exceptiones numerantur, uti videre est, apud GERGA<sup>124)</sup>, FERRIS<sup>125)</sup>, M. HOFFMANN<sup>126)</sup>, COOPER<sup>127)</sup> et alios<sup>128)</sup>.

Cura.

7. Hydrorhachitidi et spinæ bifidae medendi rationes plurimae exstant. „Quid enim in tanta opis inopia non experiendum<sup>129)</sup>?“ Audaces ligandum vel aperiendum esse tumorem proposuerunt

117) WISEN, ACRILL l. c. p. 296.

118) BUCHAN Phil. Transact. N. 410.

119) WARREN obs. in Surg. Lond. 1814. p. 156. E. JONES l. c. ROCHETTA l. c. p. 200. cas. 1 (anno 20. spina bif. sponte sanabatur).

120) CAMPER l. c. p. 412. 121) J. DAWSON l. c.

122) SWAGERMANN Ontleed-heelkund. Verhandl. Amsterd. 1767.

123) Facta operatione post dies duos, RUYSEN (l. c.) post dies tres, BURC (Eph. nat. cur. Dec. II. ann. 5. obs. 58). TULP (obs. med. p. 230), JAWANOT (l. c. p. 22) et HUKMAN (opp. Vol. II. p. 41) cfr. infra, 7 (134).

124) l. c.

125) SEDILLOT Jour. de méd. T. XXVII. p. 171 (Pueri tredecim annorum tumor hydrorhachiticus, altitudinis quatuor pollicum, et decem circumferentiae, vigente febre putrida disruptus est ac plane sanatus).

126) Eph. nat. cur. Dec. II. a. 3. obs. 208 (Tumor feliciter apertus est).

127) l. c. 128) v. infra, 7 (131).

129) BORRISINI Inst. med. pr. Vol. III. p. 79.



runt<sup>130</sup>) idque nonnulli perfecerunt<sup>131</sup>). Quorundam recentissimus celeb. ASTLEY COOPER<sup>132</sup>) tumorem acus puncturâ aperit, ac ut serum effluat concedit, hancque puncturam toties repetit, quoties serum denuo colligitur et vertebrae hiantes per *inflammationem adhaesivam* non oblitterantur. Casum felicem, infausto opponit, huic alterum addit OTTO<sup>133</sup>), ad-

130) ABERNETHY *Surg. Essays. Vol. I. p. 75. Rust Mag.* 1826. Bd. 23. H. 3. p. 506 (punctio).

131) Tentavit quondam HISTER in infante quatuor mensium tumorem pellucidum, aquosum, tenui radice ad ultimam lumborum primamque ossis sacri vertebrae haerentem, successive quindecim dierum spatio per *ligaturam auferre*; — abstulit quidem, sed infans mox ab operatione mortuus est (*Med. chir. Wahrn. 2. B. p. 540*). GUNGA tumorem, qui in inferiore et anteriore ossis sacri parte haerebat, feliciter aperuit (MORGAGNI *Epist. XII. 9*). Item M. HOFFMANN (*Misc. N. C. dec. 2. obs. 8*) et FR. LOSTRPROBART (l. c.) tumorem in secunda vertebra lumbali una cum extremitatum inferiorum paralysi sanavit punctione. De hydrorhachitide, punctione repetita sanata, refertur in: *Journ. des progr. des sc. et instit. méd. Par. 1827. Vol. 7. BURDACH l. c. cas. secund. BOGETTI (l. c.) spinam lumbalem punctione sanavit. ROGNETTA (l. c.) spinam bifidam symptomaticam sive complicatam et idiopathicam, sanatu minus difficilem, statuit et duos casus punctione curatos affert. YOUNG zwei günstige Erfahrung. üb. Punctur u. eine üb. Excision d. Sp. bifid. ex l. c. in FROBIS Notiz. 1837. Bd. 1. N. 14 (primus infans anno septimo, secundus mense quarto, et tertius mense septimo post operationem mortui sunt). Cfr. N. 6 (125—127).*

132) *Some obs. on spina bif. in Med. chir. transact. Vol. 11.*

133) l. c. cfr. HAYES in the *London medical and physical Journal* 1818. March.

dideruntque alii <sup>134</sup>). Monet vero Cooreu apertio-  
nem contraindicari a complicatione cum hydroce-  
phalo, a ruptura tumoris sub partu (quod per se  
intelligitur) ab illius nimio ambitu et a praesentia  
paralyseos extremitatum inferiorum et urinae alvi-  
que involuntaria depositione (quae mala cum ple-  
rumque adsint, punctura ad paucos meherole casus  
limitatur). Alteram vero methodum idem proponit  
egregius vir *palliativam*, qua scilicet methodo *tumor  
ope linteorum complicatorum* <sup>135</sup>) herniae instar  
reprimitur. Bina sanationis sic operatae exempla  
refert. *Fasciae* <sup>136</sup>) et *emplastra* <sup>137</sup>) saltem scopo  
tu-

- 134) BUREDT apud NEUBOLDI l. c. (tres casus infelices).  
VACCA BERLINGHIERI stor. *ragionata di una idrorachia  
terminata in una letale rachialgite. Pisa* 1820. Cfr. GAR-  
SON u. JUL. Mag. 1821. Bd. 2. p. 126 (24 punctiones).  
*Geschichte ein. Hydrorhachitis* ed. Sp. bif. mit tödl. Ausg.  
nach der Punction; in HEYERLAND Journ. 1821. St. 6. p. 103,  
N. 2 (puella 6. annor.). BURDAEN l. c. casus priox. SCHMIDT  
l. c. et SINIGOLD ib. WANDROP, D'OUTREBOY l. cc.  
(tres casus). CLEMENT, DAWSON, SCHMIDT, CRAMER ll. cc.  
VIRCH ib. das Kr.-Haus zu Osnabrück, in *Hannoversche  
Annal.* 1826. Bd. 1. H. 1. p. 32 (punctio quater repetita;  
infans diem supremum obiit). SKINNER l. c. (post 70  
punctiones mori). Cfr. N. 6 (123).

135) GARR. Bausch. GALL. pelotte.

- 136) HOIN l. c. (Cum tumor ad spinam jam magnus, omne  
auxilium respueret, quotidie autem, vi ponderis aucti,  
summas proli molestias crearet, illum ipsum fascia circa  
ventre et supra humeros deducta, laxo suffulcit, nec non  
nullam parari curavit, in cuius parte superiore ac dorso  
sustentando dicta, apertum excavatum, tumori susci-  
piendo idoneum, mollique pulvinari circumcirca munitionem

tumorem a violentiis externis tuendi jam dudum adhibitae fuerant. Quae palliativae, ut dicunt, medendi rationes et *fonticulis* ad latera tumoris applicandis<sup>137</sup>) (utpote experientia neodum confirmatis et integumentis delicatissimis recens natorem infensis<sup>138</sup>), et *setaceo* per ipsum tumorem ducendo<sup>139</sup>) (utpote gangraenae periculum minitante) et *fomentis discutientibus*<sup>141</sup>) (utpote inflammationem malignam excitantibus<sup>142</sup>), anteponendae sunt. Enim vero, cum spina bifida absolute letalis non sit, neque semper impediat, quominus ea aetas attingatur<sup>143</sup>), in qua aeger, prout

fuit; quo demum artis subsidio, ut puer absque magno incommodo et sedere et somnum capere et tempus ludendo terere potuerit, Cl. vir obtinuit).

137) c. c. emplastrum seu unguentum defansivum coeruleum, v. HAHN praal. pathol. Vol. III. p. 644.

138) RICHTER *Anfangsgründe d. Wundarzneykunst.* 2. B. §. 311. p. 241.

139) JAWANDT l. c.

140) MATHÉY en spinee bifide, setaceum? *Stance publique de la Société R. de méd. de Paris* 1779. p. 32. DESAULT *tr. des mal. chir. Par.* 1779. T. 2. *Bullet. des sc. méd.* 1829. Octbr. p. 48. P. GUIDELLA in *Giorn. di chir. prat. di I. CANELLA.* 1829. April. v. BEHREND *Journalist.* 1830. H. 2. p. 225 (intra 40 dias hydrorhachitidem congenitam setaceo sanavit). FORTAL (apud OLLIVIER l. c. p. 208, qui setaceum repudiat) tertio dia post operationem infantem mori videbat.

141) CAMPER l. c. AGRILL l. c. OLLIVIER l. c.

142) RAOCHETTI l. c. p. 417.

143) Dicam plus. Die 21. Jan. 1827 vidi Novocomi infantem 5 annor., natum asphycticum, ex haemorrhagia um-

prout illi arrideat, operationem vel accipere vel rejicere posset; crudele nobis videtur, prolem omni adhuc voluntate destitutam, methodo submittere, quae non nisi minimum successus probabilitatis gradum, certis iisque summis vitae periculis opponere valet, quaeque methodus, quatenus de apertione tumoris agitur, a conspicuis in arte viris, inter quos CAMPERUM<sup>144</sup>), BORSIERIUM<sup>145</sup>), I. P. FRANK<sup>146</sup>) et RACCHETTI<sup>147</sup>) nominasse sufficiet, reprobatum.

## §. XVIII.

biliei reviviscentem, postea opisthotono affectum, cum paralyti et spina bifida, quae duo mala nunc *fere evanuerunt*. Infans, simul hydrocephali suspectus, surdus, irascibilis est, ceterum serenus, bene comedit ac munditiei studet.

144) l. c. 68. „Asseverare possum in omnibus, in quibus, me invito, aqua educta est, mortem, etiamsi non repente, secutam esse; neque etiam ex rarissime contingentibus regula desumi potest; sed ex iis, quae, si non semper, ut plurimum tamen locum habent.“

145) l. c. p. 76. „Incisio tumoris mortifera est; quidquid contra nonnulli in ejus commendationem excogitaverint.“

146) l. c. p. 439. „Quos nempe vitae dies illa (hydrorhachis) sibi ipsa commissa, aegris, aerumnosos quidem, sed non tam paucos aliquando concederet; hos artis nimie sollicita consumina vix non semper celerius abrumpent.“  
 . . . . p. 445. . . . . ne morti a sectione chirurgica vix non semper secuturnae occasionem dedisse videamur, ut ab ea prorsus abstinenceatur, nos quoque consulimus.

147) l. c. p. 417. „Ma di esempi funesti, in conseguenza della puntura, ne son ricordati assai. Questo dunque è rimedio da pregare Iddio, che a nessun ignorante cada in mente d'adoperarlo.“

## §. XVIII.

*De hydrorhachitide chronica.*

1. *Hydrorhachitis* primis a nativitate tem-<sup>Definitio.</sup>  
poribus, vel et aetate proveciore, nunc cum,  
nunc sine apparente columnae vertebralis vitio,  
evoluta, lenteque decurrens, *chronica* dicitur.

2. Qui doctrinam hydrorhachitidis congenitae<sup>Literatu-</sup>  
cum spina bifida illustrarunt auctores<sup>ra.</sup> 1), hi et  
hydrorhachitidis chronicae passim mentionem in-  
jecerunt. De ea vero ut morbo sui generis, no-  
mine *hydrorhachiae incolumis* (ob spinam hic  
minime dehiscentem), praeprimis I. P. FRANK  
disseruit 2).

3. *Infantes* in hydrorhachitidem chronicam<sup>Sympto-</sup>  
incidentes, vel pedibus insistere nunquam addi-<sup>mata.</sup>  
scunt, vel potestatem gressus instituendi, qua jam  
fruebantur, amittunt 3). Utroque in casu cubito-  
rum ope humi reptant, dimidiam ac infimam  
corporis partem, quasi alienam et inutilem, ut  
pondus, misere post se trahunt. Cutis crura ob-  
tegens flaccida est ac pendula, non sine pedum  
continuo frigescentium quandoque lividorum, oede-  
mate. Columna vertebralis, nisi malum fortuito  
cyphosi nuptum sit, nil morborum exhibet 4). Fa-  
cultates animi, in malo recenti, rite exercentur 5),  
immo

1) §. XVII. 2.

2) l. c. p. 200.

3) Cfr. WENZEL l. c. 59. *Beobacht.* p. 379 et 80.4) JAHN in *Med. Conversat.-Bl.* 1831. Jan. p. 7.5) „Ein bis zum Eintritte der Lähmung ungetrübtes Senso-  
rium.“ BROCKMANN l. citat.

immo infantes quandoque ingenii inconsueti notas prae se ferunt. Post mensem unum alterumve officium sphincterum vesicae urinariae et anfrangitur; vel contra, lotium et faeces pertinaciter retinentur. Musculis abdominalibus relaxatis venter physconiae imaginem refert. Invalescente morbo en respirandi difficultatem. Aliquando costa una alterave distortetur ac sternum ea ex parte elevatur, vel, ut nuper vidimus, singulis costis intus retractis, protruditur. Accedit saepe vomitus. Brachia motibus automaticis tentantur, convelluntur, thoraci arcute admoventur. Plurimi partes genitales manibus pertractant. Versus finem vergente morbo caput obliquum vel retractum<sup>6)</sup> observatur, ac aegrotuli, vagitus raucos edentes, convulsi pereunt. *Adulti* post rhachialgias traumaticas, rheumaticas, arthriticas, haemorrhoidales, imprimis in scrophulosis et rhachiticis, vel sub ipso illarum rhachialgiarum curriculo, de lassitudine, totiusque corporis infirmitate, imprimis vero de crurum torpore cutisque ea obtegentis anaesthesia, conqueruntur. Habitus aegri plerumque luridus et cutis veluti plumbeo colore tineta. Subsequitur crurum paresis et paralysis<sup>7)</sup>. Veneris jam desiderium nullum. Pertinax alvi obstructio, urinae difficultates. Languet digestionis opus, ciborumque appetitus. Flatus intestina percurrunt et distendunt. Brachia, aliquando

ma-

6) „Ein Zurückgezogensein des Halses“ BROCKMANN l. citand.

7) Unius lateris non esse completior, quam alterius, ut WENZEL (l. c. p. 381 (36)) observabat.

manus tantum, voluntatis imperio non obediunt, ita ut aeger, quod pluries hinc vidimus, ab aliis nutrirī debeat. In nonnullis respirandi difficultas<sup>8)</sup>, cordis motus abnormis, quin reliqua, morbum viscerum cavitati pectoris inclusorum indicantia, signa adsint. Aegri lecto affixi facile decubitus contrahunt. Vomitus, convulsiones, abolitio exercitii facultatum animi, fatum extremum praecedunt<sup>9)</sup>.

4. Hydrorhachitidis sine columnae vertebralis <sup>Necroscopia.</sup> laesione obvenientis, sectionibus cadaverum illustratae, exempla, MORQALEXI<sup>10)</sup>, I. P. FRANK<sup>11)</sup>, et WALSARAE<sup>12)</sup> collegerunt. Vasa sanguinea quaecunque, per tenuem meningem specus vertebralis decurrentia, sanguine adeo plena erant, quasi ab injecta rubicunda materia fuissent praeter modum repleta. Et sanguifera vascula ex iis, quae spinales nervos, praesertim quosdam stipabant, turgidiora sanguine fuerunt, ganglia vero istius modi nervorum justo crassiora, laxiora.

5. Hydrorhachitis chronica, potissimum iis <sup>Causae.</sup> rhachialgiis, in quibus processum inflammatorium tantum admisimus<sup>13)</sup>, originem debere videtur.

Spe-

8) BROCKMANN l. citand.

9) De quibus symptomatibus cfr. WENZEL l. c. 58. Beobacht. p. 374 sq.

10) Op. c. Epist. XI. N. 13. Epist. XII. N. 16. Epist. XV. N. 6. Epist. XXXVII. N. 2. Epist. XXVIII. N. 3. 4.

11) l. c. p. 201.

12) Gütt. gelehrte Anzeigen 1894 N. 204. p. 2053. de hydropse medullae spinalis.

13) 5. XIII. 2. Paris (Gaz. des hôp. Vol. 7. N. 32. v. Gaz.

Spectant huc imprimis rhachialgiae a causâ *rheumatica*<sup>14)</sup> et *metastatica*, e. c. a tinea capitis<sup>15)</sup>, excitatae. Praeterea *scarlatinae* epidemia, quam dudum<sup>16)</sup> observavimus, hydropem hujus exanthematis effectum, non solum encephalo, ut monuimus<sup>17)</sup>, sed et specui vertebrali infensum esse, nos certos reddidit<sup>18)</sup>. Tandem nosse juvabit, ad hydrorhachitidem excitandam haud requiri, ut serum in ipso specu generetur<sup>19)</sup>. Exempla enim

a

son u. *JUL. Mag.* 1834. *St.* 2. p. 281 (5.)) in cranio et columnae vertebrali *ebriis* tredecim seri uncias reperiebat; TRUSHN (*HUFELAND Journ.* 1837. *St.* 12. cas. 9) serum in columna vertebrali *myelitide chronica* defuncti.

14) I. P. FRANK l. c. p. 206.

15) WASSER l. c.

16) Autumno et hyeme 1818.

17) P. I. ed. alter. Vol. III. Sect. I. C. I. §. V. 3. p. 76.

18) WENZEL (l. c. 60. et 61. *Beobacht.*) duas habet observationes hydrorhachitidis (acutae) ex scarlatina. BROCKMANN l. citand. ex scarlatinae epidemia hydrorhachitidem medullae oblongatae progredi videbat.

19) COTUGNO (de ischiade nervosa; in SANDIFORT thesaur. dissertit. 1764. T. II. p. 411) ex multorum cadaverum sectione persuasum se habet, serum in ventriculis cerebri extravasatum per canalem Sylvii et quartum ventriculum in columnam vertebralem intrare. Quod factum confirmat MACHENDIE (*Journ. de phys. exp.* 1826, Janv.), qui in ventriculi quarti fundo aperturam parvam detexit, per quam „le liquide peut s'écouler des ventricules cérébraux dans le canal spinal.“ (Cfr. GIBSON u. *JUL. Mag.* 1827. *St.* 2) Hydrorhachitis et ex encephali affectione morbosa exoriri, et in spina, in ipse ejus parte infime incipere potest. Quo in casu (v. WENZEL l. c. p. 374, 58. *Beobacht.*) serum exsudatum ascendit; in illo autem



a MORGAGNI collecta<sup>20</sup>), ac nostra praxi confirmata, docent, sanguinem in apoplexiis in cerebri cavo extravasatum, in placentam et serum separari, illam in loco remanere, hoc autem in spinam stillare<sup>21</sup>).

6. Quoties symptomata recensita<sup>22</sup>) in con-  
 spectum veniunt, ad vitium medullae spinalis, sat  
 tuto concludere licet, num vero tale vitium ex  
 serosa colluvie specus vertebralis, num ex malis  
 alterius generis, quandoque vix cultro anatomico  
 eruendis, derivandum sit; nemo prudens cum  
 certitudine ante cadaveris sectionem praedicet<sup>23</sup>).  
 Nec paucae seri guttae hic de hydrorhachitide  
 testantur, cum quovis in cadavere, sicuti in re-  
 liquis cavitatibus, ita et in specu vertebrali, ex-  
 travasati aliquid obveniat. Interim si allata hy-  
 drorhachitidis symptomata, a caussis exsudationi  
 seri faventibus excitata fuerint, sique oedema ex-  
 tremitatum inferiorum, ac urina pauca in quanti-  
 tate secreta observentur, non inanis de praesentia  
 hydropis specus vertebralis habebitur suspicio.  
 Nec exemplum hydrorhachitidis, quod cum spina  
 bifida in viro quinquaginta annorum obvenerat,  
 silentio praetereundum est<sup>24</sup>); alterum, quod an-

NA-

(WENZEL 59. Beobacht.) descendit. Cfr. MORGAGNI l. c.  
 op. XII. Sect. 9.

20) Epist. X.

21) Cfr. P. II, ed. alter. Vol. I. Sect. 1. C. V. §. XXIX. 2 (7).

22) N. 3.

23) Lego de errore, in diagnosi a I. P. FRANK commisso,  
 op. c. p. 217.

nales medici continent, ex violentia externa ortam, potius ad fracturas vertebrarum remittimus<sup>23)</sup>.

Prognosis  
et cura.

7. Morbos, quos pro hydrorhachitide chronica definivimus, dammodo non admodum neglectos, methodo adversus paralyses ex vitiō colūmnæ vertebralis indicanda, pluries sanavimus; ast num in diagnosi error non subrepperit; spondere non audemus. In hydrorhachitide chronica inveterata vix spei scintilla affulget.

### §. XIX.

#### *De hydrorhachitide acuta.*

Definitio.

1. *Hydrorhachitis*, rhachialgitudis et febrilium affinium<sup>1)</sup> effectus, citissime<sup>2)</sup> curriculum suum absolvens, *acuta* dicitur.

Auctores.

2. Auctores de rhachialgia et rhachialgitude scribentes, et hydrorhachitidis acutae mentionem injecerunt.

Symptomata.

3. Quando transitus rhachialgitudis in hydrorhachitidem<sup>3)</sup> expectandus sit, jam dictum est<sup>4)</sup>.

Idem.

24) I. P. FRANK in *Delect. op. med.* Vol. II, p. 33 (in medico Badensi Busch).

25) HONCHSTETTER l. c. p. 491. Sic et observatio apud LACAT l. c. p. 53. Attamen WENZEL (l. c. 58, *Beobacht.* p. 374—77) vi thoracum parangustorum hydrorhachitidem chronicam exoriri videbat. Femina 34 annos nata erat.

1) Febris scarlatinae et tussis convulsivae. BROCKMANN *Bemerk.* üb. *Hydrops medullae oblongatae*, in *Holzner Hannöv. Annal.* Bd. 1, H. 4.

2) intra tres ad septem dies; deinde motus convulsivi aut symptomata paralysis mortem annuntiabant, BROCKMANN l. c.

3) Quam transitum WENZEL (l. c. p. 382 sq.) quidem negat,

Infantes quin tamen soporosi sint et oculi multum a norma recedant, statuæ instar decumbunt, brachio unius plerumque lateris motus automaticos instituunt, vomitu materiem herbaceam cum vi ejaculant, pertinaci alvi obstructione laborant, urinam paucam vel nullam excernunt, crura jactant aut movere nequeunt <sup>4)</sup>. Pulsus irregularis, sat expansus, haud semper admodum frequens. Respiratio gemebunda, per vices, inprimis porrecto potu, anhelosa, aliàs fere inperceptibilis. In plurimis morbi symptomata mutantur, si aegrotulus e lecto tractus, brachiis custodis incumbit. Evadit enim infans querulus, gemebundus, manibus indusiam dilacerat easque adversus lectum tendit. Opisthotonus aut convulsiones <sup>5)</sup> morbo, ad mensem circiter protracto, finem imponunt. Aliàs infantes praevio ejulatu e medio auferuntur. Similis scena quandoque in adultis occurrit, qui tamen potius in symptomata hydrorhachitidis chronicae <sup>7)</sup> incidere solent.

4. De necroscopia <sup>6)</sup> et de caussis <sup>8)</sup> non loqui-  
Necroscopia et  
causae.

contendens, rhachialchitidem morbum rarissimum et hydrorhachitidis causam congestionem subitam in vasibus intimae medullae membranae esse; ut ubi sunt confinia hujus congestionis et irritationis vasorum atque membranarum phlogosis?

4) Cap. III. §. XIV. 3.

5) WENZEL l. c. 60. et 61. Beobacht. p. 388 sq.

6) WENZEL l. c.

7) §. XVIII. 3.

8) BROCKMANN l. c. serum inter arachnoideam et piam matrem collectam, substantiam medullae oblongatae incolorem, membranas ejusdem valde rubras, congestionas sanguinis in cerebello, et cerebrum exsanguis invenit.

mur, quoniam de utroque hoc argumento jam in capite de rhachialgitide quaestio erat.

**Diagnosis.** 5. Temporis punctum, quo morbus ad rhachialgitidem spectare cessat et jam nomen hydro-rhachiae exposcit, determinare arduum sane est. Interea praesentiam extravasati in specu vertebrali *suspicamur*<sup>9)</sup>, dum rhachialgitis jam ultra triduum duraverat, dum dolor spinae et febris multum remiserunt, quin aut illius crisis, aut levamen in reliquis symptomatibus observetur, dumque horum tumultus, quieti adumbratae locum concedit. Quo pacto hydrorhachitis acuta a hydrocephalo acuto distingui debeat quaeris? Respice functiones cerebri et sensuum. Si aegrotulus non fuerit soporosus, sique amaurosi non laboret, aut lucitate; reliqua symptomata hydrocephalo acuto et hydrorhachitidi acutae communia, potius e spinae hydrope, quam ex illo encephali, derivanda forent. Praeterea hisce in morbis inter se distinguendis, refert totum aegritudinis curriculum perpendere. Ceterum non reticuius<sup>10)</sup>, *complicationem* hydrorhachitidis cum hydrocephalo haud raram esse, neque dubitamus, plurima symptomata hydrocephalo acuto adscripta (e. c. brachiorum motus convulsivos et automaticos, alvi pertina-

cem

9) Irritatio inflammatoria arachnoideae. BROCKMANN l. c.

10) „Die oft unendliche Mannigfaltigkeit der Zufälle wird beständig eine sichere Diagnose unmöglich machen.“ WERNZ l. c. p. 387.

11) P. II. ed. alter. Vol. I. Sect. 1. C. IV. §. XXII. 5 p. 314. et C. III. §. XIII. 4. 5.

cens obstructionem, urinae difficultates, hemiplegiam, opisthotonam etc.) ex illius cum hydrorhachitide complicatione repetenda esse.

6. Hydrocephali acuti quaedam saltem felicia Prognosis adducere posuimus exempla<sup>12)</sup>, nullam vero hydrorhachitidis acutae, saltem inter infantes, in medium preferre licet. Morbus, quo tenerior aegroti aetas, eo citius ad interitum properat.

7. Quid igitur respectu curae doceamus? Cura methode contra rachialgitidem incassum exhausta, hydrorhachitidi opponimus: *vesicatorium* toti columnae vertebralis tractui applicandum, *unguentum mercuriale* circumcirca illiniendum, intus *calomel*, alternatim cum *decocto nunc florum arnicae montanae*, nunc *stipitum solani dulcamarae*, addito *liquore acetatis ammoniac*. Nec usus *foliorum digitalis purpureae* omittendus<sup>13)</sup>.

## §. XX.

### *De hydrorhachitide accessoria.*

1. Collectio seri in specu vertebrali morbi Definitio. variis praesertim chronicis superaddenda nobis est *hydrorhachitis accessoria*.

2. Sub curriculo multorum morborum, praesertim chronicorum, haud raro contingit, aegros Animed-  
versiones. ad varia columnae vertebralis loca prius sensum ingratum pressionis aut dolorem accusare. Plurimi

12) F. H. ed. alt. Vol. I. Sect. 1. C. IV. §. XXII. 4 (91).

11 (156. 157. 158).

13) WENZELII (l. c. p. 389 et 90) propositio, spinam vertebralem spernendi, nobis non arridet.

Frank Prax. II. 1. 2. 1.

rimi istiusmodi aegrorum brevi post vel citius e medio tolluntur (*apoplexia serosa spinæ*); vel virium lapsum inconsuetum experiuntur, vel in aliena mala respirationis, circuli sanguinis, functionum viscerum abdominalium et pelvis, vel systematis nervosi incidunt. Quae singula collectioni morbosae seri in cavitate specus vertebralis accidentali haud raro adscribenda esse, propriis cadaverum sectionibus freti, neutiquam dubitamus. Ad morbos praeprimis hydrorhachitidem accessoriam sociam agnoscentes illi spectant, qui oedemate extremitatum inferiorum et dorsi stipantur, hinc omnis generis *hydropes*, *scirrhi*, *phthises*, porro *icterus*, *scorbutus*, *dysenteria* etc. Quamobrem medicos hortamur, ne in illorum morborum cura dolorem ad columnam vertebralem, maxime si iste dolor circa *servicem* obveniat, spernant, sed ut illico inquirent, an partes inde nervos accipientes in consensum trahantur nec ne? Si re vera eae in consensum traherentur (ex quo scilicet pateret, malum ex ipsa medulla spinali proficisci et nequaquam ex decubitu diuturno supino, vel alia externa causa repetendum esse; affinibus illico dicendum foret, aegrum majori in periculo versari, illique facile quid improvisi accidere posse. Quo prognostico non solum familiarum bono, sed et famae medici prospicitur, nec dicamus de fonte novarum indicationum, quibus si secundum regulas, in therapia hydrorhachitidis chronicae traditas, satisfaciamus, mortis terminum quodammodo remove licebit.

DE MORBIS  
N E R V O R U M  
SINGULORUM.

---

THE JOURNAL OF THE

ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE



## CAPUT V.

### *De singulorum nervorum morbis atque de neuralgia et neuritide generatim.*

#### §. XXI.

#### *Argumenti notio. Literatura.*

1. *Nervorum* quivis, iisdem fere ac cere- Argumen-  
ti notio.  
brum et medulla spinalis, subijcitur morbis. Eadem  
ratio inter *vaginas nervorum* et *meninges* inter-  
cedit. Cum vero nervi per universum corpus  
humanum sparsi sint, descriptio morborum, qui-  
bus eorum quivis subijcitur, infinite extendi de-  
beret, nisi peculiares huic pathologiae parti as-  
signarentur limites. En quos statuimus: habita-  
ratione, quod nervi vel ad viscerum contextum  
formandum, vel ad ganglia et plexus consti-  
tuendos conflunt, vel sparsim decurrant, illorum  
morborum tria quoque statuimus genera, videli-  
cet morbos nervorum 1° ad viscera pertinentium,  
2° ad ganglia et plexus spectantium, et 3° per se  
sparsim decurrentium. Morbi nervorum contex-  
tui viscerum inhaerentium, ut monuimus <sup>1)</sup>, ibi  
describuntur, ubi de aegritudinibus viscerum in  
specie sermo est, e. c. vitia nervi olfactorii, optici,

acu-

1) P. II. ed. alter, Vol. I. Sect. I. C. I. §. I. 3 (120).

acustici, in tractatibus de morbis narium, oculorum, aurium etc. Cum ganglia et plexus nervorum functionibus viscerum thoracis, abdominis et pelvis imperent, patet, eorum quoque morbos nullibi aptius exponi posse, quam eo loco, quae functionum illarum laesiones considerantur; hinc in tractatibus de aphonia, de asthma, de tuss convulsiva, de angore pectoris, de dysphagia deque vitiis operis digestionis, chylicationis etc. Restat igitur, ut de morbis nervorum *per se* sparsim in facie et in membris decurrentium agatur atque haec doctrinae pars est, quam hic dilucidare aggredimur. Verum non nisi restricte! Status enim praesens illius pathologiae partis, quae nervorum singulorum morbos explanat, tam egenus est, ut, si aegritudines nervorum faciei et extremitatum praecipue inferiorum excipiamus; relate ad morbos speciales nervorum intercostalium<sup>2)</sup> vagorum etc. tot solum *facta* exsint (de hypothesebus enim hic nulla accipitur notitia), ut vi paucae cum iis paginae repleri possint.

Literatura.

2. Quantum confessio hujusmodi, copiascriptorum de morbis nervosis<sup>3)</sup> opposita videtur! Verum aliud est, morbos *systematis nervosi universi* describere, aliud autem in *morbos nervorum specialium* inquirere. Primo enim in casiseges observationum de morbis, nisi medulla

2) Legatur de morbo ramorum nervi intercostalis thoracis in *Nouv. Jour. de méd., chir., pharm.* etc. T. III. Paris 1818. Nov. p. 217. *Obs. des neuralgies thoraciq.* p. Nicot

3) P. II. ed. alter. Vol. I. Sect. 1. C. I. §. 1. 2.

spinalis, saltem cerebri habetur, cui, si hypothes-  
es de fluido nerveo, de electricitate, de galva-  
nismo, de magnetismo animali, de sensibilitate  
aucta, perversa et imminuta, adduntur; jam do-  
ctrina ad aspectum omnibus numeris absoluta prae-  
sto est! Verum si morbos nervorum specialium  
respicias, longe aliter res se habet, ubi nempe  
inquisitio laboriosa, super millena cadavera diu  
nocturneque protracta requiritur. Requiritur, ut  
medicus, praxin in magno nosocomio ac conspi-  
cua in urbe exercens, expertem in neurologia  
anatomicum socium habeat, utque iste, indicante  
illo, cadavera hominum ex morbis nervosis de-  
functorum exploret, et quidem non solum, ut  
fieri solet, respectu ad cavitates corporis humani,  
sed respectu ad nervos, arterias, venas, vasa et  
glandulas lymphaticas, separatim et in singulis  
eorum ambagibus ac positionibus \*). Exemplo  
illis sunt: COTUNNI, SOEMMERING, ISENFLAMM,  
REIL, AUTENRIETH, DZONDI, NASSE, ALEXANDER  
etc. †), J. SWAN ‡), J. P. DESCOT §), J. TRENOR ¶),

TH.

4) Quoad nervos ut ducem commendo CH. BELL *a series of engravings explaining the course of the nerves with an address to young physicians on the study of the nerves.* Lond. 1816. 2. edit.

5) In operibus citatis et citandis.

6) *A dissert. on the treatm. of morbid local affect. of nerves.* Lond. 1820. Vers. germ. F. FRANKL. Leipz. 1824. *A tr. on disease, and injur. of the nerv. N. edit.* Lond. 1834.

7) *Diss. sur les affect. local. des nerfs.* Par. 1822. Vers. germ. J. RADIUS. Lpz. 1826.

TH. P. TEALE<sup>8)</sup>, PIERRE<sup>10)</sup>, DELAPORTE<sup>11)</sup>, HEY-  
FELDER<sup>12)</sup>, J. D. M. CLARION<sup>13)</sup>, L. MARTINET<sup>14)</sup>,  
J. B. FRIEDRICH<sup>15)</sup>, F. SASSY<sup>16)</sup>, C. BRIOSONI<sup>17)</sup>,  
J. MONDIÈRE<sup>18)</sup>, S. SANDRAS<sup>19)</sup>, W. A. GILLERST<sup>20)</sup>,  
J.

- 8) *The N. Americ. med. and surg. journ.* by H. L. LOGG.  
1826. April. N. 1.
- 9) *A tr. on neuralgic diseases, dependent upon irritation of the  
spinal marrow and ganglia of the sympathetic nerv.* Lond. 1829.
- 10) *Ueb. Neuralgien*, in KALISCH *med. Zig. des Anst.* 1833.  
N. 17. Cfr. L. A. KRAUS *Freih. f. wissenschaftl. Kritik etc.*  
GUM. 1837. II. 1. Aufsatz 2. et ex *Journ. hebdom.* 1834.  
N. 18. in SCHMIDT *Jahrb.* 1834. Bd. 2. p. 91.
- 11) *Ueb. d. Behandl. einiger Neuralg.* ex *Journ. d. connaissances  
méd.* 1834. Jan. N. 6. in SCHMIDT *Jahrb.* 1834. Bd. 2. p. 191  
(principue de neuralgia faciei).
- 12) *Seltene Fälle von Neuralgie*, in *Med. Ver-Zig.* 1831.  
N. 18 (affert duas neuralg. testium).
- 13) *Pathol. therap. Manual od. vollst. Inbegr. d. pr. Med. etc.*  
Nach dem Franz. bearb. v. C. J. A. VERNES. Ilmenau 1834.  
Abth. 6. Abschn. 2: Neuralgia s. neuritis.
- 14) *Ueb. d. Behandl. d. Neuralgien*, ex *Revue méd.* 1834.  
Avril in SCHMIDT *Jahrb.* 1834. Bd. 4. p. 48 et l. citand.
- 15) *Die neuest. Erfahr. u. Ansicht üb. d. Lokalkrankheit u.  
die Wiederverzeugung d. Nerven etc.* in SCHMIDT *Jahrb.*  
1835. Bd. 5. p. 89.
- 16) *Diss. de neuralgiis.* Paviae 1835.
- 17) *Diss. de neuralgia.* Paviae 1835.
- 18) *Beobacht. verschieden. Neuralg. mit besonder. Bezieh.  
auf d. Therapie.* Ex *Archiv. gén.* 1835. Fév. in SCHMIDT  
*Jahrb.* 1835. Bd. 8. p. 173.
- 19) *Ueb. d. Nat. u. Behandl. einer Neuralg., welche seit ei-  
nig. Monat. in Paris sich sehr verbreitet hat; ex Bull.  
de therap.* 1835. T. VIII. l. 3. Fév. in SCHMIDT *Jahrb.*  
1836. Bd. 9. p. 308.
- 20) *Fälle von Neuralgie nebst Bemerkungen*, ex *Americ.*

J. OSBORNE<sup>21)</sup>, B. BRIDIE<sup>22)</sup>, J. HWASSER<sup>23)</sup>, A. QUADRE<sup>24)</sup>, WALTHER<sup>25)</sup>, qui saltem quidpiam tam ardua in re praestiterunt. Interea ex notione vitiorum, quibus nervi faciei et extremitatum subji- ciuntur, mala etiam, quibus nervi magis reconditi tentantur, conjectura attingi quodammodo poterunt; at certe, ne experientiam ratiocinio anticipemus!

## §. XXII.

*De morbis ex nervorum specialium affectionibus.*

1. Nervos, in omnibus corporis humani mor- bis pati, hincque nomen morbi nervosi, ad pecu- liarem aegritudinum classẽ designandam, incon- gruum esse, asseritur<sup>1)</sup>. Verum idem de morbis arteriarum, venarum et vasorum lymphaticorum dici posset, cum tamen partes istiusmodi proprias

Genera-  
tim.

MOR-

Journ. 1831. N. 27. in SCHWEDT Jahrb. 1836. Supplementb. 1. p. 250.

21) Ueb. d. Wesen d. Neuralg. u. die Principien ihr. Behandl. ex Dublin Journ. 1837. N. 35. in SCHWEDT Jahrb. 1839. Bd. 21. p. 317. et FROHNE Notiz. 1838. N. 96. p. 123.

22) Lectur. illustrativ. of certain local nerv. affect. Lond. 1837. Vers. germ. KÜSCHNER. Marb. 1838. Ofr. FRICKS Ztschr. Bd. 7. p. 423. GRAEF u. W. Journ. 1838. Bd. 27. H. 2. p. 267. et FROHNE Notiz. 1837. Bd. 2. N. Y.

23) Om periodisk Neuralgie i Hiertut. 1—3 Deelen. Upsal. 1837.

24) Diss. de neuralgia. Pavise 1838.

25) Bjuudem et JAGGER u. RADIUS Handwörterb. d. gesamt. Chirurg. etc. Lpz. 1839. Bd. 4. p. 695.

1) MESORATH Samml. v. Beob. üb. d. Nerven u. Nerven- krank. u. d. E. Leipz. 1776. p. 64. Du LA ROCHE Analyse des fonct. du syst. nerv. Genève 1778. p. 9.

*morbos agnoscere nemo inficiabitur.* Qua de causâ, rite jam animadvertente REIL<sup>2)</sup>, sub nomine *morbi nervosi*, non intelligitur morbus, in quo nervi aliarum partium instar patiuntur; sed morbus, qui ex affectione nervorum ortum ducit, aut saltem morbus, in quo nervi maxime labefactati sunt.<sup>3)</sup>

Febres intermittentes.

2. *Febres intermittentes* ad talem morborum classem spectare, jam dudum cum aliis<sup>4)</sup> suspicati sumus<sup>5)</sup>, ac quotidie magis magisque convincimur. Pro re nata enim febres istae cerebrum<sup>6)</sup>, medullam spinalem<sup>6)</sup>, et nervos singulos afficiunt<sup>7)</sup>. Immo si symptomatum gastricorum, quae febres intermittentes comitari solent, ratio habeatur; fateri adigemur, *plexus nervorum abdominales*<sup>8)</sup> maxime hic pati. *Febres intermittentes perniciosae cardialgicae, colicae*, id magis magisque

2) *Fieberlehre*. 4. B. p. 41.

3) THAMM de act. system. nerv. in febr. Gött. 1774. TISSOT ait: „*les fièvres intermittentes sont des véritables maux des nerfs.*“ (op. c.) Cfr. PETIT-RADEL *Pyretologia*. Paris. 1808. p. 373. SOMMERHORN *lib. d. Säft etc.* p. 158. *Bullet. des sc. méd.* 1828. *Septbr.* p. 47.

4) P. I. ed. alter. Vol. I. Sect. I. C. II. §. XXVII. 10 (86).

5) P. II. ed. alter. Vol. I. Sect. I. C. II. §. X. 9. C. III. §. XVI. 13.

6) Cap. I. §. II. 2.

7) Ut in neuralgia epidemica, a SANDRAS (l. c.) descripta. Gastricis symptomatibus morbus plerumque ingrediebatur, periodice decurrebat et chinini sulphurici medio sanabatur. Vix dubitamus, quin febres intermittentes, nervorum affectione singulorum larvatae fuissent. Cfr. A. L. RICHTER *intermittirende Neuralgien*, in *Med. Ver.-Ztg.* 1835. N. 12. BRÖDER l. c. p. 28.

que demonstrant. Quae inter perniciosas dicuntur *asthmaticae*, *syncopicae*, *arthriticae*, non minus de affectione peculiari plexuum nervorum pulmonalium, cardiacorum<sup>9)</sup> et nervorum extremitatum testantur. Nil vero affectionem peculiarem systematis nervosi et nervorum singulorum in febribus intermittentibus magis confirmat, quam copia spasmodum, convulsionum, paralysisum etc. quae ex febribus hujusmodi neglectis aut male curatis originem trahunt. Et sicuti affectionem cerebri in paroxysmo febris intermittens *cephalalgicae* et *apoplecticae*<sup>10)</sup>, et affectionem medullae spinalis in paroxysmo febris intermittens *tetanicae* et *epilepticae*<sup>11)</sup> a processu inflammatorio repetimus; ita in febribus intermittens *cardialgicis*, *colicis*, *arthriticis*, plexuum nervorum abdominalium nervorumque in extremitatibus decurrentium statum inflammatorium, suspicamur. Quae hypothesis si confirmaretur, mala nervosa ex febribus intermittens evoluta, reliquis inflammationum variarum systematis nervosi partium et imprimis nervorum abdominalium tribuenda forent.

### 3. Febres

8) „In febribus intermittens imprimis nervi et praesertim intestinorum in causa sunt.“ TANNA hist. febr. intermitt. Vindob. 1775. p. 141.

9) „Nervorum cardiacorum sensibilitas ita quandoque augeri potest, ut etiam absque accidente externo vel interno stimulo per se in febrilem actionem erumpant.“ THANN I. c. §. 25.

10) P. II. ed. alter. Vol. I. Sect. I. C. III. §. XVI. 13 (29).

11) Cap. I. §. II. 2.

Febres  
nervosae.

3. *Febres nervosae* pro re nata cerebrum, medullam spinalem, plexus nervorum pectoris et abdominis nervosque passim decurrentes aggrediuntur. Plexuum nervorum abdominalium affectionem praecipue febris flava Americanorum ac hemitritaeus Daciae referre videtur. De inflammatione nervorum in typho jam locuti sumus.<sup>12)</sup>

Morbi cutanei.

4. Monuimus quoque<sup>13)</sup> *nervos cutis* magnam in *exanthematibus* et *impetiginibus* vim exercere. Inter illa *erysipelas* id maxime testatur; inter haec *pemphigus*. Et *variolae* pro morbo systematis nervosi declaratae fuere.

Rheumatismus et  
arthritis.

5. Morbi haud pauci sub nomine *rheumatismi* aut *arthritidis* re ipsa nil aliud sistunt, quam affectiones nervorum eorumque vaginarum<sup>14)</sup>. Idem de *fluxionibus* faciei, colli etc. valet; ne dicamus de *tumore albo puerperarum*, debito loco explicando.

Paralyses,  
convulsiones etc.

6. Dari *paralyses* et *convulsiones*, quae neque ex cerebro, neque ex medulla spinali, sed e *singulorum nervorum* affectione originem ducant, ex variis hujus libri locis palam fiet.

### §. XXIII.

#### *De rerum positionibus morbis nervorum faventibus.*

Laesiones  
externae.

1. Qui causas morborum generis nervosi per-

scri-

12) P. II. ed. alter. Vol. II. Sect. 2. C. I. §. III. 3.

13) P. I. ed. alt. Vol. I. Sect. 2. C. VI. §. XXXIII.

14) Neuralgiae rheumaticae exempla v. ELLIOTSON neuralgia rheumat. ex *The Lancet*, Jan. 1832. in BRENNER allg. Repertor. 1832. N. 4. p. 74. BRODIE I. c. BELLING klin. chir. Beobacht. in GRAEFER u. WY. Journ. 1836. Bd. 26. II. 2. p. 205 sq.



serutantur, si semper in praegressas laesiones externas, nervi unius alteriusve, quo decet modo, inquirerent; mirarentur sane, quam multi inter morbos illos, qui vulgo a perverso systematis nervosi universi sentiendi ratione repetuntur, uni laesioni specialis nervi cujusdam, adscribendi sint. Constat enim laesiones externas minimas, e. c. acus puncturam<sup>1)</sup>, hirudinum morsum<sup>2)</sup>, venae-sectionem<sup>3)</sup> ad graves nervorum tumultus excitandos sufficere. Ad laesiones autem externas nervis infensas, non solum ictus<sup>4)</sup>, concussionem etc.<sup>5)</sup> sed operationes chirurgicas et partus opus<sup>6)</sup>,

fer-

1) HARRACH in HUBERLAND Journ. 1832, Decbr. (ex fuscinae punctura). MURRAY in Lond. med. and phys. Journ. 1833 Mars (ex clavi punctura).

2) P. JOLLY ex N. biblioth. méd. 1827, Août, in FRANZ Notiz. 1827. Bd. 19. N. 5. p. 77.

3) CH. BELL Edinb. Journ. of med. sc. 1826. Octbr. in GRAEFW. W. Journ. 1827. Bd. 10. H. 1. p. 169 (duo ex venae-sectione neuralgiae casus, quorum prior non nisi nervi laesi excisione sanabatur).

II. MAYO out-lines etc. l. c. cap. V (plures habet observationes memorabiles venae-sectione laesorum, quo facto dolores atrocissimi et spasmi excitabantur).

NELSON l. citand. (brachii dolor ex V. S. rebellis cum motus impotentia).

J. HAMILTON üb. einig. Fälle v. Nervenwund, ex Dublin j. of med. sc. 1838. Mars.

p. 38—55, in FRICKER u. OPPENH. Ztschr. 1839. Bd. 10. H. 3. p. 416 (praepriis cas. quartus, p. 417, neuralgia brachii ex V. S. cum apasmia digitorum atrocissimis).

4) DUPUYTREN in Lancet franç. 1829. Novbr.

5) De nervorum laesionibus v. SCHMIDT Jahrb. Bd. 5. p. 93. BRUNN Repert. VI. 5. p. 1. et 7. p. 255.

6) A. DUGES in Revue méd. 1824. Août.

fertilissimos morborum generis nervosi fontes, revocamus. Quod vero maxime dolendum est, ipsa *vulnerum et ulcerum sanatio*, saepe effectus longe peiores in nervos exserit, quam causae, quae malis illis ansam dederunt. Idem de *impetiginibus* sine debita cautela fugatis valet.

Laesiones  
internae.

2. Et quae in ipso corpore humano includuntur causae, nervos laedentes, morbos generis nervosi frequentissime excitant. Praeter alibi allatas \*) commemorari hic merentur caries ossium \*) et viscera mole aucta et indurata, quippe quae nervis vicinis vim inferunt, eosque e sede remonent vel distendunt. Ex hac enim causa non solum turbas systematis nervosi, sed etiam, ubi plexus coeliacus hepate vel pancreate male adfecto laedebatur, et mortem improvisam conspeximus. Immo in ea versamur opinione, magnam morborum nervosorum partem, non ex vitio generali systematis nervosi, sed ex irritatione *unius cujusque nervi* pendere \*); quae quidem irritatio,

nunc

7) P. II. ed. alter. Vol. I. Sect. 1. C. I. §. III. 78. Duo casus nervorum pressionis legi merentur: BELLINGERI in *FRONT Notiz.* 1827. Bd. 18. N. 2. JODIN in *MAGENDIE Journ. de physiol.* T. 11. Cfr. ROSENBERG l. c. N. 45. De compressione nervor. paris quinti, morbi causae, v. GRISOLIN ex *Presse méd.* 1837. N. 32. in *SCHMIDT Jahrb.* 1838. Bd. 18. p. 103—105.

8) SWAN l. c. BRODIE l. c. (ex carie vertebrarum convulsionem et dolores extremitatum).

9) Assentiunt L. MARTINET et B. BRODIE II. cc., quorum hic (*erste Vorles.*) exempla afferens addit: „Daher muss man bei Untersuchung solcher Fälle zunächst erforschen; ob im

nunc in contextu viscerum alioquin aegrotantium, nunc in decursu nervorum prope arterias, venas, vasa lymphatica, ossa, variis malis, utpote plethora praesertim haemorrhoidali; scrophula, rha- chitide, syphilide etc. detenta, contingere potest. Quamobrem frequenter de spasms et convulsio- nibus uterinis, hepaticis, cardiacis etc. sermonem instituturi sumus, quin tamen ARMSTRONGIO con- tendenti<sup>10)</sup>, affectiones nervosas chronicas *semper* ut symptomata morbi visceris cujusdam conside- randas esse, assentiri possimus.

3. Nemo enim in dubium vocare poterit, *Vitia sen- sibilitatis.*  
*nervorum sensibilitatem auctam, imminutam et per- versam*, quamvis, ut diximus, saepius immerito accusatam, tamen ex aetiologia minime excluden- dam esse. Causae istis vitiis ausam praebentes jam alibi<sup>11)</sup> indicatae sunt.

4. Praeterea si hypothesi tantulum indulgere *Plathora et ingui- tio.*  
liceret, varios sensibilitatis nervorum gradus ma- xime ex imperio, quod arteriae<sup>12)</sup> et vasa lym- phati-

*Verlaufe des Nervenstammes irgend ein Reiz vorhanden ist, durch welchen die Symptome veranlaest sein könnten.*<sup>11)</sup>

Loquitur autor e. c. de neuralgia genu, uno in casu ab aneurysmate parvo crurali, in altero autem a tumore ver- tebrarum lumbalium pelvisque provocata. JAMES MURRAY (ex *The Dublin journ. of med. sc.* 1837. in *FROBER Notiz.* 1837. N. 77.) in involucris nervi dolentis ossificationes crystallinas invenit.

10) *The Edinb. med. surg. Jour.* 1815. Oct.

11) P. H. ed. alter. Vol. I. Sect. 1. C. I. §. III. 25.

12) „Liquidum nervos nutriens ex arteriolis telae cellulosaq, fibras nerveas connectentis et involucrorum nervos obdu-

phatica in eos exercent, repeteremus, de quo argumento jam alibi mentio injecta est <sup>13)</sup>).

Affectio  
nervorum  
ipsorum.

5. Interim, rejectis quibuscunque hypothesibus, jam abunde innotuit *plethoram* eosdem effectus in singulos nervos, uti in cerebrum et medullam spinalem exercere. Ac re quidem vera, „vix alias corporis partes reperias, vasorum copia ditiores quam nervos <sup>14)</sup>,” et quidem non solum in eorum superficie, sed in ipsa pulpa <sup>15)</sup>.

Victus.  
Aër.

6. Mirum hinc non est *victum* et *aërem* <sup>16)</sup> utpote sanguini pabulum largientes imperium evidens in singulos nervos exercere, quae eo minus injurias omnis generis sustinere valent, quo magis illis cruoris fontes defuerunt <sup>17)</sup>.

7. Ad

centium provenire, *secerari*, et in tunicas, quas fibrillas nervas componunt, potissimum in earum intersitia deponi, ut *nutriat* at *irroret* decenter. (ROSENHAUSE et SCHMIDT diss. de act. nerv.)

13) l. c. 27. 28. Cfr. quoque SOHNHERRING op. c. p. 12. *Ueb. d. Saft, welcher aus d. Nerv. wieder eingesaugt wird.*

14) Sunt verba REILII in exercit. anat. de struct. nerv. Halae. 1796. cap. 5. Legatur de eodem argumento PROCHASKA de struct. nerv. cap. I. WREISBERG in LUDWIGII script. neur. min. Vol. II. ISENFLANN in DOREFFLER de vas. nerv. Erl. 1768. in LUDWIGII op. c. C. F. LUDWIG progr. de nozogenia in vasc. minimis, ad diss. C. REIKENTANZ de abscessu hepat. Lips. 1808. p. 5. C. J. HEIDLER d. Blut . . z. Schmerz, u. z. d. Neuralgie. Prag 1839.

15) ISENFLANN prakt. Anmerk. üb. d. Nerv. Erl. 1774. §. XXI.

16) FLATNER Quaest. physiol. p. 223. THAKK inquit: „Non possum quin profitear, vero longa similis me ducara, quod animales spiritus (sit venia verbo) ex aëre pronascentur.“ v. LUDWIG script. neur. min. T. III. p. 270. §. 28. SOHNHERRING l. c. p. 40.

7. Ad injurias vero, nervis maxime infensas, *animi pathemata*, inprimis terror, ut alibi demonstravimus <sup>18)</sup>, pertinent.

8. Inter illas *temperatura nimis calida aut frigida* et inprimis *humiditas* <sup>19)</sup>, verisimiliter ut *electricitatis* <sup>20)</sup> vehiculum prima occupant loca.

9. Quibus cunctis *venerem, vigilias*, aliasque *causas* adderemus, nisi de iis in doctrina generali de morbis systematis nervosi jam abunde quaestio fuisset instituta. Hic enim ob rerum nexum aetiologiam plane praeterire non potuimus.

#### §. XXIV.

*Quando affectionem nervi singuli suspicari liceat?*

1. Arguimus affectionem singulorum nervorum aut plexus nervorum cujusdam ex *dolore, crampo, convulsione, macie, anaesthesia et paralysis*. De singulis speciatim.

2. Quam-

17) AIT ISENFLANN: „Singulari hoc, quo vasa ad nervos accedunt, quo nervi vasis subveniunt, commercium singularem quoque mereri attentionem videtur, sique magnum est nervorum in arterias imperium, sana non minus a vasorum infirmitate multae pendebunt nervorum affectiones.“ l. c.

18) l. c. 9—18.

19) SOMMERHINGII inganiosam hypothesin hic silentio non praeteream, nervos, praesertim eorum nodos, in locis prius sauciatis, humiditatem ex atmosphaera absorbere (l. c. *Lehrbuch* p. 141). „*Feuchte Luft*.“ DELAFORTE l. c. p. 191.

20) De affectionibus neuralgicis ex fulgure v. FISCHER *in* d. *Wirk. d. Blützes*, in *Med. Ver.-Ztg.* 1837. N. 1.

Frank *Prax.* II, I. 2, 1.

L

Ex dolore. 2. Quamvis dolores omnis generis nervorum ope percipiantur, magnum tamen discrimen inter doloris vim intercedit, si nervus solum *conductor* perceptionis doloris alieno in loco causam agnoscentis est <sup>1)</sup>, sique ipse nervus *sedem causae dolorificae* continet <sup>2)</sup>, quod *classem morborum*, quam *neuralgiae* nomine salutamus, constituit. Dividimus neuralgias (praeter illas viscerum et gangliorum) in *neuralgiam facialem*, *ulnarem*, *radialem*, *ischiadica* et *cruralem*. Generatim in *neuralgiis* dolor, ut plurimum periodicus, remittens, omnem alium excedit <sup>3)</sup>, ab aegro desperabundo, si diutius duraret, vix sustineri posset, ac ramos nervorum ex loco affecto decurrentes, vel consensus leges <sup>4)</sup> fulminis rapiditate undique sequitur. Frequentius sic patiuntur nervi subcutanei, imprimis faciei, nervi pauca tela cellulosa eaque laxa circumdati, nervi tandem injuriis traumaticis et tempestivae mutationibus expositi <sup>5)</sup>. Quandoque neuralgiae causa ad *initium* nervi locum habet, et dolor ad *finem* illius percipitur <sup>6)</sup>. Sic affectiones ple-

1) Exempla selecta v. apud BRODIE l. c.

2) BILON diss. sur la douleur. Paris, l'an XI.

3) Sed non pulsans, pressione non augenda et sine vasorum minimorum turgescencia est, quibus a dolore inflammatorio distinguitur. B. BRODIE l. c.

4) P. H. ed. alter. Vol. I. Sect. 1. C. I. §. III. 29.

5) CHAUSSIER Tables synoptiques.

6) Itaque GRIFFIN wie unterscheiden sich neuralgische Affectionen von inflammatorischen? ex Dublin, journ. 1836, N. 28. in SCHMIDT Jahrbh. 1838, Bd. 17. p. 29. edixit (p. 30): „dass man in zweifelhaften Fällen sich entschieden

plexuum cardiacorum, dolores brachiorum; et illae plexuum nervorum abdominalium et pelvis cruciatus crurum excitantes<sup>7)</sup>, docent. Mirabiles sunt dolores, qui in membris amputatis percipi videntur<sup>8)</sup>.

## L 2

## 3. Cum

*für die neuralgische Natur des Übels erklären könne, wenn an demjenigen Theile der Wirbelsäule, welcher dem kranken Organe entspricht, Schmerz beim Drucke vorhanden sei.*" Cfr. BRODIE l. c.

7) Ao. 1814 aegrum, qui post febrem intermittentem praepostere cortice sanatum in saevum plantarum pedum dolorem, gressus impediens, inciderat, solis resolventibus et eccoproticis sanavi. In calculo vesicae urinae aegros plus vice simplici de dolore plantarum pedum conqueri audivi. Quibus perpensis num suspicari licet, dolores podagricos pedum ex inflammatione arthritica plexuum nervorum abdominalium oriri posse?

8) Cfr. P. I. ed. alt. Vol. III. Sect. 2. C. XXIV. §. LXXX. 2 (T). LANGSTAFF in *Med.-chir. transact.* 1830. Vol. 16. J. F. CROOKES *üb. neuralgische Affectionen, ex med. gaz.* Jan. 4. 1834. in SCHMIDT *Jahrb.* 1834. Bd. 4. p. 210. Bd. 5. p. 91—93. hoc argumentum perlustrerunt. Nervorum dissectorum extremitates lymphae pilesticae, inflammationis traumaticae in tela cellulosa, quae neurilema cooperit, deposita circumdatae, tumescunt in nodulos gangliosos duritiae fere cartilaginosis et nucis seu fabae magnitudine, qui dolores non raro atrocissimos et rebelles excitant. Irritatio traumatica nervorum extremitatum, quae tumores illos produxit, his sustinetur et ad medullam spinalem atque proximos nervorum ramos per nervum propagatur. Quae irritatio hoc modo in medulla spinali et ejus involucris exorta, reciprocè non solum ad nervorum dissectorum extremitates, sed etiam ad alios nervos spinales rednecitur, quo fit, ut in aliis partibus neuralgiae exoriantur, LONGHI in *FRONIER Notiz.* 1839. Bd. 9. St. 6. p. 95.

Ex cram-  
po et con-  
vulsione.

3. Cum vero nervorum plurimi motibus voluntariis imperent, aut saltem, uti videtur, musculis, motibus automaticis dicatis, facultatem motus impertiant, sequitur morbos nervorum in musculis, quibus provident, *contractiones abnormes et motus convulsivos* excitare debere. Quae musculorum mala ex *singulis nervis* toties repetere licet, quoties sine signis affecti cerebri aut laesae medullae spinalis obveniunt.

Ex macie.

4. Nervi cum et processui nutritionis praesint, intelligitur neuralgias, saltem chronicas, *emaciationem* sociam agnoscere; quae emaciatio quandoque simplicis compressionis nervi effectus est <sup>9)</sup>.

Ex anaesthesia et  
paralysi.

5. Sicuti vero chorda nimis tensa tandem rumpitur; ita excessus doloris privationem sensus in nervo (*anaesthesia* <sup>10)</sup>), impotentiam musculis motum imprimendi (*paralysis* <sup>11)</sup>), aut unum et alterum, relinquit. Interea paralyzin sub ipsa nervi inflammatione oriri posse, magnus vir jam dudum docuit <sup>12)</sup>.

## §. XXV.

9) MONRO de nervis. p. 176. TISSOT l. c. 4. B. p. 208.

10) ROMBERG *Gefühlslähm. des Nerv. 5. par.* in MÜLLER *Archiv.* 1838. Ejusd. *Anästhesie im Gebiete des Quintus*, ib. H. 3. Ejusd. *ib. Anästhesie* in CASPER *Wochenschr.* 1839. N. 11. p. 165. N. 19. p. 293. N. 20. p. 309.

11) Neuralgiae causam proximam paralyzin esse, contendit OSBORNE l. c. p. 317.

12) BORRHAAVE op. c. p. 700. „Si meta sit inflammatio in nervorum tunicis, haec, totum nervum comprimens, pro tempore facit paralyzin; illa vero per artem vel sponte resoluta, morbus sanatur.“



## §. XXV.

*Animadversiones de neuritide.*

1. Dolorum, crampi, convulsionum, maciei, <sup>Genera-</sup>  
 anaesthesiae et paralyseos origo ex nervorum sin-  
 gulorum affectione eo facilius intelligitur, si per-  
 pendamus, neuralgias plurimas non esse nisi  
 symptomata *inflammationis nervi dolentis* <sup>tim.</sup> <sup>1)</sup>, aut  
*vaginae illius* <sup>2)</sup>, cui inflammationi cum aliis <sup>3)</sup>

*neu-*

1) De phlogosi substantiae nervorum, et causa neuralgiae,  
 v. *Journ. suppl. au dictionn. des sc. méd. Vol. 7. cah. 3.*  
 Recentiores nempe, imprimis CHAUSSIER, saepe nervorum  
 substantiam ipsam in neuralgia inflammata detexerunt.  
 v. etiam *Dict. méd. T. 35. artic. neuralgie*, p. 500.  
 Autor neuralgias a neurosibus separat (p. 501) illasque  
 inter phlegmasias locat (p. 504).

2) „Nemo forte unquam vidit inflammationem in nervo;  
 haec vero si contingat, in sola tunica vaginali haeret.“  
 (BOERHAAVE de morb. nerv. p. 265). Quamvis inflammatio  
 ipsius nervi, uti infra apparebit, neutiquam in dubium  
 vocari possit, magis tamen viri opinio in genere expe-  
 rientiae confirmatur.

3) NASSI diss. de neuritide. Hal. 1801. CRUSEMANN in  
*opusc. della soc. med.-chir. di Bologna. Vol. 5. respon-*  
*sum ad quaestionem: stabilire i caratteri dell' infiammaz.*  
*del sistema linfatico, nervoso etc.* G. F. WOLF diss.  
 de nervor. inflammat. Hal. 1818. NELIN de *Inflammat.*  
*des nerfs. Par. 1818.* L. MARTINET in *Revue méd. fr.*  
*et étrang. Par. 1824. Juin.* J. E. DRENNER in *Archiv.*  
*gén. de méd. 1829. T. 22. Octbr.* p. 161. UBERTO BETTOLI  
*opusc. med. Parma 1834. Fasc. I. FRIEDRICH l. c. p. 89.*  
*N. 1. A. DELMAZONNE saggio sulla neuritide del syst. dei*  
*vasi sanguin. Torino. 1837. J. P. THOD. VAN DER LITH*  
*diss. anat.-pathol. de vitis nervor. organica. Amstelod.*  
*1838. Cap. II. de neuritide ejusdemque exitibus.*

*neuritidis* nomen imponimus; quin eam, nisi facta demonstrata, assumamus <sup>4)</sup>).

Distinguitur neuritis a neuralgia.

2. *Neuralgiam a neuritide* hucusque solum per dolorem periodice recurrentem, aut continuum et per absentiam aut praesentiam febris (saltem localis, quatenus ex calore, rubore et vibratione majore arteriarum partis dolentis desinitur), distinguere potuimus <sup>5)</sup>. Quod ultimum quidem criterium *neuritidem acutam a neuralgia* satis distinguit, vix autem *neuritidem chronicam* pauco vel nullo motu febrili insignitam.

Exitus neuritidis.

3. Verum si arduum sit in primo morbi initio simplicem neuralgiam a neuritide distinguere non ita serius, ubi *effectus variorum exituum inflammationis* animadvertuntur. Nisi enim neuritis resolvatur, singulos aliorum inflammationum agnoscit exitus. Visi enim sunt nervi inflammati

cu

4) „*Je ne conçois même pas, comment, dans un temps, la méthode analytique est si justement reconnue pour meilleur flambeau dont puisse s'éclairer le médecin, on ose reproduire l'esprit de système au point de professer l'inflammation des nerfs et du neurillème, sans l'avoir auparavant démontrée dans ces maladies chroniques du système nerveux, qui accompagnent chaque année tant de malades au tombeau.*“ NICOD. l. c. p. 251.

5) L. MARTINET qui (l. c.) neuritidis symptomata graphi designavit, dolorem semper vehementissimum videbit obscure remittentem, nervi pressionem affecti auctam, caeterum quoad gradum ejus et durationem in proportione cum nervi inflammatione. Quibus neuritidem a neuralgia distinguendum esse, contendit.

6) BRUGMANN v. P. S. VAN HOORN diss. de his, quae

cum partibus contiguis concreti<sup>7)</sup>, crassiores<sup>8)</sup>, cartilaginei<sup>9)</sup>, tumores includentes<sup>10)</sup>; tumores<sup>11)</sup>, concrementa calculosa<sup>12)</sup>, serum<sup>13)</sup> inter vaginam et nervum; hydatides vaginis adhaerentes<sup>14)</sup>, nervi erosi<sup>15)</sup>, fungosi<sup>16)</sup>, gangraena detenti<sup>17)</sup>. Caeterum nervi plus quam aliae partes suppurationi, gangraenae et cariei<sup>18)</sup>, quin immo et putredini post mortem<sup>19)</sup> resistere solent.

## 4. Neu-

partib. amputatione vuln. notanda sunt. L. B. 1803. §. 9. p. 35. SONNHERRING *üb. d. Saft* etc. p. 90.

7) HARN *Heilungsmeth.* 2. B. 5. Th. C. 6. p. 342.

8) CIRILLO *pr. Bemerk. üb. vener. Kränk.* p. 134. RHINARUS de tumore ligam. circa artic. 1757. in HALLERI *disput.* pr. T. VI. p. 437. MARTINET l. c.

9) BOERHAAVE l. c. p. 61.

10) *Trans. of a Soc. f. the improv. of med. and chir. knowledge* Vol. II. p. 152. *Abh. f. pr. Aerzte.* 20. B. p. 632. Cfr. 4.

11) CHESELDEN *Anat. of the hum. body.* Lond. 1713. T. 28. CAMPER *demonstr. pathol.* L. I. C. II. §. 5. CAPPEL de epilepsia, e tumore nervo vago inhaerente orta. Helmst. 1781.

12) in TOLKERT SNIP de Lithotomia. Amstel. 1761. p. 8. DERLINCOURT *praelud. anat.* 1672. p. 61. *Journ. des Savans.* T. VII. p. 138.

13) TISSOT von d. Nervenkrankh. *Sämmtl. Schrift.* 3. B. p. 629. Cfr. Cap. VIII. MARTINET l. c. Neo non sanguis extravasatus et pus in nervo affecto.

14) PAW *Obs. anat. var.* Vol. II. p. 5.

15) BOERHAAVE de morb. nervor. Bern. 1762. p. 62.

16) MOHRNHEIM *Beob. versch. chir. Forfälle.* 2. B. p. 54. WAGNER in LODERS *Journ.* 3. B. p. 142.

17) *Recueil des obs. faites dans les hôpit. militaires.* publ. p. Mr. RICH. D'HAUTSIEK T. I. p. 376.

18) SONNHERRING *Hirntehre.* p. 142. et *üb. d. Saft.* p. 47.

19) SONNHERRING l. c. §. 178.

Tumores  
nervorum.

4. Neuritidis exitibus, in capitibus sequentibus ultro adhuc dilucidandis, quoque *tumores nervorum*<sup>20)</sup>, adscribendi sunt, qui, quamvis obiectum chirurgiae potius quam medicinae sistant, tamen, data hic opportunitate, silentio praeteriri nequeunt. Mentionem de iis fecerunt (saepe sub nomine incongruo *gangliorum* vel *neuromatis*<sup>21)</sup>) HIPPOCRATES, GALENUS, J. DE VIGO, AMBROSIIUS PARÉ, MORGAGNI, PETIT<sup>22)</sup>, CHESELDEN<sup>23)</sup>, CAMFER<sup>24)</sup>, BISSET<sup>25)</sup>, WOOD<sup>26)</sup>, VAN GESSCHER<sup>27)</sup>, GOOCH<sup>28)</sup>, E. HOME<sup>29)</sup>, DE LA ROCHE, PETIT RADEL<sup>30)</sup>, SPANGENBERG<sup>31)</sup>, NEUMANN<sup>32)</sup>, HESSEL-

BACH

20) „Die Nervengeschwülete . . . scheinen eine Folge . . . jener krankhaften Affection, welche die Neuralgie u. Neuritis bildet, die sie denn ihrer Seite wieder unterhalten.“  
PIORRY I. c.

21) CHESELDEN *Anatomy of the human body*. Lond. 1741. p. 256, Tab. 23. N. 7.

22) *Mém. de l'acad. de chir.* T. I. p. 90. 23) I. c.

24) *Demonstrationes anat. pathol.* L. I. C. 2. p. 11.

25) *On an extraordin. irritable sympath. tumor*, in *Mem. of the med. soc.* Vol. 3. p. 58.

26) *On painfull cutaneous tubercle*; in *Edinb. med. and surg. journ.* Vol. 8. p. 283 et 429.

27) *Proeven over de voorgenaamste langduurige Geschwellen.* Amstel. 1763. Vers. germ. Lpz. 1787. p. 65.

28) *Case and Remarks*.

29) *Transactions for improvement of medical and surgical knowledge*. Vol. II. p. 192.

30) *Encycl. méth. Paris.* 1792. T. II. p. 442.

31) *Ueb. d. Nerv. Anschwell.* in *Hoan Arch.* 5. B. p. 306

32) SIBBOLD *Sammlung eeltener u. ausserl. chirurg. Beobacht. u. Erfahr.* I. B. 1805. p. 54.

NACH<sup>33)</sup>, ODIER<sup>34)</sup>, MARSHALL<sup>35)</sup>, CHAUSSIER<sup>36)</sup>, SIEBOLD<sup>37)</sup>, ALEXANDER<sup>38)</sup>, MECKEL<sup>39)</sup>, ARONSSON<sup>40)</sup>, BAUMFISTER<sup>41)</sup> etc.<sup>42)</sup>. Quorum ultimus tumores nervorum pro induratione ex inflammatione non resoluta definit. Tumor nervi a magnitudine pisi<sup>43)</sup>, ad illam ovi gallinacei<sup>44)</sup> observatur.

Kla-

33) SIEBOLD l. c.

34) *Manuel de médecine pratique. Genève. 1805. p. 279. Samml. auserl. Abh. f. pr. Aerzte. XXII. B.*

35) *The Edinb. med. and surg. Journ. 1815. Oct.*

36) *Tables synoptiques de la neurologie.*

37) l. c.

38) *Diss. med. chir. de tumor. nerv. Leid. 1810.*

39) *Handb. d. pathol. Anat. Lpz. 1818. Bd. 2. p. 258.*

40) *Observat. sur les tumeurs développ. dans les nerfs. Straab. 1822.*

41) *Diss. de tumorib. nervor., adjecto eorum casu novo. Bonn. 1833.*

42) J. SWAN l. c. Vers. germ. 1830. p. 80. H. LEEB GIBBS ein Fall v. Ausrattung ein. Geschwulst (Neuroma) des N. radialis am recht. Arme, ex Edinb. m. and a. j. 1829. N. 32. in BEHREND Journ. 1830. St. 3. p. 315. J. SYME Ganglion am Knie. ib. 1831. Octbr. p. 2. D. E. CARRUTHER Fall v. schmerzhaftem Tuberkel unter d. Haut, in FROBIEP Notiz. Bd. 27. N. 12. DUPUYTREN klin.-chir. Vorträge im H. D. z. Paris. A. d. Fr. u. BUCH u. LEONHARDI. Bd. 1. Lpz. 1834. Stück 18. NÉLATON Tuberkeln am Ursprungs des 3. 5. 7 u. 8. Hirnnervenpaar, in KALISCH med. Zig. des Ausl. Jahrg. 2. N. 25. HASLER diss. de neuromate. Turici B. 1835. WETTER Fall v. Neuroma des N. ulnar. in HECKER lit. Annal. 1836. Bd. 3. H. 4. CHULIUS in Heidelb. klin. Annal. 1838. Bd. 11. p. 104. BRUER in WALTHER l. c. p. 697. VAN DER LITH l. c. cap. III. de tumoribus nerv.

43) Ut in casu BIGORDII in *Revue méd. 1831. Avril.*

44) Ut in casu GIBBS l. c. p. 316. Peponis parvi magnitudinis tumor nervi apud WETTER l. c.

Elasticus <sup>45)</sup> est et parumper mobilis. Dolere non nisi sub compressione aut attactu quocunque solet; at tunc cruciatus intolerabilis evadit. Dolor secundum decursum nervi propagatur, e. c. si tumor in nervo cubitali sedem figat, usque ad digitos, praesertim ad digitum annularem et auricularem. Motus musculorum (nisi forte ob dolorem a simultanea compressione tumoris) illaesus. Neque temperatura partis affectae a norma recedit. Quamvis partes omnes, ex quibus nervus in loco affecto componitur, augmentum morbosum exhibeant, induratae sint, et lympham contineant extravasatam <sup>46)</sup>, attamen ipsa nervi medulla laesa dici nequit. Mirum hinc non est, posse nervum, etsi tumore laboret, tamen motui musculorum et sensui praeesse. Caussae tumorum, de quibus agitur, in illis inflammationum quaeri debent. Spectant huc nervi punctio, ictus, concussio, et compressio <sup>47)</sup>. Patet hinc cur tumores nervorum etiam

45) „Die ausgeschälte Geschwulst war von fester elastischer Consistenz.“ WUTZER l. c. Sunt quoque durioris texturae (REICH, CHESLIDEN et HESSELBACH apud WUTZER l. c.).

46) II. MAYO (out-lines l. c. cap. V.) distinguit tumores nervi densos et fluidum continentes, qui tamen raro occurrunt.

46) „Haec (lymphe) procul dubio nascitur e turbato in functione aequilibrio inter vasa arteriosa et vasa lymphatica, ad partem affectam pertinentia, sic, ut species in nervo hydropis topici vel saccati oriatur, non absimili modo, ac post indurationes quasvis alias in aliis corporis partibus evenit, ut inde frequentissima hydropis diversi origo sit repetenda.“ (ALEXANDER l. c.)

47) De phaenomenis sectionem nervorum comitantibus lega-

etiam frequentissime ad partes, violentiis externis praeprimis expositas, e. c. ad brachia, maxime ad nervum cubitalem, ad crura, maxime ad nervum tibiale, obveniant. Caeterum cum DUBOIS<sup>42)</sup> vix dubitamus, tumores nervorum ex causis rheumaticis, arthriticis, scrophulosis, scorbuticis, syphiliticis, haemorrhagiis habitualibus suppressis etc. quocunque in loco obvenire posse. Tumores nervorum externi, sibi ipsis relictis, anaesthesiam, paralyzin, aut, si membrana externa nervi rumpatur, ulcera maligna admodum dolorifica, post se trahunt. Formationi tumoris nervi occurritur, si neuritis sine mora, ut decet, antiphlogisticis et imprimis evacuationibus sanguinis localibus curatur. Evolutus tumor *frictionibus mercurialibus*, et si haec non juvarent, *balneis sulphureis*, quae prodesse vidimus, curatur. *Rebellis tumor ignis aut cultri auxilium exposcit.*

5. Ne vero phaenomena morbosa, in nervis obvenientia, praepostere a praevio processu inflammatorio deriventur, nonnulla de vitiis nervorum *primae conformationis* in medium proferre, opus est. Haec quidem nisi in monstris<sup>43)</sup>, et vix ad originem nervi, locum obtinent<sup>44)</sup>. At

infra  
tur ARNEMANN *Versuche über die Regeneration an lebenden Thieren*, 1787. 1. B.

42) HORN *Archiv f. med. Erf.* 5. B. 2. H. p. 306.

43) CLARKE in *Philosoph. Transact.* 1793. p. 151—164.

KLINKOSCH *Progr. quo Sect. et demonstrat. iudicis etc.* Prag. 1766.

44) SOMMERING l. c. p. 105. §. 126.

infra hunc locum nervi respectu ad situm<sup>51)</sup>, copiam<sup>52)</sup>, auctum volumen<sup>53)</sup> et pinguedinem<sup>54)</sup> haud raro peccant, quin necessario secunda inde laedatur valetudo. Respectu temperamenti videtur, quod apud homines cholericos nervi minores, sed magis firmi sint<sup>55)</sup>. Nervi parum ab arteriis irrorati ideoque aridi facultatem conductorum sensibilitatis verisimiliter amittunt<sup>56)</sup>. Hinc forte senum<sup>57)</sup> insensibilitas, sensibilitas infantum<sup>58)</sup>.

## §. XXVI.

51) HILDEBRAND in BLUMENBACH *med. Bibl.* 3. B. p. 157.

52) NEUBAUER *descript. anat. nerv. cardiac.* 1772. Sect. 1. Praet. p. 10. „Quam ingens, ait, est discrimen, quod quotidie observamus, quoad crassitiem vel diametrum unius ejusdemque nervi, modo ex majori, modo ex minori tubulorum seu fibrarum numero constati! unde cadavera quaedam adeo nervosa (si ita dicere licet) inveniuntur, ut non duplex sed triplex ramorum copie, in ratione ad alia cadavera oculo perquirenti ubique seem obiciat.“

53) SOMMERHING *Hirulehre.* p. 105. §. 126. LAUMONIER *Journ. de méd.* J. 93. p. 259.

54) MORGAGNI *op. c.* Epist. LXLX. §. 2.

55) *Disq. de natura cholericorum, eive de vita, sanitate, morbis, et morib. illorum, quib. temperament. choleric. trib. sol.* Vien. 1775. p. 79. SOMMERHING l. c. p. 136. p. 168.

56) SOMMERHING *ib. d. Saft.* p. 18.

57) HALLER scripsit: „In vetulis nervi corrugantur et tacti cultro anatomico duriores reperiuntur.“ Addit SHILLER: „Vix enim quid aliud in communi, qua senile corpus premitur, succorum paucitate potest expectari (Anat. corp. hum. sen. spec. Erl. 1807. p. 117.) et SCHNEIDER non vagines modo nervorum, maxime ischiadici et sacralium



## §. XXVI.

*Prognosis. Cura.*

1. Morbi nervorum singulorum *prognosis* generalem neutiquam admittunt. Periculum enim, quo stipantur, et exitus illorum a multis rerum positionibus pendet, e. c. ab officio nervi affecti, a momento partium, quorum functiones a nervo affecto reguntur, a situ illius plus minus recondito, ab indole morbi, ab aetate et constitutione aegri<sup>1)</sup> et a doloris vi. Gravissimae sunt affectiones

*nervi*

rigidiores, et aquila illa, quae aliis ipsis inesse solet, multo parciore perfusa . . . . . reperit.“ Et LUCAN assentit: quotiescunque corpus senile ad nervos arteriarum explorandos incidebam, pauciores semper inveni, quam in juniorum corporibus (Obs. anat. circa nerv. arter. adhaerentes et comitantes. Francf. 1810. §. 12).

58) „Quando nervus in corporibus infantum (nam in his optima demonstrari possunt) per injectionem coloratur et omnia interstitia inter primum et secundum involucrium etiam inveniuntur plena, his ablatis invenitur materia inter fibrillas, secundo involucrio contentas, adeo ut detegantur vasa injectam materiam accipientia, quae participant ad fibras ultimas.“ (RUYSCH v. BOERHAAVE de morb. nerv. Lugd. Bat. 1761).

1) Sicuti in aliis morbis, ita et in illis nervorum, a viribus naturae medicatricibus solum in hominibus juvenibus at vegetis multum expectamus. Docet enim BRUGMANN (l. c. p. 34) „fibras nervae resecissae de novo generari.“ Undenam autem illae formentur, ad oculum non fuit observatum, sed satis constitit, illas ex majoribus nervorum resectorum ramis ortum non sumere, contra vero plura sunt, quae suadeant, tenuissimos ramulorum ramos huic regenerationi ansem praebere.

*nervi intercostalis*, utpote quae dolore profundo, illi ex inflammatione partium externarum orto neutiquam simili, ac sensu labefactionis cordis, cum proclivitate ad lipothymiam convulsivam stipantur<sup>2)</sup>. Respectu *neuralgiarum* et dolorum generatim monemus, *ne vim doloris* vel ex vagitu aegri vel ex illius contorsionibus et lachrymis determinemus. Non solum enim nonnulli dolorem simulant, verum etiam alii maximum silentio ferunt, alii minimum cum summa impatientia<sup>3)</sup>. Interea haec de adultis, non de infantibus valent, quorum dolores generatim cognoscuntur ex vagitu, contorsionibus et lachrymis, colore faciei livido et cute rubra. Dolor summus sine vagitu et lachrymis periculo plenus est, et vice versa<sup>4)</sup>. Nec subitanea doloris cessatio salutaris; indicat enim, praesertim in neuritide aliisque inflammationibus transitum mali in gangraenam vel hydroperem acutum. Cum vero hic locus non sit, de doloribus in genere, utpote argumento ad *pathologiam* et praecipue ad *semioticam* spectante, dis-

se-

2) HALLÉ *Reflex. sur le traité des gland.* DE BORDEU. p. II.

3) Legatur art. *Cri*, — auctor PERCY in *Diction. des sciences médicales.* Vol. VII. p. 354—365.

4) „Si le malade crie, s'il exhale, si, comme le dit MONTAIGNE, il évapore sa douleur, ces effets sont presque nuls, et ces impressions simplement fugitives. Chaque cri, qui consiste en une profonde inspiration suivie d'une expiration précipitée et entrecoupée, dilate, détend tout ce que la douleur a serré, empêche les congestions, facilite le cours du sang dans les poumons, dégage le cœur etc.“ PERCY l. c. p. 359.

serendi, sufficiat anclores illud illustrantes commemorasse<sup>5</sup>).

## 2. Cura

- 6) PORTIUS diss. de dolore. Florent. 1551. ZWINGER diss. de dolore. Basil. 1583. BACHER conclus. med. et chir. de dol. in gen. ejusq. causis, speciebus, cura. Basil. 1595. RAUBENIUS diss. de dolore. Seb. 1596. GABELHOPPER diss. de dolore ejusq. causis, et remed. Bas. 1596. KAULUNG diss. de dolore. Basil. 1598. PLATER de doloribus Lib. II. Francf. 1609. UNVERZAGT diss. de dolore. Helmst. 1617. MUELLER diss. med. doloris consideratio. Tüb. 1626. SEBIZ diss. de dolore. Argent. 1632. BREDENBEEK diss. de dolore. Lugd. Batav. 1656. LOCKEMANS diss. de doloribus. Lugd. Batav. 1675. M. HOFFMANN diss. inaug. de dol. resp. ZOLLIKOPFER. Altd. 1682. SCHRADER diss. de dolore. Helmst. 1688. WYNSOTT diss. de doloribus in genere. Leid. 1690. VATER diss. sistens rat. et curat. dol. Vitt. 1696. ORTLOF diss. de fame, siti et dolore. Lips. 1697. BAYLE diss. nova de consuetud. volupt. et dol. Tolos. 1700. F. HOFFMANN compend. et clin. prax. dolor. cum cautel. Hal. 1706. Diss. de dolor. resp. Ludolf. Hal. 1730. LEJBUNE diss. de dolore in genere. Harderov. 1716. DETHARDING Ethica dolorum 2. Rost. 1722. ZIEGLER diss. de nat. et cura dolor. Lugd. Batav. 1722. MONTEITH diss. de dolore. Edinb. 1726. RUDOLF diss. de doloribus. H. 1730. ALBERTI diss. de doloribus. Hal. 1720. Diss. de Therapia per dolores. Hal. 1730. STAHL diss. dolorum generis et indolis. Erf. 1731. GESNERUS diss. de dolore. Basil. 1733. VOLCKAMER diss. de dolore doloris remedio. Altd. 1739. ADOLPHUS diss. de doloribus. Lugd. Batav. 1739. GERICKER diss. de dolorum utilitatibus e mechanicis causis deductis. Helmst. 1739. ISER an dolor a soluta unitate morbus? Negat. quaest. med. inaug. praes. LAUR. FERNET. Par. 1741. MARTEAU an unum e praecipuis symptomatibus in oper. chir. mitigandum dolor. Qu. inaug. praes. S. F. COUTHIER. Paris 1744. SCRINCI diss. de doloribus

## 176 DE NEURALGIA ET NEURITIDE

*Cura.* 2. *Cura morborum, in nervis singulis locum habentium, ex therapia generali morborum systematicis nervosi<sup>6)</sup>, ex speciali autem illa morborum cerebri et medullae spinalis, nec non ex regulis adversus prosopalgiam et ischiadem tradendis abstrahenda. Neuralgiae enim sicuti ex causis diversis oriri possunt, ita diversam quoque exposcunt medendi rationem<sup>7)</sup>. Nihilominus*

*non-*

*in genere. Præg. 1746. HECHT theoria dolorum eorumque curatio in genere. Lugd. Bat. 1747. SCHULZE diss. de spasmio dolorifico saepius remedio quam morbo. Hal. 1749. HAMBERGER diss. de dolore. Jen. 1750. FÖRSTENAU diss. de doloribus. JUNKER de doloribus eorumque causis generatim. Hal. 1755. Diss. de utilit. dolor. Hal. 1756. SAUVAGES theoria doloris. Monsp. 1757. NICOLAI diss. de dolore in genere. Jen. 1758. AURIVILLIUS diss. de doloribus. Upsal. 1765. BUCHNER diss. de salut. et nox. dol. effect. Hal. 1768. DIMSTALE diss. de dolore. Edinb. 1771. PANZER diss. de dolore. Alt. 1777. SASSARD *essai et diss. sur un moy. d'empl. avant quelq. opérations pour en dimin. la douleur. v. Esprit des Journ.* 1781. MOORE *Method of preventing or diminishing pain in several operations of surgery. Lond.* 1784. YOUNG diss. de doloris theoria. Lovan. 1787. GOSSE de doloris therapia. Lovan. 1787. LUTHER de morb. dolorif. eorumque medela. Erf. 1788. PETIT *discours sur la douleur. Lyon. an VII.* PLATNER diss. de dolore. Lips. 1792. BILON I. c. BITZELS *Versuch e. Theorie d. Schmerzens. Berl.* 1803. SARAZIN *Diss. sur la douleur. Paris. an XIII.* MOYON *sull' utilità del dolore. Genova* 1811. RENAULDIN *Dict. des sciences méd. T. X.* p. 178. 239. et J. A. SALGERS *de la douleur, considérée sous le point de vue de son utilité en méd. Par.* 1823.*

<sup>6)</sup> P. II, ed alt. Vol. I. S. 1. C. I. §. VI.

<sup>7)</sup> „*Différentes observations semblent devoir faire conclure,*

nonnulla *praecepta generalia* praesertim, relate ad *neuralgiam* et *neuritidem*, coram oculis habere juvabit. Primum illorum in eo consistit, ut quocunque in casu, ubi morbi causam directe auferre haud liceat \*), quo recentior morbus et floridior aeger, ad *venaesectionem* aut saltem ad *evacuationem sanguinis localem* confugiatur \*). Praeterea parti, in qua nervus patitur, si fieri liceat, talis positio concilianda, qualis requiritur, ut influxus cruoris in eam minimus evadat. Ad hunc scopum obtinendum, utque cruciatus ex operationibus chirurgicis leniantur, ipsa *arteriae* partem ad-

que dans la neuralgie il existe une cause matérielle d'irritation fixée sur le nerf, que cette cause n'est pas la même dans tous les cas, et qu'ainsi il faut la connaître pour établir un traitement efficace." (PINEL *Nosogr. philos.* Vol. III. 3. edit. 1807. p. 162). Cfr. PIGNY *eine auf Beobacht. gegründete Behandl. d. Neuralgien*; ex *Gaz. méd.* 1833. Jan. et Fév. in BEHREND *allg. Repert.* 1833. N. 4. p. 56.

- 8) Qui casus non raro occurrunt, nec non ii, in quibus causa ablata dolor nihilominus perdurat. Cfr. MARTINER *lib. d. Behandl. etc.* l. c. p. 48. HILDEBRAND (*annal. univers. di med.* 1831. Gennajo) commendat, si causa neuralgiae latet, methodum antagonisticam.
- 9) „On a accusé avec raison nos prédécesseurs d'avoir été trop prodigues de sang dans le traitement des affections douloureuses; ne pourrait on pas reprocher à nos contemporains d'en être trop avares?" RENAULDIN l. c. p. 323. „Bei plethorischem Individuen setze man 30 — 60 (!) Blutegel auf die schmerzhafteste Stelle, wodurch die Krankheit einige Male eogleich coupirt wurde." SANDRAS l. c. p. 309. Et in debilioribus sanguinis extractionem non valde timendum esse, expertus est PIGNY l. c.

## 178 DE NEURALGIA ET NEURITIDE

adfectam adeuntis compressio per tornaculum<sup>10)</sup> proposita est<sup>11)</sup>. Inter res, influxionem sanguinis in nervum moderantes, et frigoris applicatio pertinet. Porro *digitalis purpurea*, frenum circulo sanguinis injiciendo, ac vasorum lymphaticorum<sup>12)</sup> actio-

10) MALAPERT ad hunc scopum instrumentum invenit, quod *compresseore* nominat. v. BERREND *Repert. des Auct.* 1837. N. 91.

11) BRINGTON in DUNCAN *Annals of med. for.* 1801. p. 3113. v. *Abh. f. pr. Aerzte.* 20. B. p. 509. MOORE l. c. Nuperime pluries optato cum eventu tentata est ab ALLIER in *Journ. de méd. et de chir.* 1838. Jan. N. 16. v. FRICKH u. OPPENH. *Ztschr.* 1838. Bd. 8. II. 3. p. 367 sq. DEZIMMERIS *einige Fälle von Compresse, d. Blutgefäße bei Neuralg.* in FRORIER *Notiz.* 1838. N. 160. p. 93 (carotis omni in casu feliciter compressa). Cfr. quod de compressione in capite de cephalaea. P. II. ed. alt. Vol. I. Sect. I. C. II. §. XII. 2 (7) 11 (73) dixi. — Nec minus compressio nervorum tentata est et palliative effacit. v. HANROZ *Compression der Nerv., als Mittel bei heftigen Neuralg.* ex *Ann. de méd. belge.* 1835. Août. in SCHMIDT *Jahrb.* 1836. *Supplem.* 1. p. 251. Ast certe non nisi cautissime adhibenda est, cum hujus operationis, qua morbi causae (§. XXIII. 2 (78)) memores fuimus. BRÜGGEMANN (CASPER *Wochenchr.* 1837. N. 18) de viro, ex febre nervosa reconvalescente narrat, pressione nervi alicujus trunci extemplo ecchymoses habebat.

12) Nervos vasa lymphatica habere demonstrarunt CARR *Epist. med.* Lond. 1691. p. 6. VALSALVA de aure hum. *Traj. ad Rhen.* 1707. p. 60. NUCK de ductu salivari novo et ductibus ocul. aquos. *Lugd. Bat.* 1685. fig. 8. MARTIN *inst. neur.* Ed. alt. Holm. et Lips. 1781. p. 35. MASCAGNI vasor. lymphat. c. h. historia et ichnogr. *Sien.* 1787. Tab. VI. fig. 2. 3. Tab. IX. fig. 1. 2. 3. Tab. XIX. FLENN *Hygro-*

actionem simul excitando, vario sub respectu in neuralgia et praesertim in neuritide indicatur. Maxime enim idonea est ad plurimas inflammationum reliquias, e. c. extravasatum inter vaginas nervorum, debellandas. Cui indicationi *stipites solani dulcamarae, flores arnicae montanae, radix smilacis sarsaparillae*, et maxime *hydrargyrum*<sup>13)</sup> satisfaciunt. Accedunt *acupunctura*<sup>14)</sup>, *ulcera ar-*

M 2                      tifi-

*logie. Wien. 1795. p. 31. REIL Exercit. anat. p. 13. 21. FRAGONARDS mém. de la Soc. méd. d'émul. p. 442. SOEMMERING üb. d. Saft. p. 51 sq.*

13) HILDEBRAND l. c. (calomal). RYENBAUM in *Brandenb. Sanitätsber. Berl. 1837* (Sublimatum).

14) *Acupunctura*, nemini medicorum ignota, ex Sina at Japonia ad nos translata, pars est vetustae medicinae domesticae neo Aegyptiis solam et Sinesibus atque Japonensibus, ut hypothetice fertur, sed omnibus fere barbaris, ipsisque Americae incolis familiaris. Primas hujus chirurgicae anchiresis notitias AMATUS LUSITANUS curat. medic. Ven. 1566. Cent. I. 38. V. 90. VI. 31. VII. 58, TH. ZWINGER theatr. vit. hum. Basil. 1571. p. 374, J. BONTIUS de med. Indor. lib. IV. L. B. 1642 (Amst. 1658), M. MARTINI China illustrata. Amst. 1659, CLEYNE specim. medicin. Sinicae. Francf. 1662 (1682), GULIELM. TEN RHYNE diss. de arthritide c. mantissa schematica de acupunctura etc. Lond. 1683. Vers. germ. a ST. BLANCARD *Beschreib. wie d. Chineser vermittelst des Moxabrennens u. Nadelstechens d. Podagra curiren. Lpz. 1690*, WERDEL diss. de puncto medico. Jen. 1701, HELVETIUS (resp. BIDLOO) diss. de puncto. L. B. 1709, et E. KÄMPFER amoenit. exoticae. Lemg. 1712. Ejusd. *Geschichte u. Beschreib. v. Japan; herausgegeb. v. CH. W. DONN. Lemgo 1779. Bd. 2. p. 423*, tradiderunt. Inter hos praecipue sedulitati TEN RHYNI

et

at KÄMPFERI, qui aliquod tempus inter gentes Orientales dagebant, cognitionem operationis at descriptionem accuratorem. debamus, quae in eo est, ut partes corporis humani, variis affectionibus dolentes, acu magis minusve profunde parforentur. Quantopera viri laudati acupuncturam commandaverint, nihilominus in oblivionem venit, saltem passim solummodo ejusdem mentionem fecerunt: NENTER fundamenta medicin. Arg. 1718. T. I. p. 165, J. B. DU HALDE *descript. de la Chine*. Rost. 1747, L. HEISTER *inst. chir.* Norimb. 1750. T. I. p. 453, JUCH *diss. monita pract. circa punctur.* Erf. 1755, HALLER *disput. ad morbor. histor. et curat.* Lausann. 1758. T. VI. p. 766. DUJARDIN *hist. de la chir. Par.* 1774. T. I. p. 95, WÖYR *gazophylacium med.-phys.* Lips. 1784, *Encyclop. méd.* T. I. p. 184, THUNBERG *voyage au Japon.* Par. 1796, P. SUE *mém. sur l'état de la chir. à la Chine*, in *Rec. périod. de la soc. de méd.* 1800. Octbr. Novbr. Germ. a GÜNTHER in *Rhein.-Westphäl. Jahrb.* 1825. *Ibid.* 10. St. 2. p. 142, VICQ-d'AZYR *de l'acupunct.* in *ajusd. Oeuvres.* Par. 1805. T. 5. p. 133, *Der Freimüthige.* 1806. Aug. p. 154, *Diet. dec. sc. méd.* 1812. T. I. p. 149; donec tandem inter Francogallos L. V. Z. BERLIOZ anno 1811 coram societate medica, quae Parisiis floret, historiam febris nervosae acupunctura sanatae enarrabat at *Mém. sur les maladies chroniq. ... et l'acupuncture.* Par. 1816 edidit, in quo libello (p. 296) duas historias tussis convulsivae sanatae promulgavit. Quo ex tempora multi medicorum methodum examini novo at accuratiori subjecerunt, experimentisque in hominibus et animalibus institutis explorarunt, electricitatis et galvanismi medio validiorem raddiderunt, absentibus sanguinis inflammatione et vasorum turgescantia, in sanandis affectionibus dolorificis, praecipuis in neuralgiis, spasmis, convulsionibus, paralyisibus, rheumatismis, arthritide, cephalalgia, odontalgia, cardialgia, singultu, tussi convulsiva, ophthalmiis, pleurae affectionibus, pericarditida chronica, catamenüs suppressis, luxatio-



nationibus etc. tentarunt, neque pauca exempla sanationis hujus remedii ope plus minusve feliciter peractae retulerunt, etsi nonnulla funesta eventa non desint. Conferantur interea: HÉCLAND *sur l'innocuité de la piquûre des vaisseaux*. Par. 1816. Idem in *Dict. de méd.* en 18 Vol. Par. 1821. Vol. 2. in *Archiv. gén.* 1825. Févr. in *Revue méd.* 1825. p. 75. 309, 471. in *Bullet. des sc. méd.* 1825. Mai. N. 5. p. 67 (syncopae ex acupunct.). A. P. DEMOURS in *Journ. complém. du Dict. des sc. méd.* Par. 1818. T. 2. p. 367. Ejusd. 1. et 2. not. sur l'acupunct. in *Journ. gén. de méd.* T. 66. Ejusd. Not. sur l'acupunct. in *Journ. univers. des sc. méd.* Par. 1819. T. 15. p. 107. T. 37. p. 123. T. 38. p. 105. Ejusd. *Extrait d'un mém. sur une modificat. de l'acupunct. lu à la séance . . . de l'ac. r. de méd.* le 13. Jan. 1825. BRÉTON-NEAU in *Journ. univers. des sc. méd.* Par. 1819. T. 13. p. 35. HAINÉ notie. sur l'acupunct. in *Journ. univers.* 1819. T. 13. p. 28 (singultum 6 messium sanavit). Idem in *Journ. gén. de méd.* T. 13. in *Annal. de la soc. de méd. pr. de Montp. Série 2.* T. 3. p. 177. J. LARREY rec. de mém. de chir. Par. 1821. J. M. CHURCHILL à tr. on acupunctation; being a descript. of a surg. operat. origin. peculiar to the Japones and Chin. etc. Lond. 1821. Vers. germ. in GERSON u. JUL. Mag. 1822. H. 3. J. WAGNER *Abhandl. üb. d. Akupunkt. a. d. Engl. Bamb.* 1824 et in *Samml. auserl. Abh. f. pr. A.* 1825. Bd. 33. St. 1. p. 153—186. Vers. Franco-gall. par M. R. CHARBONNIER tr. de l'acupunct. etc. Par. 1825. Idem in *The Lond. med. reposit. and review.* 1822. Apr. 1823. March. et Mai. FROBIE Notiz. 1822. Bd. 2. N. 17. p. 263. Bd. 5. p. 43. Bd. 6. p. 350. Bd. 10. p. 16. Bd. 13. p. 169. FARINA in Cap. de Neuralgia faciali citand. SABATIER de la méd. opérat. (edit. SANSON et BÉGIN). Par. 1822. T. 1. p. 191 sq. CH. B. ZANG *Durst. blut. Op. Wien* 1822. Th. 3. Abth. 1. p. 290. FINCH in the *Lond. med. repository and rev.* 1823. Noubr. PIPELET obs. de malad. convulsive, avantageusement modifiée par l'acupunct. in *Journ. complém.* 1823. T. 16. cah. 62. p. 186.

Saleb.

## 182 DE NEURALGIA ET NEURITIDE

*Salab. med.-chir. Ztg.* 1824. p. 396 (anasarca c. ascite et hydrothorace incipiente sanst.). GRAEFB u. WALTHER *Journ.* 1824. *Bd.* 5. *St.* 3. p. 552. *St.* 4. p. 721. *Bd.* 6. *St.* 2. p. 371. C. ANGELSTEIN diss. de Perkinismi et Magnetismi miner. histor. Berol. 1825 (autor et acupunct. Chiniens. mentionem facit). PASOT obs. de neuralg., guéri par l'acupunct. in *Archiv. gén. de méd.* 1825. *Avril.* (semet ipsum neuralgia brachii deliberavit). MICHAELIS in GRAEFB u. W. *Journ.* 1825. *Bd.* 8. *St.* 2. p. 339 (efficax in rheumatismis). J. CLOQUET et MORAND mém. sur l'acupunct. etc. *Par.* 1825. et in HORN *Archiv.* 1825. *II.* 3. p. 90 (acus in vulneribus chamice mutari et electricitatem provocare). CLOQUET et DANTU de l'acupunct. *Par.* 1826. TOUILLOT in MAGENDIE *journ. de phys. expér. Par.* 1825. *N.* 1. 2 (phaenomena electro-magnetica observabat). MEYRAUX obs. sur l'acupunct. etc. in *Archiv. gén.* 1825. *Janu.* p. 149. *Févr.* p. 231. *Mars.* p. 381. PELLSTAN fils, notices sur l'acupunct. etc. 1825. Germ. in *Samml. auserl. Abh. f. pr. A.* 1825. *Bd.* 33. *St.* 1. p. 98. Cfr. RUST *Respert.* *Bd.* 10. *H.* 1. p. 155 et HUYKLAND *Bibliothek.* 1825. *Bd.* 54. p. 61. SARLANDIERM mém. sur l'électro-puncture ... suivie d'un tr. de l'acupuncture. *Par.* 1825. DANTU tr. de l'acupunct., suivi d'observat. *Par.* 1825. v. FROBIEP *Notiz.* *N.* 202. p. 164. *Revue méd. fr. et étrang.* 1825. germ. in HORN *Archiv.* 1825. *St.* 1 (acupunctura abdominis lethalis). *Samml. auserlesen. Abhandl. f. pr. A.* 1825. *Bd.* 33. *St.* 1. p. 111. GIBSON u. JUL. *Mag.* *Bd.* 7. p. 101. HARLESS in *Rhein.-Westphäl. Jahrb.* 1825. *Bd.* 9. *St.* 2. SKILKE ib. *Bd.* 10. *St.* 2. p. 138. TWENDALE in *Journ. univ.* 1825. *T.* 38. p. 106. A. LACROIX obs. sur l'acupunct. in *Journ. univers.* 1825. *T.* 38. *Juin.* vid. ib. *Jan.* p. 123. *Archiv. gén.* 1825. *Mai.* WEBSTER in *The Lond. m. and phys. j.* 1825. *Jul.* Cfr. *Revue méd.* 1825. *Sptbr.* HORN *Archiv.* 1825. *St.* 3. p. 483. *The Edinb. méd. and surg. j.* 1825. *Jul.* GAUTIER DE CLABRY analyse de quelq. écrits relatifs à l'acupunct. in *Journ. gén.* *N.* 341. p. 99 sq. G. A.

G. A. RICHTER *neuest. Entdeck., Erfahr. u. Ansicht. in d. pr. Heilk.* Berlin 1825. p. 410. J. HURGENRÖTHNER *Grundr. d. allg. Heilmittellehre etc.* Sulzb. 1825. p. 254. L. SCHRIEDER *diss. de acupunct.* Berol. 1825. HENRY *précis descriptif sur les insectes, de chirurg. anciens et modernes.* Par. 1825. p. 26. A. CARRARO in *OMOIDES annal. univ.* 1825. et in *Journ. univers.* 1825. T. 39. p. 361 (acupunctura cordis animalia asphyctica resuscitavit). RENARD in *Heidelb. klin. Annal.* 1826. Bd. 2. II. 1. PETRON in *Revue méd.* 1826. Mai (acupunctura inter cartilagineos 5. et 6. costarum ad cor: rheumatismus hujus organi disparuit). G. E. WOOST *diss. quaedam de acupunct. oriental.* Lips. 1826. BAUMGAERTNER *Resultate der Untersuch. mit ... der Acupunctur ... in Badische Annal. d. gesamm. Heilk.* Karlsruh. 1826. Jahrg. 2. H. 2. p. 50 sq. (cum et sine successu in rheumatismo fixis et neuralgiis). STRAMBIO in *Giorn. critico di med. analitica.* Milano 1827. Settbr. (encephalitis ex acupunct. capitis). G. PELAGGI in *Giorn. di chirurg. pratica.* 1827. Ottbr. (in pleuresia). BLÜMLIN *üb. d. Acupunctur,* in FRIEDRICH u. HESSELBACH *Beiträge z. Nat.- u. Heilk.* Nürnberg. 1827. Bd. 2. p. 113 (duo casus rhachialgie lumbalis sanatae). VON CASTELLA *jürl. Ber. etc. in Verhandl. d. med.-chir. Gesellsch. d. Canton Zürich im J. 1826.* Zürich. 1827. p. 78 (rheumatism. acut. brachii sinistri sanatus intra 7 dies). L. LOHMEYER *ein Beitr. z. Acupunctur,* in *RUST Mag.* 1827. Bd. 25. H. 1. p. 173 (in anasarca ex causa rheumatica et in duobus rheumatismis acutis nuchae cum eventu). J. ELLIOTSON *über .... Acupunctur,* ex *Med. chir. transact.* Vol. 13. p. 460. in *N. Samml. ausserlee. Abh. f. pr. A.* 1828. Bd. 11. St. 2. p. 327 (praecipue contra rheumatismum et anasarcam). J. BERNSTEIN *üb. d. Nutzen d. Acupunctur etc.* in *HUFELAND Journ.* 1828. St. 8. p. 84 (casus novem sanati: rheumatismus, neuralgie frontalis, lumbago, ophthalmie scrophulosa et rheumatica). MEYER in *Verhandl. d. vereinig. ärztl. Gesellsch. d. Schweiz, Jahrg. 1828.* Zürich (levamen rheu-

ma-

matismi brachii et axillae). OMOIDEI *ann. univ.* 1829. MARZO p. 466. G. J. MOST *Beitrag z. Acupunctur*, in GRAEFE u. W. *Journ.* 1829. *Bd.* 12. *H.* 3. p. 449 (brachii immobilitas et dorsi rheumatismus fixus periodicus sanati). KEIMER *d. Akupunkt. als Belebungsmittel bei Ersäuft*, u. *durch Steinkohlendampf Erstickt*, in GRAEFE u. W. *Journ.* 1829. *Bd.* 13. *St.* 3. p. 520 (incassum). W. HENNEHMANN *ein Nadelhalter f. d. Acupunctur*, in *Beitr. Mecklenb. Aerzte z. Med. u. Chir. Rostock u. Schwerin* 1830. *Bd.* 1. *H.* 1. p. 163. MOST *Nutz. d. Acupunctur bei ein. hitzigen Rheumatism*, *ex N. bibl. méd. Par.* 1829. *Octbr.* in BEHREND *Journalistik des Ausland.* 1830. *H.* 1. p. 153 (dolor disparuit). *Ejusd. Wirk. d. Akupunkt. bei partiell. Convulsionen*; *ex ib. ib.* p. 154 (lavamen attulit operatio). *Ejusd. Wirk. d. Akupunkt. geg. eine rheumat. Lähmung.* *ibid.* (lavamen). PICHONNIERE *nervöses Gesichtschm. u. Amaurose durch Electropunktur geheilt*, *ib.* et in GERSON u. J. *Magaz.* 1830. *St.* 3. p. 491. J. RENTON *Bemerk. u. Beobacht. üb. Akupunctur*; *ex The Edinb. m. and s. j.* 1830. *N.* 104. p. 100, in BEHREND *l. c.* 1830. *H.* 8. p. 232 (extollit acupuncturam). JOHN TATAM BANKS *Bemerk. üb. Acupunctur*; *ex The Edinb. m. and s. j.* 1831. *Apr.* in BEHREND *allg. Repertor.* 1831. *Juliheft* p. 82 (multi casus rheumatism. et neuralg. feliciter operati). *Eine 12jähr. Icthias, geheilt durch Acupunctur*, *ex The med.-chir. review.* 1831. *Apr.* in BEHREND *allg. Repert.* 1831. *Augustheft* p. 228. A. VULPHEU *üb. d. Acupunctur d. Arterien bei d. Behandl. d. Aneurysma*, in FROBIEF *Notiz.* 1831. *Bd.* 29. *N.* 11, *ex Gaz. méd. de Par.* 1831. *T.* 2. *N.* 1. H. G. SCHNEIDER *Erfahr. üb. d. Einwirk. d. Acupunctur-Voltaismus etc.* in *Rust Mag.* 1831. *Bd.* 34. *H.* 3. p. 462 (sanctionis historiam paralysis incompletae extramitatie inferioris dextrae ex fonte rheumatico narrat). C. KUNZE *diss. de acupunctura at electropunctura.* Vienn. 1831 (effectum salutarem in eo asse, quod electricitatis copia nimia organismo acupunctura extraheretur; inopia vero

ela-

electropunctura compensaretur, conteadit). FLORINETH mit gut. Erfolge angewandte Acupunctur, ex E. v. EHREHARTSTEIN Hpt.-Sanit.-Ber. v. J. 1828, in Oesterr. med. Jahrb. 1832. Bd. 11. p. 448 (arthritis genu). SACHS üb. Prosopalg. u. Acupunctur, in CASPER Repertor. 1832. Bd. 32. H. 1 (in prosopalgia optatum, in rheumatismi aut nullum aut infaustum habuit effectum). A. HAYNE Bemerk. u. Erfahr. üb. Acupunct. in thierärztl. Bezieh. in Oesterr. med. Jahrb. 1833. Bd. 13. St. 2. p. 283. Med. Ver.-Ztg. 1833. N. 1 et 37. FRANCESCO DA CAMIN sulla Ago-Puntura con alcuni cenni sulla puntura elettrica. Venez. 1834 (extendit operationem et multas sanationes, praecipue neuralgiarum et paralysis affert). P. VICINI diss. de acupunctione. Paduae 1834. NICOLA NARDUZZI Beobacht. üb. d. Wirksamk. d. Acupunctur; ex l'Osservat. med. di Napoli. 1834. Gennaio. 1. in SCHMIDT Jahrb. 1834. Bd. 3. p. 143 (quatuor casus sanati: dolores atroces brachii, contractura extremitatum inferiorum post epilepsiam, ischias et paralysis vesicae urinae). LUIGI MARCHESANI Beob. üb. Acupunct. ex ib. Gennaio 15. in ib. p. 144 (in sex neuralgiis feliciter, in prosopalgia sine successu adhib.). HAYFELDER l. c. (uno in casu convulsiones ex acupunctura; in altero leniebat, non sanabat operatio neuralgiam). POHNITZ in Auszüge a. d. Protocoll. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd. Jahr 1835. Dresd. 1834. 8. Versamml. d. 31. Aug. (contra paralysis et rheumatismum). F. LALLEMAND Beobacht., d. sich auf die verschiedenen, gegen d. erectilen Geschwülste angewendet, Verfahrungsweise, beziehen; ex Archiv. gén. 1835. Mai, in SCHMIDT Jahrb. 1835. Bd. 9. p. 203. Fall 4 (sanatio) et p. 204. BARTELS üb. d. Acupunctur; in GRAEFE u. W. Journ. 1836. Bd. 23. H. 3 (in ophthalmie acrophulosa, paralysis, hydrope ascite et anasarca sine; in epilepsia cum cephalaea aliquo cum fructu adhibita). R. WALLACE Heil. des Naevus maternus durch Acupunctur; ex London. med. gaz. 1836. Jan. in DIFFENBACH Ztschr. Bd. 2. H. 1. KING in Gazette méd. de Par. 1837. p. 322 (in

*tificialia, caustica et ignis.* Induratione in nervo relicta, *balnea tepida* aliaque *emollientia*<sup>15)</sup> conducunt. Nervi affecti sensibilitatem obtundunt *narcotica*<sup>16)</sup>, pro vario nervo varia eligenda<sup>17)</sup>, et, quousque id fieri potest, prope nervum labo-

ran-

(in hydropse ascite cum successu). W. DAVIDSON in *The Edinb. med. and s. j.* 1837. Dec. N. 2 (duo casus hydroceles. Acupunctura sine eventu optato). GÖDBACHEN *rheumat. Kniegeschwulst, durch Acupunctur beseitigt*, in DIERFENBACH *Ztschr.* 1837. Bd. 6. H. 4. p. 476. *Eccelus Hydrocele durch Acupunct. geheilt*; in FROBIEP *Notiz.* 1837. Bd. 4. N. 1 (duo casus. An cura palliativa aut radicalis? tempus docebit). BESSE *Acupunctur, als Radicalcur der Hydrocele u. des Hydrops ascites*; in HUFELAND *Journ.* 1838. St. 1 (in hydrocele incassum adhibita). LONGHI *eine merkwürdige Anwend. d. Acupunctur bei schmerzhaft. Convulsion, ein. Schenkelamputationstumpfes*; ex *Memoriale della medicina contemporanea, Venez.* in FROBIEP *Notiz.* 1839. Bd. 9. N. 6. p. 95 (effectus temporaneus). OSBOURNE l. c. p. 417. 11.

15) P. H. ed. alter. Vol. 1. Sect. 1. C. I. §. VI. 51. 52.

16) MARTINET l. c.

17) l. c. 40. *Datura stramonium praesertim commendatur.* J. BRONIE ex *Transact. of the med. and chir. soc. of Edinb.* 1828, in FROBIEP *Notiz.* 1829. Bd. 25. N. 15. p. 235 (Extracti gr.  $\frac{1}{2}$  omni trihorio et augenda dosis ad gr.  $\frac{1}{4}$ ). J. R. L. DE KINCKHOFF ex *N.-York m. and. phys. j.* 1837. Vol. 6. N. 3. in *N. Samml. ausicles. Abh.* 1828. Bd. 12. N. 1. p. 16 (Tinctura externe adhibita). RUCAMIER u. TROUSSEAU *Datura stramonium in Fällen v. Hiftweh u. hartnäckig. Neuralgien*, in FROBIEP *Notiz.* 1832. Bd. 32. N. 9 (gr. j—jij, endermice adhibita). F. AMELUNG *fortges. Erfahr. üb. d. Anwend. d. Stechapfels etc.* in HUFELAND *Journ.* 1832. St. 12. p. 51 (valde laudat et digitali anteposit).

rantem, non neglecta methodo endermica<sup>18)</sup>, applicanda<sup>19)</sup>. *Opium* nervorum sensui universali in-

18) P. III. Vol. I. Sect. 2. cap. X. §. XXIX. 8. A. LUNBERT *essai sur la méthode endermiq.* Par. 1828. Cfr. *Med.-chir. Ztg.* 1830. Bd. 1. N. 13. 14. OROIDEI ann. univers. 1830. p. 494. A. W. GERHARD *Anwend. mehr. Medicamente nach der Methode, sie v. d. Haut aus auf d. innern Körp. wirken zu lassen*; ex *The N. Americ. m. and s. journ.* N. 18 et 19. in FROBIEP *Notiz.* Bd. 31. N. 2. et in GRAEFE u. WY. *Journ.* 1833. Bd. 19. H. 1. p. 140. a MICHAELIS (200 pericula at plura). J. A. HOFFMANN *Erfahr. u. Bemerk. üb. d. endermische Methode*, in HUFELAND *Journ.* 1833. H. 1. p. 100. H. 2. p. 33. Cfr. CLARUS u. RADIUS *wöchentl. Beitr.* 1833. N. 15. L. ROHRBERG *endermat. Heilversuche*, in CASPER *Wochenschr.* 1833. N. 12. 13. RICHTER *d. enderm. Meth. durch eine Reihe von Versuch. in ihr. Wirksamk. geprüft.* Berl. 1835. P. BRÜHL *de methodo enderm.* Berol. 1835. RACIBORSKI *üb. d. Anwend. d. enderm. Methode bei einige. Affect. d. Nervensyst.* ex *Journ. hebdom.* 1835. N. 26. 27. in SCHNIDT *Jahrb.* 1836. Bd. 10. p. 15 (applicatio endermica strychnini et morphii. — Adhibuit hanc methodum etiam in febr. intermittantib. ib. p. 17). A. ANDRESEN *dis. de methodo endermat.* Havniae 1836 (quod opusculum legisse non poenitebit). *Beseitig. ein. Neuralg. intermitt. durch Veratrin nach d. enderm. Methode*, in *Med. Ver.-Ztg.* 1839. N. 18. p. 93 (chinino, opio, belladonna etc. incassum adhibitis, sanatio).

19) Unguamentum veratrinae laudem promeruit (Veratr. gr. IV — XX. Axung.  $\frac{5}{16}$ ). v. A. TURNBULL in *The Lancet.* 1833. Decr. GARSON u. JUL. *Hamb. Mag.* 1834. St. 4. p. 121. Ejusd. *An investigat. into the remarkable med. effects resulting from the extern. applicat. of verutria and delphinia.* 2. ed. Lond. 1834. Ejusd. *On the med. propr. of the nat. order ranunculaceae and more particularly on the use of sabadilla seeds . . . and this alkaloids, veratria, saba-*

interno inservientium sentiendi facultatem delet. Interea semper optandum, ut potius causam nervum labefactantem abigamus, quam ut impediamus, solum ne illius praesentia percipiatur. Quamobrem si forte cuidam nervo injuria fieret ab exostosi venerea, a glandula scrophularum culpa infarcta, e cruore ob infirmitatem vasorum inter pulpam nerveam et neurolemma effuso, potius ad antisiphilitica, antiscrophulosa, corroborantia etc.<sup>20</sup>), quam ad sic dicta nervina confugiendum foret. Intelligitur hinc et ratio, cur pharmaca saburras, bilem, vermes, calculos fugantia, nec non ipsae operationes chirurgicae irritamenta localia auferentes, morbis nervosis saepe medentur. Auxilium eminens, quod chirurgia suppeditat, *sectio vel extirpatio nervi* morbo dententi est<sup>21</sup>). Labefactata exhaustaque nervorum

5611-

*dilline* etc. Lond. 1835 (Grani  $\frac{1}{2}$  ter quaterve de die interne dedit). OMOIDEI ann. univ. 1834. Ottobre, Nov. p. 275. S. G. v. VOGEL u. zwei durch die Erfahrung bewährt., so schätzbar, als wirksam. Heilmitt. in CASPER *Wochenchr.* 1834. N. 13. EBERS in CASPER *Wochenchr.* 1835. N. 46—49. F. A. FORCKE *phys.-therap. Untersuch. üb. d. Veratrins.* Hannov. 1837 (virtutem medicatricem in Neuralgia et Paralysibus laudet). REICHE üb. d. innere u. äussere Anwend. des Veratrins, in *Med. Ver.-Ztg.* Jahrg. 8. N. 23.

20) Huc pertinet quoque ODIERI methodus diaphoretica, de qua MARTINET l. c. p. 49.

21) Multos casus percisione et excisione nervi dolentis portionem quinqve, sex linearum ad digitum unum semis sanatos afferunt: BRODIE in GERSON u. *Jul. Magaz.* 1822. St. 5. J. L. ARONSSON l. c. RIBES in MAGENDIE *journal.*



sentiendi facultate, carbonas ferri <sup>22</sup>) et salia alcali

- phys. 1822. T. 2. N. 4. LARREY in *Bullet. de la soc. méd. d'émulat.* 1824. T. NELSON in *N.-York med. and phys. journ.* 1824. Mars. DELPECH ex *Revue méd.* 1832. Jan. in *FRORIUS Notiz. Bd.* 33. N. 5. p. 71 (monet vir celeberrimus, neuralgias sponte exortas et ex tenicis nervorum affectione pullulantes, excisione non sanandas esse; nec non percisionem per se impedire non posse, quomius nervi continuitas restituitur; quod MARSHALL HALL (MËLLER *Archiv. f. Anat. u. Phys.* 1839. II. 3. p. 204) etiam testatur). J. F. MALGAIGNE *manuel de méd. opératoire, fondé sur l'anat. normale et l'anat. pathol.* Par. 1834. II. chap. 6. CH. BELL l. c. WEIGEL einige Fälle v. Nervendurchschneid. bei Neuralgien; ex ejusd. diss. inaugur. Monech. 1836. in *FRORIUS Notiz.* 1838. Bd. 8. N. 1. BÉRRARD Fälle v. hartnäckig. Neuralg., d. durch d. Durchschneid. d. krank. Nerven gehoben wurden, ex *Journ. des connoiss.* T. 3. p. 231. in *SCHMIDT Jahrb.* 1837. Bd. 16. p. 34. HAMILTON einige Fälle v. Nervenwund. l. c. (convulsiones quidam excisione 4'' nervi, sed morbi sanatio).
- 22) KILLER, KARTER et FORSTER in *Journ. gén. de méd. franç. et étrang.* 1823. WEDEL in *N. Samml. auserles. Abh.* 1824. Bd. 8. R. EVANS et A. BORTHWICK in *The Edinb. m. and s. j.* 1824. N. 79. B. HUTCHINSON in *The Lond. m. and phys. j.* 1824. VANDERBURGH ib. *Noubr. v. Med. chir. Ztg.* 1825. Octbr. p. 34 (in duabus neuralgiis vehementibus salutaris). WITTE in *HUFELAND Journ.* 1828. St. 3. p. 80. St. 4. p. 34 (quinque neuralgiae feliciter sanatae). BANG memorab. clin. in *Act. n. r. soc. m. Hav.* 1829. Vol. 3. CLESS et DUVERNOY *erst. Ber. üb. d. ... des Kathar.-Hosp. in Stuttg.* (anno 1828) behandelt. Kr. in *HORN Archiv.* 1830. St. 2. p. 284 sq. (3<sup>a</sup> p. d. omni triborio, salutifers). J. ELLIOTSON in *Med. chir. transact. Lond.* 1830. Vol. 15. v. *N. Samml. auserles. Abh.* 1830. Bd. 18. St. 2 (in neuralgiis, nec vitiiis organicis, nec in-

*cali pro basi habentia*<sup>23</sup>), interne, atque oleum  
essen-

flammatione nervorum complicatis, utilis) et in *The Lond. m. and s. j.* 1832. GAVES in *Revue méd.* 1832. Août, PIORRY l. c. (in aegrotis neuralgicis exsanguibus et in complicatione menstruationis perturbatae).

- 23) OMOIDEI ANN. UNIV. 1831. *Agost. Settör.* p. 555 et 1832. *Marzo.* p. 440. — *Chininum sulphuricum* (praesertim in neuralgiis intermittentibus) prodesse, ELLIOTSON in GRAEKE u. W. *Journ.* 1833. *Bd.* 20. *H.* 1. p. 170, SANDRAS, GILLEPSIE, MARTINET II. CC. et multi testantur. — *Strychninum* (praecipue endermice adhibitum): STEINHAUSEN in GRAEKE u. W. *Journ.* 1833. *Bd.* 19. *St.* 1. FISCHER in *Schles. Sanitäts-Ber. Bresl.* 1833. R. ROWLAND üb. d. Gebr. des *Strych. geg. Neuralg.* ex *Lond. m. gaz.* Apr. in BEHREND allg. *Repert.* 1833. *N.* 8. p. 97. G. RUSSEL MART *pract. obs. on the nat. and treatm. of nervous diseases, with remarks on the efficacy of strychnine in the more obstinate cases.* *Lond.* 1835. *Chapter.* 4. p. 149—185 (contraindicatur a vasorum irritatione et pblogosi). — *Morphium* (plurimumque endermice applicatum): J. L. BARDSLEY *Vers., welche mit neuen Heilmitteln, dem ... Morphinum .. an-gestellt worden, ex ejusd. Hospit. fuets and obs. etc.* *Lond.* 1829. in FRORIER *Notiz.* 1830. *Bd.* 27. *N.* 9 (gr.  $\frac{1}{4}$  — ij (!) usque). SANDRAS l. c. (gr. j. quotidie, endermice). MARTINET l. c. (interne gr.  $\frac{1}{4}$  —  $\frac{1}{2}$  ter de die). — *Kali hydrocyanicum* (non confundendum cum kali ferroso-hydrocyanico. v. SANDRAS in *Annal. d. Pharmacie v. Brandes etc.* 1833. *Bd.* 5. *H.* 3. *Abtheil. III.* *N.* 15): RECAMIER et TROUSSEAU in FRORIER *Notiz.* *Bd.* 32. *N.* 3. BLOUQUIER *gute Wirk. d. Cyankalium in den Neuralgien;* ex *Bullet. gén. de therap.* T. 6. *livrais.* 9. in SCHNIDT *Jahrb.* 1834. *Bd.* 4. p. 142. MARTINET l. c. p. 50. *Remedium audacissimum et damnosissimum* (v. BUCHNER *Repertor. Erste Reihe.* *Bd.* 49. *H.* 1. *Zweite Reihe.* 1835. *H.* 4) tantummodo externe (gr. IV. in aquae  $\frac{3}{4}$  soluta)

essentiale terebinthinae<sup>24</sup>) et alia<sup>25</sup>), frictiones<sup>26</sup>), magnetismus animalis<sup>27</sup>) et mineralis<sup>28</sup>), nec non electricitas<sup>29</sup>) conveniunt<sup>30</sup>).

## CAPUT

et in clysmate (gr. j. jam nimia dosis est, etsi audaces medici dosin majorem dederint) adhibitum est.

24) PAKÉ apud DIONIS *cours d'opérat.* p. 681. PLATNER *chirurg.* p. 279. DUFOUR in *Revue méd.* 1824. Août (usu ol. terebinth. interno plures neuralgias sanasse, asserit). *Revue méd.* 1825. Novbr. p. 222. L. MARTINET *Untersuch. üb. d. Wirksamk. des Terpentins in d. Behandl. d. Neuralgien etc.* in tract. de ischiade nervosa citand. et l. jam cit. CASTELLA in POMMER *schweiz. Ztschr.* 1836. Bd. 2. H. 2. Bericht v. 1833 (interne: Ol. Tereb. ʒj. Emuls. amygdal. ʒjV. quotidie consumend.). SCHNEIDER in HUFELAND *Journ.* 1837. St. 3. p. 30 commendat: R. Terebinth., Gi. Mimos. ana ʒij. Sacch. alb. ʒβ. Aq. Menth. crisp. ʒjV. Syrup. Menth. pip. ʒj. D. S. Cochlear maj. bis de die sumend., contra neuralgias omnes formas.

25) Ol. Crotonis; ol. Sinapeos (gtt. XXIV. Spirit. vini ʒj. vel ol. Amygd. dulc. ʒi). WOLFF in *Med. Ver.-Ztg.* 1835. N. 41. MARTINET l. c. p. 50 et propria editoris experientia.

26) Frictio frontis apud teneros infantes, illa partis capillatae capitis apud adultos etiam somnum inducit. Animalia licet ferocia benevolentiam illis saepe concedunt, qui collum, caput, venter perfricant. Chinesenses aurium frictione gaudent. Ventus frigidiusculus quantam gelido corpori voluptatem inducit! Quanta in scabie voluptas a perfrictione! Certe medicinam videtur asserere tactus, et veteres eodem utebantur. MARTINET l. c. p. 50.

27) SIEDERER *Gesch. ein. durch Magnet. anim. spontan. geheilt. krampfhaft. Krankh.* in HUFELAND *Journ.* 1837. St. 7. p. 7 sq. (Morbus ingrediebatur ut neuralgia vesicae urinaria et intestini recti).

28)

## 192 DE NEURALG. ET NEURITIDE IN GEN.

- 28) CH. A. BACKER *d. mineral. Magnetism., u. sein. Anwend.* in *d. Heilk. Mühlh.* 1829. *Ueb. d. Beseitig. v. Neuralg.* durch *Anwend. d. mineral. Magnetism.* (sanationis pericula in nosocomiis Londinensibus facta), ex *The Lancet*, Jun. in *BEHREND Rept.* 1833, N. 12. p. 194. Huc pertinet convolutum filamentorum metallicorum sive esopulae anodynae metallica HILDEBRANDT *annal. schol. clin. med.* Ticinens. P. altera. Pap. 1830. p. 231. CH. SCHMIDT *ein. Worte üb. d. Wirksamk. u. Anwendungsart d. künstl. Magnets als Heilmitt.* in *HUFELAND Journ.* 1834. Spätr. p. 118. WOLFF *Anwend. d. mineral. Magnetism.* in *Med. Ver. - Ztg.* 1835, N. 9 (in neuralg. dorsi musculor. par 18 dies incessum adhib.). MICHAELSEN *üb. Heilkr. des mineral. Magnetism.* in *PRAFF Mittheilung.* 1838. *Dritten Jahrganges* 11. u. 12. *Heft.* p. 77 (duo aegroti sanati).
- 29) LEBEAUME *on the med. efficacy of electricity on nervous and chronic disord.* Lond. 1823. G. F. MOST *üb. d. gr. Heilkr. des in uns. Tag. mit Unrecht vernachläss. Galvanism.* Lüneb. 1823. J. MÜLLER *Einfl. auf die Nerven des Rückenmarks*, in *FRORIEP Notiz.* 1831. N. 646. SCHRÖDER *d. Galvan. in Beziehung auf s. chem., pharmaz. u. Uebertragungs-Wirkung. im Organism.* in *HUFELAND Journ.* 1834. Aug. p. 66. TH. HARRIS *Fälle v. Neuralg., welche durch d. Galvanism. behandelt wurden*; ex *Americ. journ.* 1834. Aug. in *SCHMIDT Jahrb.* 1836. Spätr. 1. p. 250. MAGENDIE in *FRORIEP Notiz.* 1839. Bd. 11. N. 4. p. 64.
- 30) Supersunt quaedam alia remedia, quae nominatim sufficiet; *Tartarus stibiatus*: BAUMGAERTNER in *Bad. Annal. f. d. gesammte Heilk.* 1826. H. 2. p. 50 (affectiones neuralgicas vehementes fugavit). HILDEBRAND l. c. (contra neuralgias, in cerebro aut medulla spinali radicales). — *Plumbum oxydatum et Acetum plumbi basicum*: OUVRIARD *Anwend. d. weissen Bleioxyds*; cap. VI. §. XXXI. 9 (24) citand. MILLET *üb. d. w. Bleioxyd bei der Neuralg.* ex *Bull. de thérap.* T. 7. L. 5. in *SCHMIDT Jahrb.* 1835. Bd.

## CAPUT VI.

*De neuralgia faciali.*

## §. XXVII.

*Definitio. Literatura.*

1. **D**olor acerbissimus, fugitivus et perio-Definitio.  
dicus, ex uno alterove ramorum facialium quinti  
aut septimi nervorum paris<sup>1)</sup> emanans, *neuralgia*  
*facialis* seu *prosopalgia*<sup>2)</sup> dicitur.

## 2. Se-

Bd. 7. p. 12. BURGERT *heftige Neuralgie des 5. Nervens*,  
*Behandl. derselb. mit basisch essigsaurem Blei; schnelle*  
*Heilung*; ex *Gaz. des hôp.* 1837. Janv. in SCHMIDT *Jahrb.*  
1838. Bd. 19. p. 308. Sane hoc remedium cautissime ad-  
hiberi debet; JACOBI (FRORIEP *Notiz.* Bd. 24. N. 11) saltem  
tentatur, vaporibus plumbi neuralgiam excitatam esse. —  
*Aqua cohibata Laurocerasi*: BROLIO in *Il Filiale*  
*Sebezio, Giornale della sc. med. Nap.* 1834 et *Revue méd.*  
*fr. et étrang.* 1834. T. 1. — *Spiritus nitrico-aethe-*  
*reus*: GUILLO *Neuralg. durch die Anwend. des Salpeter-*  
*äthers geheilt* in TROUSSEAU, LEBROUDIN u. GOURAUD *allg.*  
*Journ. f. med. u. chir. Kenntnisse.* Nürnberg. 1834. H. 4. —  
*Amputatio*: MAYO *Amputat. a. d. Hüftgelenks wegen*  
*Neuralgie*, ex *The Lancet*, 1836. Octbr. p. 110. in DIER-  
FENBACH *Ztschr.* 1837. St. 4. p. 536. TYRREL *Exarticulatio*  
*humeri wegen Neuralgie.* Ib. cfr. LANGSTAFF et CROOKES  
§. XXIV, 2 (93) cit.

- 1) C. F. BELLINGERI *de nervi faciei, quinti et septimi nervos.*  
*paris functionib.* Aug. Taur. 1818. *Bullet. des sc. méd.*  
1830. Mars. p. 331. BELL in OMIDORI *ann. univ.* 1830.  
Mars. p. 552.

Frank *Prax.* II, I, 2. 1.

N

Literatura.

2. Seculo aerae Christianae secundo ARISTARUS CAPPADOX<sup>1)</sup> primus hunc morbum perfunctorie descripsit. Secuti sunt medici Arabi RHazes<sup>2)</sup>, MESUR<sup>3)</sup> et ABULKAZEM<sup>4)</sup>; atque seculo decimo sexto GORDONIUS<sup>5)</sup> et MASSA<sup>6)</sup>. Seculo decimo octavo prosopalgiam accuratius dignoverunt DEGNERUS<sup>7)</sup>, FR. HOFFMANNUS<sup>8)</sup>, C. ANDRÉ<sup>9)</sup>, SAUVAGES<sup>10)</sup>, LUDOVICUS<sup>11)</sup> et FOTHERGILLIUS<sup>12)</sup>. Aevo nostro de eodem argumento innumerabiles exstant scriptores<sup>13)</sup>.

## §. XXVII

2) Α Γρ. Πρόσωπον facies, et ἄλγος, dolor. Synonyma Heterocrania ARISTANI CAPPADOCIS, tortura oris Arabum et GORDONI, affectus spasmodico-convulsivus labiorum FR. HOFFMANNI, trismus dolorificus SAUVAGESII, prosopalgia FLOUQUETI et REILII, dolor faciei FOTHERGILLI, neuralgia facialis CHAUSSIERI. GERM. Gesichtsschmerz, Antlitzschmerz, schmerzhafter Trismus. GALL. Tic des lèvres. ROSS. Личная боль, спрадание или бо́ль личного нерва. POL. Ból twarzy Fothergilla.

3) L. VII. Jun. Paul. Crass. int. Arg. 1768. de caus. et m. diuturn. affect. L. I. C. 2. p. 58.

4) Opera exquisit. Bas. 1521. L. divia. C. 14.

5) Opp. omn. c. notis MENARD. et STYL. Venet. 1556. C. 6. p. 9.

6) Chirurgor. omn. prim. L. III. Argent. 1532. P. I. C. V. de modo cauteris, in tortura. p. 124.

7) Opera. Paris 1542. p. 131.

8) Epist. medic. 19. f. 106. Venet. 1550.

9) Act. n. cur. V. 1. Nov. Ed. 2. obs. 159.

10) Med. consult. T. II. Halae 1721. Vol. II. Decur. 2. cas.

11) Obs. prat. sur les mal. de l'urèthre. Paris 1756. p. 3 (binas divulgavit observationes).

12) Nosol. meth. Vol. I. p. 534.

- 13) Ephemerid. n. cur. Aug. 1772. obs. 252.
- 14) *Compl. collect. of Fothergill's Works* by LETTSON Vol. II, p. 56. 179. Et: *Med. obs. and inquir. N. 49. Uebersezt. d. Fothergillschen Werke*, 2. B. p. 164. v. *Abh. f. pr. Aerzte*, 3. B. p. 52.
- 15) C. L. F. ANDREY *mém. de la Société R. de Médecine*, T. I. V. MENURET *Journ. de médecine*, 1780, Juillet, p. 50. SELLE n. *Beitr. z. Natur- u. Arzneiw. Berl.* 1782. 1. B. p. 27. PUJOL *ess. sur la mal. de la face nomm. le tic doulour*, Paris 1787. Vers. germ. CH. H. SCHREYER. *Münch.* 1788. BORNAED *Journ. de médecine*, T. 50, p. 60. HAMEL *de la Neuralgie faciale* in *Jour. gén. de méd.* T. 17. p. 336. DES-ONDES *Journ. de méd. l. c.* p. 336. DUFONT *ibidem* l. c. p. 340. LONGAVAN *ibidem* l. c. p. 323. TROUBERT *mém. de la Soc. R. de Méd.* T. I. IV. 1782. 1783. DUBAL *observations sur quelques affections douloureuses de la face* v. *Bibl. méd.* T. 33. N. 98. p. 159. FORSTMAN diss. *de dolore faciei Fothergillii*. Duisb. 1790. *Salzb. med. chir. Ztg.* 1790. Bd. 3. p. 351. et 1793. Bd. 2. p. 389. WATON J. *de méd. chir. et pharm.* 1793. T. 93. *Mars. N. 1.* ZUCCARINI Pr. *cas. atrociss. capitis faciei que doloris, cum enormi tumore carioso conjuncti*. Heidelb. 1793. VAN WY *Verhandelingen van Vlissingen*, 8. D. p. 624. A THUESINK *Verhandelingen de Soc. in's Hage*, 1. D. p. 74. MARINI *memoria di matematica e fisica*, T. 9. BLUNT *Lond. med. Journ.* 1. 786. p. 47. v. *Samml. ausw. Abh. f. pr. Aerzte*, 12. B. p. 8. SIMON diss. *de prosopalgia*. Hal. 1793. LEIDENFROST ad diss. FORSTMANNI *Epistola. SIEBOLD doloris faciei, morbi rarioris atque atrocis, observationibus illustrati adumbratio*. Wirzb. 1795. BREITING in HUFELAND *Journ.* 25. B. 4. St. LENTIN *Beitr. z. ausüb. Arzneiw.* I. B. p. 334. 3. B. p. 120. HUFELAND *Journ.* 9. B. 1. St. p. 56. BLUMENBACH *med. Bibl.* 2. B. p. 146. *Comment. soc. Goetting.* T. XI. p. 43. TRILENIUS *med. u. chir. Bemerk.* Frankf. 1789. p. 283. REIL *Memorab. clin.* Vol. I. Fasc. 2. p. 7. RAHN *Museum der Heilkunde*, 1. B.

1. B. N. 36. 40. OSWALD *Arch. d. pr. Heilk. f. Schles.*
2. B. 2. St. N. 1. VOLGER in BLUMENRACH *med. Biblioth.*
2. B. p. 506. BOXNER *ib.* T. III. p. 315. SACHSE *Journal d. Erfindung.* 33. St. p. 3. POSHWITZ *Journal f. Med., Chir. u. Geburtshülfe.* 1. Hest. SAUTER *Museum der Heilkunde.* 1. B. N. 39. JONAS in HORN *n. Archiv.* 2. B. p. 276. HERBER in HUFELAND 1. c. 36. B. 6. St. WEISE *diss. de dolore faciei prosopalgia dicto.* Jen. 1796. LORREN *diss. de dolore faciei convuls.* Gröning. 1797. HAIGHTON *med. records and research., select. from the papers of a private med. soc. Lond.* 1798, in SCHREGER u. HARLES *Annal. d. newcast. engl. u. fr. Chir. u. Geburtsh.* Erl. 1799. 1. B. 2. St. p. 248. KUNDE *Beobacht. üb. d. Fothergill, Gesichtschmerz.* Salz. 1800. SCHLEGEL *Materialien für die Staatsarzneiwiss. u. pr. Heilk.* Jena 1805. 2. Th. 4. Samml. LANGENHECK *Pr. de nervis cerebri in dolore faciei consideratis.* Goett. 1805. Gött. *Anzeig.* 1806. p. 751. J. LEYDIG *dolor. faciei dissecto infreorbit. nervo profligati histor.* Heidelb. 1807. RADENMACHER in HUFELAND *Journ.* 2. B. p. 614. KLEIN in HESOLD *Chiron.* 2. B. p. 157. LEUTHNER *diss. de dol. fac. Fothergillii.* Würceb. 1810. MACLIN *Sour. de méd.* CORVISART *etc.* 1811. Nov. p. 331. Et: *Recherches et obs. s. la neural. faciale.* Str. 1817. HARTMANN *diss. sistens observat. quosdam de prosopalgia.* Praes. AUTENRIETH. Tüb. 1811. GERZEN in WEBER *Samml. med. pract. Dissertat. v. Tübingen.* *ib.* 1820. St. 1. JACKSON *the new England Journal of medicine and surgery.* Vol. III. 1813. April. N. 2. FRICHER *diss. de secundo turco nervi duri in prosopalgia.* Praes. AUTENRIETH. Tüb. 1813. MAEUS in HUFELAND *Journ.* 1813. Sept. p. 109. TRAIL *diss. de neuralgia.* Edinb. 1815. MURRAY *an essay on neuralgia.* New-York 1816. GROSSKOPF *treatise on the tic douloureux or rheumatisme of the nerv. with treatm. and alleviat. of this hitherto impenetrable disease.* Lond. 1817. WOSKRESENSKI *diss. anet. therap. de dol. fac.* Mosqu. 1817. BOYER *tr. des malad. chir.* Par. 1818. T. 6. p. 313—337. *Dictienn.*

des



des sc. méd. T. 25. p. 519 sq. Journ. supplément. au dictionn. des sc. méd. T. 7. cah. 26. p. 171. RICHMOND v. ein. Gesichtsschm., d. durch kohlens. Eis. behandelt wurde. Ex Lond. m. and phys. journ. 1821. Septbr. in GERSON u. JUL. Mag. 1822. Bd. 3. p. 343. G. NESSER HILL Fall v. Fotherg. Gesichtsschm. ex Edinb. m. and s. j. 1822. Apr. in GERSON u. JUL. 1822. Bd. 3. p. 438. PALLETTA v. d. Behandl. des Fotherg. Gesichtsschm., ex Annal. univers. di med. 1822. Septbr. in GERSON u. JUL. Mag. 1822. Bd. 5. p. 422. G. D. YEATS histor. of a sever. cas. of neuralg., commonly called *Tic doulour*, etc. Lond. 1822. R. HUTCHINSON cas. of neuralg. spasmod., commonly termed *Tic douloureux*. 2. ed. Lond. 1822. et in The Edinb. m. and s. j. 1822. N. 72. Cfr. Rhein. Jahrb. 1822. Bd. 6. St. 2. p. 1. St. 3. p. 98 et 119. FARINA diss. de neuralg. facial. curat. Bon. 1822. FR. BIRD üb. d. Nutz. des äusserl. Gebr. d. kalt. Wass. in der Prosopalg. Fotherg. in HOHN Archiv. 1823. St. 1. p. 106. R. EVANS cas. of neuralg. of the face and painfull affect. of the limbs successfully tr., in The Edinb. m. and s. journ. 1824. p. 278. G. A. BORTHWICK case of *Tic doul.*, successful. tr. ib. p. 283. CH. BEW opinions on the cause, and effects of the disease denominat. *Tic douloureux*. Lond. 1824. E. W. NOLLAN diss. prosopalgiae adumbratio. Berol. 1824. J. F. W. HÜGEL disquisit. neuralg. facial. pathol. Berol. 1824. C. H. W. BARTH mehrjähr. sorgfält. (in semet ipso) angestellte Beobachtung. üb. d. Gesichtsschmerz. Halle 1825. F. H. NEUBERT diss. de prosopalgia. Berol. 1825. E. TH. HALPER diss. de prosopalgia. Berol. 1825. Journ. complément. 1826. Cah. 100. Octbr. p. 368. SCHRÄMLI Beobacht. ein. heftigen Grad. v. Gesichtsschm. in Verhandl. d. med.-chir. Gesellsch. des Canton Zürich im J. 1826. Zür. 1827. J. L. HAYES diss. de prosopalg. nervosa. Pest. 1826. SAMUEL mehr. Fälle v. periodisch. Gesichtsschm. in RUST Mag. 1826. Bd. 25. H. . p. 456. H. HALFORD üb. d. *Tic doul.* ex The med. gaz. in FRONIER Notiz. 1826. Bd. 21. N. 21. et GRAYE u. W. Journ.

- Journ.* 1834. *Bd.* 21. *H.* 2. p. 294. 3). A. TH. BOLLMANN  
diss. de prosopalg. nonnulla. Berol. 1829. *Bullet. des ec.*  
méd. 1829. *Mars.* p. 437. K. BOSCH üb. d. Erkenntnis u.  
Behandl. des Fothergill. Gesichtschm. Freib. 1829. SUR-  
PERT Prosopalgie, in HUFELAND *Journ.* 1829. *Decbr.* p. 123.  
W. ELWERT period. Gesichtschm. durch Chinin geheilt;  
in *RUST Mag.* 1830. *Bd.* 31. *H.* 1. p. 104. PICHONIERE  
Fall ein. Gesichtschm. u. schwarz. Staar. durch Electro-  
punctur geheilt, ex la Cliniq. 1829. *N. 11.* in GERSON u.  
J. *Mag.* 1830. *St.* 3. p. 491. SACHS üb. Prosopalg. u. Aku-  
punktur, in CASPER *Repertor.* 1832. *Bd.* 32. *H.* 1. S. HOY-  
MANN diss. de prosopalgia. Vind. 1832. L. J. SCHMIDTMANN  
(2) Beobacht. üb. d. Fotherg. Gesichtschm., in HUFELAND  
*Journ.* 1832. *Jul.* p. 29. HALLIDAY considérat. pratiq. sur  
les neuralg. de la face (ex Anglico vers.) Par. 1832. HAS-  
BACH Fothergill. Gesichtschmerz, in HUFELAND *Journ.*  
1832. *Decbr.* IV. 5). FRITSCH Heilung ein. Neuralg. facial.  
durch Ferr. carbon., in HUFELAND *Journ.* 1832. *Octbr.*  
p. 107. C. BÄHREN diss. de prosopalg. Fotherg. Berol. 1833.  
MANTER Fotherg. Gesichtschm. durch Ciuta u. Calom.  
geheilt, ex ejusd. *klin. Beiträg.* N. 4. in GRAEFER u. W.  
*Journ.* 1833. *Bd.* 20. *H.* 2. p. 322. DELBAU Heil. des Ge-  
sichtschm. durch Belladonnabrei; in FROBIEP *Notiz.* *Bd.* 37.  
N. 4. A. VIEPHAU üb. d. Durchschneid. der Nerven des  
Gesichte (in prosopalg.), ex ejusd. *Nouv. éléments de méd.*  
opérat. T. 2. in FROBIEP *Notiz.* *Bd.* 37. N. 1. p. 108.  
WINDISCH neuralg. facial, in SCHMIDT *Jahrb.* 1834. *Bd.* 3.  
p. 201. CARBON DE VILLARD pract. Bemerk. üb. d. N. su-  
pra orbital. etc. ex *Journ. des conn.* 1834. *ib.* p. 71. J. SCOTT  
cases of tic douloureux and other form. of neuralg. Lond.  
1834. Vers. germ. A. HILDEBRAND. Berl. 1835. DE LA  
PORTE üb. Behandl. d. Neuralg. (faciei), ex *Journ. des*  
*connaissance. méd.* 1834. *Jan.* N. 6. in GERSON u. J. *Mag.* 1834.  
*Spitzb.* *Octbr.* p. 267. BELLINGHRI annot. sulla neuralg.  
della faccia; in OMIDDI *annal.* 1834. *Apr.* fasc. 70. et in  
*FROBIEP Notiz.* 1834. *Bd.* 41. N. 11. F. SEURIC diss. de  
proso-

prosopalgia. Vindob. 1834. CHAPMAN *Bemerk. üb. Tic doul. mit Fäll. ex Americ. Journ.* 1834 N. 28. in SCHMIDT *Jahrb.* 1836. *Spptb.* 1. p. 271. F. C. DRAEHLER *diss. de prosopalgia rheumat. . . adnexa epicrisi.* Prag. 1834. SHURN *neuralgia facialis d. linken Seite; ex Journ. des connoiss. méd.-chir.* 1834. Octbr. in SCHMIDT *Jahrb.* 1836. *Spptb.* 1. p. 251. FRANC. HAWKINS *Neuralgia des Ram. supraorbit.* v. 1. *Acta des 5. Nervenpaars;* ex *Lond. med. gaz.* 1835. Vol. 16. Jul. in SCHMIDT *Jahrb.* 1836. *Spptb.* 1. p. 250. F. OCCULI *diss. de prosopalgia.* Vindob. 1835. J. RANKINE u. LICHENT *Beob. üb. d. Behandl. des Gesichtschm.; ex The Edinb. med. and surg. journ.* Vol. 41. N. 118. p. 132, in *N. Samml. auserl. Abh.* 1835. Bd. 17. St. 2. Abh. 4. p. 335. G. H. SCHREIER *diss. de prosopalgia.* Lips. 1836. SCHÜLER *diss. de prosopalgia.* Berol. 1836. F. WUNDELSTADT *üb. d. Strammonium, als Specific. geg. d. Fothergill. Gesichtschm., in HUFELAND Journ.* 1836. Nour. p. 100. H. DOTY *diss. de neuralgia (faciali).* Ticin. 1836. J. HRYGAY *on tic doulour, or Neuralg., together with a few cursory remarks on intermitt. fever and its suppos. connexion with the former.* Lond. 1836. A. M. HORNUNG *prosopalgia, in Oesterr. med. Jahrb.* 1836. Bd. 10. St. 3. p. 399. et 1839. Bd. 29. St. 4. p. 509. FLEISCHMANN *üb. den Gesichtschm. in HUFELAND Journ.* 1836. St. 6. p. 25. G. B. BERTOLI *nonnulla de cura neuralg. faciei.* Pavia 1837. ZACHAR. BELLINI *diss. de prosopalgia.* Pav. 1837. J. BOYTANI *diss. de prosopalg. ac de specifica sulphat. chinin. una c. opio in illam virtute.* Pav. 1837. C. A. TOTT *ein Fall v. glücklich geheilt. Gesichtschm. in HUFELAND Journ.* 1837. Febr. p. 95. Beob. 5. BENATTI *Prosopalg. durch Electricität geh. in Oesterr. med. Jahrb.* 1837. Bd. 12. St. 2. p. 496. A. ZEUBER *dem Fothergill. ähnlicher Gesichtschm. a. mechan. Ursache, in Oesterr. med. Jahrb.* 1837. Bd. 13. St. 4. p. 577. BEHR *Markschwamm des Magens nach mehrjähr. Fotherg. Gesichtschm. in CAMPER Wochenschr.* 1837. N. 37. F. C. SKRY *üb. Behandl. d.*  
*acut,*

## §. XXVIII.

*Symptomata. Necroscopia.*Sympto-  
mata.

1. Morbus *paroxysmis* et *liberis intervallis* componitur. Varios illi agnoscunt gradus, quorum tantummodo vehementissimus *Tic douloureux Fothergillii* nuncupandus, reliqui vero mitiores, ut *vulgares neuralgiae* considerandi sunt. Primum ex permultis aliorum et quindecim propriis observationibus describere aggredimur, et quidem ab *intervallis liberis* incipiendo. Hisce vigentibus, saltem in malo nondum provento, aegrotus nisi animo plerumque depressus esset<sup>1)</sup>, secunda frui videretur valetudine. Paroxysmus utplurimum extemplo, quasi ab ictu electrico<sup>2)</sup> excitatus, rarius, uti videtur, noctu, adoritur<sup>3)</sup>. Annuntiabatur tamen in quibusdam exemplis, a perceptione odo-

*atut. Neuralg. od. des Tic doulour. ex Lond. med. gaz. Vol. 19. p. 181. in SCHMIDT Jahrb. 1838. Bd. 17. p. 306. SCHAUER der Gesichtsschm. als Symptom; in CASPER Wochenschr. 1838. N. 25—29. C. J. HEIDLER Krampf u. Krämpfe. Prag 1838 (präcipes de Prosop. Fotherg. disserit). LAPPICH hintere Gesichtneuralg. in Oester. med. Jahrb. Bd. 16. St. 2. p. 193. GLASER d. Lehre v. d. Prosopalgie v. physiolog. Standpunkte. Würzb. 1838.*

1) IAM ARISTARUS CAPPADOX (l. c.) asserit: „vita ipsa invisa est, mortem discipiunt.“

2) BOYER l. c. p. 323 „comme des charges électriques.“ Sic observavimus is sento, prosopalgia Fothergillii laborante. Quisque paroxysmus subito et dolore in uno faciei puncto pungente rediit sine prodromis. Ex sched. editoris.

3) Apud 40 aegrotos paroxysmus horis matutinis redibat. BELLINGERI l. c.

odoris nunc grati spirituosus \*) nunc cadaverosus \*), a pruritu in parte doloris futuri, ab aura veluti epileptica \*), a palpitazione vel fornicatione palpebrarum, a peculiari tensionis sensu in palato et in naso \*), et a contractione dolorifica brachii \*).

Dolor nunc spatium angustum, veluti punctum occupat, nunc latius extenditur. Detinet vero ille, nunc locum, ubi nervus *orbitalis inferior* per foramen infraorbitale egreditur; nunc ubi *nervus facialis* in *pedem anserinum* \*) extenditur; nunc ad alias propagines rami primi, secundi et tertii paris quinti, nec non paris septimi \*), ad ramum scilicet frontalem, subcutaneum malae, alveolarem posteriorem, — ad ramum massetericum, buccinatorium, temporalem profundum et superficiale posterioriorem, — et ad ramos superficiales, zygomaticos ac faciales; hinc ad supercilia, genam,

4) LEIDENFROST in diss. FORSTMANNI L. c. grandiv. agn.

5) LÄRTIN *neue Beitr.* I. c. *opusc.* *deur.* *cont.* *deur.* (81)

6) RABN *Beob. v. e. Gesichtschm. m. e. aura epilept. verbunden.* *Mus. d. Heilk.* I. B. p. 302.

7) WOSKRESENSKI L. c. p. 32.

8) STERNBRUCH L. *infra citando.*

9) HORNUNG L. c. *cas. prior*, p. 509.

10) Inter casus 40 bis tantummodo par septimum effectum erat. BRILLINURI L. c. Contenditur, prosopalgiam solummodo in nervis, sensui obedientibus, in ramis nervi trigemini, radicare. Cfr. FR. NOR. AB HILDEBRAND *ann. schol. clin. med. Ticinens.* P. II. Pap. 1830 (Autor choream facialem inter et prosopalgiam distinguit esseritque, se nunquam prosopalgiam e nervo faciali pullulare vidisse). SCHAUER L. c. (nervum facialem non nisi motibus obedire; par trigeminum praeter ceteris affici in tunc doloribus).

gingivas, maxillam superiorem et tempora. Quandoque dolor inter fibras diversas ejusdem nervi fluctuat<sup>11)</sup>; generatim vero stabilis est atque uni loco, plerumque lateris dextri, inhaerens. Enim vero bina solum exempla<sup>12)</sup> numerantur prosopalgiae simul in utroque latere urgentis; quaterve tantum faciei latus sinistri ea detentum observavimus<sup>13)</sup>. Qualiscunque vero doloris sit sedes, vix alius illi aequiparari potest. Superat enim ista prosopalgia atrocitate dolorem dentium auriumque ac aeger desperabundus horrendos edit ejulatus. Verba autem proferre<sup>14)</sup>, manducare et deglutire nequit. Dantur tamen exceptiones, ubi aeger, devicta prima difficultate, dein manducare<sup>15)</sup> et loqui<sup>16)</sup> potuerat. Generatim rudis

11) *Salzb. med. chir. Zeit.* 1806. T. IV. p. 159. Dolorem ex gingivis ad buccas migrasse et vicissim observavi in Judaea Vilmensi.

12) Alterum viri, memoratum a LENTINO l. c. alterum a PUJOL ad FOUQUET casum appellante.

13) MORF quinque casus prosopalgiae, omnes lateris dextri curavit (MURRAY l. c.). P. U. WALTER (l. citand.) vidit semper latus dextrum dolens. FR. AB HILDEBRAND (annal. schol. clin. med. Ticin. P. II. Pap. 1830) contendit, prosopalgiam fere semper in latere faciei sinistro, rarissime in dextro, nunquam in utroque simul urgere. BELLINGERI (l. c.) monet, neuralgiam supraorbitalem semper fere in latere faciei dextro, frontalem multo saepius in sinistro obvenire. Utrum latus affectum sit, casu et fortuito fieri, credit WOLFFENHEIM l. citando.

14) „Les malades n'osent ... ni proférer une seule parole; ils semblent mêmes redouter le plus léger mouvement du corps.“ BOYER l. c. p. 318.

dis partis affectae attactus non solum fertur, sed desideratur, contra vero lenis. Musculi faciei, imprimis levatores labii superioris, levatores anguli oris, masseteres, buccinatores, saepe, at certe non semper; convelluntur, aut rigent<sup>17)</sup>. Strepitum<sup>18)</sup> sub convulsione musculorum faciei nunquam percepimus. Nec vidimus, ut alii, aegros vel humum<sup>19)</sup> vel in genua<sup>20)</sup> concidisse, vel convulsionibus<sup>21)</sup> tentatos fuisse. Facies vigente dolore plerumque rubet et turget<sup>22)</sup>, aliquando pallet<sup>23)</sup> aut livet<sup>24)</sup>. Arteriam temporalem ad crassitudinem calami scriptorii dilatata, chordae metallica instar rigidam bis vidimus<sup>25)</sup>. Similia viderunt alii<sup>26)</sup>. Strias, veluti vibices, in fronte, ad nasi radicem<sup>27)</sup>, non conspeximus; illas vero gingivarum<sup>28)</sup> conspeximus<sup>29)</sup>. Febris nec um-

15) BRITTING narrat, durante paroxysmo, aegrotum mandibulas, linguam at collum absque doloris augmento movere potuisse. (l. c.)

16) REIL l. c. p. 3.

17) BRITTING l. c.

18) HARTMANN l. c. p. 8. Germ. das Schmatzen.

19) BRITTING l. c. 20) LENTIN l. c. 21) FOTHERGILL, REIL.

22) LENTIN, BOEHMER l. c.

23) SAUTER l. c. at duae meae aegrotae.

24) HARTMANN l. c. p. 9.

25) Villaes, in exule Gallico.

26) BOEHMER l. c.

27) WOSKRESENSKI l. c. p. 35.

28) „Das, rothe Zahnfleisch - Streifen.“ v. STEINBRUCH

in HUFELAND Journ. 1816. Apr. p. 77. Jam THILENIUS

(l. c. p. 272) de prosopalgia agens, dixerat: „Hieby war

die besondere Erscheinung, dass das Zahnfleisch über der

leidenden Stelle her mit einem Strohhalmbreiten, sehr hoch-

rothen Saume wie mit einem Bändchen eingefasst war.“

bra<sup>30</sup>); pulsus enim vel normalis, vel sano lentior<sup>31</sup>). Quo fortior dolor, eo brevior insultus: generatim per horae nonnulla momenta durat; raro ultra quartam horae partem et rarissime ad horam<sup>32</sup>) protrahitur. Terminatur paroxysmus dolore *gradatim* decrescente aut *extemplo*, uti accesserat, evanescente, nonnunquam supervenientibus fluxu salivae<sup>33</sup>), lacrymarum<sup>34</sup>), muci narium<sup>34</sup>), et flatuum eructatione<sup>35</sup>). Libera intervalla, quae

paro-

29) In aegro ex alba Rossia, jam a 10 annis prosopalgia laborante, et sacerdote 60 annor., quem die. 26. Mayi. 1828 Novocomi vidi.

30) Notatur (in *Salab. med. chir. Zeit.* 4. B. 1806), pulsum fuisse aliquanto fortiolem, sed simul arat minutus; et SCHLEGEL (l. c.) asserit, pulsum a naturali stata se una quidam vibratione aberrasse, nec duriore, nec fortiore.

31) LENTIN (l. c.) animadvertibat pulsum paulo planiorem, sed tardioram, ita ut 10—15 pulsationes solito horae sexagesimae partis numero decissent.

32) Observavi in Judaea, de qua supra.

33) REIL l. c. ait: „Salivam ingentem copiam ex ductu stemoniano cum levamine exprimebat.“ At vero ptyalismus non semper salutaris hic est; salivationis enim depascantis apud aegrotam, quae ex suppressa poena prosopalgia laborabat, mentio fit in annotatione ad recensionem operum FOTHERGILLII in *Abh. f. pr. Aerzte.* 3. B. BOYER l. c. p. 319. RAST *merkwürdige Metastase*, in HUFELAND *Journ.* 1836, St. 1.

34) C. SPRENGEL *Pathologia.* 3. Vol. MARCUS JONAS l. c. BIRUBE apud WATON l. c. KLEIN in SINBOLD l. c. HARTMANN l. c. p. 11. BOYER l. c. p. 319.

35) BIRUBE l. c. BOYER l. c. p. 319: „lorsque tout un côté de la face est affecté, les larmes, la salive, et le mucus nasal peuvent couler à la fois.“



paroxysmos, sine typo recurrentes<sup>37)</sup>, separant, ad horas, dies, hebdomadas, menses, quin immo ad annos extenduntur<sup>38)</sup>. Rarissimis quibusdam in casibus post paroxysmum tumor partis affectae<sup>39)</sup>, quandoque crusta obiectus<sup>40)</sup>, relinquebatur. Visa quoque est peculiaris sympathia inter dolorem faciei et scrotum<sup>41)</sup>, atque hypochondria<sup>42)</sup>.

2. Fertur C. SPRENGEL casum commemorare, <sup>Necropsia.</sup> ubi tunica nervorum faciei affectorum extensa et sero plena reperta fuit<sup>43)</sup>. Alii<sup>44)</sup> tumorem scirrhosum<sup>45)</sup>, ad latus dextrum protuberantiae annularis

36) JONAS l. c. BIRUDR (Flatus cadaverosum spirebant odorem).

37) Unius tantum prosopalgiae typum servantis fasti medici mentionem injiciat (SCHLEGEL l. c.); existimarim tamen cum HARTMANNO (l. c. p. 7), errorem in diagnosi locum habuisse, morbumque febrem intermittentem constituisse. Cfr. §. seq. (6).

38) Per annum at ultra, scilicet per totum tempus anni 1812 liber a morbo fuit aeger Rossiae albae, de quo supra.

39) DEGENER l. c. BOYER l. c. p. 318. 40) BRUNING l. c.

41) BOHE MONTEAU in *Bibl. méd.* 1818. Oct.

42) Principissa Lubomirsk, Polona, jam multis a mensibus laborabat trismo faciei ad mandibulae inferioris partem sinistram; simul vero obstructione viscerum abdominalium, maxime hepatis. Saepius in jecinoris regione dolores momentaneos atroces patitur, tunc vero trismus faciei cessat; hoc vero redeunte abdomen a dolore liberetur: sic mense Decembri 1803. Ex schedis petris.

43) WOSKRESZENSKI l. c. p. 40.

44) TRIDAUULT et MARECHAL in *Journal général de méd. chir. et pharm.* Vol. 44. Août.

45) In basi cranii. HAYGATE ex *Med. chir. rev.* Jul. 1832.

laris jacentem detexerunt, qui nervum trifaciale  
ad originem ejus circumdabat. Item tumorem  
fungosum ad basin cranii<sup>46)</sup>, nec non dentes<sup>47)</sup>  
et ossa cranii semper immunia<sup>48)</sup>.

## §. XXIX.

## C a u s s a e.

C. prae-  
disponen-  
tes.

1. Feminae frequentius maribus prosopalgiae  
obnoxiae esse dicuntur<sup>1)</sup>. Tempus, quod vitae  
me-

in FRONIEP *Notiz*, Bd. 35, N. 9, p. 137. Tumorem carti-  
lagineum ulceratum in nervo optico sinistro. HAYGATE.  
Tumorem albidum et durum in lobulo anteriori. Frae-  
tarea totum cerebrum emollitum fuit. HOLZ ex Eyr.  
XI. 3, in FRONIEP *Notiz*, 1839, Bd. 10, N. 13, p. 208.

46) MONTAULT in MAGNENIE *Journ. de phys. Août*, 1829,  
p. 115—119. v. FRONIEP *Notiz*, 1829, Bd. 25, N. 11. BRIGHT  
*Fall von Tic. doult. in Folge ein. Geschwulst an d. Basis*  
*cranii; ex The Lond. med. gaz.* 1832, Juni, in BREHEND  
*Repert.* 1832, N. 9, p. 280.

47) HALFORD l. c. (in dentis radice exostosis). CH. BEW l. c.

48) HALFORD (in FRONIEP l. c. p. 333) pauca quidem, at  
pretiosa da imperio ossium cranii in tic douloureux gi-  
gnando verba protulit (protuberantiam invenit in osse  
frontali, ethmoidae at sphenoidae, atque in crista galli  
una cum ossis frontalis at falcis carabii crassitie, nec non  
exostosis et exfoliationes ossium faciei et alveolae).

1) Inter septuaginta sex casus, triginta duos viros, mulie-  
res autem quadraginta et unam reperit HARTMANN l. c.  
p. 6 (da reliquis tribus sexus non commemorabatur). SIM-  
HOLD (l. c.) inter nonaginta duos casus triginta octo viros  
et quinquaginta quatuor mulieres. Contra vero inter quin-  
decim, a me observatos, aegrotos novem erant mares.  
Inter sex aegrotos quatuor erant mares et duo feminae.  
P. U. WALTHER l. citand. FOTHERGILL, PUJOL, THOURNT

medium sequitur, maxime huic morbo favet, ita tamen ut feminae citius, mares tardius in eum incidant<sup>2)</sup>. Prosopalgia nobis saepius inter divites quam inter pauperes obvenit<sup>3)</sup>, alii contrarium observarunt<sup>4)</sup>. Ad clima quod spectat, morbum, de quo agitur, in Lithuania vix crebrius quam in Austria et Insubria conspeximus; generatim tamen magis septentrioni addictus videtur<sup>5)</sup>. De impe-

et BELLINGERT dispositionem sexuslem non agnoscunt; quorum ultimus autem addit (l. c.): „die grössere Hälfte waren Unverheuratete,“ quod THOURETI et REILII experientie jam compertum habemus.

2) „In casibus viginti et uno, ait HARTMANN (l. c.) aetas virorum memorabatur, et numerus medius annorum erat quadraginta et unius; in viginti quatuor casibus, in quibus aetas mulierum notabatur, numerus medius erat quadraginta et duorum annorum, ita ut id fere, quod medium vitae sequitur, tempus, apud utrumque sexum, huic morbo praecipue sit obnoxium, sed notandum, mulieres multo rarius invadere hunc morbum, si sexagesimum jam excesserunt annum, viros vero post ipsum octogesimum quartum vitae annum adhuc prosopalgia corripit, et mulieres iutardum a vigesimo ad tricesimum annum jam hoc morbo vexari, viros vero potius, si tricesimum jam excesserunt.“ „Alle 40 Kranke, bis auf 2 Geschwister von 25 u. 31 J., waren über 40 J. alt.“ BELLINGERT l. c.

3) Nullum exemplum prosopalgiae in nosocomio Vindobonensi magno octo annorum spatio vidi, — quatuor in urbe. Quinque, quos Vlnae vidarem, omnes vel superiorem civium classem spectebant, si duos Judaeos utriusque saxus excipiam, vulgares quidem, at commode viventes. HAASER *chron. Krankheit*. etc. Bd. 2. p. 406, et P. U. WALTER l. citand., assentiunt.

4) HARTMANN l. c. p. 161.

imperio constitutionis annuae in prosopalgiam, observationes desiderantur <sup>6)</sup>). Morbus ille plerumque in hominibus haemorrhoidibus, arthritidi, vitiis viscerum abdominalium <sup>7)</sup> et catameniorum, scirrhus <sup>8)</sup>, plicae <sup>9)</sup> obnoxiiis, jure aliquando haereditario <sup>10)</sup> evolvitur; quandoque vero perfecte sanos invadit <sup>11)</sup>).

C. excitantes.

2. Inter causas prosopalgiam excitantes numerantur vulnera capitis <sup>12)</sup>, larvae oestri <sup>13)</sup> alia-

5) Parmulta exempla patri mao Patropoli obveniant, ac de non paucis Mosquae ab egregio Dr. MUDROW observatis loquitur illius discipulus WOSKRESENSKI l. c. Et in America septentrionali prosopalgiam frequentar obvenire MURRAY opusculum testatur.

6) Argumentum istud per transennam BORHMERS tetigit. (BLUMENBACH *Med. Bibl.* 3. B. 2. St.). Hiemis 18 $\frac{1}{2}$  et 18 $\frac{3}{4}$  constitutio prosopalgis rheumaticis et arthriticis favabat. SCHAEFER l. c. BELLINGERI morbum fera saepe in autumno et verno tempora incipere videbat. Sunt quidam, qui prosopalgiae epidemicae mentionem fecerint (SANDRAS in *Bullet. de therap.* 1835. *Févr.* T. 8. l. 3. RENNUS in *Archiv. gén. de méd. Par.* 1836. *Juin*), qui casus autem, typum intermittentem observantes, ad febras hujus generis laryngitis pertinent, quarum exempla sunt innumera. Cfr. P. l. ed. alt. Vol. I. S. I. C. II. §. XXIII. 3.

7) WILSON in *The Edinb. m. and s. j. Apr.* 1823. MIGNON in *Houw Archiv.* 1824. *Sptbr. Octbr.* p. 250. RANKINS l. c.

8) FOTHERGILL, HAYGATE II. cc.

9) Plicosa erat vetula judaea, quam Vilnae prosopalgia affectam curavi, plicosis nager Rossiae albae.

10) ELBAESSER in *HUFELAND Journ.* 1824. *Aug.* p. 38 (femina 48 annor. at illius soror at frater. Pater neuralgia manus laborabat).

11) MASIVS l. c.

aliaque corpora extranea <sup>14)</sup> nervos faciei velli-  
cantia <sup>15)</sup>, operatio cataractae <sup>16)</sup>, fucus <sup>17)</sup>, tran-  
spiratio suppressa <sup>18)</sup>, aurium fluxus cohibitus <sup>19)</sup>,  
her-

12) KLEIN l. c. p. 157. BELLINGERI l. c. *Tic douloureux nach einer tödtlichen Kopfverletz.* in HOLSCHER *Annal.* 1837. B. 2, H. 1.

13) HAIGHTON l. c.

14) *Ut frustulum terrae porcellaneae.* JEFFERYS in *The Lond. m. and s. j. edit.* by MACLEOD Vol. 49 (*Quo frustulo remoto prosopalgia, quae 14 annos saeviebat, disparuit.*) *Festuca ossis.* ZHUBER l. c. p. 578.

15) MONTAULT *Gegenwart ein. schwammig. Geschwulst an der Basis des Gehirne; Druck auf das 5. Nervenpaar; Gesichtschmerz u. Leiden des Auges auf d. entsprechenden Seite* l. c. „*Vergrößerung eines Knochens des Kopfes — Ablagerung eines Knochenstoffs in einem weichen Theile, wodurch der Nerve gereizt wird.*“ HALFORD l. c. p. 300.

16) J. MOLINART *diss. de scleronyxiidis sequellis earumq. cura.* Pap. 1823. CARON DU VILLARDS *pract. Bemerkung. üb. d. Neuralg. supraorbital. . . welche sich nach Staaroperat. entwickelt.* *Ex Journ. des connaiss. méd.* 1834. Mars, in SCHMIDT *Jahrb.* 1834. B. 3. p. 71.

17) WOSKRESENSKI. *Inficinas caeterum non ibo, vulgus faminarum Rossicarum mirum in modum faciem cerussae obducere.*

18) JONAS l. c. *Salzb. med. chir. Zeit.* (miles quum sudore perfusus per flumen equitaret). SCHLEGEL l. c. (Doliorum faber vino deditus, postquam saepius refrigerio et madori expositus esset). LEIDENFROST ed FORSTMANNI *diss. c.* THOURET l. c. *Nobilis Lithuanus, quum hyeme an. 1812 belli tempore a militibus vehementer terrafacta ac indusio tantum obtecto e lecto fugam in nemora petiisset, illico in rebellem prosopalgiam incidit. Ex refrigerio morbum contraxit niger Rossiae elbae.*

19) LENZIN in BLUNENBACH *med. chir. Bibl.* 2. B. p. 156. *Frank Prax.* II, 1. 2. 1.

herpes<sup>20</sup>), scabies<sup>21</sup>) et erythema gutta rosea<sup>22</sup>) retropulsum, forte metastasis urticationis ad nervos<sup>23</sup>), contagium venereum<sup>24</sup>), frequentissime suppressio haemorrhoidum<sup>25</sup>), menstruorum<sup>26</sup>), infarctus abdominis<sup>27</sup>), decubitus diuturnus<sup>28</sup>), animi pathemata, praesertim moeror gravis, diuturnus, ira cohibita<sup>29</sup>) et refrigeratio<sup>30</sup>).

### 3. Morbi

20) MASIUS l. c. RADENACHEN l. c.

21) FOTHERGILL l. c.

22) FR. HOFFMANN l. c.

23) FORSTMANN, HARTMANN l. c.

24) WATON, MAMER l. cc.

25) In duobus meis aegrotis. Cfr. DEGENERUS, REIL, HARTMANN, BELLINGHRI.

26) RITTER in HUFELAND Journ. 17. B. 3. St. p. 37. SAUTER l. c. BIRD l. c. Exceptionem nobis narrat BRANTING l. c. ubi, ex quo malum aegrotam 34 annorum invaserat, mensium fluxus consueti largior aderat, atque cum impetu rectam tenabat rationem, quamvis tunc temporis, quo BRANTING aem videbat, quadragesimum jam ageret annum; evanescentia vero jam menstruationis dolor, jam dimidium sanatus annum, tamen non amplius apparuit.

27) VOLGER, LÖNNEN, THUESSINK, LENTIN.

28) Sacerdos (§. XXVIII, 1 (95)) memoratus Novocomensis, vir obesus et plethoricus, in terribilem prosopalgiam incidit dum, ob pedis sinistri vulnus, per plures menses lecto decumbere debuerit. Tempore aestivo ista aeger paroxysmos tunc douloureux lateris sinistri denue experitur.

29) In plurimis aegrorum meorum gravia animi pathemata praegressa erant, ac duae feminae ante morbi evolutionem per plures menses diu noctuque lacrymis innataverant. Cfr. WEINHOLD in HUFELAND Journ. 1812, Oct. p. 111. Contra in vivo ex Rossia alba, de quo supra, gravia animi pathemata temporis belli 1812 tolerata, morbum suspenderunt.

30) Positio lecti prope murum, cujus altera superficies a

3. Morbi jam stabiliti paroxysmi provocari C. paroxysmum  
solent ab ira<sup>31)</sup>, terrore<sup>32)</sup>, luce nimia<sup>33)</sup>, at-  
tactu diversarum regionum corporis<sup>34)</sup>, maxime  
a leni loci affecti attactu<sup>35)</sup>, a manducatione<sup>36)</sup>,  
sermocinatione, risu et marium emunctione<sup>37)</sup>.

4. *Causa proxima* prosopalgiae quaerebatur C. proxima.  
in vitio arthritico<sup>38)</sup>, catarrhali<sup>39)</sup>, abdominali<sup>40)</sup>,

O 2

car-

foris erat, in uno aegrorum meorum causam prosopalgiae constituere vidabatur; neque mirum, faciam, utpote unicam corporis, cacterum tepore lecti fruentia, denudatam partem, per horas septem at ultra frigori humido expositam, prae aliis locis affici.

31) *Salsb. med. chir. Zeit.* l. c.

32) Uxor fabri scriuarii, quae datem jam mansens a prosopalgia liberata erat, post terrorem ex vicino incendio ortum, denuo prosopalgiae paroxysmo subito invadabatur teste BRITING. Felicius fuit Judaea Vilnensis, quae jam a duobus annis a prosopalgia immunis vivens, quamvis ab incendio propriae domus valde petra terrestructa fuerit, attamen morbi reditum perpessa non est.

33) LENTIN agricolam vidit, cui aspectus parietis albi, quam sol affulgebat, dolorem faciei movebat, l. c.

34) RHEI l. c. „Haud vero dolor ab ipsa haemorrhoidem coecorum frictione refricabatur.“

35) MASIUS, RHEI, HAIGHTON, JONAS, LENTIN, RAST etc.

36) BOYER l. c. p. 321.

37) Sic in vix memorato sacerdoti. Cfr. BOYER l. c. p. 320 et 321.

38) FORSTMANN l. c. QUENSEL in *HUFELAND Journ.* 13. B. 4. St. p. 134.

39) LEIDENFROST l. c. BELLINGRI.

40) LENTIN l. c. J. HAYGATE, RANKINE (quatuor affectus), BIRD? BURN (deprehendebat post prosopalgiam plures annos durantem sarcoma medullare ventriculi). ll. co.

carcinomatico<sup>41)</sup>, in malo nervi ipsius topico<sup>42)</sup>, in morbose canalium osseorum, quos nervi faciales intrans, angustatione<sup>43)</sup>, et in asthenia, ut dicunt, directa<sup>44)</sup>. Illarum opinionum pro varia rerum positione, modo unam modo alteram admittimus.

## §. XXX.

*Diagnosis. Prognosis.*

Fr. ad  
neuralgias  
revocatur.

1. Priusquam vero nos ad prosopalgiae variam indolem perscrutandam accingamus, de morbo generatim conveniendum est. Eum potius ad *neuralgias* quam ad *neuritides* revocamus, cum fugax illius apparitio et indoles apyretica, inflammationem neutiquam admittere sinat<sup>1)</sup>. Nomen tunc douloureux tantummodo maximo neuralgiae facialis gradui quadrare, jam monuimus.

Difficilis  
confusio.

2. Caeterum neuralgia ejusmodi generis vix errori subjici potest. Quamvis enim nullum agnoscat signum pathognomicum<sup>2)</sup>; attamen quis hodie-

41) FOTHERGILL. BOYER l. c. p. 317.

42) LANGENBRUCK. HATGATE l. c. (nervorum radices desorganisatas).

43) THOURET l. c.

44) HARTMANN: „Causa prosopalgiae proxima est aucta in loco affecto incitabilitas ejusque in paroxysmo explosio.“ „*Aufgehobenes Gleichgewicht in der Reaction*“ ECKHART in GRAEFH u. W. Journ. 1826. B. 7. St. 4.

1) MARINO (l. c.) affinitatem prosopalgiam inter et ischiadem statuit, quae falsa est, cum ischias ad neuritides pertineat.

2) MURRAY l. c. *motus convulsivus musculorum faciei* neutiquam pro constanti prosopalgiae signo declarare debuisset.



diedum<sup>1)</sup> morbum periodicum, acerbissimo et fugaci, circa ramos faciales quinti et septimi paris nervorum, dolore insignitum, qui dolor attactum, dummodo fortem, nequaquam respuit et saepe convulsionibus musculorum faciei stipatur, quis, inquam, talem morbum vel cum *rheumatismo musculorum faciei*, vel cum *hemicrania*, vel cum *trismo*, vel cum *odontalgia*<sup>4)</sup> confunderet?<sup>5)</sup> *Rheumatismus enim musculorum faciei* dolore constante, motum partium affectarum impediens<sup>6)</sup>, attactum potissimum rudiorum fugiente, noctuque maxime urgente, stipatur. *Hemicrania* ut plurimum typo exacte alligatur<sup>7)</sup>, signis prodromis annunciatum, ad plures horas protrahitur, et ad amplam encephali, plerumque lateris sinistri<sup>8)</sup>, superficiem extenditur. *Trismus* vix dolorem socium agnoscit<sup>9)</sup>. De *odontalgia* alibi<sup>10)</sup>.

### 3. Pro-

3) Temporibus, ubi doctrina prosopalgiae necdum ite ex-culta fuisset, uti aevo nostro, principes medicorum in diagnosi errare potuerant, uti alibi relata ad hemicraniam observavi. (P. II. ed. ult. Vol. I. Sect. 1. C. II. §. VIII. 4 (37)).

4) Diagnosis scrupulosissime v. apud J. Scott l. c.

5) Cfr. Boyer l. c. p. 323—325.

6) Fuzol ait (l. c. p. 9) se videri mulierem, quae ei affirmabat, durante acerbissimo doloris faciei peroxismo se in sua penitus potestate semet habere, ut omnes motus musculorum faciei possit impedire, sed eam ob causam id omittit, quia existimet, eos levaminis aliquid sibi adferre (!).

7) P. II. ed. ult. Vol. I. Sect. 1. C. II. §. VIII. 4 (23). 8) Ib. (37).

9) Cap. XIII. §. LXV. 2.

10) P. III. Vol. I. S. 1. C. XIX. §. LXXIX. 2.

- Pr. indol- 3. Prosopalgiam pro re nata *variae* prorsus  
les. *indolis* esse, illius aetiologia et therapia docent.  
Juvabit hinc eam in varias species dividere.
- Pr. traum- 4. Quum facies saepe violentiis externis ex-  
matica. ponatur, quaestiones circa illas, forte diu ante  
morbi nostri evolutionem praegressas, nunquam  
negligendae forent. Et dentium, et antri High-  
mori, et sinuum frontaliū examen commendari  
merentur.
- Pr. inflam- 5. De indole prosopalgiae quandoque *inflam-*  
matoria. *matoria* vel ex propria experientia certissimi su-  
mus; concludimus ad eam in individuo caeterum  
florido, laute vivente, suppressione catameniorum  
vel haemorrhoidum laborante, inprimis si sub  
doloris insultu vasa sanguinea faciei turgeant.
- Pr. rheu- 6. Prosopalgiam *rheumaticam* esse supponi-  
matica. mus; si perspiratio suppressa illi ansam dederit,  
si aeger aliunde affectionibus rheumaticis, aut ca-  
tarrhalibus, inprimis coryzae, subditus vixerit,  
sique morbus, plus quam reliquae prosopalgiae  
species ad rheumatismum musculorum faciei ac-  
cedat<sup>11)</sup>,
- Pr. meta- 7. Prosopalgiam *metastaticam* eam esse, quae  
statica. ex morbis cutis aut aliis incaute fugatis originem  
ducit, non est cur moneamus.
- Pr. gastri- 8. Prosopalgiam saepe ex *vitiis abdominis*  
ca. emanare, nemo mirabitur, qui perpenderit nervum  
in-

11) Prosopalgia, cujus historiam (l. c.) JONAS tradidit, ma-  
xime ab afflatu aquilonis sub itinere evoluta est. DRANK-  
LER l. c.

intercostalem ad plexum coeliacum constituendum concurrere eumque a secundo ramo paris quinti nervorum cerebri proficisci. Cum prosopalgia plerumque in latere faciei *dextro* obveniat, nonne illa saepius ex *affectione hepatis* repetenda? Quomocunque res se habeat, originem abdominalem prosopalgiae exspectamus: in hominibus vitam sedentariam ducentibus, alvi obstructioni, haemorrhoidibus, obnoxiis, per animi pathemata vexatis, habitumque plus minus cachecticum exhibentibus.

9. Praesente abdominis vitio, et accedente <sup>Pr. arthritica.</sup> perspirationis suppressione, ad *indolem arthriticam* prosopalgiae constituendam nil nisi regnantes in familia aegrotantis podagra <sup>12</sup>), herpes <sup>13</sup>), aut calculi urinales <sup>14</sup>) requiruntur.

10. Vitae periodus, in quam prosopalgia in- <sup>Pr. carcinomata.</sup> cidere, et societas, quam cum scirrho inire solet, dolorum carcinomaticorum qualitas lancinans ac fugitiva, nec non praestantia conii maculati adversus prosopalgiam, haec omnia, inquam, *Fothergillum* ad naturam hujus morbi *carcinomaticam*

12) *Arthritidem* causam esse prosopalgiae contenderunt LUDOVICUS, FORSTMANNUS, QUENSEL, SPIELMANNUS (*Fransös. Annal.* v. HUFELAND. 2. B. p. 179. 3. B. p. 219) et ROEMER (*Fasc. obs. med. pr. Argent.* 1787); qui ultimus de viro sexaginta sex annorum narrat, dudum podagra laborante, quae, oborto dolore faciei, prorsus disparuit.

13) De indole illius *erthritica* lege hujus operis P. I. ed. alt. Vol. III, S. 2, C. XVIII, §. LI. 6.

14) FR. HOFFMANN l. c.

cam statuendam induxerunt. Ac re quidem vera, opinio hujusmodi, quam SELLE<sup>15)</sup>, et quodammodo S. G. VOGEL<sup>16)</sup> amplexi sunt, eo majoris apparet momenti, si perpendamus: — nervos in affectionibus cancrrosis magnam scenam ludere<sup>17)</sup>, *plicam*, quam pro morbo leproso<sup>18)</sup>, et lepram, quam pro stirpe carcinomatis, cum aliis<sup>19)</sup>, declaravimus, pluries, ut dictum est<sup>20)</sup>, cum prosopalgia societatem inire, — *Sueciae* morbum endemicum, forte leprosum, atrocissimo dolore illi prosopalgiae simili insignitum esse<sup>21)</sup>; — et tumorem scirrhusum in homine prosopalgia laborante, ad originem nervi trifacialis repertum fuisse<sup>22)</sup>. „Vidimus praeterea neuralgiam Fothergilli ab apparitione ulceris cancrrosi ad faciem, evanuisse, eoque sanato, recruduisse“<sup>23)</sup>.

## 11. Pro-

15) l. c.

16) *Handb. d. prakt. Arzneiw.* 2. Aufl. 2. B. p. 143.

17) Nemo de hoc argumento pulchrius scripsit SCHARFNERO (*Versuche aus d. theoret. Arzneyk.* 2. Th. Ueb. Nerven u. c. Theil ihrer Krankh. Nürnberg. 1784. p. 195). Legatur et BOERHAAVE (de morb. nerv. p. 328). RUTSCH (apud BOERHAAVE l. c. p. 268). BRUGMANN (BERNARD diss. Quæst. med. argumenti. Lugd. Bat. 1796 ad finem). SOEMMERRING über d. Saft etc. p. 200. et cap. nostrum de morb. carcinom. P. III, Vol. II.

18) P. I. ed. alt. Vol. III, S. 2. C. XXII, §. LXXIII, 1. Quotidie nova facta, ad hanc opinionem firmandam idonea, colligo.

19) ALARD *hist. de l'éléphantias. des Arab.* Paris 1810 (Cancer est communis inter plicosos).

20) §. XXIIX. 1.

21) SAGAR syst. morb. p. 220. Cfr. VOGEL l. c. p. 144.

11. Prosopalgiae *indolem syphiliticam* nec ad-<sup>Pr. syphi-  
litica.</sup> mittere nec plane rejicere audemus. Sane morbi, quo magis ad carcinoma accedunt, eo magis complicationis syphiliticae suspicionem movent.

12. Si pathologi, qui causam proximam pro-<sup>Pr. nervea.</sup> sopalgiae, — „potius in fluido quodam imponderabili, cujus conductor nervus est, aut in nervo, qua conductore hujus fluidi, quam in chronica atque palpabili mutatione materiei ponderabilis nervi,“ — quaerunt, a veritate non aberrant, species *prosopalgiae nerveae* aut *dynamicae*, quam in hystericis et in hypochondriacis, in hominibus venere exhaustis expectaremus, statuenda foret. Interea, saltem id ex praxi compertum tenemus, in prosopalgia cujuscunque demum indolis variam aegrorum sensibilitatem, variasque virium vitalium conditiones, imperium conspicuum exercere<sup>24)</sup>, ac remediis nervinis saepe laudem haud recusandam esse.

13. Prosopalgia difficilis curationis est mor-<sup>Prognosis.</sup> bus<sup>25)</sup>, qui, quin longaevitati obstat, miseris interdum, omnibus artis auxiliis irritis, usque ad vitae finem excruciat<sup>26)</sup>. Attamen virum prospera

22) §. XXVIII. 2.

23) Ex schedis paternis.

24) Prosopalgiam rarissime ab initio nervosum esse, sed longiore decursa id fieri, censet BELLINGHUI l. c.

25) „Les nombreux remèdes qu'on a proposés contre cette affection procurent quelquefois du soulagement, mais très rarement une guérison complète.“ BOYER l. c. p. 325. 326.

26) LUDOVICUS (l. c.) de medico narrat, hoc dolore, donec senile confectus vita decederet, vexato. De aegrota fortur

spera omnino valetudine gaudentem coram oculis habemus, qui decem abhinc annis prosopalgia inflammatoria, per mensis unius spatium, laboraverat<sup>27)</sup>. Vetulam a dira prosopalgia liberavimus, quae, postquam per biennium sanitate usa fuerat, tandem apoplexia fulminante periit. Sors ista est plurimorum. Tres alios aegros prosopalgia rheumatica et gastrica laborantes, saltem quin jam a longo tempore paroxysmos doloris experirentur, remisimus. Cum enim prosopalgia ad morbos periodicos spectet, probe cavendum, ne intervallum liberam solito diutius protractum pro perfecta sanitate jactemus. Nec sanatis ii adscribendi sunt aegroti, qui, prosopalgia liberati, brevi post in alium pejorem etiam morbum e. g. in cancerum<sup>28)</sup>,

hy-  
(Abhandl. f. prakt. Aerzte, 3. B. 1. St. p. 152), quae ab underigesimo anno ad septuagesimum, prosopalgiam patiebatur. FOTHERGILL (l. c.) feminea memor est, quae, scabie retropulse, ab underigesimo anno ad quinquagesimum prosopalgia cruciabatur. RAST (l. c.) de prosopalgia refert, quae decem annos et quod excurrit, durabet. Hist-  
storia morbi quarta, quam HARTMANN enarrat (l. c. p. 56)  
demonstrat, morbum hunc interdum ad summa aetatis ve-  
stigia homines comiteri. LENTIN (l. c.) mentionem facit  
prosopalgiae 30 annor., quae tamen intervalla libera sex  
mensium et quod excurrit, habebat. „Le tic douloureux,  
abandonné à lui même, dure presque toujours aussi long-  
temps que la vie.“ BOVEN l. c. p. 325.

27) Exul Gallus, de quo supra.

28) MAIUS (l. c.) testatur carcinoma prosopalgiae et vitae  
finem posuisse; enimvero postquam aliquamdiu duraverat  
morbus, verruca oriebatur scirrhosa, qua abscessa, car-  
cinoma faciei aegrotum internecabat. Commemorat LAM-

hydropem ascitem<sup>29</sup>), melancholiam<sup>30</sup>), inducunt<sup>31</sup>). Contra vero metamorphosin prosopalgiae in herpetem<sup>32</sup>) aliosque morbos cutaneos, pro critica habemus. Diarrhoea cruenta haemorrhoidalis unum aegrotorum nostrorum valde sublevavit.

## §. XXXI.

TIN (HUFELAND *Journ.* l. c.) mulierem quandam, quae per plures jam annos dolore faciei laboraverat, ac tandem carcinomate periit, tam fastidiosum spargente odorem, ut aedes, in quibus diem obierat supremum, per longam tempus non possent inhabitari.

29) KOENEN (L. c.) teste Archiatro GOMMER de aegroto narrat, qui, dum a prosopalgia per quatuor annos durante sponte liberatus fuerat, brevi post hydropem anasarca et escite periit. LENTIN (*N. Beytr.* l. c.) de quadragenario quodam refert, eum sex menses, priusquam exstinguere-tur, cum levissimae doloris de abdominis vitis conquestum esse, pedes intumuisse etc. Sic quoque in Clinico Tübingensi mulier profligato dolore per annum satis bene valebat, quo vero praeterlapsa tempore ascite periit. (HARTMANN l. c. p. 25).

30) BOEHMER in BLUMENBACH *med. Bibl.* 3. B. 2. St. refert, in viro, qui sexagesimum jam excesserat annum, quum diutius jam eum excruciasset morbus, organa digestionis fuisse debilitata, ventrem intumuisse atque tactui se obtulisse crassum et adstrictum in abdomine tumorem, simul aegrotum de asthmatica pectoris oppressione cum eugore conquestum fuisse, priusquam ipsum invadebat paroxysmus; quae tandem symptomata sequebatur melancholia.

31) Et in amaurosin (L. HENZIG *Gesch. ein. Amaurose, als Folge v. Gesichtsschm.*, in SCHMIDT *Jahrb.* 1836. B. 10. p. 216. ex *Gaz méd. de Par.* 1835. N. 10).

32) RADEXACHER l. c.

## §. XXXI.

## C u r a.

Genera-  
tim.

1. Qui varios prosopalgiae perpendit fontes (non exceptis causis faciem vulnerantibus ac manu chirurgica abigendis <sup>1)</sup>), hic sane universale adversus eam nequaquam expectabit remedium, intelligetque, cur in therapia morbi hujusmodi, eadem prorsus pharmaca nunc extra modum jactari, nunc pro perniciosius declarari soleant. Inde colligitur, e curiosa solum investigatione rerum positionum, sub quibus remedium aliquod vel juverat vel nocuerat, boni quid expectandum esse.

Evacu-  
tiones san-  
guinis.

2. *Evacuationes sanguinis* aliquando profuisse ex observationibus THILENII <sup>2)</sup>, DEGNERI <sup>3)</sup> et POSEWITZII <sup>4)</sup> elucet. Effectu caruerunt *venaesectio ipsaque arteriotomia* apud LUDOVICUM <sup>5)</sup> et *scarificationes* nec non *hirudines* apud SELLE <sup>6)</sup>.

Istis

1) Sic JEFFREYS (l. c.) frustulum terrae porcellaneae, atque ZHUBER (l. c.) ovis festucam exciderant, et HALFORD (l. c.) atque BUSCH (HUFELAND Journ. 1832. Decbr. p. 72, 4)) dantem cariosum extraxerunt.

2) *Med. chir. Bemerk.* 1. Th. Vir quidam ex gingivis sanguinem sugere poterat; quo facto dolor per dies, quin immo hebdomades disparebat, apud eundem egrotum hirudines, sed una cum aliis remediis, profuerunt.

3) l. c. Deletio per liquorem quandam septicum duabus tertiiis carnis partibus in loco affecto, post peram simul ortam haemorrhagiam egrotus consolidato vulnere convaleuit.

(4) l. c. p. 74.

5) l. c.

6) l. c. Cfr. HARTENKEIL in *Salzb. med. chir. Zeit.* 1790. 3. B.



Istis tum vasis haemorrhoidalibus, tum ad tempora applicitis, non neglecto reliquo regimine antiphlogistico, *prosopalgiam inflammatoriam* plus vice simplici profligavimus <sup>7)</sup>.

3. Nisi aut nimius affluxus sanguinis ad ca-  
put, aut obstructiones viscerum abdominalium,  
aut magna aegri sensibilitas, aut alia quaedam ex  
consuetis emeticorum contraindicationibus obstant,  
nil impedit, quo minus prosopalgiae cura vomito-  
rio inchoetur <sup>8)</sup>. Praeterea prosopalgiae originis  
abdominalis lenia *purgantia* <sup>9)</sup> et maxime *resol-*  
*ventia* accommodata sunt. Inter haec *aquae so-*  
*leriae salinae* et *saponaceae*, praecipue *Carolinae* <sup>10)</sup>  
aliaeque <sup>11)</sup> excellunt.

## 4. Pro-

- 7) Et profligaverunt alii: HERRICH l. c. (hirudinibus ponesures applicitis). Cfr. PLOWY in KALISCH *med. Ztg. des Ausland.* 1833. N. 17. FRANC. HAWKINS in *Lond. med. gaz.* 1835. Aug.
- 8) LENTIN l. c. p. 140. A. MONRO apud BOYER l. c. p. 327.
- 9) VOLGER, THILLENUS, MIQUEL, WILSON, RANKINE ll. cc. A. MONRO l. c. p. 328.
- 10) J. DE CARRO *alman. de Carlsbad. 1me ann. Prag.* 1837. p. 50: *guérison d'un violent tic douloureux.* HOHN *Archiv.* 1834. St. 5. p. 757 sq.
- 11) PREEZ d. *Wirksamk. Wiesbadens in verschieden. Art. v. Gesichtsschm., durch eine Reihe v. Krankgeschicht. erläutert.* in *Heidelb. klin. Ann.* 1831. B. 7. H. 2. p. 295—311 (Sex aegroti prosopalgia in plethora abdominali radicante liberati egrediebantur). — C. OSANN in *HUFELAND Journ.* 1834. Decbr. p. 95. II. B. extollit vires medicatrices thermarum Driburgensium in tic douloureux (malum rebell., ex digestionis et assimilationis vitio propullulans,

Diapnoi-  
ca, diu-  
retica.

4. Prosopalgia rheumatica et arthritica, ut illa, cui impetigines retropulsae ansam dederint, a *diapnoicis* et *sudoriferis* leniri saltem solet. Loquimur de *pulvere Doveri*, de *guajaco*<sup>12)</sup>, de *antimonio*<sup>13)</sup> et de *sulphure*. Quorum pharmacorum virtus *indumentis calidis* et *balneis*<sup>14)</sup>, praecipue vaporis, nisi affluxus sanguinis caput versus timendus sit, sustentari debet. Praeterea urinae evacuationi<sup>15)</sup>, ope decocti *stipitum solani dulcamarae* et tincturae *colchici autumnalis* prospiciendum est.

Narcotica.

5. Quamvis narcotica<sup>16)</sup>, opio<sup>17)</sup> et aqua lauro-cera-

sanabatur) A. TH. BRÜCK in CASPER *Wochenschr.* 1835. N. 2. hist. 2.

12) RADENMACHER l. c. HÉRISON in *Journ. de pharm. et des sc. access.* Par. 1832. Mars. GERSON u. JUL. *Mag.* 1832. St. 2 (Tinctura). SAMEL l. c. Fall 5.

13) LENTIN *Beyträge*. l. c. p. 341.

14) Nenndorfenala, uti videre est apud LENTIN (*N. Beitr.* 2. B. p. 123) et SCHRÖTER. HUFELAND *Journ.* 9. B. 3. St. p. 30. Aquisgranensia, v. W. KRIMER *heilsame Wirk. d. Aachener Douchebäder gegen den Gesichtsschm.*, in HORNBAUM *med. Conversat.-Bl.* 1831. N. 16. p. 126 (novem refert casus, plane sanatos).

15) HARTMANN l. c. p. 53.

16) KERRISON in *The Lond. med. and phys. Journ.* y. 1822. Lond. Octbr. v. GRAEFE u. W. *Journ.* 1823. Bd. 4. St. 4.

17) LEIDENFROST in Diss. FORSTMANNI (contendit se puellae cuidam scrupulum opii (!) prospero cum eventu dedisse). Ex longe minori dosi profectum obtinui. TRÄPFENFELD in *N. Samml. auserles. Abh.* 1825. Bd. 8. St. 4 (majores doses opii). BINC in *Rust Repert.* 1832. Bd. 37. p. 182. N. 9 (Tinctura). — Magis nobis arridet morphii acetici applicatio endermica: G. CROZET in *OMIOWSKI ann. univ.* 1839. Mayo. TROUSSAUX in *Journ. univers. et hebdom.*

*cerasi*<sup>14)</sup> exceptis, nostris in aegrotis ad prosopalgiam profligandam effectu proreus caruerint; attamen contrariis aliorum observationibus, quae de virtute *coni maculati*<sup>15)</sup>, *daturae stramonii*<sup>16)</sup>,

hyo-

1831. T. 3. *Juin.* J. L. BARDSLEY l. c. (sex vero dolores Fotherg. leborantes sonavit). KREYSSIG in CASPER *Receptor*, 1831. Bd. 29. H. 1. ROMBERG *enderm. Heilvers.* in CASPER *Wochenschr.* 1833. N. 13. p. 221 (casus secundus). L. MARTINET in *Revue méd. fr. et étrang. Par.* 1834. T. 2.
- 18) In aegro Rossiae albae guttae viginti quinque eque leuocerasi constanter incipientem fugabant peroxysum. Cfr. OMOIDEI *ann. univ.* 1833. *Lugl.* p. 50. BERNDT in HUYLAND *Journ.* 1825. *Supplemtb.* 1. BIEL in *Rust Mag.* 1832. Bd. 37. *Miscellan.* p. 182. N. 9 (prosopalgia arthritica). C. F. SCHWABER *pract. Beobacht. u. Erfahr. Dresd.* 1827 (pr. disarthrit.).
- 19) FOTHERGILL, LENTIN, MAENTER II. CC. J. B. PALLETTA in *Mem. dell' J. R. instituto del Regno Lomb. Veneto* 1825. Vol. 1 (Extr. coni).
- 20) LENTIN l. c. (Tinctura). KIRCKHOFF v. *Gebr. des Stechapfels*, in GERSON u. *JUL. Mag.* 1827. *Jul. Aug.* p. 145 (Tinctura, quotidie decies quindiciesve infrieta, medicatrix fuit). TOTTE ein *Fall v. Prosopalg. od. Neuralg. facial.*, durch *Stechapfeltinctur* u. ein *Fontanell* auf d. *recht. Oberarm* geheilt, in *Beitrüge Mellenb. Aerzte* v. HENNUMANN Rostock u. Schwerin 1830. p. 76. Fall 5. C. BROUSSE in *Lancette franç. Par.* 1833. Jan. (Extract, interne et externe exhib.). J. PRACOCK *special hints on the treatm. of several diseases.* Lond. 1834. WENDELSTADT l. c. (Extract, gr. β.). G. L. GÉRY *üb. d. Gebr. des Extr. v. Dat. Stramon. gegen d. Gesichtneuralg.* ex *Bull. de thérap.* 1838. B. 14. p. 51. in SCHNIDT *Jahrb.* 1838. Bd. 20. p. 157 (aeger sanatus). WEIHNWESER in *Königab. Provincial-Ber. f. d. 1. Semester* 1837. *Königab.* 1838. p. 28 (in casu rebellii, gr. β. omni bihorio ad narcosin usque). DROSTE in Hu-

*hyoscyami nigri*<sup>21)</sup>, *aconiti napelli*<sup>21)</sup> et praeterea *atropae belladonnae*<sup>21)</sup> testantur, fidem abrogabimus.

6.

FRLAND Journ. 1839. St. 2. p. 87. WOLFFENHIM ib. St. KREUSER gebessert. Gesichtsschm. durch äussere (endermische) Anwend. des Strychnins u. schwefels. Chinins, in Correspondenzbl. 1832. N. 16. ROMBERG endermische versuche, in CASPER Wochenschr. 1833. N. 12. p. 221 Strychn. sulphur. — Sanatio post septem dies). G. SELL MART pract. obs. on the nat. and treatm. of diseases, with remarks on the efficac. of strychnis Lond. 1835. p. 103—148. CASPER Wochenschr. 1836. 21) BRITTING I. C. MEGLIN I. C. J. B. PALLETTA (Ex contra neuralg. supraorbital.), in Memor. dell' Imp. istituto del regno Lombardo Veneto 1825. Vol. 1. 1 son in Journ. de pharm. et des sc. access. Par. 1832. (Formula est: Tinct. alcohol. Hyose. 3ij. Tinct. Guaj. 3j. M. D. Mane et vesperi gutt. 30. v. GERSON u Mag. 1832. St. 2). BRILLINGER I. C. (Extr. gr. XX—XX maxime conducere).

22) OBERTRUPFER in HUFELAND II. B. 3. St. p. 94 (Tis ex herba recenti parata). C. F. SCHWABER I. C. (pi disarthrit.). THALIER in Revue méd. fr. et étrang. 1834. T. 1. ALEX. TURNBULL on the preparat. and employm. of Aconitine by the enderm. method, i treatm. of tic doulour. Lond. 1834 (Formula ejus: R. nitin. gr. ij. Alcohol. gutt. VI. Ter. opt. et adm. A porc. 3j. F. Ung. 8. bis quaterve de die illiniend.). SKRY I. C. (tres cas. sanati).

23) SCHLEGEL, HERBER II. CC. EDW. THOMPSON in Edinb. m. and s. j. 1822 (Extract). HENRY in The m. and phys. j. 1825. Jun. (Extr. externe adhib.). B in HUFELAND J. 1825. Suppl. mtb. 1. J. BAYLEY ob lativ, the use of belladonn. in . . . tic doulour. Lond. STEINBUCK in Berlin. Centralzeitg. 1835. N. 52. Ro

6. *Hydrargyri* virtus adversus prosopalgiam, <sup>Hydrargyrum.</sup> nisi mere syphiliticam, saltem cum complicatione venerea <sup>24</sup>), item adversus prosopalgiam rheumaticam, nemini mira videbitur. Laudem quidem summam *unguentum Neapolitanum* <sup>25</sup>) obtinuit; ad nos vero quod spectat, *calomelli* cum aliis <sup>26</sup>) primum locum addicimus; potissimum si virtus illius per *sulphur auratum antimonii* et *moschum* <sup>27</sup>) aut per *opium* <sup>28</sup>), *asinum foetidum* ac *valerianam* <sup>29</sup>), maxime in hominibus nervosis, sus-

Med. Ver.-Zeitg. 1836. N. 12 (Herba Bell. c. Digital. at Morph. Sanatio intra sex dies).

24) WATON l. c.

25) RANN, SAUTER, SIEBOLD ll. cc. WHISSER diss. de praec. virt. ungu. Neapol. in prosopalgia. Jen. 1796. J. B. PALLETTA l. c. J. SCOTT l. c. (Ung. Mero. 3j. Tart. stib. 3j). Et Hydrargyr. jodetum externe adhibuit.

26) THILENIUS l. c. p. 296. SCHRECHER in HORN's Archiv. 1810. Jul. p. 207. POMMER in Württemberg. med. Correspondenzbl. 1832. N. 6 (contra prosop. nervosam ad salivationem usque dedit Calomel c. Opio, Extr. Aconit. et Sulph. ant. eur.). MAETZ l. c. — Ipsud hydrarg. mur. corrosiv. c. Extr. Strammen. celeriter sonasse, esserit SCHLESNER in CASPER Wochenschr. 1837. N. 8 (contra prosopalg. rheum.). RUMBAUM in Med. Ver.-Ztg. 1838. N. 1 (sublimato senavit).

27) Pater meus, tum Petropoli tum Vindobonae, sequenti formula nonnullas prosopalgias aliis auxiliis rebelles sanavit; profuit ea et mihi in huius negotiis R. Moschi optimi granum unum. Calomel, sulphuris aurati antimonii aa granum semis. Sacchari grana sex. M. S. Cap. salam pulverem mane et vespere.

28) COCKINDALE in Med. and surg. journ. Vol. 4.

29) MUGLIN l. c.

Frank Prax. II, 1. 2. 1.

P

neatur. Quocunque autem modo hydrar  
usurpaveris, cave a *salivatione*; quæ si ser  
verit <sup>30</sup>), quinquies <sup>31</sup>) et ultra <sup>32</sup>) detrimen

Murias  
potassæ  
oxygena-  
tum. Hy-  
drocyanat.  
potass. Ar-  
genicum.  
Zinc. Ferr.  
et Cupr.  
carbon.  
Chin.  
sulph. etc.

7. Grato hinc animo pharmacum, que  
tutem hydrargyri æmulare asserunt, quin-  
lismum moveat, *muriatē* scilicet *potassæ*  
*genicatum* <sup>33</sup>) accepimus, simulque cum ei  
senicum, Zinc. Ferr. successu, ibi ubi sectio nervi nos dereli-  
adhibuimus <sup>34</sup>). Non ita *hydrocyanatum potas*  
*Solutionem arsenici* <sup>35</sup>) medicus religiosus n

30) RAHN l. c. PARSON in *Edinb. med. and surg*  
*Vol. III.* POMMER vix citatus. HILDBRAND l. c.  
mendat mercurii usum ad salivationem usque. I  
mur, in casibus allatis diathesin syphiliticam a  
SCHAUER l. c.

31) SELLE, REIL, SAUTER, HARTENREIL loc. cit.

32) In Judæa valde penituit pytalismum mercuria  
citasse.

33) TRILENIUS, HERBER II. cc. SCHARFER in *H*  
*Journ.* 1816. Oct. p. 20. R. Kali muriatici ox  
sacchari albi àà sesquidrachmam. M. divide in 3  
æquales. S. ter quaterve de die dosin cap. (Tris  
kali muriatici istius grana pro dosi præscribar  
sum). KNOD VON HELMENSTREIT in *HUFELAND Jou*  
*Mai* (Chisholmo duce quater de die gran. X. ded  
34) In Judæa Vilmensi.

35) *Bullet. des sc. méd.* 1831. Nouv. p. 196. LOMB  
d. *Wirksamk. d. blausaur. Kalis in einig. Krankh.* e  
de *méd. de Genève* in FRORIER *Notiz.* Bd. 31. 1  
quatuor prosopalg. adhibet.). RECAMIER u. TROUS  
FRORIER *Notiz.* B. 32. N. 3 (gr. IV. Aq. dest. 3j.  
adhib.). DELAPORTE in *Journ. des connoiss. méd.* 183  
36) M'RUENNER in *Med. and surg. journ. of Edin*  
*BEDDINGFIELD a compend. of med. pract. Lond.* 181

terne<sup>37)</sup> adhibebit. *Oxydum zinci*<sup>38)</sup>, *sulphatam zinci*<sup>39)</sup> necdum hoc in morbo usurpavimus. Decantatas *ferri carbonici*<sup>40)</sup> vires minime confir-

## P 2

ma-

PRICH in *Annal. du cercle méd.* 1822. v. GRAEPE u. W. *Journ.* 1823. *Bd.* 4. *St.* 4. -G. NESSE HILL in *The Edinb. m. and s. j.* 1823. *N.* 71. Cfr. *N. Samml. ausserles. Abh.* 1824. *B.* 8. *St.* 2. BOYER l. c. p. 330 (incassum adhibuit). G. MARSHALL in *Horn Archiv.* 1831. *St.* 1. p. 154. 2): *Heilung ein. merkw. Gesichtschm. durch Liq. Fowleri.* BAEHDOW in *CASPER Wochenschr.* 1835. *N.* 30 (casus confirmantes).

37) *Journ. compl. du dictionn. de méd.* T. 12. *N.* 48. p.<sup>o</sup> 327.

38) MEGLIN l. c. (cum extracto hyoscyami). J. B. PALLETTA l. c. (cum extr. Hyosc.). CANQUOIN in *Journ. de chimie méd. Par.* 1835. *Févr.* (zinc. oxydat. muriaticum).

39) MEGLIN l. c.

40) G. D. YEATS l. c. (laudat). MOLINARI l. c. (contra neuralgiam supraorbitalem). RICHMOND l. c. B. HUTCHINSON l. c. et in *Lond. m. and phys. j.* 1825. *Octbr.* et in *The Lancet* v. KALISCH *med. Ztg. des Ausland.* 1833. *N.* 56 (et ibi, ubi nervi perscisio inutilis fuit, senesbat). WADDELL in *The Edinb. m. and s. j.* 1822. *N.* 72. BORTHWICK ib. 1825. *N.* 83. p. 295. RANKING in *The Lond. m. and ph. j.* 1825. *Fébr.* WITTEK in *Rust Mag.* 1826. *Bd.* 22. *H.* 3. p. 568 (effectus sphaemicus), et in *HUFELAND Journ.* 1828. *St.* 3. p. 80. GRANVILLE in *The Lond. m. and phys. j.* 1826. *Vol. I. Jan.* F. C. BLACKET ib. *Fébr.* (Uncias 8, intra horas 36). J. D. BROUGHTON ib. *Mai.* L. J. SCHMIDTMANN summ. obs. med. ex proxi clin. 30 error. deprompt. Berol. 1826. T. III (non specificè agere). SUFFRAT in *HUFELAND Journ.* 1829. *St.* 12. SCHRAENLI l. c. (gr. XXXij p. d., in toto  $\frac{5}{3}$  (!) sumi jussit). FRITSCH l. c. SCOTT l. c. (commendat remedium contra prosopalg. asthenicam). PIGNY in *KALISCH med. Ztg. des Ausl.* 1833. *N.* 17. STEINRÜCK in *Berlin. Centralzeitg.* 1835. *N.* 52

matas habuimus. Illas carbonatis cupri<sup>41)</sup>,  
nini sulphurici<sup>42)</sup> etc.<sup>43)</sup> experimento haud  
misimus. *Tincturam coccionellae septempunctat*

(tantummodo gr.  $\frac{1}{2}$  ter de die, sed cum totidem  
Bellad.), SEERIG in *Provinzialber. des Med. Coli*  
*Königsb. f. d. 2. Semester 1835. Königsb. 1837.*

41) KEY in *The Lancet* 1826, Jul. *Bullet. des sc. méd*  
*Decr.* p. 315.

42) PIEDAGNEL in *Bullet. de la soc. d'émul. Par.* 1822.  
v. GRAEFF u. W. *Journ.* 1823, Bd. 4, St. 4. WIT  
RUST *Mag.* 1826, Bd. 22, St. 3 (Chin. sulph. ferro  
anteponit). SAMUEL, c. ELWERT L. c. RICHTER in *The*  
*med. and s. j.* 1829, Aug. (in forma pulveris sternu  
v. FROHIEP *Notiz.* 1829, B. 25, N. 14). RITTER in  
*temb. med. Correspondenzbl.* 1832, N. 20. FIORE  
A. L. RICHTER in *Vereinszeitg.* 1835, N. 12.

43) *Veratrinum* externe adhibuerunt; A. TURNBULL  
investigat, into the remark. med. effects resulting fr  
extern. applicat. of *Veratria*. Lond. 1833, et *The*  
1833, Decr. Cfr. GERSON u. JUL. *Mag.* 1834, Jul  
p. 521. et CASPER *Wochenschr.* 1834, N. 13 (Vera  
IV. Axung. porc.  $\frac{3}{j}$ . Serius unguent. aconitia, a  
nebat). JOHNSON in *Med.-chir. review.* Lond. 18  
A. TH. BRÜCK (Veratr. gr. XXX. Pingued.  $\frac{3}{j}$ .) in  
*Wochenschr.* 1835, N. 2. EBBAS (Veratr. gr. 5—20 s  
gued.  $\frac{3}{j}$ .) ib. N. 46—49. SUPPERT in *Med. Ver*  
1836, N. 12. FR. A. FÖRER *physiol. therap. Untersu*  
*d. Veratr.* Hannov. 1837, Abtheil. 2 (octo sanavit aeq  
*Med. Ver.-Ztg.* 1839, N. 18 (neuralgia intermiu  
*Morphium*, endermice adhibuerunt. KREYSIG in  
*krit. Repertor.* 1832, B. 29, St. 1. J. MONDIÈRE (  
*gén.* 1835, *Fév.* in SCHMIDT *Jahrb.* 1835, B. 8.  
histor. 4) et alii.

44) HUFFLAND *Journ.* (a guttis decem pro dosi).



saltem in odontalgia neuralgica cum successu propinavimus.

8. *Electricitatis* administratio topica a nobis <sup>Electrici-</sup> nunquam adversus prosopalgiam in usum deducta, <sup>tas, galva-</sup> aliis utilissima <sup>nismus,</sup> <sup>magnes,</sup> aliis indifferens <sup>magne-</sup> <sup>tismus.</sup> <sup>visus.</sup> aliis demum nocua <sup>visus.</sup> visa est. *Galvanismus* ut prosopalgiae remedium laudant RITTER <sup>45)</sup>; QUEK <sup>46)</sup>, CHISHOLM <sup>47)</sup> etc. <sup>48)</sup>; vituperant LEXDIG <sup>49)</sup> et GRAFENGIESSER <sup>50)</sup>, quin nos opinionum istiusmodi diversitatem conciliare audeamus, quod et de *magnete* atque *magnetismo animali* fatemur, quorum ille suffragia HEURTELOUPH <sup>51)</sup>, THOURET, AN-

45) R. BLUNT *Abh. f. pr. Aerzte*, 12. B. 1. St. p. 8. KUNDER l. c. et REIL l. c. Fasc. II. p. 10 (saltem momentaneum levamen inde vidit). BUSCH in *HUFELAND Journ.* 1832. Jul. IV. 8. BENATTI in *Oesterr. med. Jahrb.* 1837. B. 12. St. 3. p. 494.

46) CHISHOLM *J. d. auserl. med. Liter.* von HUFELAND, SCHLEGEL u. HARLESS 2. B. p. 162. THOURET l. c.

47) *Salzb. med. chir. Zeit.* 1806. 4. B. (Exemplum viri memoratur, in quo, ubi medius electricitatis gradus dolorem sedabat, major vero atrociores provocabat impetus). RAHN l. c. N. 40.

48) *HUFELAND Journ.* 13. B. 4. St. p. 134.

49) *Ibidem* 17. B. 3. St. p. 37. 40.

50) l. c. p. 197.

51) FROBIEF *Notiz.* B. 14. N. 6. p. 96. J. GRANTHAM ex *Lond. m. gaz.* Vol. 20. p. 70. in *SCHMIDT Jahrb.* 1839. Bd. 21. p. 195. Fall 3.

52) Doloris faciei infraorbitali nervo dissecto profligati historia, Haidelb. 1807.

53) *Versuche.* p. 97.

54) *HUFELAND neueste Annal. d. franz. Arznei- und Wund-* *arznei*, 3. B. p. 400 (Vir septem jam annos prosopalgia

ANDRY<sup>55)</sup> etc.<sup>56)</sup>, contradicente PUJOL<sup>57)</sup>,  
tinuit, hic vero a JOERDENS<sup>58)</sup> commendatur.

Auxilia  
topica.

9. Paroxysmus prosopalgiae inflammator  
de qua supra mentionem fecimus<sup>59)</sup>, applicati  
*glaciei*<sup>60)</sup> ad partem affectam valde lenieba  
*Aquam frigidam* loco dolenti admotam leva  
afferre perhibent FOUQUET et PUJOL<sup>61)</sup>; *epi*  
*mata frigida et stillicidia* utilia fuisse memo  
DEGENERUS<sup>62)</sup>, SCHLEGEL<sup>63)</sup>, THOURET<sup>64)</sup> et  
*nymus*<sup>65)</sup>; et *stillicidia frigida* una cum *vesic*

vexatus suadenta protomedico nosocomiorum militis  
in Corsica, laminam applicavit in locum dolentem mi  
ticam, qua a facie remota, ferrugo apparuit ac  
spatio quinque mansium, ista sub cura sanatus est;  
similiter potissimum ob id, quod lamina ferrea ps  
affectam a vicissitudinibus atmosphaerae tuebatur).

55) RICHTER *chir. Bibl. II. B. 1. St. p. 133* (Dolor qu  
mitigatus est, sed non panitus fugatus).

56) *Auffallende Heilkr. des mineral. Magnetism. beim*  
*sichtschm.* HUFELAND *Journ. 1826. St. 1. p. 100.* Hi  
BRAND l. c. (convolutum filamentorum metallicor  
II. SPITTA *d. med. Klinik z Rostock. 1. Ber. Rost.*  
BEHREND *allg. Repertor. 1835. St. 12. p. 195. ex The*  
*cet. June.*

57) l. c. p. 150.

58) HUFELAND *Journal. 15. B. 2. St. p. 95.* 5

60) FOUQUET apud BOYER l. c. p. 333 (effactus optatos v

61) l. c. p. 129. 62) l. c. 63) l. c. 64) RICHTER

65) *Salzb. med. chirurg. Zeitung. 4. B. p. 163, nec*  
*FRIESE in Med. Vereinszeitg. 1836. N. 12. HORN in*  
*nitütsber. f. d. Provinz Brandenb. v. J. 1834. Berl.*  
*OUTWARD ex Bull. de therap. T. 7. L. 1. in SCHNIDT Ja*  
*1835. Bd. 5. p. 284* (epithemate ex Cerato et Plumbo  
dato ad locum dolentem, quinque in casibus paroxys

riis in cervice-positis et diu suppurantibus juvasse narrant THOURET et BIXUDE <sup>66</sup>). Et *adspersio* alternatim calida et frigida commendata est <sup>67</sup>). *Aether sulphuricus*, quem loco dolenti, consilio JONAS <sup>68</sup>) non sine levamine admovebamus, forte quâ refrigerans egit. Idem de *aethere acetico* <sup>69</sup>) suspicamur. *Calor*, una excepta observatione <sup>70</sup>), semper ut topicum nocuit <sup>71</sup>). Profuit frictio genae et temporum ope *picis* <sup>72</sup>) aut usus externus *mercurii sublimati corrosivi* <sup>73</sup>). Praedicatur ad nervum affectum in paralysin conjiciendum illinitio *unguenti cerussae* <sup>74</sup>). Applicatio *spirituosorum*,  
*alca-*

extemplo profligavit). Cfr. H. BURGUET ex *Gaz. d. hôp.* 1834. Jan. in SCHMIDT l. c. 1838. B. 19. p. 308. HORN (psychrosiis frigidis prosopalg. atrocissim. sanavit), in SCHMIDT *Jahrb.* 1836. *Supplementb.* l. p. 277.

66) WATON l. c. p. 248.

67) MOMBERT in HUFELAND *Journ.* 1833. *Sptbr.* p. 78 (tres casus sanati).

68) l. c. 69) MEYNIER in *Gazette de santé.* 1817.

70) SUCOW in HUFELAND *Journ.* 31. B. 3. St. (asserit, se prosopalgiam cum oris distorsione et paralysi complicatam lenivisse et profligasse). S. G. v. VOGEL *med. Beobachtung, u. Memorabil.* Stendal 1834 (cinere calide applicato prosopalgiam se sanasse asserit). TRAFVENFELT l. c. (cataplasmatibus calidia; sed simul magnas doses opii adhibuit). BOYER l. c. p. 336 (cataplasmata).

71) HARTENKEIL l. c. p. 263. (Cfr. et 10. B. 1806. *Diarii Salab.*). THULENIUS l. c. p. 271.

72) *Bibliothèque méd. Brit. N. 1. Paris* 1814.

73) WEDERKIND in HUFELAND *Journ.* 10. B. 3. St. p. 200.

FLISCHMANN ib. 1836. Juny. p. 25 (Grana quatuor in Una. una aq. solut.).

*alkalinorum*<sup>75)</sup> *aromaticorum*, *narcoticorum*<sup>76)</sup> in locum dolentem semper<sup>77)</sup> expectationem saltem nostram frustravit. Quod et de *vesicatoriis* valet<sup>78)</sup>, in prosopalgia tamen rheumatica, vel super ipsam partem affectam, non plane negligendis<sup>79)</sup>. Feratur *cauterium* tum *potentiale*, tum *actuale* loco dolenti appositum juvasse<sup>80)</sup>. Alias ipsa destituebatur effectu *moxa*<sup>81)</sup>.

## 10. Cum

74) BEDDINGFIELD l. c.

75) THILENIUS liquorem ammonii causticum linteorum complicatorum ope ad locum dolentem applicuit, donec eschara excitata fuerit.

76) J. CLARKE üb. d. äusserl. Gebr. d. Belladonna in d. nervösen Gesichtsschm. ex The Lond. m. and s. j. 1830, in BEHRND Journ. 1830, I. H. 6. p. 365 (Extr. qua unguent.). C. BROUSSAIS ib. 1833. N. 2. p. 137. DELKAU l. c. (radix Belladon.). BENNET ex N. Americ. arch. 1835. April, in SCHMIDT Jahrb. 1837. Bd. 16. p. 14 (fomentationis ex Aq. Laurocerasi, Aeth. sulphur. et Extr. Belladon.). Cfr. Oesterr. med. Jahrb. 1836. Bd. 11. St. 3. p. 494 (foment. Aq. Laurocerasi).

77) DRENERUS tiecturam quendam alkalina cum camphora et croco et *emplastrum* quoddam mercuriale itemque seponstum per vices imposita, in mali initio utilis invenit, serius ea seponere cogebatur (l. c.). THILENIUS ait: se unguentum Nespolitanum cum oleo terebinthinae una cum vesicatorio pone aures cum bono successu ordinasse (l. c.).

78) Laudem vesicatoriis in prosopalgia a THEURTO et BIEUD l. c. impetitam destruunt testimonia HARTENKILII, CHISHOLMI, RHILI, LENTINI, SELLEI, aliorumque.

79) Virgo formosa, quae, non dicam, gannius prosopalgia, sed saltem gravi affectione rheumatica musculorum faciei unius lateris laboravit, appposito sibi vesicatorio ad portem affectam, illico nulla relicta vel cicatrice, convaleuit.

80) DRENERUS refert, cauterium actuale in his, qui tange-

10. Cum auxilia topica parum vel nil praestiterint, Revellentia.

bantur, locis dolorem abagisse, sed nimiam partis dolentis extensionem totius regionis illius deletionem prohibuisse (l. c.). ANDRÉ (WATON l. c.) asserit, ex cauterio potenciali, quod nequaquam nervum ipsum, quae centrum doloris, tangebatur, ne dicam destruebat, aegrotum quandam magnum levamen percepisse; idem auctor duos vidit casus, in quibus cauterium actuale in foramina mentali dolorem extinguebat, pariter quoque GUINCOURT prosopalgiam per cauterium actuale sanavit. (*Obs. sur une néuralgie maxillo-dentaire guérie au moyen de cautère actuel, Journ. de méd. T. 15. p. 346*). Quibus observationibus illas PALLETTAE (OMOIDEI ann. univ. 1822. Septbr.) et DÖSTERBERG (HUFELAND Journ. 1825. Novbr.) conferte, operae pretium est. REINHOLD (HUFELAND Journ. 1832. Dezbr. p. 73. 4) tribus in casibus prosopalgiam ferro candente profligavit, et DERMOTYX (*The Lancet. Lond. 1834. Septbr.*) cigare ardescens (*brennende Cigarre*), quam, ubi portio dura e foramine stylo-mastoideo citra concham auriculae exit, applicabat.

- 81) HUBERTLOUP l. c. p. 456. HAMEL l. c. BOYER l. c. p. 333. ATTAMEN F. A. SKUBERSKI (WEITENWEDER Beiträge z. gesamm. Nat.- u. Heilw. Prag 1838. B. 2. St. 3. p. 348) Tic doul. rebellem moxa sanasse, contendit — Praeterea ut topica adhibebantur: Oleum Crotonis (illinitum) a HUTCHINSON in KALISCH med. Ztg. des Ausland. 1833. N. 56 (neuralgiam nervi supraorbitalem mitigasse); Kreosoti p. l. Aq. p. 4. illinitum a SCHAEFER in Provinz. Sanitäts-Ber. v. Pommern. 1. Semester 1835. Stettin 1836 (mixturem salutifera esse); emplastrum ex Tart. stib. Resin. pin. et Terebinthin. Venet. a HAUSBRAND in Sanitäts-Ber. d. Provinz Königsb. 1. Semester 1834. Königsb. 1835; et fumigationes herb. Mikavies Guaco (una cum usu interno succi ejusdem expressi) a OTTO in CASPER Wochenschr. 1835. N. 11.

stiterint, confugiebatur ad *methodum revulsoriam*, quae eo magis successum promittebat, cum prosopalgia quaedam, vulnerato fortuito capite, disparuerit, simulac vero vulnus sanatum fuit recruduerit<sup>82)</sup>. At vero et ista spes fefellit; paucis enim exceptis casibus<sup>83)</sup>, *fonticuli et setacea* brachiis aliisque locis admota nil boni effecerunt<sup>84)</sup>. Nihilominus in prosopalgia rheumatica, arthritica et metastatica auxilia hujus generis tentari possent. Sic prosopalgia, ex blennorrhoea urethrali suppressa orta, hac restituta, evanuit<sup>85)</sup>.

Nervorum  
resectio.

11. Nullum vero ad prosopalgiam sanandam propositum auxilium medicorum chirurgorumque attentionem magis ad se traxit, quam *resectio nervi affecti*, scopo communicationem illum inter et cerebrum auferendi. Quamvis enim MARECHAL<sup>86)</sup>, qui hanc operationem primum instituit, eam bis frustra tentaverit, alii tamen non defuerunt, qui testabantur, discisso nervo adfecto morbum penitus

tus

82) GÜNTHER in diss. FORSTMANNI.

83) Fonticulos inter scapulas positos prosopalgiam mitigasse, et post diuturnam suppurationem sanasse, perhibet POULLETIER DE LA SALLE. (WATON l. c.). DÜSTERHAG (HUPFELAND Journ. 1825. Novbr. et Rust Mag. 1825. B. 20. St. 3) fonticulo inter processum mastoideum et mentibulam sanavit prosopalgiam. TOTT (supra 5 (20) cit.) fontic. ad brachium.

84) Sic SELLE, CHISHOLM, MASIUS, BOYER l. c. p. 333. aliiqua, me ipso non excepto, testantur.

85) THILENIUS l. c.

86) HUPFELAND neueste Annalen der franz. Arzneyk. u. Wundarzneyk. 3. B. 1800, p. 453.

tus fuisse sanatum<sup>87</sup>). Contra vero plura exstant  
ex-

- 87) RITCH in SABATIER *traité complet d'anatomie*, T. III, Paris 1777, p. 375. HAIGHTON in *ARKEMANN Mag.* 2. B. 1. St. Gött. 1792, et in *Med. records* l. c. p. 19 (a. infra-orbital). ANDRÉ in PUJOL l. c. p. 16. LEYDIG l. c. STIMSON in *The new Engl. journ. of med. and surg. and the coll. branches of scienc. conducted by a number of physicians*, Vol. 6, Boston 1817. LIZARS in *The Edinb. m. and s. j.* 1821, Octbr. (aurealg. fac. per section. nervi maxillar. inferior. ad foramen mentale sanata). Vers. germ. a MICHAELIS in GRAEFH u. W. *Journ.* 1822, B. 3, St. 3. Cfr. LANGENBECK in *Bibl. f. Chir.* 1824, B. 2, St. 2. RAVIN in *Journ. gén. de méd.* 1821, Debr. Germanico in HARLESS *Rhein. Westphäl. Jahrb. f. Med. u. Chir.* 1822, B. 6, St. 2 (prosopelgia traumatica nervo discisso sanata). KLEIN in GRAEFH u. W. *Journ.* 1822, B. 3, St. 1 (duo casus n. fac. ial. descise.). J. PN. FRICKER diss. de secundo tranco nervi duri in prosopalgia. Tüb. 1823. versio in WEBER *Samml. med. Dissertat. v. d. Universität Tübingen*, ib. 1829, N. 5 (persecutio nervi supra processum styloideum). WARREN *Ausschneidung des Nervens im Gesichtsschm.* ex Boston m. and s. j. 1828, N. 6. in FROBIEF *Notiz*, B. 27, N. 13, p. 201. Cfr. GRAEFH u. W. *Journ.* 1829, B. 19, H. 2. epud TROSCHEL p. 317. 6) (nerv. infremexill. Dolor fugiit). E. B. SCHENKFF *üb. d. Durchschneid. des Antlitznerv.* ex *The Lancet* 1832, Jan. 28, in FROBIEF *Notiz*, 1832, B. 33, N. 13, p. 204. BELLINGERI l. c. v. WALTHER in ejusd. *Journ.* 1835, B. 22, H. 2. WHIGEL diss., cas. duo nerv. sect. in prosopelg. Monach. 1836 (nerv. supraorbital. et infraorb. cum fausto eventu), et enonymi: *A case of tic doulour., or painful affect of the face, successfully treated by a division of the affected nerve; in The Lond. med. review and magaz.* Vol. 1, p. 8 sq. *The medical repertory by MITCHELL*, Vol. II, N. I, New-York 1813. ELGENSTIERNA *Swenska läkare*, 2. B. Stockh. 1815.

experimenta de nervorum sectione incassum instituta<sup>84</sup>). Ibi non indicatam esse, certe non sine jure, asserunt, ubi morbus ex vitio totius systematis, necdum plane pharmacis eradicato, pullulat, ubi dolor inter fibras diversas ejusdem nervi fluctuat, et ubi nervus affectus, ob sedem suam reconditam, cultro vix attingi potest, e. c. nervus infraorbitalis in foramine suo. Quarum difficultatum

84) VIEILLARD ergo in pertinescibus faciei capitisque doloribus nihil prodest, sed contre plurimum nocere potest nervorum quinti paris sectio. Paris 1788. (Tribus in casibus dolor sublatus cito rediit). THOURET l. c. p. 204 (Marasmo denique aegroti obiit). KAPP in HUFSLAND *Journal*. 20. B. 4. St. p. 65. MASIUS ibid. 25. B. 1. St. SABATIER l. c. BOYER l. c. p. 335 (nervus frontal.; dolor redux). ROUX ib. (nervus mentalis, infraorbitalis et portio dura paris sept.; sed incassum). P. U. WALTHER *Durchschneid. mehr. Gesichtsnerv. bei ein. Prosopalgie*; in GRAEFH u. W. *Journ.* 1832. St. 3 (nervi faciei, ubi e foramine stylomastoideo exit; post haec rem. alveolar. maxill. infr. per. quinti, deinde nerv. alveol. max. infer. ram. tertii per. quinti, sed dolor saeviens rediit). A. VELPHEU l. c. (exponit operationem commendatque, ut remedium ultimum, sed fere nil sperat). RAST l. c. (nerv. infraorbital., est incassum). Obijciunt inprimis huic operationi, quod periculum surditetis minetur, quodque feliciori in casu pro tempore solum dolorem profliget. Quibus objectionibus fautores operationis obviam veniunt asserendo, causam frustraneae operationis in eo positam esse, quod exploratio fibrae nerveae effectae non semper, ut decet, institueretur, quod vulnus inflictum nimis cito sanaretur (STIMSON l. c. Per quinque hebdomades vulnus apertum tenuit), quod sectio nervi non in omni prosopalgia indicata sit.



tatum partem, saltem quoad prosopalgiam ex vitio ramorum septimi paris nervorum, egregius KLEIN<sup>89)</sup> solvere satagit, *sectionem trunci nervi duri eo in loco, ubi ex foramine stylomastoideo exit*, proponendo. Propositum hoc innititur observationi aegri cujusdam, qui dolorem presso fortiter loco foraminis stylomastoidei constanter sedare poterat. Operatio ista hucusque solum in cadaveribus suscepta, in homine vivente timorem paralyseos musculorum digastrici, stylohyoidei, stylopharyngei, styloglossi et geniohyoidei, movet. Qui caeterum timor, a factis circa extirpationem parotidis collectis<sup>90)</sup>, sub qua operatione plures etiam faciei nervi rescindi solent, quodammodo imminuitur.

12. De *acupunctura* aliorum dumtaxat referre **Acupunctura.**  
licet observationes<sup>91)</sup>.

13. A viro fide digno<sup>92)</sup> accepimus, illustrem **Auxil. in-**  
femi- **nocuum.**

89) FRICKER Diss. citat.

90) I. P. SIBBOLD *Historia systematis salivialis*, Jen. 1797.  
p. 158.

91) FARINA I. c. HARLESS *die Acupunctur, als Mittel gegen den Gesichtsschm.* etc. in ejusd. *Rhein.-Westphäl. Jahrb.* B. 9. St. 2. p. 1. G. BERGAMASCHI *neuriti faciali guarite mercè l'agopuntura*; in OMIOIDEI *ann. univ.* 1826. Lugl. Fasc. 115. p. 5. J. HUNTER EWING in *The Lond. med. repository*, 1826. Septbr. E. GRABBE *Beitr. z. Electropunctur*, in GRABBE u. W. *Journ.* 1828. B. 12. H. 2. p. 333. A. LAUER *diss. de acupunct.* Pest. 1830. PICHONNIÈRE I. c. SACHS I. c. FROBIEF *Notiz.* B. 46. N. 8. p. 124 (acupunct. electrica).

92) *Dux militum Austriacorum Liber* Baro Hauer.

feminam saevissimo eoque genuino *tic douloureux* laborantem, nsitatis prius incassum variis medendi methodis, applicatione vivi muris porcelli Linnaei sanatam fuisse. Tali saltem applicatione minitantiem aliquando paroxysmum extemplo fugavit.

## CAPUT VII.

*De neuralgiis extremitatum.*

## §. XXXII.

*Definitio. Morbi limites et literatura.*

## Definitio.

1. **D**olor decursum nervi ulnaris, radialis, ischiadici, cruralis sequens, aut potius, ex iisdem nervis emanans, modo per insultus rediens, modo continuus, cum motu brachii vel cruris imminuto, *neuralgiam* constituit *cubitalem*, *radialem*, *ischiadica*m, *cruralem*.

## Literatura.

2. De neuralgiis extremitatum superiorum scripsere JEFFREYS<sup>1)</sup>, ARONSSON<sup>2)</sup>, LEEKE GIBBS<sup>3)</sup>, WUTZER<sup>4)</sup> aliique<sup>5)</sup>; de ischiade nervosa, id est

Co-

1) *The Edinb. physic. and med. journ.* Vol. 49.

2) *Obs. sur les tumeurs développ. dans les nerfs.* Strasb. 1822.

3) *The Edinb. med. and surg. journ.* 1829. Vol. 32, p. 250—253. German. in BEHREND *Journ.* 1830. I. II. 3. p. 315.

4) *Fall v. Neuroma d. n. ulnaris*, in HECKER *Annal.* 1836. II. 3. II. 4. p. 393.

5) *Heilung ein. Neuralgie d. Finger durch d. Nordpol ein. gewöhnl. Magnets*; ex *Med.-chir. review*, Jul. in BEHREND

## DE NEURALGII EXTREMITATUM. 239

COTUNNI<sup>6)</sup>, KOELPIN<sup>7)</sup>, LENTIN<sup>8)</sup>, J. PETRINI<sup>9)</sup>,  
BARTHEZ<sup>10)</sup>, S. G. VOGEL<sup>11)</sup>, FALKNER<sup>12)</sup>, MAR-  
CET<sup>13)</sup>, L. MARTINET<sup>14)</sup>, C. G. MAY<sup>15)</sup>, THIER<sup>16)</sup>,  
MAETER<sup>17)</sup>, ZHUBER<sup>18)</sup>, LÖWENHARD<sup>19)</sup>, FRICKE<sup>20)</sup>,  
BASEVI<sup>21)</sup>, SCHLESIER<sup>22)</sup> et passim citandi.

### §. XXXIII.

*allg. Repert.* 1833. N. 9. p. 221. Ex *Lond. med. gaz.* in  
*FRORIEP Notiz.* B. 37. N. 19. p. 301. Cfr. cap. V. §. XXV. 5.

6) De ischiade nerv. commentar. Neap. 1780. Vers. germ.  
Lpz. 1792.

7) *Med. prakt. Bemerk.* 1. Heft.

8) *Beobacht. einiger Krankh.* p. 134.

9) *N. Heilmethode d. nervicht. Hüftwehe, a. d. Ital. v. K. H.*  
*SPORER. Detmold* 1787.

10) *Abhandlung über die Gichtkrankheiten. A. d. Fr. Berl.*  
1803. 2. Th. p. 79.

11) *Handbuch der prakt. Arzneywissenschaft.* 2. Th. 2. Aufl.  
p. 154.

12) l. infra citando.

13) *Medical - surgical transactions by the medical and*  
*chirurgical society of London: Vol. 3.* 1812.

14) *Mém. sur l'emploi de l'huile de térébinth dans le sciatic.*  
*Par.* 1834. Vers. germ. Lpz. 1824 (qua ntor). *Du traitem.*  
*de la sciâtique ... par l'huile de terebinth.* 2. ed. *Par.* 1837.

15) *Diss. de ischiade nerv.* Cot. Lips. 1828.

16) De ischiade nerv. Cot. ejusq. curat. per ol. jecinor.  
aselli. Pest 1829.

17) *Ischias nervosa, als Folge v. chron. Entzünd. d. rechten*  
*Backenhälfte;* in GRAUPE u. W. *Journ.* 1833. B. 22. II. 2.  
p. 322.

18) *Eine organ. Krankh. d. Rückensäule, welche sich vor-*  
*züglich als nervöses Hüftweh aussprach (casus memoratu*  
*dignus), in Oesterr. m. Jahrb.* 1837. Bd. 13. St. 4. p. 568.

19) *Verlauf einer durch d. Oeffnung des ischiadisch. Nerven*  
*geheilt. ischias nerv. Cotunni;* in HUFELAND *Journ.* 1835.  
St. 6. p. 93.

## §. XXXIII.

*Symptomata. Necroscopia.*N. cubi-  
talis.

1. In *neuralgia cubitali*, cujus stupenda observavimus exempla, dolor sub axilla orditur, ac sese plerumque ad plicam tantum cubiti extendit. Attamen quandoque usque ad manum, torpidam redditam, propagatur. Torpor praesertim digitos auricularem et annularem nec non pollicem, difficulter adducendum, detinet. Quin immo dolor in pollice ortus per brachium ascendere observatus est <sup>1)</sup>. Generatim summus cruratus loco inter axillam et cubitum medio, attactum respiciente, persentitur. Est ille ut plurimum periodicus et quocunque in casu noctu maxime argens, somnumque plane fugans. Aeger sub doloris paroxysmo brachium attollit, manumque torpidam altera sana comprimit, ac sensum anxietatis, vix verbis designandum, accusat. Animi pathemata accidentaliter mox paroxysmos doloris excitant, vel solitos saeviores reddunt. Ita et repentinae atmosphaerae mutationes. Temperatura brachii affecti in recenti morbo evidenter aucta <sup>2)</sup>, senescente malo  
bra-

20) *Ischias nervosa mit Verlänger. des betreffend. Schenkels*; in DIEFFENBACH *Ztschr.* 1836. B. 3. p. 440.

21) *Diss. de ischialgia*. Pav. 1837.

22) *Ein Beitrag z. Behandl. d. Ischiadik*, in CASPER *Wochenschr.* 1838. N. 26. p. 408.

1) MONAST apud GOOCH l. c. (dolor leniebatur, frictione aut leni percussione eo in loco, ubi ultima vertebra colli cum prima vertebra dorsi jungitur).

2) EARLE *med. transact.* 1816. Vol. 6. (Sesto nervo dolor et

brachium tabescit ac cutis palmar manus corrugatur<sup>1)</sup>).

2. *Neuralgiae radialis* nobis nunquam obser-<sup>N. radia-</sup>  
vatae casum DENMARK describit<sup>2)</sup>). Dolor ad ex-<sup>lis.</sup>  
ternam brachii superficiem decurrit, et ad manum  
propagatus, torporem digiti indicis et annularis  
nec non pollicis gignit, qui pollex difficulter ab-  
ducitur.

3. *In neuralgia ischiadica* (*ischias nervosa* <sup>N. ischia-</sup>  
*postica Cotunnii*) dolor oritur inter trochanterem<sup>dicae.</sup>  
majorem et os ischii, extenditur ad os sacrum et  
lumbos, maxime vero ad superficiem posticam  
femoris et ad poplitem. Neque vero hic crucia-  
tus limites semper agnoscit. Propagatur enim  
semper a capitulo tibiae per superficiem exter-  
nam spinarum tibialis et malleolum externum, ter-  
minaturque in planta pedis. Musculi gastrocne-  
mii flaccidi evadunt, et totum crus marcescit<sup>3)</sup>).  
Dolorem ad *nervum tibialcm* ortum prosopalgiae  
instar decurrentem aegramque valde excruciantem  
observavimus<sup>4)</sup>).

4. *Neuralgia cruralis* (*ischias nervosa antica* <sup>N. crura-</sup>  
<sup>lis.</sup>  
<sup>Co-</sup>

aucta temperatura evenuerunt, sed digitus auricularis pa-  
ralyticus factus est).

3) Sic in viro Vindobonensi.

4) *Med. and chir. trans. publ. by the med. and chir. Soc. of  
Lond. 1813. Vol. 4.* (Facte brachii amputatione, nervus  
radialis erat crassus, continebatque globum scopetarium).

5) Sic in casu a LÖWENHARD (l. c.) allato.

6) In uxore ducis militum Rossici comite B.... s. n. (His  
terre de anno paroxysmum et pluribus insultibus compo-  
situm experiebatur).

Frank Prax. II. I. 2. t.

Q

*Coturnii*) dolore insignitur, incipiente ab inguine, descendente secundum superficiem internam cruris, et surae, terminaturo in dorso pedis. Interdum in digitis pedum dolor oritur, extenditurque sursum<sup>7)</sup>. Quocunque in casu in morbis, de quibus agitur, dolor ad vespertas exasperatur, ac in neuralgia ischiadica, praesertim si malum adhuc recens sit, periodice recurrit. Vis cruciatuum tanta est, ut aeger neque in lecto, cujus calor intolerabilis est, decumbere, neque parti affectae, quam sat libere movet, insistere possit. Haec vero crampis tremoribusque tentatur ac, sub nisu illi insistendi, saepe livet, venis cunctis quandoque chordarum metallicarum instar tensis. Raro febris initium morbi comitatur. Temporis tractu dolor minus urget, magisque obtusus evadit, sed tunc crus affectum emaciari incipit, suris jam pridem flaccidissimis factis. Universum corpus in neuralgia ischiadica et crurali vix patitur, observavimus tamen sub violentia dolorum aegros ciborum desiderium amisisse et de dolore epigastrii ac nausea conquestos fuisse. Nisi occurratur, morbus in partis affectae paralytin et atrophiam transit.

Neuroseopis.

5. Nisi per cadaverum sectiones, saltem operationum chirurgicarum ope in rebellibus neuralgiis extremitatum superiorum, maxime si in cute sedem figant, plerumque tumores nervorum reperiuntur<sup>8)</sup>. Quoad neuralgias extremitatum inferiorum,

Co-

7) VERRING in *Salzb. med. chir. Zeit.* 1819. N. 66. p. 229.

8) Exempla sedulo collegit ARONSSON l. c., ut etiam vi-

COTUNNI in plurimis cadaveribus *serum et pseudo-membranulas* in cellulosa inter vaginam et pulpam nervi ischiadici invenit<sup>9)</sup>. Hydropem nervi ischiadici observatio TISSOTI<sup>10)</sup> demonstrat<sup>11)</sup>, quippe qui illum ambitus trium pollicum et ultra invenit. Aeger a lapsu in paralyam cruris dextri inciderat, ac hydropem perdit. BOERHAAVE<sup>12)</sup> jam depositionem materiae arthriticae inter vaginam et nervum ischiadicum suspicatus est<sup>13)</sup>. Neque hic verba COITZII<sup>14)</sup> silentio praeteribimus, qui scripserat: „se spatium inter infimam spinæ medullam et crassam hujus meningem, per quod nervi illi (intestino recto proximi) traducuntur, in arthritica ischiadici et podagricis, multoties *tenui sero*,“ interdum *pituita viscosa refertum* deprehendisse, — quamvis observatio ista a MORCAENIO<sup>15)</sup> infringatur, dicente: „quod ejusmodi humor et in iis reperitur, qui ex eo morbi genere non laborarunt.“

Q 2

§. XXXIV.

dece est in *Magazin d. anal. Lit.* v. GERSON u. JULIUS B. 5. p. 248.

9) l. c. 10) *Nervenkrankh.* Versio WEBERI l. B. p. 79.

11) Simile quid LÖWENHARD (l. c.) in aegrotto suo observavit.

12) De morbis nervosis, p. 67.

13) Cfr. ROESCH in HUFELAND *Journ.* 1839. St. 3. p. 93 sq. (Nervus ischiadicus reti vasorum rubrorum circumdatus (p. 96). Materia scrophuloso-rheumatica neurosin, neuritidem et deinde telae cellulosa inflammationem lethalem excitaverat).

14) Obs. anatom.

15) De sed. et causa. morb. Epist. LVII. N. 6.

## §. XXXIV.

C a u s s a e.

C. prae-  
disponen-  
tes.

1. Nervi ulnaris et ischiadicus neuralgiae ob id praesertim obnoxii esse videntur, quod, si cum aliis extremitatum nervis conferantur, per tractum sat longum paucioribus musculis coeperiuntur; indeque injuriis externis maxime exponuntur; nervus ischiadicus praeterea vagina admodum laxa est instructus, quo fit, ut spatium quoddam inter eam et pulpam nerveam relinquatur, ad depositiones morbosas recipiendas valde idoneum. Insuper arterias conspicuas processui inflammatorio opitulantes habet. *Neuralgia ischiadica* maribus communior est quam feminis. Nulli vero lateri prae alio magis addicta videtur, nec unquam ambas extremitates inferiores simul detinuisse visa est.

C. exci-  
tantes.

2. Excitantur neuralgiae extremitatum a vulneribus<sup>1)</sup>, contusione<sup>2)</sup>, a refrigeratione brachiorum et crurum, praecipue corpore excaefacto super solum humidum decumbente<sup>3)</sup>, a meta-  
stasi

1) Sic e. c. nervus ischiadicus vulnerari solet insidentibus fortuito super acus, forficis, cultros, praesertim portatiles, seculo vestis inclusos, quorumque lamina, e vagina, qua custodiebatur, forte exiit, et nervus ulnaris per venae sectionem brachii. De nervi paronaei dolore ac vulnere sclopetario vide RIBES in MAGENDIE *journ. de phys. expériment. et pathol.* T. 2. N. 4.

2) Famulos, qui longe itinera visco partis curru posterioris insidendo, uti nostratum mos adhuc fert, absolvunt, in ischiadem hanc traumaticam incidisse vidi.

3) Mercetor, vix laute vivens quinquegenerius, set robustae



stasi<sup>4)</sup> morbillosa<sup>4)</sup>), ab haemorrhoidibus ani, a lochiorum secessu lactisque secretionem suppressis, imprimis vero ab arthritide. *Neuralgiae crurali* speciatim vulneratio nervi sapheni in saucianda incaute vena ejusdem nominis ansam praebet<sup>5)</sup>. Oritur quandoque a vitis uteri<sup>6)</sup>.

## 3. Neu-

corporis constitutionis et haemorrhoidarum, caeterum nullo morborum unquam effectus, e cana suo fideli venetico comitatus mense Aug. hora 6. matutine hortulum, extra urbem situm, culturum ambulat, ut est consuetudinis suae. Canis humi recumbit, quam ros matutinus humectavit; dominus hortulum fodit sub eura frigidiuscula, quae ex oriente flet. Ille subito ululat surgens claudicansque pedes posteriori sinistro; hic eodem plene temporis momento dolorem sentit pungentem in femoris sinistri articulatione tam saevientem, ut aeger vix et non nisi magno labore et lente et tarde domicilium attingere queat. Uterque, canis et dominus ischiae laborant et id solum differebat, quod ille solis radios querens paucos intra dies sine; hic vero, in lecto jacens, sub usu medicaminum tres post hebdomadas convalescit. Ex sched. aditor.

- 4) Post gonorrhoeam et nec non exanthema pamphygo simile ischies atrocissime. WERLE in *Beob. u. Abh. a. d. Geb. d. gesamt. Heilk. v. Oesterr. Arzt. Wien. 1828. p. 49. histor. 2.* Herpete cruris sinistri retropulso ischias n. post. orta est. *Jahresber. üb. d. 1829 im Landkr.-Hause zu Jena behandelt, Kr. in HUYELAND Bibl. 1832. Jul.* Ex ulcere pedis habituali praepostere sanato ischies nervosa. BACH in NADHERNY *Hpt. - Sanitätsber. v. Böhmen 1835.* Mox ex impetigine serosa brachii dextri exsiccata. RÖSCH l. c. p. 93.
- 5) Apud puellam neuralgia ulnari affectam morbus post morbillos abnormiter decurrentes oriebatur.
- 6) Merentur de hoc argumento legi observationes a SABATIERA enarratae. v. *Traité complet d'anatomie. Paris 1781. 3. Tom. p. 315-318.*

C. *proxima.*

3. Neuralgias extremitatum chronicae in origine *neuritides* fuisse, existimamus, quae, nisi resolvantur, tandem consuetos neuritidis exitus \*) agnoscunt, inter quos, in extremitatibus superioribus *tumores nervorum*, in inferioribus autem, rite monente CORUSSI<sup>7)</sup>, *hydrops tunicae vaginalis nervi*, communissimi sunt.

### §. XXXV.

#### *Diagnosis. Prognosis.*

*Diagnosis.* 1. Confundi possunt; A. cum *neuralgia ischiadica*: — 1° *rhachialgia lumbaris et sacralis*, 2° *abscessus musculi psoae* et 3° *coxarthrocace*; B. cum *neuralgia crurali*: 1° *abscessus sub fascia lata* et 2° *aneurysma arteriae cruralis*; C. cum *neuralgia ulnari et radiali*: *rheumatismus musculorum brachii*, *dolores symptomatici extremitatum superiorum*, in morbis *hepatis, lienis, pulmonum et cordis familiares*.

Neuralgie ischiadicae a rhachialgia distinctio.

2. Cum nervus ischiadicus e plexu ejusdem nominis oriatur, nervi vero plexum ischiadicum componentes ex pari quarto et quinto nervorum lumbalium et ex pari primo, secundo et tertio nervorum sacralium proveniant; error, *rhachialgiam lumbarem et sacralem, cum neuralgia ischiadica* confundendi, condonandus foret. Distin-

guun-

7) HARTMANN l. c. in capite nostro praecedente. BASKOW neuralg. puerperar. cruralis, in CASPER *Wochenschr.* 1838. N. 29. p. 636.

8) Cap. V. §. XXV. 3.

9) l. c. Cfr. RICHTER *spec. Therap. Th.* 2, p. 19.

guantur nihilominus invicem, nisi complicati, uti ex sequenti tabula elucet.

*Rhachialgia lumbalis etc.*

1. Dolor ad lumbos vel ad os sacrum oritur ac crurum mala eum tantum sequuntur.

2. Ambo plerumque femora, magis imbecillitate, quam cruciatibus tentantur.

3. Imperium saepe super vesicam urinariam, intestinum rectum et partes genitales exercet.

3. Abscessus musculi *psoae* <sup>1)</sup> a neuralgia ischiadica distinguitur:

*Abscessus psoae.*

1. Dolor lumborum praecipuum morbi symptoma.

2. Crus, saltem sine summo cruciatu, extendi nequit.

3. Febris suppuratoria vehemens.

*Neuralgia ischiadica.*

1. Dolor oritur prope trochanterem, ascendit quidem hinc inde ad lumbos et ad os sacrum, sed maxime deorsum extenditur.

2. Unum afficitur femur, magis dolore excruciatum, quam imbecillitate.

3. Vesica urinaria, intestinum rectum, et partes genitales vix laborant.

*Neuralgia ischiadica.* Neuralgiae ischiadicae ab abscessu musculi psoae distinctio.

1. Dolor solum ad lumbos extenditur, neque semper.

2. Motus cruris decumbenti aegro plus minus concessus.

3. Febris, praesertim in diuturno morbo, plane nulla.

4. Omnes

1) P. I. ed. ult. Vol. III. Sect. 1. C. XXX. §. CV. 8. 9.

4. Omnes corporis functiones perturbantur.

5. Tumor fluctuans ocyus serius vel ad nates, vel ad inguina, praesertim si aeger profunde inspiret, vel ejulet, vel pedibus insistat, percipitur.

4. Functionibus viscerum abdominalium quandoque exceptis, aeger caeterum sanus.

5. Quo diuturnior morbus, eo magis partis affectae macies.

Neur.  
ischiadica  
a coxarthrocace.

4. Nisi *neuralgia ischiadica*, ut quandoque accidit<sup>2)</sup>, cum *coxarthrocace* complicatur, morbi istiusmodi sequentibus signis inter se discrepant.

#### *Neuralgia ischiadica.*

1. Dolor intertrochanterem majorem et os ischii oritur, sequiturque decursum nervi ischiadici usque ad plantam pedis.

#### *Coxarthrocace<sup>3)</sup>.*

1. Dolor partem anteriorem femoris occupat, ac praecipue genua detinet.

#### 2. Aeger

2) *Arthrokakologie oder üb. d. Verrenk. durch innere Bedingung u. über d. Heilart, Wirkungs- u. Anwendungsart des Glüh eisens bey dieser Krankheitsform.* v. I. N. RUST. Wien 1817. p. 53. not. (b).

3) Est quidem argumentum chirurgicum; sed diagnosis coxarthrocaces, nec non coxalgiae medico tanti momenti, ut fassit, fontes, ex quibus hauriri possit, indicare: J. A. ALBERS u. FICKER *gekürzte Preisschr. üb. das sogenannte freiwill. Hinken d. Kinder.* Wien 1807. FORD obs. on the disease, of the hipjoint. Lond. 1794. N. ed. by COPLAND.

ib. 1810. Vers. germ. Bresl. 1795. J. N. RUST *Arthrokakologie*, l. c. Wien 1817. BRODIE *pathol. and surg. obs. on diseases of the joints*. Lond. 1818. 3. ed. 1831. Vers. germ. HOLSCHRA. Hannov. 1821 (all quam prolongationem truris apparentem statuit). J. M. REISER *theoret. pract. Abhandl. üb. d. Coxalgie od. d. sogen. freiwill. Hinken*. Prag 1824. G. TH. SÄBLER *obs. et animadversat. de coxalgia*. diss. Dorpat. 1824. FRITZ *schmerzlose u. dennoch sichere Heilart der Coxalgie*; in ERHARDT *med.-chir. Ztg.* 1828. B. 2. N. 37. p. 191. WAGNER *höher Grad v. Coxalgie*, in HORN *Arch.* 1828. St. 4. VINC. v. KERN *üb. d. Anwend. des Glüh Eisens bei verschied. Krankh.* Lpz. 1828 (coxarthrocaceo primitivum malum nervosum, nautiquam inflammatorium esse, docet). J. HINTERBERGER *zwei künstl. Hüftgelenke am obern Rande d. Darmbeins, in Folge von Coxarthrocace an einem u. demselb. Individ.* in *Heidelsb. klin. Annal.* 1829. B. 5. H. 3. CAMERON in GRAEFE u. W. Journ. 1830. B. 14. St. 1. p. 115 (luxatio spontan. femor.). *Jahresber.* ... üb. d. im J. 1829 in dem Land-Kr.-Hause zu Jena behandelt. Kr. Jen. 1831 (editores casum coxarthrocaces referunt, cujus sedes primitiva in superficie capitis femoris et acetabuli fuit). SIKOGOWITZ *üb. d. Anwend. des Glüh Eisens bei Gelenklübeln*, in GRAEFE u. W. Journ. 1831. B. 16. p. 201 (coxarthrocace lateris dextri cum exulceratione externa). *PHYSIK. Behandl. d. Coxarthrocace*, ex *The Americ. journ. of the med. sc.* 1831, Febr. N. 4. in *Rust Mag.* 1832. B. 37. p. 146. J. v. WATTMANN *diagnost. Erörter. üb. Coxalgie*, in *Oesterr. med. Jahrb.* 1833. B. 5. p. 86. HANN *üb. Sacrocoxalgie*. Stuttg. 1833. G. A. BRUN *diss. de olei jecinor. aselli praesert. in coxarthrocace efficacia*. 1833 (quatuor habet casus). DRONDI *wie kann man das freiwill. Hinken erkennen u. heilen?* Halle 1833. Ejusd. *Ansicht u. Behandlungsart des freiwill. Hinkens bei Kindern*, in *FRORIEP Notiz*, 1834. B. 36. N. 18. FRICKER in GRAEFE u. W. Journ. 1834. B. 21. H. 2. p. 223 (coxarthroc. ex bursae mucosae iliaceae malo exorta) et in *Ham-*  
*burg.*

- burg. Ztschr. 1836. B. 2. H. 3. et 4. B. 5. H. 2. p. 168. CHIAVANNE  
*Acute Coxalgia mit Verlänger, des Schenkels, ex Journ. des*  
*connaiss. méd.* 1834. Jan. N. 6. in SCHMIDT Jahrb. 1834.  
 B. 2. p. 187. MÜNKENTHALER in HUFELAND Journ. 1834.  
 Mai („merkwürd. Krankheitsfälle, Monat August“). KÜHN  
 rheumat. Coxalg. in Summar. des Neuest. u. Wissenswert.  
 a. d. Med. Lpz. 1835. B. 10. p. 76. SCHNALE coxalgia, ib.  
 B. 11. p. 338. A. PASANT coxarthroc., durch Hollenstein-  
 Fontanelle geheilt. in Pract. Tydschr. 1835. Maert Apr.  
 BURKE Beobacht. ein. Coxarthroc. in 4 Stad. mit total. Zer-  
 stör. des Schenkelkopfes etc. in RUST Mag. B. 45. H. 1.  
 A. WERNER 56. mal. coxae senile, coxarthroc. u. Coxalg.  
 in SCHMIDT Jahrb. 1836. B. 12. p. 99—113. SCHNUHR  
 Coxarthrocace, in Med. Ver.-Ztg. 1836. N. 14. JAEGER  
 in ejusd., WALTHER u. RADIUS Handwörterb. d. gesamt.  
 Chirurgie. Lpz. 1836. B. 1. p. 680. NIC. MUSELLI diss. de  
 coxarthrocace. Pad. 1836. TRESEN unvermuthet plötzl. To-  
 desfälle u. deren auffallende Sectionsberichte, in HUFELAND  
 Journ. 1837. Decbr. (v. histor. 7., obsecratus in pelvi sub larva  
 coxarthrocace). H. SCHERBEL diss. de coxarthrocaces no-  
 viss. applicat. etc. Berol. 1837. CAS. APOSTOLI diss. coxitis,  
 et coxarthroc. quaed. discrim. Pad. 1837. J. BRENNER R. v.  
 FELSICH Coxalgie, in Oesterr. med. Jahrb. 1837. B. 13. H. 1.  
 p. 159. B. GORDONEN d. Physiol. des Hüftgelenk. in ihrer  
 Bezieh. z. Lehre v. d. Coxarthroc. in Hamb. Ztschr. 1837. B. 6.  
 H. 1. p. 184. SCHNUHR et BOLDERMANN Coxarthroc. in Med.  
 Vereinztg. 1837. N. 9. JOSEPHAWNS z. Actiolog. d. Coxalg.,  
 v. Versamml. des wundärztl. Vereins, in Würtemb. med.  
 Correspondenzbl. 1837. N. 25. C. P. HILSENBERG Jahres-  
 ber. in RUST Mag. 1837. B. 50. H. 2 (cas. memorab. cox-  
 arthroc. pueri 7. aenor. refert). L. STROMAYER Contractur  
 des Hüftgelenkes; in ejusd. Bemerkung. am Krankenbette,  
 in CASPER Wochenschr. 1837. N. 8. SACHS üb. d. Entzünd.  
 des Hüftgelenkes u. deren Folgen, in RUST Mag. 1838.  
 B. 55. H. 2. P. HENDRIKSEN Fall vollkomm. Heilung ein.  
 Lux. spontan. des link. Schenkelbeins, ex Tydschr. voor  
 Genees-

2. Aeger paresi fere laborat, ac gressus instituere nequit.

3. Regio trochanteris autopsiae nil morborum exhibet.

4. Articul. femoris non riget.

5. Crus vix unquam brevius, nunquam longius.

2. Aeger quidem claudicat, sed, saltem in primis morbi periodis, sat expeditè gressus instituere potest.

3. Trochanter pro varia morbi periode, extrorsum, deorsum, sursum vergit.

4. Articul. femoris, saltem in morbo pro- vecto, rigidus.

5. Crus affectum ab initio morbi longius, dein brevius.

5. Ut *neuralgiam cruralem* ab *abscessu sub* Neur. cru-  
radialis ab  
abscessu sub  
fascia lata  
et aneury-  
smate ar-  
teriae cru-  
ralis dis-  
tinguitur. *fascia lata*, et ab *aneurysmate arteriae cruralis* distinguamus, nil nisi autopsia et assiduum par-  
tis affectae examen requiritur. Praeterea scien-  
dum, *neuralgiam cruralem* morbum esse admo-  
dum rærum.

6. Eadem ratione, quâ *neuralgiam facialem* Neur. extr.  
super. ab  
indie.  
neu-  
morbis  
distingui-  
tur. a *rheumatismo musculorum faciei* distinximus<sup>4)</sup>,

*Genies-Heel-Verlos in Artsenijmengk.* 1838. Jan. in SCHMIDT  
Jahrb., 1838. B. 20. p. 358. W. COULSON v. d. Krank-  
heit. d. Hüftgelenkes oder d. Coxarthrose. A. d. Engl.  
in BLASIUS u. MOSER Analect. d. Chirurg. Berl. 1839. B. 2.  
H. 1. p. 93. H. 2. p. 127. H. 3. p. 260. K. HANMANN üb.  
Coxarthrose in GRÄFE u. W. Journ. 1839. B. 20. H. 3.  
p. 436.

4) Cap. VI. §. XXX.

neuralgiam etiam *ulnarem* et *radialem* a *rheumatismo musculorum brachii* discernimus. De *doloribus symptomaticis extremitatum superiorum*, in doctrina morborum pulmonum, cordis, hepatis et lienis quaestio erit. Hic meminisse sufficiat, indicata viscera, *compressionem plexus brachialis* mediate aut immediate inducentia, saepe doloribus validis brachiorum occasionem praebere.

Indoles  
neural-  
giae.

7. Quoad *indolem* neuralgiae extremitatum et praecipue neuralgiae ischiadicae, eam cum BARTHES<sup>5)</sup>, praesertim in *diatesi rheumatica et arthritica*, non exclusa complicatione *sypilitica*, quaerimus. Caeterum doctrina prosopalgiae<sup>6)</sup> vel hisce neuralgiis quadrare videtur. De neuralgia crurali veluti febris intermittens decurrente singula exstat observatio<sup>7)</sup>.

Prognosis.

8. Duas neuralgias ulnares, omnibus fere remediis rebelles, post sex hebdomadam curriculum sponte evanuisse vidimus. Tertiam jam tabe brachii stipatam sanavimus. Neuralgiae ischiadicae prognosis ex ipsa innotescit morbi descriptione. Nisi in primo morbi limine succurratur, malum admodum taediosum fieri solet et quandoque insanabile<sup>8)</sup>, nec non lethale<sup>9)</sup>.

## §. XXXVI.

### C u r a.

Genera-  
tim.

1. Quousque neuralgiae extremitatum adhuc ad

5) l. c.

6) Cap. VI. §. XXX.

7) OMOIDHI *annali universa*, Octobr. 1826. p. 118.

8) Sic in viro nobili ingenio excellente CARPANI.

9) RÖSCH l. c. (ischias, inflammationem telae cellulosaе excitans).



ad neuritides pertinent, in hominibus caeterum sanis, aliarum inflammationum instar sat cito resolvi possunt. Secus autem si jam inflammationis *exitus* coram habetur, potissimum in aegrotis labe arthritica, syphilitica aut alia contaminatis, et systemate nervoso praeter modum sensili instructis.

2. Quo recentior hinc morbus, quo eviden-<sup>C. morbi recentis.</sup> tiores turbae febriles, quoque vegetior aeger, eo audacior esto *venae sectionis* usus. Sectionem venae *post aurem* prope eminentiam ossium, HIPPOCRATES, in coxarum et crurum morbis extirpandis, commendavit <sup>1)</sup>, monens tamen sterilitatem inde oriri. Itaque RIVERTI consilium <sup>2)</sup> sequimur, quo vena directe in parte affecta sauciat. In ischiade ipsa *arteriotomia* proposita est <sup>3)</sup>. Peracta *phlebotomia*, ad *hirudinum* vel *cucurbitularum scarificantium* <sup>4)</sup> applicationem prope decursum nervi affecti deveniendum. In neuralgia ischiadica cum successu vasa haemorrhoidalia sauciamus, e quibus antea cruor stillare erat solitus. Porro *debita* membro dolenti concilianda est *positio*, ne scilicet cruor nimis in partem dolentem irruat. Neuralgiae ulnari et radiali, num *com-*  
*pres-*

1) De locis in homine. Legatur de hoc argumento VALLESIUS (Lib. VI. Epid. V.) et ZACUTUS LUSITANUS (Prax. admiranda obs. 160. Lib. II).

2) Obs. cent. II. N. 25.

3) GALENUS de cur. rat. per sangu. miss. c. 23 (Arteria in malleolo).

4) RIVERTIUS, TISSOT, SCHLESIER II. ce., quorum ulterior cucurbit. scarific. ut remedium supremum ad curam inchoandam commendat.

*pressio arteriae brachialis* <sup>1)</sup>? — *Fomenta frigida* hucusque incassum in neuralgiis, de quibus loquimur, adhibuimus; aliàs frigus in ischiade condixit <sup>2)</sup>. Quacunque porro in neuralgia, maxime vero in ea extremitatum inferiorum, alvus aperta teneatur oportet <sup>3)</sup>. Maxima vis clysteribus et quidem acrioribus in morbis ad ischiadem revocatis tribuebatur ab AURANTIO <sup>4)</sup>, MONTAGANA <sup>5)</sup>, RAVENIO <sup>10)</sup> aliisque <sup>11)</sup>; quod, si de morbo tantum provento quaestio esset, in dubium haud vocare-

mus

- 5) Ischiadem rebellem COTUNNII J. MONTAGAN (ex *Arch. gén.* 1835. Fév. in SCHMIDT Jahrb. 1835. B. 8. p. 175) compressione; similem casum LEQUINE (ex *Ann. de méd. belge* 1836. Mars. in SCHMIDT l. c. 1836. B. 12. p. 54) compressione nervi ischiadici sanasse, referunt.
- 6) THILHNUS *med. und chir. Bemerk.* p. 282. QUAIN animadv. in morbo chron. VOUG. l. c. p. 212.
- 7) Cotunnii methodus conjuncta cum remediis eccoproticis maxime conduxit. REYRIEL PARISI in *Arch. gén. de méd.* 1825. Décbr. ROMBERG in CASPER *Wochenschr.* 1836. N. 25. eccoprotica commendat.
- 8) Lib. de tumore p. n. Cap. 63. „tante est, inquit, in ischiadico dolore; praesertim insipiente, enematum fictitas, ut ipse, nullo praeter clysteres adhibito medicamento, plures graviter effectos, in pristinam sanitatem produxerim.“
- 9) Conseil. 257. „Dolores ischiadici, ait, sapientium omnium concordia clysteribus acutis sanantur.“
- 10) Prax. med. L. 16. c. 2.
- 11) E. c. Kalium cyanogenatum, elysmate applicatum, ischiadem nervosam (ex *Journ. de la soc. de méd. de Tours*, in KALISCH *med. Ztg. des Ausl.* 1836. N. 55. Cfr. RUMERUS *allg. Repert.* 1833. N. 10. p. 6) et neuralgiam lumbalem rebellem (*Gazette méd. de Paris* 1833. N. 50) sanasse refertur.

mus<sup>12)</sup>. Generatim vero *emacata emollientia* adhibemus, additis sub summis doloribus, sedatoque impetu inflammatorio morbi, guttis viginti et ultra *laudani liquidi* SYDENHAMJ.

3. Quamvis et in *neuralgis proVectis*, quid C. morbi proVecti, sanguinis evacuationes, saltem locales valeant, aliquando experiamur; attamen in iis curandis methodum ab antiphlogistica toto coelo diversam usurpare solemus. Plurimum hic *auxiliis externis* tribuimus. Spectant huc 1° *indumenta e. c. tela cerata subtilis*, qua partis affectae transpiratio, sine nimio calore, aegris saepe molesto, sustinetur: *vestes laneae* corpori arcte adhaerentes, aliaeque super impositae, ut sub motu sudor eliciatur<sup>13)</sup>. 2° *Thermac*<sup>14)</sup> inprimis *sulphureac*<sup>15)</sup>, illa-

12) „Quis ausit credere, tot expertissimis professoribus id non respondisse quod adeo commandant!“ (MORGAGNI l. c.)

13) Legi meretur MARCHET in *Med. chir. transact. by the med. and chir. Soc. of Lond. Vol. III. 1812.*

14) FALCONER in *mem. of the med. soc. of Lond. Vol. VI. p. 174. et Abh. f. pr. Aerzte. 23. B. 3. St. p. 337 (Bath).* RITTER in *HUFELAND Journ. 7. B. 3. St. p. 88 (Fischbaden).* Propria experientia commendare possum balnea Teplitz, Baden-Baden, Gasteien, Pisa, Lucca, Acqui.

15) ALBERS in *HUFELAND Journ. 25. B. 4. St. p. 146 (Rehburg).* Miracula a balneis Badensibus prope Viennam in neuralgia ischiadica vidi. Cfr. SCHENKII opusculum *Die Schwefelquell. v. Baden in Nieder-Oester. Baden 1817.* ZIEGEL in *HUFELAND Journ. 1829. St. 3. p. 118 (Eilsen contra ischiad. rheumat.).* OSANN *Chronik d. Heilg. in HUFELAND Journ. 1834. Decbr. (therm. sulphur. Fietsalensis).* ZECCHINELLI *sagg. sull' uso med. delle terme Padov. ib. 1835. p. 53.*

illarum limus<sup>16)</sup>, iis deficientibus alia balnea<sup>17)</sup>, embrocatio<sup>18)</sup>. Balnea vaporis<sup>19)</sup> multum hic promittunt; ita et vapor sulphuris<sup>20)</sup>. 3° Frictiones cum panno laneo ad plantas pedum vel lenes ope manus secundum<sup>21)</sup> nervi curriculum cum oleo olivarum, hyperici, crotonis<sup>22)</sup>, terebinthinæ<sup>23)</sup>

16) ZABREL l. c. OSANN l. c. (*Tatenhausen* contra ischiad. n. postic.).

17) Neuralgiam autibrachii socia contractione digitorum CI. RUGGERI ope balnearum localium a sadecim libris aquae at octo uncis salis muriatici oxygenati sanavit (*Nuovi comment. di med. e chir. Padova* 1818). R. W. TOLBERG (*HUFELAND Journ.* 1832, St. 5. p. 71) ischiadem nervosam balneis salinarjjs et fumigationibus, STEINTHAL (*Sanitätsber.* in *HORN Archiv* 1833, St. 1) neuralgiam extramitalem superiorum vehementissimam mari Baltico debellavit.

18) SREUDAMORE in *N. Samml. auserles. Abh.* 1827, B. 34, St. 1 (ischias chron.). HAUSLUTHNER in *HUFELAND Journ.* 1827, St. 5. p. 104 („*Frottir-Douche in Warmbrunn gegen isch. nerv. ant.*“). LÖWENHARD ib. St. 9 (embrocatio vaporosa contra ischiad. n. postic.).

19) CARLIUS AURELIANUS p. 550. PELANOUS *Med. Jahrg.* 1. B. p. 140. 3. B. p. 437. ZABREL l. c. WISSENER in *Provincial-Sanitätsber. des Med. Colleg. zu Königsb.* ib. 1837 (balnea spirituosovaporosa).

20) DR CARRO *observations pratiques sur les fumigations sulphureuses.* Vienne 1819.

21) COTURNI l. c.

22) MONDIÈRE l. c. p. 175. ANDRAL in *KALISCH med. Zig. d. Ausland.* 1833, N. 18.

23) Laus (num merito, nec na?) hujus pharmaci se sustinet, ut videre est ex E. FRISCH in *Otto Nys Hygen* 1824, Febr. (infrictiones Terebinthin., Balladonn. at Merc. mur. corros.). MARTINET l. c. OMOIDEI *ann. univers.* 1830, *Agost.* p. 586. at ex infra allatis.

cum *axungia* variorum animalium<sup>24)</sup>, cum *linimento volatili* aut simili<sup>25)</sup>, cum *unguento hydragryri*<sup>26)</sup> et *camphorae*, aut cum *saliva*, *opio* et *camphora*<sup>27)</sup>, cum *tingtura cantharidum*<sup>28)</sup>. 4° *Urticatio*<sup>29)</sup>. 5° *Emplastra* e. c. illud *diaphoreticum MYNMONTHII*<sup>30)</sup>, *emplastrum hyoscyami*, *saponaceum BARBETTI*, *Ischiadicum PH. DANIIACAE*<sup>31)</sup>. 6° *Vesicatoria* consilio COTUNNI secundum tractum nervorum et quidem bis terve repetita<sup>32)</sup>. 7°

*Fon-*

24) Ipsam *axungiam humanam* COTUNNI (*pour la rarité du fait*) commendat.

25) *Linimentum* ex oleo amygdalarum, ammonia caustica, aethere vitriolico et tinctura cantharidum, quondam cum successu adhibui. SCRELSIER I. c. — Porro: *Liniment. Veratr.* BERG I. c. (apud tres ischiada nervosa postica laborantes cum fructu adhibuit). FL. CUNIER *Abhandl. üb. d. äuss. Gebr. des Veratrins*, ex *Annal. de méd. de belg.* 1837. Decr. in SCHNIDT *Jahrb.* 1838. B. 19. p. 284.

26) BALDINGER *Journ.* 20. B. p. 32. BAYLIS in *Abh. f. pr. Aerzte.* 1. B. 2. St. p. 92. Unguento Cirilli ischias nervosa antica et postica, ex herpete cruris sinistri retropulso orta, sanabatur. v. *Jahresber. nebst pr. Bemerk. üb. d. im J. 1829 im Landkr.-Hause zu Jena behandelt. Kr. Jena* 1831.

27) BERG Comment. med. Dec. I. T. II. N. 10.

28) MONELLI *Lettera*, v. *Nuovo giorn. di Milano* 1792. KÜHN *Ital. Bibl.* 2. B. 1. St. p. 23. TONN in N. act. R. Soc. med. Havn. Vol. IV. p. 189. v. *Abh. f. pr. Aerzte.* 21. B. 2. St. p. 34.

29) Eph. nat. cur. Dec. III. ann. I. obs. 34.

30) Utiliter adhibui praestantissimum istiusmodi emplastrum.

31) Dias. inaug. praestantiss. rat. ill. mat. med. praes. TONN resp. NIELSEN. Hafn. 1782. p. 65.

32) Haec methodus in neuralgia ischiadica maxime mihi satisfecit. Vesicatorium dimidii pedis longitudinis et quatuor Frank *Prax.* II. 1. 2. 1.

R

*Fonticuli et setacea*, atque illi inprimis per lapidem causticum chirurgorum excitati<sup>33</sup>). Et 8<sup>a</sup> si haec omnia non juvarent, *ustio* prope trochanterem et sub genu aut super malleolum<sup>34</sup>). Neuralgia digitorum pedis *sectione* transversali nervorum super dorsum phalangis secundae sanata est<sup>35</sup>).

**Rtai**

pollicem latitudinis capiti fibulae transversim extrorsum sub genu imponitur. Quo tenacior inde humor extrahitur, eo major sensationis spes. Si dolor deorsum extenderetur; aliud vesicatorium ad tibiam super malleolum externum applicatur. Simili modo at peri cum successu DUBOIS (*lib. d. Behandl. d. Isch. mit Sinapis.*, ex *Gaz. méd. de Par.* 1836. N. 11. *Mars*, in *DIEFFENBACH Hamb. Ztschr.* 1836. B. 2. p. 101) sinapismos applicabet.

33) Sic neuralgiam ulnarem feliciter debellavi.

34) Laus a remotissimis temporibus ustioni in morbo ischiadico impertita nostroque aevo confirmata maxime quidem *coxarthrocacem* respicere videtur; interae et in *neuralgia ischiadica*, aliis remediis rebelli, eam, ope *moxae* cum successu adhibui. Quae de causa plus etiam sub applicatione ferri candentis expectarem. Lege de hoc argumento PETRENI l. c. RICHTER *med. chir. Bemerk.* p. 162. FLAJANI *collex. d'observ.* T. 3. obs. 51. LODER *chir. med. Beob.* I. B. p. 242. DE MATHEIS *Ratio Instituti Clin. Romani.* 1816. Tab. hist. XIV. PALLETTA in *OMOIDEI ann.* 1829. Vol. 23. *Setobr.* (neuralg. extremitat. chronicas ustione ad ossa usque se senasse, asserit). J. A. BODENHÜLLER in *J. S. WEBER Samml. med. Dissert.* v. *Tübing.* 1829. N. 5 (ischiadæ nervos. in studio tertio medendi methodum, in clinico *Tübing.* usitatam, mirifice celebrat. Moxa nampe parve agerici ignarii inter pedis digitos applicatur et tandem in vulnus suppurans linimenti ex Ol. Oliv. 3j, Phosphor. gr. Vj, cochlear maj. his teris quotidie illinitur). LÖWENHARD l. c. (ferro candente sanavit).

Etsi similes non desiderantur observationes <sup>36</sup>), illis et casus fatales opponere possumus <sup>37</sup>). An certior acupunctura <sup>38</sup>)? Ab electricitate adeo ja-

R2                      ciata

35) VERING l. c.

36) L. GIBBS l. c. p. 316 (narvo perciso sentiendi et movendi facultes delata sensim sensimque rediit). RIBES l. c. (dolor nervi perinaei, vulnere sclopetario cicatrizzato relictus, disparuit nervi portione 1½" excissa). L. MALAGODI sul taglio del nervo ischiadico, in *Opusc. del soc. med.-chir. di Bologna*, Vol. 7. et in *Osservatore med. di Napoli* 1830, Decbr. Cfr. *FRORIEP Notiz.* B. 30. N. 11 (excissa portiuuncula 1½" disparuit dolor, sed crue paralyticam). *FRORIEP Notiz.* 1832, B. 34. N. 18. et 1833, B. 37. N. 19. ex *Lond. med. gaz.* 1833 (nervi mediani portiuuncula excissa, neuralgia brachii amputeti disparuit).

37) WUTZER l. c. MAUNOIR in *Journ. de méd.* 1809, Septbr. (a sectione nervi cubitalis secuta tandem est gangreena musculorum brachii et mox paralysis digitorum annularis et auricularis. — Haec ipsa paralysis secuta est sectionem ejusdem nervi et quidem sine neuralgiae lavamine in viro amico de historia naturali bene merito Genuesi professore *Viviani*). Legatur de hoc argumento *SCARPA opusc. di chirurg.* Vol. 3. R. *BAYARD Aussehneid. ein. Stücke d. ischiadisch. Nervens*, in *FRORIEP Notiz.* 1830, B. 27. N. 16 (quinta die mors).

38) *Case of sciatica cured by acupunctation*, in *The family oracle of health.* 1827. N. 52. p. 138. Eine 12jähr. Ischias, geheilt durch Acupunctur; ex *The med.-chir. review* 1831. Apr. in *BEHRND allg. Repertor.* 1831. Aug. p. 228. *TOMMEL* in *BEHRND allg. Repert.* 1833. N. 8. p. 178. ex *Acad. de méd. de Par.* *NIC. NARDUZZI Beobacht. üb. d. Wirksamk. d. Acupunctur*, ex *Osservat. med. di Napoli.* 1834. Febr. 1. in *SCHMIDT Jahrb.* 1834. B. 3. p. 143. 144 (tres casus neuralg. extramitat. saneti). *SYME* ex *Edinb. med.*

ctata<sup>39</sup>), non nisi in neuralgiis extremitatum originis traumaticae, fructum, aliàs enim potius detrimentum accepimus. Idem verisimiliter a *galvanismo*<sup>40</sup>) expectandum. Quoad auxilia ex fonte pharmaceutico, ea minime negligenda sunt, quae liquorem extravasatum absorbere et per viam urinariam vel sudores eliminare valent: hinc *calomel*<sup>41</sup>), *aethiops antimonialis*, *pulveres PLUMERI*, *stipites solani dulcamarae*, *guajacum*<sup>42</sup>), *vinum antimoniatum HUXHAMI*, *sulphur*, *oleum jecconis aselli*<sup>43</sup>), *terebinthinae*<sup>44</sup>) cum melle ac similia.

Ab

*and surg. journ.*, in *FROMIEP Notiz. B.* 36. N. 15 (duae ischiades sanatae).

39) SIGAUD LA FOND *de l'électr. méd.* p. 25. 451. MAUDUYT in *mém. de la soc. R. de méd.* ad 1782 et 83. p. 168. DU BONEIX in *Journ. de méd.* T. 58. p. 136. A. CLEMENS *schnelle Wirksamk. d. Electricität bei ein. nervös. Hüftweh*, in *Jahrb. d. philos.-med. Gesellsch. z. Würzb.* 1828. B. 1. II. 2. p. 157.

40) HUMBOLDT *Vers. üb. d. gereitz. Muskel- u. Nervenfas.* 2. B. p. 23. GRAFENGIESSER *Versuche etc.* p. 142. MARCUS *Magaz. f. Therapie u. Klin.* 1. B. p. 341.

41) MORELLI L. c. *Parvas imprimis doses e. g. granum dimidium bis da die, exhibere soleo.* SCHLESIER L. c.

42) LÖWENHARD L. c.

43) THIER L. c. SUTTINGER in *ROST Mag.* 1828. B. 26. II. 2. p. 385 (unciis sex-octo intra dies quatuordecim ischiadem reballem sanavit). CH. WIEBACH *d. bürgerl. Kr.-Haus in Bergen*, in *GERSON u. JUL. Mag.* 1830. St. 3. p. 500. MÜNZENTHALER in HUFELAND *Journ.* 1834. St. 5. p. 85 (ischiad. post. aradicavit). MOLL *üb. d. Berger Leberthr.*, ex *Pract. Tydschr.* 1834. Jan. Febr. in *SCHMIDT Jahrb.* 1835. B. 8. p. 143. 144 (neural. crural.).

44) HORN *klinische Versuche und Krankengeschichten*, CREYNE



Ab *aconito* <sup>45)</sup> aliisque hujus generis narcoticis <sup>46)</sup> excepta *digitali purpurea* parum in *neuralgiis* lucri obtinuimus. *Opium* ad sedandos dolores, noctu porrectum, conducit quidem, sed ob alvi inde excitatam obstructionem, praesepimis in neuralgia ischiadica, nocet. *Morphium* <sup>47)</sup> non adhibuimus.

Prae-

on the Gout. §. 71. STEEDMAN *medical essays and observations*. Vol. II. p. 48. MARTINET l. c. et in *Revue méd. fr. et étrang.* Par. 1828. Nouv. p. 222 (externum et internum usum in ischiade n. Cotunn. commendat. E. g. Rj. Ol. Terebinth. ʒij. Mell. rosar. seu mucilag. ʒjv (aut Magnes. conjunct.), ter quaterve de die cochlear maj. sumend. Inter 70 aegrotos 58 sanavit). Cfr. FRORIE Notiz. 1829. B. 23. N. 7. p. 103. WERNICK in CLARUS u. RADIGS *wöchentl. Beitr.* 1833. B. 1. N. 20 (extollit virtutes in ischiade nerv., et doses magnas exhibuit). BLUFF in *Heidelsb. klin. Ansal.* 1835. B. 1. H. 3. p. 464 (guttal. 30 c. Saccharo omni bihorio). P. J. SCHNEIDER in HUFBLAND *Journ.* 1837. St. 3. p. 30. N. 2 (interne et externe).

45) LÖWENHARD l. c.

46) Extract. Dat. Stremon. contra ischiad. nervos. BUCHER diss. inaug. Edinb. 1829. Pulv. Stremon., endermice adhibet., commendatur, FRORIE Notiz. 1831. B. 32. N. 9 (et contanditur, minus narcotice agere, quam morphium, qua ex cause TROUSSEAU et RECAMIER huic anteponebat et gr. j—jjj applicat). De extract. Belladonna, et Hyosc. v. DE BARRE *Behandl. d. Neuralg. ischiad.* ex *Journ. des con-naiss. méd.* 1836. N. 6. in SCHMIDT *Jahrb.* 1837. B. 15. p. 188.

47) OMOIDEI ann. univ. 1829. Lugl. p. 42. LAMBERT apud RICHTER in *Rust Magaz.* 1830. B. 32. II. 3 (ischias postica). ROMBERG in *CARPER Wochenschr.* 1833. N. 12 (neuralg. rebell. brachii sinistri sanavit, nec non alias neuralg. extremitat.; in ischiada autem incassum adhibuit). HRYFFELDER in *SCHMIDT Jahrb.* 1835. B. 8. p. 122. BOUILLAUD neuralg.

## 262 DE NEURALGIIS EXTREMITATUM.

Praesente complicatione venerea et *mercurio sublimato corrosivo* <sup>48)</sup> aliisque antisyphiliticis locum esse, sponte patet <sup>49)</sup>. Viribus provectioni in morbo eo securius *cinchonâ* <sup>50)</sup> aliisque tonicis, nec non victu selecto nutriente prospici potest; quo minus aeger haemorrhoidarius est, vel praeter modum sensibilis. Tandem non reticendum *musicam* in ischiade sibi omni aevo laudem promernisse <sup>51)</sup>.

### DE

femoro-popliteam, quae quatuor annos saevierat, morphio, endermice adhibito, intra paucos dies debellavit. v. SCHMIDT *Jahrb.* 1835. B. 5. p. 232. MONDIERE duos refert casus feliciter sanatos. Ex *Archiv. gén.* 1835. Févr. in SCHMIDT *Jahrb.* 1835. B. 8. p. 174. 175. A. AHNSEN diss. de methodo endermica. Havn. 1836. p. 97 (ischias nerv. postica). M. JANSKOWICH *einig. Bemerk. üb. endermat. Heilmethode, nebst Heilversuch.* in *Oesterr. med. Jahrb.* 1838. B. 14. St. 4. p. 530.

48) Et complicatione ista deficiente adhibuerunt aut *incassum*; aut aliis remediis conjunctum: LÖWENHARD l. c. (cum Extr. Guajac., Aconit. et opio). SCHLESIER in CASPER *Wochenschr.* 1837. N. 8 (c. Extr. Stramon., aliâs incassum. ib. 1838. N. 26). SAUTER (*Oesterr. med. Jahrb.* 1839. B. 28. St. 4. p. 553).

49) Silentio praeterimus *Creosoti* adhibitionem (SCHLESIER l. c. REICH *Beobacht. üb. d. med. Wirk. des Creosots*, in HUFELAND *Journ.* 1834. St. 1) et medelam psychicam (EISENMANN in GRAEFE u. W. *Journ.* 1834. B. 22. p. 108).

50) Sulphas chinini a RIBES aliisque commendatur l. c.

51) CARL. AURELIANUS p. 555. ZACUTUS LUSITANUS l. c. Eph. Nat. curios. dec. I. ann. I. REDI obs. de vipera. p. 24.

DE MORBIS EX VARIIS  
**SYSTEMATIS NERVOSI**  
PARTIBUS INDISCRIMINATIM  
ORTUM DUCENTIBUS.

---

The first part of the paper is devoted to the study of the  
 properties of the function  $f(x)$  defined by the equation  

$$f(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt$$
 and to the proof of the following theorem:

The function  $f(x)$  is continuous and strictly increasing on the interval  $(-\infty, \infty)$ .

The second part of the paper is devoted to the study of the  
 properties of the function  $g(x)$  defined by the equation

$$g(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt + \int_0^x \frac{1}{1+t^4} dt$$

and to the proof of the following theorem:

The function  $g(x)$  is continuous and strictly increasing on the interval  $(-\infty, \infty)$ .

The third part of the paper is devoted to the study of the  
 properties of the function  $h(x)$  defined by the equation

$$h(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt + \int_0^x \frac{1}{1+t^4} dt + \int_0^x \frac{1}{1+t^6} dt$$

and to the proof of the following theorem:

The function  $h(x)$  is continuous and strictly increasing on the interval  $(-\infty, \infty)$ .

## CAPUT VIII.

### *De morbo cereali,*

#### §. XXXVII.

#### *Definitio. Historia.*

1. **A**ffectionem systematis nervosi, formi-Definitio.  
cationis sensu, temulentia, neuralgiis, nunc moti-  
bus convulsivis, nunc gangraenâ extremitatum  
insignitam, ex usu farinae secale cornutum conti-  
nentis ortam, plerumque epidemicam, *morbi ce-  
realis* nomine compellamus<sup>1)</sup>.

#### 2. Utrum

1) *Synonyma.* *Morbus convulsivus malignus et epidemicus*  
*auctorum* (Denominatio antiquissima, sed re ipsa nullum  
peculierem morbum exacta designans). — *Raphania* LIN-  
NAEI, CULLENTI (Appellatio LINNAEO usitata, qui im-  
merito raphano raphanistro frumentis admixto, morbum  
tribuit, cum haec quidem herba, hordei potius et avenae  
segetibus infesta, secale non inficiat, ejus tamen deprava-  
tio vel maxima accusanda est). — *Necrosis ustilaginea*  
*SAUVAGEUSII* (Nomen unum modo morbi nostri varietatem  
designans). — *Convulsio Soloniensis* (SALERNE). (Morbus  
non solum provinciae Galliae Soloniensi proprius, sed  
ubique locorum obvenire solitus). — *Convulsio cerealis*  
*BALDINGHUI*, *convulsio dolorifica DARWINT* (Convulsiones  
non sunt necessarium morbi symptoma). — *Myrmekiasis*  
*SWEDIAURII* (a Gr. *Myrmekiasis*, fornicatio, quae pri-  
marium hujus morbi, at non perpetuum symptoma consti-  
tuit). GRÆC. *Kriebelkrankheit*, *Krampfsucht*, *Krampf-*

## Historia.

2. Utrum *sacrae paginae* jam morbum cerealem designaverint<sup>2)</sup>? — utrum *Gentiles* Deum *Robigum* adversus eum imploraverint<sup>3)</sup>? utrum huc spectet morbus inter Massilienses ex inopia et depravatione rei frumentariae regnans, de quo JULIUS CAESAR loquitur<sup>4)</sup>? aut febris epidemica ex frumento corrupto, tempore famis orta, de qua GALENUS scribit<sup>5)</sup>? aut ignis sacer medii aevi<sup>6)</sup>? — doctioribus dirimendum derelinquimus.

Dubia

*sucht, Hiebelkrankheit, epidem. Epilepsie, Ziehseuche, ziehende Seuche.* GALL. *Ergotisme.* POL. *Choroba zbożowa, Rafania.* ROSS. Злая судорга, Переменяющіеся корчи.

2) MOIS. Lib. V. 28. v. 22.

3) VARRO L. de re rustica. COLWELL. de cultura hortor. OVID. Fastor. Lib. IV.

4) De bello civili. L. II. c. 22. Cfr. GAUNER morb. antiquit. p. 103. et SPRENGEL *Vers. u. pr. Gesch. d. Arzneyk.* 1827. B. 3. p. 268.

5) De differ. febr. L. I. p. 322. L. I. de med. facult. c. 37.

6) Symptomata characteristica, ambobus morbis familiaria; eorum causas occasionales et excitantes, nec non regiones, in quibus occurrere solabant, identitatem ignis sacri aut St. Antonii et morbi cerealis gangraniosi, quam Francogalli *ergotisme* appellant, extra dubium ponunt. Talem sententiam RAYMOND, READ, TISSOT, TESSIER, ORANAN et FODERÉ tenent, in quali et C. H. FUCHS mandat, qui quod argumentum bene dilucidavit et in fine tractatus sui: *das heilige Feuer des Mittelalters. Ein Beitrag z. Gesch. d. Epidemien*, in HECKER *Annal.* 1834. Januarh. p. 1—81, concludit: „dass das epidemische heilige Feuer des Mittelalters, der Ignis sacer oder St. Antonii, eine u. dieselbe Krankheit mit der durch *Sacale cornutum* erzeugten

Dubia quoque morbi cerealis vestigia apud H. SAUVALIUM<sup>7)</sup> et DODONAEUM<sup>8)</sup>, certiora apud SCHENKIIUM<sup>9)</sup> et certissima apud SCHWENKFELDIUM<sup>10)</sup>, utpote jam veram mali causam indicantem, obveniunt. Sequebantur scriptores de epidemiis morbi cerealis, inter quas infamatae sunt illae annorum 1596, in *Hassia*<sup>11)</sup>, — 1600 in tota fere Eu-

Gangrün, dem Ergotismus der Franzosen, sci.“ Cfr. SPRENGEL l. c. p. 269.

- 7) v. SCHNURER *Chronik d. Seuchen. Tübing. 1825. Th. 2. p. 80* (morbus cerealis a. 1590 in Delphineto grassans).
- 8) *Observ. medic. exempl. rare Colon. 1581. p. 82.* (De epidemia scorbuti an. 1556 Brahentiae ex frumento corrupto loquitur). Cfr. J. A. F. OZANAM *hist. méd. gén. et partie. des malad. épidém. etc. Par. 1823. T. 5* (q. uxor). Ed. alter. 1836. p. 121. SCHNURER l. c. p. 98. H. v. MARTIUS *Ausz. aus d. Chronik v. Altencelle; in Dresdner Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. 1827. B. 5, H. 1. p. 105—133.*
- 9) Lib. VI. p. 830 (en. 1561 Lüneburgi malum atrox grassabatur notis morbi cerealis insignitum. v. SPRENGEL l. c. p. 115. OZANAM l. c. p. 123. SCHNURER l. c. p. 137. 138. MARTIUS l. c.)
- 10) Theriotroph. Silesiae p. 334. Lignic. 1605 (en. 1588 et 1598 inter incolae Silesiae, sub nomine das Kromme). v. MARTIUS l. c.
- 11) HORST de morbo convulsivo maligno et epidemico; in obs. med. L. III. part. II, eppend. p. 299. *Von ein, ungewöhnlich. vnnnd biesanhero in diesen Landen vnnbekandten giftig. ansteckend. Schwachheit, welche der gemeyne Mann dieser Ort in Hessen d. Kriebelkrankh., Krimpfsucht oder ziehende Seuche nennt, samt angehengt. Tractülein v. Curation d. Pestilens u. Nöten. Edirt durch die Professor. facultat. med. d. Universit. zu Marburg in Hessen, gedruckt zu Marb. 1597. 4. (Cfr. SCHNURERUS libr. de febrib.*

*Europa*<sup>12)</sup>, — 1630 in *Gallia*<sup>13)</sup>, — 1648 in *Boigtlandia*<sup>14)</sup>, — 1650, 1670, 1674 et 1675 in *Galliae* provinciâ *Vasconica* et *Soloniensi*<sup>15)</sup>, nec non in *Anglia*<sup>16)</sup>, — 1690 *Finali*<sup>17)</sup>, — 1693 in regionibus *Nigrae Silvae*<sup>18)</sup> et 1695 *Augustae Vindelicorum*<sup>19)</sup>, — 1709 in vicinia *Blesarum*<sup>20)</sup>, — 1710 in *Insubria*<sup>21)</sup> et in *Gallia*<sup>22)</sup>, — 1716—  
1717

p. 563 et 567). De convulsione cereali epidem. novo morbi genere, facultat. med. Marburgens. responsum; libell. prim. rarum et argumento gravem recudi curav. notulis-  
qua aux. D. CHR. GOTTFR. GRUNER, Jen. 1793. JOH. FR. NIEMAN *Symbiot. Leipz.* 1819, p. 49. v. MARTIUS l. c. Quae epidemia et alias regiones devastavit. HALLER bibl. med. T. II. p. 293. SCHNURER l. c. p. 146.

12) WHESTER et HORST apud SCHNURER l. c. p. 151.

13) SCHNURER l. c. p. 170. Cfr. OZANAM l. c. p. 144.

14) GOTT. BUDDANUS *consilia medica von der Krampfsucht, Budissin* 1717.

15) *Journ. des savans*, an. 1676, T. 4. p. 79. *Encycl. méth. agricult. art. Ergot.* TISSOT apud SCHNURER l. c. p. 188 et 207. OZANAM l. c. p. 145.

16) THOM. WILLIS de morbo convulsivo, C. 8. p. 45. BRUNNER *Eph. nat. cur. dec. III, an. 2*, p. 348.

17) RAMAZZINI op. med. T. II. *Constit. epidem. ruralis* a. 1690.

18) WEPFER apud OZANAM l. c. p. 127.

19) *Ephem. nat. cur. dec. III.* et OZANAM l. c. p. 146.

20) OZANAM l. c. p. 146.

21) GINANNI *delle malattie del grano in arba*, Pesara 1755. MOSCATI in *Nuovo giorn. di Milano*, T. 9. WHEIGL *Ital. Biblioth. B.* 3. St. 2. p. 28. *Üb. eine convulsiv. Krankh. im Waisenb.*, z. Mailand, Wien 1796. Cfr. OZANAM l. c. p. 141 sq.

22) *Mém. de l'ac. des sc. à Paris* 1710. p. 80.



1717 in *Saxonia*<sup>23)</sup>, *Holsatia*<sup>24)</sup>, *Helvetia*<sup>25)</sup>, — 1722 *Stettinii*<sup>26)</sup>, — 1736 iterum in *Silesia*<sup>27)</sup>, *Hannovera*<sup>28)</sup> et in *Holsatia*<sup>29)</sup>, — 1741 et 1742 in *Marchia Brandenburgica*<sup>30)</sup>, — 1745, 1746, 1747 et 1754 in *Gothia*<sup>31)</sup> et *Gallia*<sup>32)</sup> *Occidentali-*

23) WEDEL Diss. de morbo spasmod. epidem. maligno in Saxonia, Lusatia etc. grassato et adhuc grassante. Jen. 1717. v. HALLER diss. pr. Vol. VII. p. 557. WILISCH Bericht d. Krampfsucht od. spasmod. Krankheit, so in unterschied. Ort, uns. Vaterlandes im vergang. Jahr sich ereign. Pirna 1717. LONGOLIUS Judic. med. de corrupt. lymphæ per frumentum corrupt., oder von Kornstaupen, Reissen, Ziehkrantheit, Krampfsucht u. Kriebelkrankh. 1717. HABERKORN Gedanken v. d. Ziehe- od. Nerven-Krankh. Budissin 1717. BRUNO Gottgewidmete Gedank. v. d. Krampf- oder Kriebelsucht, Budissin 1717. A. KUNRAD considerat. theologic. morbi et phantasmat., quibus Annabergae nonnulli hom. utriusq. sexus ac diversae ætatis hoc et superiorib. ann. conficti sunt. Annab. 1717.

24) WALDSCHMIDT de morbo epidem. convuls. per Holsatiam grassante. Kiliae 1717. v. HALLER diss. pract. Vol. I. p. 75. Breslauer Samml. 1718. Sept. p. 76.

25) K. N. LAMM Beschreibung des schädlichen Genusses der Kornapfen im Brodte. Lucern 1717. aut: descript. morbor. ex usu claverum Campaniae. ib. eod. ann.

26) MÜLLER act. med. Berolin. Dec. III. Vol. VI. p. 50. Cfr. FR. HOFFMANN opp. Vol. III. p. 34.

27) SCRING et BURGHART in Satir. med. Siles. Spec. III. p. 55. 57. VATER Diss. obs. select. de morbo spasmod. populari Silesiacos. Wittemb. 1723.

28) WICHMANN apud SCHNURER l. c. p. 283.

29) BRÜCKMANN in Commenc. lit. Norimb. an. 1743. p. 50.

30) MÜLLER Disputat. de morbo epid. spasmod. convuls. contagii expert. Francf. ad Viadr. 1742.

talibus, — 1749 *Insulis* <sup>33)</sup>, — 1755 in *Borussia* <sup>34)</sup>,  
 — 1764 *Atrebat* <sup>35)</sup>, — 1770—1772 in *Hassia*  
*inferiori et regionibus vicinis* <sup>36)</sup>, partem *Succiae*  
 et

31) LINNAEUS *amoenit. eced.* Vol. VI. p. 430. ROSENSTRINII  
*Diss. de morbo spasmod. convuls. epidem.* Londin. Goth.  
 1742. A. BERGER *Diss. de morbo epidem. spasmod. con-*  
*vuls. contagii experte.* Frankf. 1742. HALLER *Coll. Diss.*  
*pr.* Vol. I. N. 6. ROTHMANN (praesid. LINNAEUS) *diss. de*  
*Raphenis.* Upsal. 1763. Cfr. OZANAM l. c. p. 136.

32) MULCAILLE in *Mém. de l'ac. des sc. & Par. a.* 1748.  
 p. 528.

33) BOUCHER apud OZANAM l. c. p. 148.

34) COTHENIUS v. d. *Kriebelkrankheit.* Potsdam. v. SCHREDER  
*Samml. v. Kameralchrift. I. Th.* Halle 1755.

35) BRAD *traité du ceigle ergoté.* Straßb. 1771. OZANAM l. c.  
 p. 130. SCHNURER l. c. p. 345.

36) E. WICHMANN *Beiträge z. Gesch. d. Kriebelkrankh. im*  
*J. 1770.* Lpz. u. Celle 1771. et in *ejusd. kl. med. Schrift.*  
*Hannov.* 1799. R. A. VOGEL *Schuttschrift vor das Mus-*  
*terkorn, als ein. angebl. Ursache d. sogenannt. Kriebel-*  
*krankh.* Gött. 1771. MARCARD v. *ein. d. Kriebelkrankh.*  
*ähnl. Krampfsucht, d. in Stade beobachtet ist.* Hamb. 1773.  
 J. TAUBE *d. Geschichte d. Kriebelkrankh., welche 1770 u.*  
*71 in den Cellisch. Gegend. gewüthet hat.* Gött. 1782. HUN-  
 NANN *Abh. v. d. Kriebelkrankheit, eo in Niederhessen v.*  
*1771—1772 grassirt.* Cassel 1774. BALDINGER *verschied.*  
*Nachrichten üb. d. 1770 herrschende Epidemie im Fuldai-*  
*schen.* Ejusd. *Secula cornut. perpetua a nonnull. ab in-*  
*famie liberatum.* Jen. 1771. *Nachricht. v. d. Kriebelkrankh.,*  
*welche im Herzogth. Lüneburg 1770 u. 1771 grassirt u. wie*  
*selb. geheilt word.* Zelle 1771. ROUNDER *Abh. v. d. in*  
*Teutschland hin u. wieder grassirend. Seuche, d. Kriebel-*  
*krankh. genannt.* 1772. SCHLEGEL *pr. obs. circa huj.*  
*temp. et loci epidemias.* Cassel. 1772. *Ejusdem de epid.*  
*antea acuta, nunc chronica.* Cassel. 1773. *Schilderung d.*

et Daniae<sup>37)</sup>. Nec Rossiae morbus cerealis percipit<sup>38)</sup>. Notiones de eo continent *acta Caesareae Societatis Oeconomicae Petropolitanae*<sup>39)</sup> et *Système universae agriculturae*<sup>40)</sup>. Praesertim observatus est in provinciis meridionalibus hujus Imperii, maxime in Guberniis Kiow a. 1785, 86, 87<sup>41)</sup>, Minsk, Podolia, Ucraina, Volhynia, Ecatерinoslaw a. 1804<sup>42)</sup> et Wiatka a. 1819<sup>43)</sup>. Nostro aevo adhuc occurrebat a. 1817 in Stiria<sup>44)</sup>, — 1813,

Witter. — u. Krankh. — Constat. v. Böhmen im J. 1821. Prag 1834.

37) *Vetensk. Acad. Handl. för 1771. ROTH'S Berichte u. Besenk. d. Kriebelkrankh. betreff. Kopenh. 1772.* (Collectio ROTH continet observationes HENSLEI, SEIGEBERG, CONRADI, HERMANNI etc.). Cfr. *Tome med. chir. Bibl.* 1. B. 1. St. p. 32. et p. 150. Cfr. SCHNURKE I. c. p. 399 et 458.

38) СКОБОВ (1722) apud OKANAM I. c. p. 129.

39) Труды еженедѣльные Императорскаго вольнаго Экономическаго Общества N. 3, 5, 17, 62.

40) Полная система сельскаго хозяйства.

41) Описаніе о черныхъ рожкахъ причиняющихъ корчи и померившіе членовъ. Сочиненіе Надворнаго Сов. и Шш. Лѣкаря Стефановича Донцова (*Stefanowicz - Danzow*) Перепечатано 1811. Года въ С. Петербургѣ.

42) Excerptio ex actis Consilii medici Petropolitani, penes Ministerium Instructionis publicae constituti, Jussu Administrati Serenissimi Principis GOLICYN mecum humillime id expetente communicata. Et alterius Consilii med. Petropol. penes Ministerium politicae locuti, hac in re excerptiones possideo.

43) Ibidem.

1813, 1814, 1816, 1820 in pluribus provinciis Galliae<sup>44</sup>), — 1828 Lutetiae Parisiorum<sup>45</sup>), — nec non 1831 et 1832 in nonnullis regionibus Germaniae<sup>47</sup>). Praeter auctores, qui memoratas epidemias descripserunt, de doctrina morbi cerealis adhuc bene meruerunt plurimi, non solum inter medicos sed et inter physicos agricultoresque<sup>48</sup>).

## §. XXXVIII.

44) V. SCHÖLLER *Krankh. - Constitut. in Steyermark des J. 1817. in Beobacht. u. Abhandl. a. d. Geb. der gesamt. pr. Heilk. v. Oesterr. Aerzt. Wien 1828. B. 6. p. 1 sq.*

45) BOUCHET, JANSON apud OZANAM l. c. p. 151. COURHAUT l. citando.

46) Epidemia, quae etiam in nonnullis aliis Galliae urbibus saeviit, magnam saltem similitudinem cum morbo cereali alit. GENESTIUS duas formas describit, in quarum priori erythema inflammatorium manuum pedumque, in ulteriori paralysis extremitatum pathognomica fuere. In malo chronico decurrente cutis extremitatum nigrescebat. GENEST in *Archiv. gén.* 1828. Octbr, Novbr, et 1829. N. 1. et 3. Cfr. HECKER *lit. Annal.* 1829. Febr, et 1830 Jun, p. 209. *Revue méd.* 1828. T. 4. p. 445 sq. DE FERRUSSAC in *Bullet. des sc. méd.* 1828. Novbr, p. 252 sq. Cfr. GERONDE JUL. *Mag.* 1829. Mai, Jun, p. 498.

47) WAGNER *Beobacht. d. Kriebelkrankh. im J. 1831. in HUFELAND Journ.* 1831. St. 10. p. 3—16. *Nachtr. z. Beobacht. etc. ib.* 1832. St. 5. p. 71—81. *Ejusd. Gestaltung d. Kriebelkrankh. (convulsio cerealis) in den Niederung. d. schwarzw. Elster im Frühjahr 1832 etc. ib.* St. 6. p. 3—19. *Ejusd. Endbericht üb. Convulsio cerealis im Schwarzburger Kreis u. Umgegend im J. 1831—32. ib.* St. 9. p. 97—107. BURDACH in CASPER *Wochenschr.* 1834. N. 45. SCHRAMM *kurze Schilder. ein. Kriebelkrankh. in CASPER Wochenschr.* 1833. N. 18. p. 377 sq.

48) CAMERARIUS de ustulagine frumenti. Tub. 1709. DEHAMRL.

mém. de l'acad. R. des sciences, an. 1748. **SALERNE** mém. de l'acad. R. des sciences à Paris 1748, p. 523. **MOHLER** conjectura de caus. secal. cornuti v. *Oecon. phys. Ach.* v. **JACOB.** *Leips.* 1751. **TILLET** diss. sur la cause, qui corrompt et noircit les grains du bled dans les épis et les moy. de prévenir les accidens. *Bord.* 1755. *Ejusd.* Suite des expériences et réflexions relatif. à la diésert. etc. *Par.* 1755. **BLOM** diss. de affectu spasmod. vago maligno. *Erf.* 1756. **LUDOLF** diss. sistens casum novi mali spasmod. convuls. *Erf.* 1727. *Ejusd.* de affectu spasmod. vago, maligno, epidem., vernac. *Grübelkrankh. Erf.* 1786. **BAKER** *Phil. transact.* 1761. **FONTANA** osserv. sopra la rugg. del grano. *Lucca* 1767. *Journ. de phys.* T. 7, p. 42. Et: *Saggio sopra il falso ergot e tremella.* *Firenze* 1755. **FRENZ** *Nachricht vom brandigen Weizen, Hamb.* 1768. **VENTILLARD** mém. sur une espèce de poison connu sous le nom d'Ergot. *Journ.* 1770. **VOGEL** *Schutzachr. f. d. Mutterhorn als e. angebl. Ursache der Kriebelkrankh. Gütt.* 1771. **FOKENS** *Versuche und Beobachtungen in der eo genannten Krübel-sucht, Zelle* 1771. **BEGUIET** diss. sur l'ergot ou blé cornu. *Dijon* 1771. **BOUHIX** mém. e. la nature et les effets du seigle ergoté p. serv. de refut. au mém. de **SCHLEGGER.** *Paris* 1771. **MOHEL** *phys. chem. Untersuch. d. Mutterhorns.* 1771. *Fortsetz. sein. chem. Nebenstund. Petersb.* 1768. **SCHÜTCHER** *progr. clavos secalinos perperam a nonnullis venenum morbiq. rigidi cerealisve causam nominari.* *Castel.* 1771. **NEBEL** diss. de secale corn. ejusq. nox. *Giess.* 1771. *Progr. quo diss. tamerar.* **SCHLEGGER** *viand. Giess.* 1772. **ESCHENBACH** *Bedenk. v. d. Schädlichk. d. Mutterhorns.* *Rostock* 1771. **LEIDENFROST** diss. de morbo convulsivo epidemico Germanorum, catitatis annonae comita. *Dnib.* 1771. **BRAWE** *Beyträge zur Geschichte und Kur der Kriebelkrankheit im Jahr 1771.* *Brem.* 1772. **SANGIORGIO** *dissertazione sopra la gramigna che nella Lombardia infesta le segale.* *Milano* 1772. **LENTIN** *Beob. ein. Krankh. Gütt.* 1774. p. 1—80. **TISSOT** *oeuvres. Edit. Lausanne* T. 13.

Art.

*Art. 13. Des maladies produites par le seigle ergoté, l*  
*v. d. Kriebelkrankh. u. ihr. wahrscheinl. Ursache*  
*Genusse des Mutterkorns. Lpz. 1771. MAILLANT 1*  
*Comment. Vol. IX. p. 161. ROUYREDI suite d'observ.*  
*sur le rachitisme du blé, sur les anguilles de la co*  
*farine, et sur le grain charbonné. v. Journ. de ph*  
*RUSIER. Paris 1775, T. 5. p. 197. et T. 7. p. 369. Ts*  
*traité des mal. des grains. Paris 1783. RYAN de r*  
*nia. Edinb. 1784. ROUCIER DE LA BERGERIE d'une m*  
*du seigle v. la décade philosophique, septième année*  
*xième trimestre. p. 261. ROSSIG Abhandlung übe*  
*Mutterkorn, dessen Entstehung etc. Leipz. 1786. SCI*  
*TER Bemerk. üb. d. Mutterkorn, u. was dabey in A*  
*d. Gesundh. zu beobacht. ist. Rinteln 1792. KIRCH*  
*Beob. üb. d. Mutterkorn u. dess. Entsteh. Altenburg*  
*RENAULDIN in dict. d. scienc. médicales. T. 13. Art. .*  
*p. 162. Ergotisme. p. 166. PH. BUDETZIIUS diss. de*  
*vuls. cereali. Vienn. 1814. KJELLMANN Svenska Lä*  
*Sällskapets Handlingar. 2. Vol. 1815. Stockholm. Lec*  
*gazette de santé p. MR. MONTAGNE. Paris 1817. -*  
*WILDENOW Grundriss zur Kräuterkunde. N. 474. Ot*  
*ROTH in HUFELAND Journ. 1817. Novemb. p. 96. Was*  
*ibidem p. 68. C. J. LORINER l'ers. u. Beobacht. in*  
*Wirk. des Mutterkorns auf d. m. u. thier. Körper, etc.*  
*lin 1824. J. F. COURHAUT tr. de l'ergot du seigle c*  
*ses effets sur l'économ. animale, principal, la gang*  
*Par. 1827. F. ROBERT Erläuterung u. Beitr. z. med.,*  
*Geschichte des Mutterkorns; in RUST Mag. 1827. B*  
*II. 1. p. 3—50. II. 2. p. 199—251. VILLENEUVE hist. l*  
*riq. sur l'emploi du seigle ergoté. Par. 1827, Germ. in*  
*Samml. auserles. Abh. f. pr. A. 1828. B. 11. St. 3. p. 18*  
*St. 4. p. 658 sq. B. 12. St. 1. p. 116 sq. ROULIN in B*  
*des sc. méd. 1829. Août. p. 275. Kriebelkrankh. nach*  
*nuss v. Mutterkorn; in A. ANDREAE Med.-Ber. des K*  
*Med.-Colleg. d. Provinz Sachsen f. d. J. 1830. Mag*  
*1831. H. A. L. WIGGERS inquisit. in secale ergotat.,*

## §. XXXVIII.

*Symptomata. Necroscopia.*

1. Morbus cerealis duabus sub formis obve-<sup>Genera-</sup>nire solet, quarum altera chronica, *convulsiones*,<sup>tim.</sup> altera acuta, *gangraenam* exhibet<sup>1)</sup>.

## S 2

## 2. Mor-

spectu imprimis habito ad ejus ortum, natur. at part. constituentes etc. Goett 1831. Comment. praemio regio ornate. W. Ditz *Vers. üb. d. Wirk. d. Mutterkorns auf d. thier. Organism.* etc. Tübing. 1831. R. PADIERA da sacali cornuto. Berol. 1831. C. EICHMANN *Kriebelkrankh., muthmaasslich durch den Genuss des Samens d. Nigella sativa erzeugt*; in GRAEFF u. W. Journ. 1833. B. 19. St. 1. p. 129 sq. A. ARM. WAGNER de convulsione cereali. Berol. 1833. S. J. GALAMA *Verhandl. over het Moederkorn etc. The Groning.* 1834. p. 70—129. J. MACHER diss. de raphania. Vindob. 1834. GIUL. SPADYANI *del modo d'agire della segale cornuta sull' uomo sano ed ammalato etc.* Pavia 1834. p. 20. 21. CHARL. HOOKER v. d. *Eigenthümlichkeit, u. nächst. Bestandtheil. des Mutterkorns*; ex Boston j. Vol. 10. N. 19, in SCHMIDT Jahrb. 1835. B. 8. p. 8 sq. H. HOLLARD *précis d'anat. comparé ou tableau de l'organisation, considéré dans l'ensemble de la série animale.* Par. 1835. p. 548. TOTT *der Kriebelkrankh. nahe stehende Nervenfieber-Epidem.*, in CLARUS u. RADICS Beitr. 1836. N. 8. FR. STARK diss. de raphania. Vindob. 1836. A. MAGANZA diss. de raphania. Pavia 1837. M. KARG diss. de raphania. Vindob. 1837. B. S. PATUZZI diss. de raphania. Pav. 1838. WAGNER d. *Kriebelkrankh. im J. 1838.* in HUYVELAND Journ. 1839. St. 2. p. 21 sq. et BRACH *üb. Kriebelkrankh. u. Mutterkorn*, in Med. Ver.-Ztg. 1839. N. 38. p. 187. N. 39. p. 191.

- 1) Cfr. TAUBER l. c. OZANAM l. c. p. 153. SPRENGEL l. c. B. 5. (1828). p. 553. VILLENEUVE l. c. p. 411 („Die Zufälle . . . lassen sich in zwei Hauptklassen eintheilen“

Forma  
prima.

2. *Morbus cerealis convulsivus* ingruere solet dolore spinae dorsi <sup>1)</sup>, lassitudine et *sensu reptatus formicarum* <sup>2)</sup> super cutim atque alio ac si membra a se invicem distraherentur, quin immo ac si lacerarentur. Urgent praeterea *dolores atroces* diros exprimentes ejulatus <sup>3)</sup>. Aeger pavorebus e somno excitatur <sup>4)</sup>. Accedunt subsultus tendinum <sup>5)</sup> ipsaeque *convulsiones* <sup>6)</sup>, quibus membra aut veluti in chorea Sti Viti miro modo agitantur, aut veluti in opisthotono rigent <sup>7)</sup>. Pulsus in-

1) Schwindel, Krämpfe, Convulsionen; 2) Gangrän oder Sphacelus der Extremitäten. Beide Arten treten isolirt auf u. machen die Kriebelkrankheit aus<sup>1)</sup>. Solum in epidemia Insularum, a BOUCHER descripta, utroque forme conjuncta fuit. ROBERT, GALANA II. c. c. Contraria FUCHS (l. c.) in illis duos morbos diversos vidit.

2) STEFANOWICZ - DONCOW l. c.

3) In epidemia Parisiensis a. 1828 (GURSON u. JUL. Magaz. l. c. p. 498): „unerträgliches Anwesenkriechen, besonders an den Fingerspitzen u. Fusssohlen,“ et p. 499: „Mehrere klagen, dass, wenn sie die Füese auf die Erde setzten, sie wie auf Nadelspitzen oder Dornen gingen; ähnliches zeigte sich, wenn sie Gegenstände mit der Hand berührten, so dass sie dieselben fallen lassen mussten. Einige bewegten sich auf den Ellenbogen u. Knien von einem Orte zum andern, um nur nicht die Fusssohlen mit dem Boden in Berührung zu bringen.“ BRACH l. c. p. 188.

4) SCHNURRR l. c. p. 137. 146. HERMANN l. c. p. 11. SCHRAH l. c. WAGNER l. c. (1838). p. 25 et 27.

5) HERMANN l. c. p. 14.

6) GRUBER l. c. (1829). BRACH l. c. p. 188 (ut symptoma pathognomicum affert).

7) HERMANN l. c. p. 13.



interea naturalis<sup>8)</sup> et febris nulla, nisi aestus intestinus, aliorum dorsi, temulentia capitis, cum siti extingui nescia, et sudores pro febris indicibus habeantur. Dum aeger laborat, maxime dum prandet, repente angores, pectoris oppressionem, animi deliquia, persentit, et quandoque apoplecticorum more humi procumbit<sup>10)</sup>. Expergefactus capitis dolorem queritur immanem et cardialgiam. Cum paullo magis ad se redit, *fame insatiabili* afficit<sup>11)</sup>, omniaque sine discrimine vorare solet et nisi cibum manibus ori adferre potest, illum animalium instar ore arripere tentat. Subsequitur in multis vomitus, quo pituitae tenacis copia, et aliquando vermes (trichocephali<sup>12)</sup>), rejiciuntur, parum plerumque levaminis afferens. Accessus per circuitus tertianarios, vel sine ordine recurrunt. Dum remittunt, superest in membris languor summus, stupor, resolutio, vel contractio ea, ut solis digitis pedum incedere cogantur. Musculi pollicis tabescunt<sup>13)</sup>. Animi desponsio, fatui-

8) BRING I. c. HERRMANN I. c. p. 9. In epidemia Parisiensi a. 1823. V. GRISSON M. JUL. Magaz. I. c. p. 499.

WAGNER I. c. (a. 1831 et 1838. p. 25). BURDACH, BRACH II. c.

9) „Puls normal“ WAGNER I. c. (1836). p. 26 et 27.

10) „Sie stürzen unvernünftig zu Boden u. glauben sich bekehrt.“ WAGNER I. c. (1831).

11) „Non aliter ac si bulimia laborarent“ SCHNURER I. c. p. 136 (epidemia 1581). LONGOLIUS I. c. (1717). HERRMANN I. c. p. 10.

12) SPRENGEL Inst. med. Amstel. 1814. Vol. 4. §. 538. 539. EICHMANN I. c. (emetico sumpto).

13) LENTIN I. c.

fatuitas, loquela balbutiens<sup>14)</sup>, spuma ci-  
coram ore, maxillae inferioris motus et deg-  
impedita<sup>15)</sup>, vox debilis, facies livida col-  
quasi arida, pupilla dilatata<sup>16)</sup>. Accessus  
crebriores post aliquot hebdomadas<sup>17)</sup> diarr-  
nervorum resolutiones<sup>18)</sup>, anthraces, bulli  
bubones et ecchymomata<sup>19)</sup> inducant, quibus  
acceleratur. Super haec in longum protr-  
morbus, dum in epilepsiam abit pertinacis-  
aut fatuitatem, in suffusionem etiam lentis-  
piam<sup>21)</sup> et membrorum singulorum resolutione

**Forma  
secunda.**

3. *Morbus cerealis gangraenosus* capi-  
ventriculi doloribus atque temulentia orditur  
aliquot dies utplurimum<sup>22)</sup> febris accenditur  
aestu intestino validissimo, *formicarum re-*  
*tium*, languorisque in membris sensu et sudo

14) „Bei mehreren stellte sich noch ein eigener Zungen-  
ein, wobei die Zunge aus dem Munde hervorragte  
Sprache unverständlich ward.“ BERDACH l. c. SCHRA

15) STEFANOWICZ-DONCOW l. c.

16) BERDACH

17) A hebdomadibus 4, 8 ad 12. SRING, BURGHART

18) Paralysis extremitatum erat frequens in epidem  
wiensi a. 1785 et 86. STEFANOWICZ-DONCOW l. c.

19) HORST l. c. p. 32. SCHNURER l. c. p. 147 (in ej  
a. 1595). FR. HOFFMANN l. c. T. 3. p. 34. SI  
BURGHART l. c.

20) SRING l. c. GENEST l. c. 1829 (in epidemia Par

21) SRING l. c.

22) SCHNURER l. c. p. 137 (in epidemia a. 1581).

23) Desiderabatur febris in epidemia a LANGIO de  
l. c. Sic Medici Vratislav. l. c. In epidemia Pa  
(a. 1828) febris mox vehemens, mox nulla. v. GENE

24) GENEST l. c. 1829 (in epidemia Parisiensis).

Extremities pallidae, lividae, cutique veluti macerata<sup>25)</sup> instructae, frigore marmoreo tentantur, ad motum impares evadunt, ac summopere, inprimis accedente lecti calore, dolent<sup>26)</sup>. Sequitur anaesthesia membrorum et tandem *gangraena*<sup>27)</sup>, quandoque ichorem foedum fundens, longe saepius sicca. Hoc ultimo in casu sphacelus circumscriptus est, ac membrorum partem sejungit: primum enim caro ab ossibus<sup>28)</sup>, dein digiti, tandem majores articuli; postremo membra à trunco<sup>29)</sup>, sine ulla sanguinis profusione secedunt. Curriculum morbi plerumque est trium hebdomadam.

4. Cadavera ex morbo cereali demortuorum<sup>Necroscopia.</sup> citissime putrefiunt<sup>30)</sup>, exhibentque serum circa occiput et medullam spinalem<sup>31)</sup>, sanguinem in cavitate pectoris extravasatum, cor flaccidum cum ventriculis suis cruore vacuis, arterias et veas, fluido bili simili repletas<sup>32)</sup>, hepar et lienem maculis gangraenosis notatum<sup>33)</sup>, et generatim viscera, apice cordis non excepto, inflammatione erysipelacea correpta<sup>34)</sup>.

## §. XXXIX.

25) LANG l. c.

26) In Epidemia Parisiensis l. c.

27) WEDEL l. c. (in epidemia 1717). In epidemia Galliae.

28) Hist. de l'acad. des sciences. 1709. „Par fois aussi les muscles seuls se détachent, et les os restent comme dans le squelette.“ OZANAM l. c. p. 162.

29) DUNAMEL, SALERNE l. c. Mém. de l'ac. des sc. 1710. LANG, CAMERARIUS ll. cc.

30) GAUBER l. c. SENNET l. c. 31) LENTIN l. c. p. 49.

32) MÜLLER l. c. (venas gastricas). 33) RENAULDIN l. c. p. 168.

34) A. BERGER l. c. Cfr. Necroscop. apud HERRMANN l. c. p. 23—31.

## §. XXXIX.

## C a u s s a e.

C. praedispen-

1. Morbus cerealis inter rusticos egenos venit<sup>1)</sup>. Regiones paludosae<sup>2)</sup> illi inprimis fa Mares plus quam feminae patiuntur<sup>3)</sup>, ma infantes<sup>4)</sup> tempore plenilunii<sup>5)</sup>.

C. exch-

2. Priusquam vera, et in definitione<sup>6)</sup> indicata, morbi cereali caussa innotuerat; crebatur ea in tempestate nebulosa<sup>7)</sup>, in derivatione aeris<sup>8)</sup>, in contagio<sup>9)</sup>, in rei frum riae inopia<sup>10)</sup>, in pane male cocto et impur

1) BRACH I. c. p. 187.

2) RAMAZZINI Constitut. ann. 1692. Cap. 6. In littoribus Baltici creberrime obvenire, fertur. II. MARSH KALINCH med. Ztg. des Ausl. 1833. N. 9 (30).

3) SALERNO I. c. RINNAULDIN I. c. F. ROBERT I. c. I.

4) „Junge zarte Kinder von 1—10 J. ergriff diese Seuche heftigsten“ HERRMANN I. c. p. 38. Plurimi negoti quantum et decimum sextum aetatis annum erant; ultra trigesimum secundum WAGNER I. secundo cit. tummodo pueri ad decimum quartum aetatis annum rapti sunt. BURDACH I. c. F. ROBERT I. c. H. 2.

5) A BERGEN I. c. Cfr. HALLER Samml. acad. Streites Geschichte, u. Heilung d. Krankh. betreff. Ed. C Helms. 1799. I. B. p. 89.

6) §. XXXVII. 1. Legimus, ex usu seminis nigellae exportum esse. EICHMANN I. c.

7) WALDSCHNID I. c. SCHNURER I. c. p. 254. Medici tislavienses; Breslauer Samml. 1718. Septbr. p. 76.

8) KANNENGIJSSEN I. c. HERRMANN I. c. p. 65.

9) GRUNER I. c. SCHNURER I. c. p. 147. SENNERI HERRMANN I. c. p. 18. 19. MARCARD I. c. p. 30. 32.

10) ECHENBACH, LEIDENFROST, MOSCATI.

in melligine<sup>11)</sup>, in nstilagine<sup>12)</sup>, in raphano raphanistro<sup>14)</sup> et in lolio temulento<sup>15)</sup>. Contenderant quidem nonnulli<sup>16)</sup>, *secale cornutum*<sup>17)</sup> nisi plane innocuum, saltem ad tantum malum produ-

11) HORST l. c. p. 21. 22. HEHRMANN l. c. p. 36. 37. 65.

12) LONGOLIES, HABENKORN, TAUBER ll. cc., BERGHN, LENTIN (at iste saltim utpote a melligius secale cornutum a scarabeo solstitiali lussu, irrorante).

13) CAMERARIUS, TILLET ll. cc.

14) LINNAEUS l. c. Ab ANDRAEO WÄHLIN (*Vetensk. Acad. Handl. för 1771*, p. 14—42) contradictus.

15) KIRCHMANN l. c. SCHNURER l. c. p. 254. 351. HEHRMANN l. c. p. 36. 76. MOSON et SILVANO in memoria della soc. di med. emulazione di Genova. T. I. 1801 (non invenitur lolium temulentum in secali sed in hordeo).

16) SCHLEGEL, R. A. VOGEL, LINNAEUS, LEIBNIZ, TAUBER, BRAWE, MARCARD, HEHRMANN l. c. 77. ESCHENBACH, MOSCATI, MOBEL et FARRINGTON (addit. aux *récréat. chim. de MOBEL*). BARRIÈRE v. BEHNEND *Repertor*. 1831. Dezbr. p. 379.

17) Syn.. Calcar, clavus secalinus, secalis mater, secale luxurians, sclerotium clavus, orga. GERM. das Mutterkorn (num ex actione illius speciei in uterum, vulgo die Mutter, forte jam antiquitati nota?), After-, Rank-, Martins-, Hunger-, Schwarz-, Dürrkorn, Kornzapfen, Hahnen-, Vogelsporn, Bockshorn, Roggen-, Korn-, Mehlmutter, Aetzroggen, Hasenbrod, Mutterhernlein, Tottenkopf, Kornstaube, Wolfszähne. GALL. Ergot, eigne ergoté, argot; bled aroté, cornu, farouche, have, rachétique; calcar, chambucle, clou de seigle, ébrun, mane, mère de eigne, eigne ivre, seigle noir. ITAL. Grano allogliato, segala allogliata. ANGL. Ergot, spur. HOLLAND. Aliter. POL. Sporyś, éniec, mącznica. ROS. черные рожки.

ducendum impar esse; at vero experimenta animalibus capta <sup>18)</sup> et sedula inquisitio rerum positionum, sub quibus morbus cerealis evolvit contrarium prorsus demonstrarunt <sup>19)</sup>. Caeteri fateri oportet, tempestatem nebulosam frigidam <sup>20)</sup> et rorem mellitum, (quatenus scilicet ad gignendum secale cornutum contribuunt <sup>21)</sup>) ac inopi-

- 18) SRINO et BURGHART L. c. (in cane). THUILLIER *Jos des savans p. l'année 1676*. SALERNI L. c. (in porc READ, THESIER L. c. Cfr. RENAULDIN L. c. p. 175. et FURON et VILLENEUVE in *Revue méd.* 1831. Juil. v. FRIEP *Notiz. B.* 31. N. 19. et BEHREND *Repertor.* It N. 2. p. 228 sq. et L. c. p. 400. F. ROBERT L. c. H. SCHREGER, LORINER, WAGNER *Endber.* L. c., ROUL DIEZ, WIGGERS L. c. vel in BRANDES *Annal. d. Pharmacie.* 1832. B. 1. H. 1. p. 129. GALAMA L. c. p. 70—1
- 19) Praeter auctores, allatos legi merentur: SCHREUCHER gangraena eliiq. symptomatib. ab esu panis, clavorum acalinar. farina inquinati, excitetis. LA ROCHE in *biblioth. méd.* 1825. T. 48. p. 258 sq. FR. MÖLLER *üb. die Wirkung. des Mutterkorns*; in *Rust Mag. B.* 40. H. ROBERT *Gangrün nach d. Anwend. des Mutterkorns*; *Gaz. méd. de Par. T.* 3. N. 43. in *Summar. des Neuest d. in - u. ausländ. Med. Lpz.* 1832. B. 2. p. 343. LITENBERG in *WILDBERG Mag. f. d. ger. A. W. Berl.* It B. 2. H. 4. p. 392. M. JACOBI *Narkose durch die Anwesen. stark. Dosis Mutterkorn etc.* ex *Arch. méd. de Str.* 1835. Juill. in *SCHMIDT Jahrb.* 1837. B. 14. p. 319. H. *Vergift. durch das Secale cornut.*; ex *North Americ. chiv.* 1835. Mai. in *SCHMIDT L. c.* 1837. B. 16. p. 15.
- 20) An. 1785 in Russia quam rubram vocant, aestas admodum humida nebulosa et frigida fuit, nade messis prius quam mense Septembri colligi potueret, secale nutro ebundans. (STEFANOWICZ - DUNCOW L. c.).

rei frumentariae<sup>22)</sup> (ut omnium aegritudinum popularium fomitem) ad producendum morbum cerealem, indirecte concurrere<sup>23)</sup>. Praeterea vis secalis cornuti tanta non est, ut pauca illius dosis semel bisve exhibita, illico effectus veneficos exserere possit<sup>24)</sup>. Postremo creditur secale cornutum qualitatem veneficam temporis tractu amittere<sup>25)</sup>, unde explicatur, cur epidemia morbi

cerea-

21) LANG nec non LENTIN II. c. c. contendit, secale cornutum sine rose mellito morbum cerealem producere non valere.

22) Cfr. J. P. FRANK *Syst. ein. vollst. med. Pol. Mankheim* 1804. B. 3, p. 206.

23) Qualibus rebus concurrentibus explicatur, in Ducatu Brunsvicensi e. c., quo an. 1741 et 1742 frumentum sacali cornuto valde contaminatum fuit, morbum cerealem non regnasse (BRÜCKMANN in *Commerc. lit. Noric.* a. 1743. p. 60), dum hñdem annis in Marchia et Holsatia vehementer grassatus est. Ibi immo epidemia perduravit non farinae inquinatae prohibito; quo ex facto KANNEGIESSENRO. (in *Aqt. nat. cur.* Vol. 7, p. 109) non haec substantia, sed aeris coeditio causa epidemiae est. Cui ROSENSTEIN (l. c.) contradicit. Nec minoris momenti est dispositio corporis humani. Legatur de hoc argumento BRACH l. c., qui vere ait (p. 167): „*Jene Erscheinungen ... werden sich natürlich sehr modificiren nach den verschiedenen Individualitäten, auf die das Mutterkorn einwirkt, nach der Menge, in welcher es genossen wird, nach der sonstigen Lebensweise der Individuen, nach der gerade herrschenden Krankheitsconstitution u. nach hundert anderen Einflüssen, mit welchen seine Wirkung zusammentrifft.*“

24) „*Wenn es in Menge, frisch u. wiederholt genossen wird*“ (secale cornutum excitat morbum cerealem). WAGNER *Beobacht.* l. c.

cerealis brevi post messem furens <sup>25)</sup>, sub ejusdem panis contaminati remittat dein et enescat. Huic caeterum opinioni facta nonn contradicunt <sup>27)</sup>).

C. proxi-  
ma.

3. Quo pacto secale cornutum morbum realem producat, determinare non audemus. terim si cardialgiam, temulentiam, fornication neuralgias, convulsiones, paralysin et gangraen quibus stipatur, perpendamus, apparet, venen de quo agitur, primum plexus nervorum abdo naliū, dein cerebrum, tandem medullam spi lem, et postremo nervos singulos extremitat aggređi fontemque principii vitalis, praesertim locis a corde dissitis, destruere.

#### §. XL.

#### Diagnosis. Prognosis.

Genera-  
tim.

1. Cum nemo *diagnosin morbi cerealis* s penitiore notione secalis cornuti et farinae il continentis instituere possit, primum doctrin tales notiones suppeditantem exponemus. Ratio

25) J. P. FRANK l. c. „*Frisch ist das Mutterkorn aus schädlich; durch langes Aufbewahren, Austrocknen ver es bedeutend an Kraft.*“ F. ROBERT l. c. H. 2.

26) WAGNER l. c. (*vidabat morbum semper*) „*im Jul Aug., wenn das frische Getreide gleich ausgedrosche vermahlen war.*“

27) STEFANOWICZ-DONCOW (l. c.) refert, rusticos Gube Kiow, cum etiam putavrint, frumentum secale cori inquinatum, trectu temporis innocuum reddi, fame pr illud comederunt, quo facto omnes morbo cereali ec vehementissime correpti sunt.



dein, cur duas aegritudinum sat diversas formas nihilominus ad unum eundemque morbum revocamus, examini subicientur. Quo facto, aegritudines, quae cum morbo cereali confundi possunt, ad trutinam vocabuntur. Animadversiones circa similitudinem morbi cerealis cum affectionibus leprosis paragrapho finem imponent.

2. Est *secale cornutum* productio vegetabilis <sup>Secalis cornuti</sup> morbosa super spicas, praeprimis secalis, sub <sup>notio.</sup> forma calcaris vel cornu obveniens. Optima illius descriptio TESSIERIO, ROBERTO, VILLENEUVIO, WIGGERSIO et GALAMAO <sup>1)</sup> debetur. En epitomen: secale cornutum longitudinem decem vel duodecim <sup>2)</sup> linearum adaequat. Extremitates corpore tenuiores, nunc obtusae, nunc acuminatae, cernuntur. Lineae longitudinales, ab una ad alteram extremitatem decurrentes, illi plerumque formam angularem impertiunt. Color, neutiquam, ut vulgo dicitur, niger, sed violaceus, cum punctis nonnullis albis. Cortex violaceus, substantiam candidam, cui tenaciter adhaeret, cooperit. Grana secalis cornuti facile et cum fragore, veluti amygdalae siccae, rumpuntur <sup>3)</sup>. Recentia odorem spi-

1) Il. cc. 2) In Gallia immo 18—20. VILLENEUVY L. c. p. 401.

3) VILLENEUVY L. c. p. 402 et pergit: „der Bruch ist glatt u. gerade; die Mitte bildet eine matt weisse Substanz von festem Gefüge, welche mit der gefärbten Substanz der Rinde fest zusammenhängt u. selbst durch Kochen nicht von letzterer getrennt werden kann. Bringt man die Bruchflächen unter das Microscop, so zeigen sich in der Mitte weisse, glänzende, mehlartige Körner; die Masse, welche

spirant ingratum<sup>4)</sup>, atque linguae saporem acrem imprimunt<sup>4)</sup>. Non ita exsiccata. Exsiccantur vero facile a contactu aeris, et levissima tunc fiunt. Secale cornutum, si voluminosum, secalis spicam, ejus grana bonae indolis manent, solitarium occupat. Contra vero spicae, quae secalia cornuta minus voluminosa exhibent, eorum plurima e. c. quatuor, decem, duodecim, quin immo viginti<sup>5)</sup> portant, granis secalinis plus minus corruptis<sup>7)</sup>. Nunquam<sup>6)</sup> tota spica, e secale cornuto

cop-  
an, der Hinde liegt, hat hingegen einen veilchenblauen Schein u. ist mit kleinen weissen Punkten durchzogen.“

4) „Eine Quantität Mutterkorn, welches mehrere Jahre hindurch in einem Weinglasse aufbewahrt worden war, hatte einen unausstehlichen Geruch nach verfaulten Fischen angenommen; es sah schwarz aus, fast alle Körner waren wie vom Wurmfraße befallen, so dass meist nichts, als ihre Hindeusubstanz übrig war, u. sie leicht zwischen den Fingern zerbrachen; von Insekten konnte man übrigens keine Spur entdecken.“ VILLENEUVE l. c. p. 403.

5) „Das Pulver schmeckt widerlich, bitter, etwas beissend, u. hat eine Ähnlichkeit mit dem Geschmacke von etwas verderbenem Korne.“ VILLENEUVE l. c. p. 403.

6) WIGGAS l. c. „2 — 12, auch wohl 20.“

7) „Die Roggenkörner von Aehren, die mit vielem Mutterkorn gefüllt sind, haben immer ein schlechtes Aussehen u. eine schlechte Beschaffenheit, sind mager, ausgetrocknet, an der Spitze mit schwärzlichem Staube bedeckt, u. die Aehren selbst haben ein übles, schnürliches Ansehen.“ F. ROBERT l. c. — „Die Mutterpflanze scheint wenig durch das Mutterkorn zu leiden, nur wenn 10 und mehrere Stück auf derselben Aehre entstehen, werden sie u. die gesunden Körner, so wie die ganze Aehre, kleiner; oft wird sie dann ganz schwarz u. enthält kein gesundes Korn.“ WIGGAS l. c.

conflata, visa est<sup>8)</sup>). Genesis secalis cornuti a SCHMIEDERO et TAUBKO neutiquam constitutioni atmosphaerae humidae, sed potius substantiae mellesae viscosae, quae cum rore in grana secalina penetrat ibique fermentationis genus excitat, adscribitur. TESSIER et WILDENOW solum maerum, ROBERT<sup>10)</sup> pingue, humidumque, inprimis accidentibus pluviis<sup>11)</sup>, et TILLET, insecta et vermes

accu-

8) Fortasse tamen in Gallie. VILLENEUVI l. c. p. 399.

„Höchstelten sind alle in einer u. derselben Aehre zu Mutterkorn verwandelt.“

9) Secale cornutum semetipsud generandi impos esse (VILLENEUVI et WIGGERS ll. cc.), admonitio fere supervacua videtur; minime vero quod ille l. c. p. 399 adnotet:

„Manchmal, was jedoch selten geschieht, ist bloß ein Theil eines Kornes verändert u. dann ist es immer der Theil, welcher von der Aehre am weitesten entfernt ist.“

Quod argumentum adversus COURMAUT esset, l. c. de genesi secalis cornuti contententem, germinis secalini fecundationem guttula aquae pluviae perturbari et processu fermentativo, solis radiis deinde provocato, metamorphosin monstrosam grani secalini effici.

10) l. c. „Wärme u. feuchte Luft, fetter, schwerer, wasserreicher Boden, niedriger, tiefer, dem Winde nicht ausgesetzter Standort der Pflanzen, u. reichliche aber schlecht verarbeitete Nahrungssäfte. Diese Bedingungen verändern den Lebensproceß der Pflanze so sehr, daß sie ihr letztes Geschäft, einen gesunden Saamen hervorzubringen, unmöglich vollführen kann; ihre Reproductionskraft wird gewaltsam, und besonders zur Zeit des reifenden Fortpflanzungsproductes gestört; statt des Saamenkornes ein Auswuchs, statt der gehörigen Mischung gleichsam eine Dykrasie erzeugt.“

11) „Soviel ist gewiss, daß in verschiedenen Ländern u. besonders in der Provinz Sologne, das Mutterkorn in nassen

accusant, cui opinioni et ROFFREDI, FOX ABILGAARD atque FIELD favent<sup>1 2</sup>). Quomodo

*Jahren in grosser Menge vorkommt.*" VILLENEUVE p. 398.

- 12) *Asserunt secale cornutum vibriones (animalcula) continere, quales in aceto et glutina occurrunt* vivacere ea animalcula semel emortua, Itali statim unda in pacificis quoque, licet foruacis aestu vitam recuperare posse, existimant (!). Hinc opinio et CROME rejicit (*Handb. d. Naturgesch. f. Land Hannov.* 1810. 1. B. N. 538). Et tritici morbus per a tali verme, qui *Fibrio tritici* nominetur, excitari a BAUER in FROBIEP Notiz, 1823. B. 4. N. 22. Mis surda videtur hypothesis, ex qua secale cornutum, rum instar, punctiana ab aliquo insecto facta proest. „Von den Oeffnungen, welche nicht selten an (granis secalis cornuti) wahrgenommen werden, man, dass sie durch Insectenstiche entstanden.“ NEUBE I. c. p. 401. FIELD (*Versuche u. Erfahr. des amerikan. Generals F. üb. d. Entsteh. des Mutterkorn* KERN. v. ENNHARTSTEIN med.-chir. Ztg. 1827. B. 1. muscam pilosam seu hirsutam secalis cornuti causa occasionalem, persuesum sibi habet; quae (blow-fly) in America quidem mensibus Julio, Aug. Septembri, sed non sub omni coelo, quo secale crescit, familiaris est. Inter omnes hypothases, quae genesi secalis cornuti astant, et quorum VILLI (I. c. p. 392 sq.) undecim enumeravit, maxime arrisibilia, ex quae grani secalini sani metamorphosis immo succi nutriticii affluxu (LEVEILLÉ in Journ. g. méd. T. 97. p. 358. WIGGERS at DIERZ II. cc.), huius et ardore fento. „Der Vorläufer dieser Krankheit WIGGERS, ist ein farblos, züher, meistens trübe Mutterkorn ähnlich riechender, süsslich schmeckender Utrum pars huius succi sponte (per diepidesin),

res se habeat, *secale cornutum* probe a carbone (*charbon*), a rubigine (*rouille*) et a carie (*carie*), utpote a morbis granorum ab illo plane diversis distingui debet. Est enim *carbo*, ulcus malignum, a quo grana spicae quotquot sunt, eroduntur et destruuntur, atque una cum involacro in pollinem nigrum reducuntur<sup>13</sup>). *Rubigo* paret ut pulvis ferruginosus in foliis, stipitibus et seminibus plantae, quo grana secalina amylo sive substantia nutriticia exspoliantur<sup>14</sup>). In *carie* grana pelle alba obducta sunt, quae pellis pulpam, serius in pul-

ve-

sectorum punctione affluat; utrum deinde pluvia ablatur (WIGGERS), an in fungum (*sphaceliam*) mutatur, ut LAVUEILLÉ (VILBENNEVE l. c. p. 395, 396) at ROBERT viderunt, et tandem, an *secale cornutum* illo fungo producatur, ut DUCANDOLLE (*ergot est produit par le développement d'un champignon très analogue au sclerotium*; in *Bull. univers.* 1830. Jan. p. 86) explicat, experientia adhuc docebit. FETTERMANN (POHL *Archiv d. deutsch. Landwirthschaft.* 1838. Aug. p. 171) *sphaceliam* abnuat, at iudicat da viribus sacalis cornuti (p. 171 sq.) sine sufficiente experientia.

- 13) WIGGERS l. c.: „Durch den Brand werden Ähren u. Saamen plötzlich zerstört u. in eine schwarze, pulverigte Masse verwandelt.“ Talis metamorphosis fungis efficitur, ad quos pertinent *ustilago segetum* (ROBERT l. c.), *caenomata segetum* at *caenom. foetidum* (WIGGERS l. c.).

- 14) J. P. FRANK *Syst. ein. vollst. med. Polizei. Mannh.* 1804. B. 3. p. 211. WIGGERS l. c. „Beim Roste werden die Blätter, Halmen u. Saamen der Pflanzen mit pulverigten Flecken bestreut, die auch aus Schwämmen u. den Gattungen *Accidium*, *Uredo*, *Puccinia* u. *Phragmidium* bestehen.“ Quam morbum farinam altarcere, attaman innocuum assa fertur. F. S. CORDIER *note sur l'uredo caries*, in *Journ. gén. de méd.* 1831. Janv. p. 98.

Frank *Pres.* II. I. 2. 1.

T

verem nigrum desinentem, includit. Caries in frumento tritico, hordeo et avena, quam autem in secale, evolvantur, occurrit, nec non rubigo et secale cornutum in graminibus<sup>15</sup>). Farina conspicuam copiam cornuti continens, colorem flavescens, odin gratum saporemque acrem empyreumaticum habet et ab animalibus domesticis aversatur, ita et hirudines necat<sup>16</sup>) et aqua remixta in tenax abit, cuticulaque subtili, colores exhibente, cooperitur. Pasta ex farina secalinum continente parata, vix caloris operatur<sup>17</sup>). Panis calide comestus maxime nocet. Utrum testibus WILDENOW et COURHAUT duae species secalis cornuti admittendae sint, quarum *benigna* (pallida, intus albida, farinacea, saporis et odoris), altera *maligna* (obscura, tida et acris) expertissimis determinandum linquimus<sup>18</sup>).

3.

15) BICLOW in *The new Engl. journ. of med. and* 1816. Vol. 5. N. 1. VILLENEUVE l. c. p. 400. CA l. citand. WIGGERS l. c.

16) TODE l. c. p. 156. DIEZ, GALAMA ll. cc.

17) „Knetet man Mehl, worunter Mutterkorn ist, mit Wasser, so entwickelt sich ein ziemlich starker Geruch; der Teig hält sehr wenig zusammen, u. das gebackene Brod hat weder die Festigkeit, noch die wie das aus gutem Mehle bereitete“ VILLENEUVE p. 403, „u. erregt, in grössern Quantitäten u. läng hindurch genossen, mehr oder weniger bedeutende heitszufälle.“ ib. p. 141.

18) Collegium medicum Petropolitannum penes Mini Politiæ.

3. SAUVAGESIUS non solum morbum cerealem <sup>Da forma morbi cerealis.</sup> *convulsivum* (præcipue in Germania observatum) a *gangruenoso* <sup>20)</sup> (potissimum in Gallia et in Helvetia obviente) distinxit, sed convulsivum in *duas* iterum *species* <sup>21)</sup> divisit: Secuti sunt SAILLANT <sup>22)</sup> et MARGARD <sup>23)</sup>. Contra vero ZIMMERMANN <sup>24)</sup>, TISSOT <sup>25)</sup>, et RENAULDIN <sup>26)</sup> cunctas

T 2 illas

19) Jam jam FONTANA secale cornutum *verum*, interna perturbatione plantæ organorum ac depravatione succi nutriticii, et *spurium*, insectorum nonnullorum puncturis productum, agnovit. Cfr. ROBERT I. c. II. 1. p. 12 sq. LEVHILLÉ (v. VILLERNEVE I. c. p. 395) duas partes secalis coranti plane diversas distinguit, i. e. secale cornutum *purum* aut *sphacelia* (de qua supra (12) dictum est) *inquinatum*. Quo in statu secale cornutum efficacius et malignum est; aliàs, cum sphacelia et ejus succus, quo graminum obtegitur, aut pluvio abluuntur, aut sponte exfoliantur et desquamantur. Nihilominus WASCHKE, DIEZ, WIGGERS et GALAMÉ differentiam secalis cornuti nocivi et *innocui* repudiant. — Exstant quoque plures analyses chemicas non plane conformes, e. c. a VACQUERLINO (in *Anal. d. chim. et phys.* T. 3. p. 337. et *BUCHNER Repert. d. Pharmaz.* B. 3), FATTENKOVERIO (in *BUCHNER I. c.*), R. BATILLYO (ex *The Lond. med. gaz.* 1831. Febr. in *BRUNNEN Repert.* 1831. *Spidr.* p. 388 sq.), ROBERTO (I. c. II. 1. p. 41 sq.), WIGGERSO (I. c.) et a GALAMÉ (I. c.). Omisum est amyllum, nec non saccharum; inventum Ergotinum, Fungium, Osmundroma vegetabile, Saccharum, spermodiæ etc.

20) Necrosis ustilaginea. Nosol. method. Vol. V. Class. X. Gen. XXIX. Sp. I. Amstel. 1765. p. 547.

21) Convulsio Saecana; et convulsio a rubigine (I. c. T. II. P. II. Cl. IV. Gen. XII. sp. 7. 8. p. 48. 49).

22) I. c. p. 308. 23) I. c. 24) *Von der Erfahrung.* 4. B. p. 413.

illas formas ad unum eundemque morbu carunt. Et omni sane jure; constat enim calis cornuti parva dosi, morbum cerealis *vulsvum*, — ex magna *gangraenosus*. Symptomata utrique formae communia, s cerealis fere gentilitia sunt, *formicatio*, *giae* et *anaesthesia*; accidentalia magis *morbosa* et *vermium proventus*.

Facilis  
confusio.

4. Prout morbus cerealis vel *convu* vel *gangraena* stipatur, variis cum mor fundi posset, primo scilicet in casu cun *Sti Viti*, cum qua similitudinem alit<sup>27)</sup>, *cationibus* quibusdam<sup>28)</sup>; altero, cum *ga* *sicca senili extremitatum inferiorum*, quam vocant<sup>29)</sup>, ne dicamus de illa a gelu<sup>30)</sup>;

25) l. c. Oeuv. T. 6. p. 171.

26) l.

27) WICHMANN l. c. BRACH (l. c. p. 187) autem *halte es rein für unmöglich, dass Jemand, der es Mal in seinem Leben einen Veitstanz gesehen hat mit jenen Zuständen (morbi cerealis) verwechselt*

28) WAGNER ein merkwürd. zufällig. Vergiftungsf. *wahrscheinl. durch Veratrum album; in HUVELLA 1827. St. 6. p. 42—52 (autor vidit quoque, pri annis humidis, brevi post messem ex usu panis bus rhinanthi cristae galli inquinati, symptomata, cerealis simillima, oriri. Sic et a veratro albo)*

29) Chirurg. Werke. 2. B. p. 538. Cfr. MICHAELIS TER chir. Bibl. 5. B. p. 116. KIRKLAND *Though putat. Lond. 1780. p. 112. JEANROU Recueil de de méd. de Paris 1782 (Existimarem tamen gang JEANROU descriptam non plane cum illa POTTII ae magis ad SAUVAGESII necrocin a viru (seorbu cet) accedere). DUMONT. obs. sur la gangrène*



nota caussâ, per se obvia, et de igne *Sti Antonii*, specie erysipelatis maligni<sup>31</sup>). Vix morbum cerealem inter et *colicam saturninam* ab aliis animadversam<sup>32</sup>) similitudinem invenimus. Forte *Beriberi*<sup>33</sup>) huc spectat.

### 5. *Gangraena senilis.*

1. Morbus laute ventium.

*M. cerealis gangraenosus.* M. c. a

1. Morbus vitam ege-<sup>gangraena</sup> senili.  
nam ducentium.

### 2. Se-

Pott; in *Ann. elin. de la soc. de méd. pr. de Montp.* 1816. T. 39. p. 253. *La gangrène sénile*, in *Rapport gén. sur les travaux du conseil de salubrité. Par. l'an. 1828.* DUFREYEN in *FORIER Notiz. B.* 10. p. 206. G. R. BAUER Beobacht. üb. *Gangraena senilis*; in *Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. B.* 2. p. 204. MOURONVAL obs. sur une gangrène sénile terminée par la chute du 3. orteil du pied droit et de la prem. phalange du 2., in *Journ. complém. du dict.* 1826. Jan. p. 278. WIDENHIER der Brand d. Greise. v. Ejusd. *Pathol. therapeut. Abhandl. üb. d. Brand*; in GRASSE u. WALTHER *Journ.* 1830. B. 14. H. 3. p. 373 sq. N. II. KOPF *Denkwürdigkeit.* etc. p. 142 sq. SPIELMANN *Brustwassersucht mit Leberanschwell. verbund.*, wozu sich *Gangraena senilis* gesellte; in *Heidelb. klin. Annal. B.* 8. II. 3. p. 412 (casus memorabilis). W. STOCKES *Vorles. üb. d. Heil. d. innern Krankheit.* etc. A. d. Engl. v. J. BERNHARD. Lpz. 1835 (autor duos habet casus gangraenae Pottii). BLANDIN *Fall v. Gangraena senilis des link. Untersehenkels, der mit dem Tode endigte*; ex *Gazette méd. de Par.* 1836. N. 44. in SCHMIDT *Jahrb.* 1837. B. 15. p. 166.

30) *Gangraena pedum e frigora.* J. P. FRANK interpretat. clin. etc. Tübing. 1812, p. 429 sq.

31) *Feu de St. Antoine, mal des Ardennes.* Cfr. P. I. ed. alt. Vol. I. Sect. 2. C. XI. §. LXL. N. 9.

32) TODE, WICHMANN l. c.

33) Cep. XII. §. LX. 11.

2. Senes maxime ag-  
greditur.

3. Maribus praecipue  
infensa.

4. Excepto cruris stu-  
pore, sine prodromis,  
hominem caeterum va-  
lentem, afficit.

5. Proserpit malum,  
epidermide in loco af-  
fecto secedente, at sine  
lapsu articularum.

2. Omni aet  
munis.

3. Utrumqu  
invadit.

4. Ultimum n  
ribilis sistit stat

5. Secedunt d

M. cerea-  
lie simili-  
tudo cum  
lepra,

6. Si *fornicatio*, *neuralgiae* et *anc*  
pro symptomatibus gentilitiis morbi cere  
beantur; quisne *similitudinem* illius cum  
*leprosis* iisdem fere symptomatibus insig  
non animadvertat? Similitudo ista maxir  
buna cerealem *gangraenosum*, utpote *lap*  
*brorum*<sup>34)</sup>, noto leprae symptomate, a  
respicit. Fames morbos<sup>35)</sup> et tabes mus  
pollicis<sup>36)</sup> in utroque morbo obveniunt.

7

34) P. I. ed. alt. Vol. III. Sect. 2. C. XX. §. L.  
cap. XXII. §. LXXIII. 1. HENSLER op. c. I  
„Dieser Zufall (fornicatio), der so sehr eine merkli-  
tung der Hautnerven anzeigt, und der in der  
traurigen Kriebelkrankheit eben so eine Beh-  
ganzten Nervensysteme nach sich zieht, verdient  
die folgenden Wahrnehmer der Spur der Abendlü-  
gehen. Selbst beim Examen der Ausstüzigen ki  
Frage.“

35) „Et cadunt juncturae membrorum“ (JANUS D  
in therapeut. meth. L. II. Basil. 1543, De lepro

7. Quam periculosus sit morbus cerealis, ipsa Prognosis illius descriptio docet. Maximus morbi gradus, qualis in *Sologne* observatur, ex centum viginti aegrotantibus vix quinque sanari concedit<sup>35</sup>). Inter quingentos aegros tercenti infantes periire<sup>36</sup>). Verum et qui effugiunt, per totum vitae curriculum, praesertim mensibus Januarii et Februarii, plus minus pati solent<sup>37</sup>). Contra spontaneus membrorum secessus longaevitati, relicto quandoque solo trunco, non semper obstat<sup>38</sup>). Epilepsia et

36) „In (lepra) leonina tantus est appetitus, voracitas et sitis, quod vix aptissima reperitur medicina, ut nec potu nec cibo saturari possint et non raro apparet, eorum appetitum superexcedere eamimum“ (MONTAGNANI in Consiliis. Lugd. 1526. Cons. 209).

37) Carnositas, quae est inter pollicem et indicem, conseruitur (LANFRANCUS in arte compl. chir. p. 207).

38) „Bei Trismus, Gefühllosigkeit u. lähmungsartiger Schwäche des Magens u. Darmkanals, wie im J. 1832, ist der Tod unvermeidlich“ WAGNER (1838) l. c. p. 33.

39) SRING. „In pago Euminka et Odincy (Gubernii Kiow) numerus civium morbo cereali laborantium meaque curae commissorum ad 143 ascendebat. Ex his a die decima Martii ad diem primam Jun. 1787, 5 spasmis interamti, 123 sanati et 15 ob gangraenam mutilati sunt“ (STEFANOWICZ-DONCOW l. c.). „Die Krankheit endete immer tödlich u. Kinder erlagen eher, als Erwachsene,“ in ANDREAN l. c.

40) Medici Marburgenses. SCHMURRER l. c. p. 147. SENDRAT l. c. WAGNER l. c.

41) SALERNE l. c. „La gangrène qui se circonscrit donne lieu à espérer que le malade s'en tirera, néanmoins avec la perte de quelque membre. La gangrène sèche... n'est pas dangereuse; mais cette humide, qui ne se limite point, est

et fatuitas<sup>42)</sup> ex morbo cereali evolutae ois artis conaminibus resistunt<sup>43)</sup>. Saluti fuere mitus, quo vermes ejicerentur, exanthematiem referentia, abscessus, ptyalismus<sup>44)</sup>, digitorum<sup>45)</sup>. Morbus diuturnior in feminis atque cum peculiari ferocia ante menstruationem saevit<sup>46)</sup>.

## §. XLI.

## C u r a.

Prophylaxia.

1. Agri secalis cultura dicati potissimum regionibus aliunde evolutioni secalis cornuventibus, et pluviis multis messi praeconspiciantur Regiminis attentionem, praecipue messis frumenti immaturi locum obtineat<sup>47)</sup> possunt; quae attentio si collibus vineariis et demiae consecrari potest, cur non agris et

*ordinairement mortelle, surtout si l'on pratique l'irrigation* OZANAM l. c. p. 163.

42) Et oppositam metamorphosin observabat WAGNER grösste Phlegma wurde dadurch (morbo cereali) lebhafteste Wesen umgeschaffen (l. c.).

43) HÖRST l. c. SCHNURER l. c. p. 147. SENNER Medici Silesiae l. c. WAGNER l. c. BRACH l. c.

44) TAUBER l. c.

45) LENTIN l. c.

46) Quod vim specificam, quam secale cornutum exercit (forta indirecte per actionem in medullam spinalem), comprobare videtur. V. PRESCOT in *Philosophical Journ. publ. by FOTHERGILL and WENT*. London April.

47) Horysthenidae frumentum cum secale cornuto vis huc mens. Jul. et Aug. 1785 in usum ducentes, fimbile malum inciderunt (STEFANOWICZ-DONCOW l. c.

frugum? <sup>2)</sup>). Populus ad leges congruas accipien-  
das parandus est, illum de vi venefica secalis  
cornuti, et de modo hoc venenum cognoscendi  
instruendo, quod efficitur per Parochos, Prae-  
fectos, medicos, non neglectis instructionibus ca-  
lendaris inserendis <sup>3)</sup>). Sciant rustici, fruges a  
secale cornuto selectione, cribellando, lavando,  
maxime autem ventilando et torrefaciendo purifi-  
cari <sup>4)</sup>). Prohibeatur molitoribus, ne fruges secale  
cornuto contaminatas commolant, ac refractarii  
poena pecuniaria mulcentur <sup>5)</sup>). Periti hinc mo-  
lendinas et mercatus frumenti visitent <sup>6)</sup>). Caete-  
rum frumentum secale cornuto contaminatum tuto  
ad crematum destillandum adhiberi potest, cujus  
tamen (verisimiliter ob principii saccharini de-  
fectum) haud conspicuam copiam largiri solet <sup>7)</sup>).

## 2. Cum morbum cerealem neque observandi Therapia.

ne-

- 2) J. P. FRANK *Syst. e. vollst. med. Polizey.* 3. B. 1. Abth.  
3. Abschn. KRÜNITZ *Encycl.* 3. B. p. 356.
- 3) Exemplo esto: *Donaueschinger Kalender f. d. Jahr 1813*  
egregium prophylaxeos morbi cerealis tractatum continens.
- 4) *Bekanntmachung des Stadtraths zu Leipzig, in Betreff*  
*des Mutterkorns*, v. 19. Juli 1831 et v. 28. Novbr. 1832. in  
CHOULANT *N. Samml. Sächs. Med. Gesetze. Lpz. 1834.*  
p. 224. §. 1 et p. 374. *Bekanntmachung der Landesregie-*  
*rung, das Mutterkorn betr.*, v. 6. Aug. 1831. CHOULANT  
l. c. p. 223 et 234.
- 5) Lex Badensis an. 1812. v. KOPP. *Jahrbuch der Staats-*  
*arzneylunde.* 7. B. p. 274. Lex Lipsiensis l. c. §. 2.
- 6) Lex Erfurtensis an. 1808. v. KOPP. l. c. 2. B. p. 351.
- 7) Consilium medicum Petropolitanum penes Ministerium  
Politiae.

neque curandi nobis unquam sese obtulerit tunitas; aliorum tantum experientiam in n afferre possumus. Confirmat ea in primo limine usum *emeticorum* <sup>8)</sup>, praecipue radi *phaelidis ipecacuanhae* <sup>9)</sup> cum *tartrate stibii tassae* <sup>10)</sup> quorum major solita requiritur de quibusque superbibitur oleum aut butyrum potu calido <sup>11)</sup>. Sub ipso spasmodum insutius ab emeticis abstinetur <sup>12)</sup>. *Purgantia* l tur quidem <sup>13)</sup>, at maxime, praesentibus ver *anthelminticis* juncta <sup>14)</sup>. Si faeces acidu rent et viridescant, *sapo* <sup>15)</sup> commendatur. *clysteribus* aperta tenetur <sup>17)</sup>. *Potui* oxym aqua, addita parva *tartari emetici* dosi <sup>18)</sup>, vit. *Cibi* sunt facilis digestiones et nutr

8) Emetica in epidemia Parisiensi n. 1828 utilia eradi  
dici Paris, l. c. Quod et WAGNER l. c. expertus

9) LANG, BUDDAEUS, BERGEN, HERRMANN, BURDACH

10) READ, EICHMANN, WAGNER, SCHRAMM II. cc.

11) Ad quadraginta grana requirebatur (consilium i  
Petropolitanum penes Minist. Pol.).

12) HENSLEY *Anzeige der hauptsächlichsten Rettun*  
*Alton.* 1770. p. 117.

13) STEFANOWICZ-DONCOW l. c.

14) A *medicis Marburgensibus* l. c. BURDACH, SCH  
WAGNER qui scribit (1838. p. 32): „Bei fieberle  
phanie sind Ausleerungen nach oben u. unten,  
Opium die Hauptmittel.“ — In epidemia Pari  
1828 nocuerunt purgantia. GENEAT l. c.

15) TAUBE l. c. *Calomel* a. HERRMANNO adhibeba  
p. 37. 93.

16) LENTIN l. c.

17) READ l. c.

18) *Idem*

*Venaesectio* generatim morbo non quadrat<sup>19)</sup>. Interea si aeger fuerit floridus, pulsus plenus et durus, sensorium commune vehementer affectum, et dolores stabiles; sanguis e vena eo securius, quo recentior morbus, educitur<sup>20)</sup>. Indicatione dubia saltem ad *cucurbitulas scarificantes* confugiendum<sup>21)</sup>. Refert porro *transpirationi*<sup>22)</sup> studere; *acetum camphoratum* hoc sub respectu maxime se commendavit<sup>23)</sup>. Virium lapsui radices *aristolochiae serpentariae*<sup>24)</sup>, *inulae helenii*<sup>25)</sup>, *acori calami*<sup>26)</sup>, *valerianae officinalis*<sup>27)</sup>, *castoreum*<sup>28)</sup>, *oleum cajeput*<sup>29)</sup>, *liquor anodynus mineralis* [HOFFMANN<sup>30)</sup>], *ammonia*<sup>31)</sup> et similia<sup>32)</sup> opponi

80-

19) BURGHART, TAUBE, WICHMANN, HENSELER, MARCARD, BRAWE, TISSOT, ZIMMERMANN, HERRMANN ll. cc.

20) READ l. c. MULCAILEN l. c. (solimmodo morbo incipiente). WAGNER l. c. 1831 et 1836, p. 33: „Bei entzündlichem Fieber mit entzündlichen Localaffectionen oder starken Blutcongestionen nach dem Kopfe sind Blutentziehungen nöthig.“ V. S. a medicis Paris. (l. c. a. 1828) crebrius instituta est. Sanguis crusta inflammatoria detegebatur.

21) HERRMANN l. c. (illico levamen attulerunt) p. 91.

22) *Medici Marburgenses*. LANG l. c.

23) TAUBE l. c. Aliud diaphoreticum apud ROTHE (l. c.) commendatur ex rosb sambuci, camphorae grana quatuor, cerevisia calida et butyro.

24) TAUBE l. c.

25) Conseil. med. Petropolitenum penes minist. Politiae.

26) Idem consilium.

27) HENSELER l. c. (etiam qua anthelminticum).

28) BERGEN, TAUBE l. c. 29) LINTIN l. c. 30) A BERGER l. c.

31) COURNAUT l. c. (guttel. X—Xj) p. d; in Chinae infuso

solent<sup>23)</sup>. *Opium* a paucis ad summos d  
sedandos laudatur<sup>24)</sup>. Si ex analogia cun  
graena sicca *senili Pottii* concludere liceret; n  
a laudano<sup>25)</sup>, inprimis *moscho* aut *alkali*  
nupto, adversus gangraenam extremitatu  
pectandum foret. Nec defuerunt, qui puru  
*schum* laudarent<sup>26)</sup>, cujus caeterum admini  
in pauperibus rusticis vix locum invenire po  
Idem de *cinchona* valet, encomiis non destitu

internae; Aq. ammoniata externae adversus gang  
minitantes vel jam exortas. Aegrotorum 300  
unus mortuus est!). BURDAU l. c. (Liq. amm  
HÜLSE l. c. (Ammon. carb. gr. V. in vino. Dosi  
symptomata scæci cornuto provocata fugavit).

32) Celebrabantur quondam, ut specifica, *electuariu*  
dam (*Kriebel-Latweg*) ex castoreo, croco, zii  
cumino, caryophyllis et drasticis; — itam *theriac*  
cies (*Kriebel-Theriac*), ex pasonis, castoreo, cra  
mano usto, theriaca et mithridata, — itemque  
quidam (*Kriebel-Pulver*) ex foliis lauri, carduo be  
radice insulas Helenii, v. HORST l. c. p. 34. 38. 43.  
*Amanita muscaria* Camtschadalis: *Med. Convers*  
1832. N. 32.

33) Omnibus laudatis remediis incassum adhibitis,  
Parisianases (s. 1828) praeparatis sulphureis salutaris  
asserunt, l. c.

34) Praemissis emasticis laudet LECOINTE l. c. WAGN  
(gr. j. c. Flor. Zinc. gr. ij; in pueris op. c. l  
(1838) c. Tart. vitriolat.).

35) Dedit WAGNER (1838) l. c. p. 26.

36) LANG, TAUBE II. cc.

37) READ l. c. En ejus formulam: R<sup>y</sup>. Pulv. cort.  
ruditer contusi, salis ammoniaci aa unciam semis.  
c. a. q. aquae et infunde flor. chamomillae drachm



Opponuntur praeterea membrorum torpori, — *vesicatorium* <sup>38)</sup>), *frictiones cum alcohol camphorato* <sup>39)</sup>); spasmis, convulsionibus et paralyti, — *electricitas* <sup>40)</sup> atque *balnea calida* <sup>41)</sup>), inprimis vapores <sup>42)</sup>); frigori, — *frictio cum panno laneo, oleo cajeputi* <sup>43)</sup> et *fomentationes aromaticae calidae* <sup>44)</sup>); gangraenae incipienti, — *solutio aluminis et salis culinaris* <sup>45)</sup>), decoctum corticis sive quercus roboris, sive tiliæ europaeae aut infusum florum matricariae chamomillae <sup>46)</sup>); sphacelo, — *fotus spirituosus, pulveres aromatici, sulphas ferri* <sup>47)</sup>.

Omnes

Stant in digestionem ut colantur. D. S. Omni quarta hora uncias quatuor capiat. (Consil. med. Petrop. penes Ministerium Politiae at STEFANOWICZ-DONCOW L. c.) Tempore a spasmis libero cortex exhibetur, libentina sub forma pulv.

38) READ L. c. (prope partem torpentem). HERMANN L. c. p. 91.

39) Consil. med. Petrop. penes Minist. Politiae. HERMANN L. c. p. 91 (c. Spiritu Juniperi et Salis ammoniaci).

40) SIGAUD LA FOND *de l'électricité médicale*. p. 472. ROTHE L. c.

41) ROTHE L. c. Bala. sulphur. et embrocationem laudent Medici Parisiens. in epidemia c. 1828.

42) Sub spasmorum accessu, ait STEFANOWICZ-DONCOW, non parum levaminis offert balseum vaporis, later condens in ves ponitur, et acetum affunditur; vapor inde emergenti membre spasmis detenta exponuntur (L. c.).

43) LENTIN L. c.

44) READ L. c.

45) Auxilium usitatissimum in provincia Sologne.

46) Consil. med. Petropol. penes Minist. Polit.

47) READ L. c. En formulam (!!!) R. Vitrioli martis drachmas tres. Salis culinaris unciam unam. Aluminis usi

Omnes quibus membra gangraenosa resecta (obierunt \*\*). Alii tamen amputationem eo in ubi ipsa natura partem gangraenosam a san- lineam separat, admittunt \*\*). HENSLER \*\*) s: ut ulcera diu aperta teneantur.

## CAPUT IX.

*D e t r e m o r e .*

## §. XLII.

*Definitio. Literatura.*

**Definitio.** 1. *Tremor* <sup>1)</sup> est oscillatio rapida, quâ bra continuâ vicissitudine per itus et reditus a bih ratione in contrarium agitantur.

**Literatura.** 2. De tremore singulae dumtaxat exstaservationes. Monographiae interea locum (dissertationes inaugurales <sup>2)</sup>).

§. 2

uncias quatuor. Ebul. c. aquae libris duabus ad nentiam librae unius. D. S. pro usu externo.

48) NOËL *mém. de l'académie royale de méd. à Par* 1770. SALERNE I. c.

49) READ. STEFANOWICZ-DONCOW II. cc.

50) Apud ROTH I. c.

1) A Gr. Τρόμος, tremor, tromos SWEDIAURII. Zittern. GALL. Tremblement. ANGL. Trembling. Drzenie, Trzęsienie. ROSS. Дрожаніе, препенчаніе.

2) HANSEN diss. de tremore. Helms. 1819. DRUKER

## §. XLIII.

*Symptomata. Necroscopia. Caussac.*

1. Tremor nunc universum corpus <sup>1)</sup>, nunc <sup>Sympto-</sup> partem illius occupat, scilicet caput <sup>mata.</sup> <sup>2)</sup>, palpebras

et

diss. de trem. et paral. Traj. ad Rhen. 1652. RUHOCK diss. de tremore. Regiom. 1656. DN BÜCHNER diss. de tremore artuum. Hal. 1698. SCHULHAMMER diss. de tremore. Jan. 1692. NELTHARD diss. de artuum tremore. Erf. 1703. VESTA diss. de tremore. Erf. 1714. Diss. aeger artuum tremore corruptus. Erf. 1694. RICHTER diss. de tremore. Goetting. 1750. HANDBERGER diss. de tremore. Jen. 1754. VAN DER BELN diss. de tremore. v. Collect. Diss. Lovan. EH- MICKS diss. de tremore symptomatico. Hal. 1776. FISCHER diss. de tremore. Budae 1782. BUNTE diss. de tremore. Francq. 1783. Recentiores desiderantur.

- 1) PSCHLIN L. H. obs. 32. Act. nat. Cur. Vol. IX. obs. 28. MATH. MORTON in Direct. med. pract. in massa p. 2. ep. 18. Plurima vidi exempla. ELIAS CAMERARIUS describit in Ephem. nat. cur. Vol. II. tremorem universalem a. 1729 Tubingae et in vicinis epidemica grassantem, Epidemia plures manus perduravit et quadraginta pluresque personas graviter affixit. *Samml. auserl. Abhandl. f. pr. A. B. 9.* p. 513. ELLIOTSON *üb. d. Zitterlähmung oder d. Paralysis agitans, eine klinische Vorlesung; ex The Lond. med. gaz.* 1832. Jan. in BERNEND *allg. Repertor.* 1832. N. 12. p. 305 sq. Cfr. ib. 1830. H. 10. p. 123. 1831. Jul. p. 40. et ZAEGL in HUYELAND *Journ.* 1830. St. 12. p. 68. W. TURNBULL paraly. agitans, in SCHMIDT *Jahrb.* 1834. B. 2. p. 351. ex *Edinb. m. and s. j.* 1834. Jan. HORN *Bericht etc.* in ejusd. *journ. f. d. gesammte pr. Heilk.* 1837. Jahrg. 1. H. 1. p. 1 sq. (puer 10 annorum tremore universali et tussi affectus).

- 2) MARTIN in *mém. de l'ac. des sc. à Paris* 1741. QUEL- MALZ Pr. de musculorum capitia extensorum paralyai. Lips. 1754. BARTHOLINUS *hist. anat. cent. V. hist. 88.*

et labia<sup>3)</sup>, brachia<sup>4)</sup>, Manus<sup>1)</sup>, crura et  
ne dicamus de partibus internis utpote

3) HIPPOCRATES Progn. II. N. 24. AVICENNA Canon. 8. tract. I. C. 16. SCERRE obs. L. I. obs. 43. TEN Commenter. T. III. p. 439.

4) WEPFER obs. med. pract. de tremore brachiorum. RIEGLER Const. epid. Opp. N. 6. BANG R. Havn. Vol. II. p. 153. OLLIVIER l. citendo (t. tibrachii dextri). HUFELAND Journ. 1827. St. 11. 1828. St. 12. p. 37 (tremor brachiorum pedumq., quoque linguae et labiorum). WAGELER Zittern des Armes etc. bei ein. 2jähr. Kinde; in Med. 1837. N. 37.

5) FORESTUS lib. X. obs. 99. MONTAGNANA Consil. I. GIERL öffentl. Consultat. üb. ein eigenthüml. Zittern d. recht. H., wenn sich diese z. Schreib. Lindau am Bodensee im März 1832. (Cfr. Med. 1832. B. 2. N. 29. et EITNER ib. B. 3. N. 73. | SCHRÖDER in Allg. med. Zig. 1833. N. 1). Casu similem in viro caeterum sano, Novocomii coram ibi die 21. Novbr. 1827 etiam pro puella decem in consilium vocatus fui. Haec a matre convalescente et a patre maniae obnoxio descendens, j. bus annis (verisimiliter post terrorem a conspectu matris) in tremorem manuum (non brachiorum) incidit, metutinis praesertim horis per accessus com quibus durantibus nec scribere, nec suere, nec ori admoveere valet. — HEYERLDER üb. ein ei Zittern d. Finger d. rechten Hand, in Med. 1835. N. 1. et in autoris Studium im Geb. d. Heil. 1838. B. 1. p. 196—207. C. F. v. SIEBOLD in M Zig. 1835. N. 19 (tremor pollicis dextri). C. SCHMIDT Jahrb. 1835. B. 6. p. 114 (tremorem in digitum sub nomine paralyseos localis describit)

6) HORNSTATTER Dec. IV. obs. 10.

et corde \*). Observatur nunc *continuus* (saltem in vigilantibus), nunc *periodicus* \*). Tremor maxime sub exercitio partis <sup>10</sup>), caeterum voluntario motu non destitutae, observatur. Urget quoque sub conspectu hominum extraneorum. Cessat haud raro, si pars tremens sustentatur, alias contra ea tunc

7) Eph. nat. cur. Dec. I. ann. 6. 7. obs. 15. In aegro, de quo ELLIOTSON (*Monthly gaz. of health*. 1830. Novbr. p. 1129) loquitur, morbus in capite et ad linguam incipiebat: „When he attempts to speak his tongue begins to vibrate like the tongue of a serpent, he makes an indistinct noise, a kind of murmuring, and then brings out his words with great rapidity and having once commenced he cannot stop himself, but repeats the last words of the sentence three or four times over.“ PRYOR l. citand. p. 164; „Stottern, beständiges Zittern der Zunge.“

8) P. II. Vol. II. Sect. 2.

9) SALMUTH cent. II. obs. 13. TULPIUS L. I. C. 12. act. nat. c. Vol. II. obs. 143. *Journ. de méd.* T. I. p. 323. LEDERUS (misc. nat. cur. Dec. II. an. 6. obs. 27. p. 81) tremorem artuum quotidianum in ancilla 17 annorum plethorica observavit. Haec singulis diebus aliquoties sine discrimine artibus tremebat absque ullo succedente symptomate; tremor eadem post tres, sex vel septem horas revertebatur, eodemque modo intermittebat, quo quidem tempore domesticos labores perficere potuit. EITNER l. c. de se ipso loquens (tremor digitorum manus dextrae quotidie semel, saepius rediit). THOMAS G. GOWRY ein Fall v. Paralysis agitans intermittens; ex the Lancet 1831. Aug. in BENKUND allg. Repertor. 1832. N. 1. p. 110 (tremor extremitatum, duodecimam vel decimam horae partem durans, bis terve intra horam rediit, liberis intervallis).

10) Non nisi scribendo GIERL, HRYFELDER, ALBERS, BAUCK et SJEROLD II. cc.

Frank. Prax. II. 1. 2. 1.

U

tunc invalescit. Tremore accuratius considerato, apparet, eum ex duplici motu componi, uno, quo attollitur vel attrahitur membrum, altero, quo deprimitur, iterumque retrahitur. Capitis quidem tremor, cum pars non sursum et deorsum, sed super axin in circulum moveatur<sup>11)</sup>, exceptionem constituere videtur, sed re ipsa non constituit, propterea quod ille tremor a musculorum rotantium alterutrius lateris imbecillitate, quâ antagonistae vim aequare nesciunt, pendet. Summus tremoris gradus concutiens est, ita ut potius *conquassationis*<sup>12)</sup> speciem referat.

## 2. GUIDO

11) PERRON l. citand. p. 164.

12) Vidua 40 annorum, a dimidio inde et quod excedit anno menstruo fluxu defacta, multis declaratae phthiseos pulmonalis symptomatibus oppressa, jam diu saevum spinæ dolorem saepiusque intestini recti pruritum at ardorem quarebatur. Die 17. Martii 1815 cum ex balneo vaporoso agressa frigus aestuante corpore contraxisset, cubitumque se contulisset, tam vehementer omnibus artubus contremuit; ut, si edinas succurrissent, grabato excussa fuisset. Altera die tremor aliquantum se fregit, ut ipsa sine casu matu cubaret. In clinicum die 2. Mali receptae lactoque commandatae capitis in utrumque latus conversio assidua, ut facies modo dextrorsum, modo sinistorsum, manto semicirculum describente, moveretur, artuumque modicus tremor fuit. Si vero de lecto surgaret et citatiore gradu incedaret, confestim brachia per frequentissimos itus reditusque jam subsultare, jam concidere videras, ut fere volucrum alae, priusquam in altum subvolarent, trapidare solent. Interce manus contremiscere, pedum in utramque partem vacillare, capitis autem micatus mirabili visu, omnino se remittere. Sanguine cucurbitulis

2. GUIDO PATINUS in cadavere cujusdam <sup>Necroscopia.</sup> Campani, qui insolito tremore fuerat correptus, cum febre, hoc extincto invenit in cerebro serum multum subviridescens, cujus pars in *medullam spinalem* dilapsa erat <sup>13</sup>). PARKINSON <sup>14</sup>) nervos, partes prius tremore laborantes (linguam videlicet et brachium) adeuntes, tendineos reperiit, atque medullam oblongatam compactam et amplam, cervicalem medullae partem duram etc. <sup>15</sup>).

3. *Causis* tremoris adnumerantur: vitium *Causae* congenitum <sup>16</sup>) et organicum <sup>17</sup>), violentiae externae <sup>18</sup>), defatigatio <sup>19</sup>), plethora <sup>20</sup>), suppressio menstruorum <sup>21</sup>), abusus liquorum fermentatorum <sup>22</sup>)

U 2 et

cruantis spinae admotis extracto, mox omnes turbae, expectatione citius, compositae fuere.

13) SAUVAGES l. c.

14) Referente ELLIOTSON l. c. (tremor fuit universalis).

15) PÉRYOT l. c.: cerebrum injectum, rubra punctatum, durum excepte substantia grisea; in parte posteriori pontis Varolii tumorem magnitudine nucis avellanae cerebellum comprimantem; partem cervicalem medullae duram.

16) FRL. PLATER obs. Lib. I.

17) BONET anat. pract. L. I. Sect. 14. obs. 6. et 8 (in utroque casu causa tremoris lien degeneratum fuit). PÉRYOT l. c. tumor in cerebro.

18) BEUCHER in Journ. de méd. T. XII. p. 20. RICHTEA l. citendo (ex brachii contusione tremor trium digitorum).

19) e. c. labores inconsumptos ac diuturnos manibus perficiendo, praesertim pugillatus.

20) PELLAGUS med. Jahrgänge. 5. B. p. 93. Plethora haemorrhoidalis: HUFELAND Journ. 1828. St. 2. p. 98.

21) MERCURIUS Consil. 80.

22) SCHUNK obs. med. rez. L. I. GILBERT adveersar. pract.

et coffeae<sup>23</sup>), inedia, frigus<sup>24</sup>), transpiri  
pressa<sup>25</sup>), ira<sup>26</sup>), terror<sup>27</sup>), seminis  
libido<sup>28</sup>), onania, morbi praegressi<sup>29</sup>),  
suppressa<sup>30</sup>), venaesectio<sup>31</sup>), senium<sup>32</sup>

p. 265 et quotidiana experientia, unde FORST  
(L. X. obs. 99): hanc nullem causam tremoris  
existere. Maxima vero vinum jejuno stomacho  
tremoram inducit.

23) BAGLIVI. Cfr. SAUVAGNE nosol. magh. T. II, P  
class. IV. gen. XIV. spec. 4. Tremor ex coffea  
l.c. (paroxysmi saltem ex coffeae et theae usu  
HUFFELDNER l. c. (item).

24) Primum frigus hyemale etiam optime valentes  
tremiscere; perpetuique ex eo tremoris exempl  
epud HOKCHSTUTTER. Obs. Cent. IV. Cas. 16.

25) OLLIVIER *tr. de la moelle épîn. et de ses m*  
1827. T. 2. obs. 117. p. 813.

26) PELARGUS op. c. 4. B. p. 207. Cfr. ed. alt. F.  
Sect. I. C. XX. §. LXXXVI. 1 (28).

27) Eph. nat. eur. Dec. II. ann. 5. obs. 27. F  
*Samml. auserl. Abb. f. pr. A. B.* 9. p. 513.

28) ABRAHAMSON in MECKEL *N. Archiv.* I. B. 3.

29) e. c. febres suppressae (Commerc. lit. Nor  
p. 365. et *Edinburg. Versuche.* 2. B. N. 25) con  
Febria nervosa (HUFFELAND *Journ.* 27. St. 11. p. 1

30) LENTIN *Beyträge* p. 104. CAMERARIUS *diss.*  
a cessante scabia. Tab. 1688.

31) TULPIUS Obs. L. I. C. 23 (Ex vanaesectione  
pollicis et brachii in febro ferrario se observasse  
— varisimilliter ex laesione nervorum). BONNE  
obs. 45 (Similis observatio). HORNBAUM in *Me  
sat.* - *Bl.* 1831. N 37. p. 291 (tremor antibrach  
repatita; quod phenomenon autor sanguinis qu  
tatae adscribit).

32) LENTINIUS *miscell.* Vol. II. p. 516.



mes<sup>22</sup>), opium<sup>23</sup>), nicotiana<sup>24</sup>), et maxime vapores plumbi<sup>25</sup>) et mercurii<sup>27</sup>).

#### XLIV.

33) Act. nat. cur. Vol. II. p. 143. IX. obs. 28. BONET Sepul. T. I. p. 6. obs. 116. „In Marca Aconitana ad. 1571 epidemia grassabatur (*tremor vertiginosus*), cum cephalalgia quasi pertarebrante, tremore convulsivo, vertigine per paroxysmos redeuntibus et haud paucos dies occidentibus. Nulla profuere remedia, inventum est in cerebri animal, vermiforme, rubrum, digito longius, ora acuto, collo piloso, vivum, latens in cerebri sinibus.“

34) GRANT in the London medical journal Vol. VI. p. 1. v. Abh. f. pr. Aerzte. II. B. p. 73.

35) Qui in officinis, tabaco parando, operam navant, tremori subijci, aliquis me certiores reddidit.

36) BROCKMANN pathol. therap. Bemerk. üb. d. Bleikrankh. d. Hüttenarbeiter; in HOLACHER Hannöv. Annal. f. d. gesammte Heilk. 1837. B. 2. H. 3. p. 556—599 describit tremorem saturninum. BICKING traurige Folge ein. Behandl. d. Schwindelsucht durch plumb. acet. in HUFELAND Journ. 1839. St. 6. p. 110.

37) SALMUTH. cent. III. obs. 39. RIEDLIN — Lin. med. 1695. p. 19. WELSH Dec. III. chrat. J. BONET in sepulchro L. I. Sect. 14. obs. 17. et in eam annotationes, quae ut legantur sunt dignae. Act. nat. cur. Vol. V. obs. 446.

HARN rat. med. P. III. p. 202. IV. p. 231. MAUDUYT v. FOURCROY méd. éclairée. T. 3. MÉRIAT in Journ. de méd.

continué. 8. Vol. p. 391. Beob. üb. d. schädli. Wirk. d.

Quecksilberdünste und bes. das Zittern der Glied-

massen, welchem mit jen. Metalle umgehende Arbeiter unterworfen sind. Vom Prof. PROCHASKA aus d. schriftl.

Nachlass d. Dr. WERNERCK DU CHATEAU, ehemals Arzt in Prag. v. Med. Jahrbücher des K. K. Oester. Staates, Wien

2. B. 1814. Dictionn. des ec. méd. Artic. Tremblement métallique. PATISSIER traité des malad. des artisans et de celles qui résultent de diverses professions. Par. 1822.

## §. XLIV.

*D i a g n o s i s.*

**Distinctio.** 1. De tremore symptomatico jam ab tractatibus de febre intermittente <sup>1)</sup>, ac p de encephalitide <sup>2)</sup> et rhachialgitide <sup>3)</sup> t cientibus quaestio fuit. Istis in morbis habitualis potatorum et senum, utpote *ac lis* probe ab illo, qui ex morbo pullulat, guendus est. Diagnosis tremoris morbi pe tuitu instituitur, ne ille cum chorea *Sti* aut cum *paralysi imperfecta* <sup>4)</sup> confunda

PETROT *Mercurfalsittern, Sudamina etc., ex At* 1834. *Avril*, in SCHMIDT *Jahrb.* 1831. *B.* 4. p. 1  
NOWAKOWITZ *üb. das bei Metallvergiftungen vorhomi*  
*tern*; ex *Lond. med. gazet.* 1834. *Fol.* 14. *Apr.* in  
*Jahrb.* 1835. *B.* 5. p. 301. G. VAN CHARANTH  
*ein. Falles v. Gliederzittern in Folge von Quec*  
*giftung*, ex *Pract. Tydschr.* 1834. *Jul. Aug.* in  
*Jahrb.* 1835. *B.* 8. p. 176. E. M. A. HEIM *üb. c*  
*rialkrankh.* *Erlang.* 1835. Ex abusu mercurii trem  
posse, medicorum nemini ignotum est. COLSON  
*Notiz.* 1827. *B.* 17. *N.* 17) sex egrotas, quae,  
philitide liberarentur, et SWITENIT liquore, et i  
bus mercurijlibus naae erant, trementes videbat

- 1) Edit. ult. P. I. Vol. I. Sect. 1. C. II. §. XXII. 2.  
febilem a tremore probe distinguit SAUVAGES  
ideo negat, eos societatem inire posse.
- 2) P. II. ed. ult. Vol. I. Sect. 1. C. III. §. XIV. 7.
- 3) C. III. §. XII.
- 4) ПЕТУХОВЪ (l. c.) tremorem digitorum choream  
nominat.
- 5) ELLIOTSON (l. c.) tremorem *shaking palsy* (para  
tantem), idque duce PARKINSON, primo de h

*palpitatione* pathologi tremorem distinguunt, quod in illa non totum membrum, sed unus aut alter musculus movetur <sup>6)</sup>. *Subsultus tendinum* <sup>7)</sup> e contrario pro specie tremoris agnoscunt,

2. Tremor pro re nata ex cerebro, medulla <sup>Indoles.</sup> spinali, singulis nervis ortum ducit, et quidem, nisi a violentiis externis proveniat, culpā variarum diathesium.

3. *Inflammatorius* ille, ab infarctu cruento Tremor  
vel seroso cerebri et medullae spinalis pullulans <sup>inflammato-</sup> <sup>torius.</sup> <sup>8)</sup>, linguam et brachium afficere, atque potui liquorum fermentatorum, et suppressioni menstruorum, et haemorrhoidum originem debere, solet.

4. Tremor ex *diathesi rheumatica* et *arthri-* Tr. rheu-  
*tica* ut plurimum originis spinalis (*rhachialgitis tre-* maticae et  
*mefaciens*) in extremitatibus inferioribus et trunco arthriti-  
non sine rhachialgiae notis et subsultibus tendi- <sup>cus.</sup>  
num sese manifestat.

#### 5. Tre-

mento scriptore, et J. F. H. ALBERS (*Beobacht. auf d. Geb. d. Pathol.* etc. Bonn 1838, Th. 2, IX. 4) *paralysin tremulantem* vocant.

6) KRAUSE l. c. Thes. XXIV. Palpitatio singulorum musculorum, quandoque ex defatigatione in musculis inter articulos extremitatum tum superiorum tum inferiorum sitis obvenit. Obvenit hinc inde in hystericis etiam ad musculos abdominales, motum foetus simulans.

7) SAUVAGES l. c.

8) WURFFER (l. c.) ait: „Causa proxima non alia esse potest, quam serum sanguinis; nam solum hoc se citra graviora symptomata medullae spinali et reconditis cerebri porulis et meatibus, per quos spiritus distribuuntur et moventur, immergere at hac ratione has actiones immutare potest.“

Tremor  
gastricus.

5. Tremor ex *diathesi gastrica*, per SAUVAGESII observationem constat \*).

Tr. ex  
tonia.

6. Tremor ex inedia, onania, morbis praegressis et senio, plerumque ab *tonia* repetitur. Interea tremor iste saepe praeter atoniam alias etiam causas socias agnoscit, vitia scilicet medullae spinalis, metastases ad varias systematis nervosi partes, et quoad senium forte tendinum musculorumque rigiditatem <sup>10)</sup>. Nec silentio speciem tremoris ex *debilitate*, ut aiunt, *indirecta* praeteribimus, potatorum scilicet ad extremum perductorum, quique maxime jejuno ventriculo urget, ac sumto lauto pastu, cum liquoribus fermentatis, evanescit aut saltem imminuitur.

Tr. nervosus.

7. Tremores transitorii a terrore, ira, hysteria, et libidine, nec non a narcoticis excitati, utpote evidenter ex affectione primaria systematis nervosi orti, certe *nervi* dici queunt. Minori cum certitudine, at coacti, tremores metallurgorum huc revocamus, de quibus speciatim.

Tr. metallurgorum.

8. Tremori metallurgorum <sup>11)</sup> obnoxii sunt, vulgo qui in plumbi, hydrargyri, aliorumque metallorum fodinis habitant, nudo corpore laborant, vel etiam incaute se exponunt aëri frigido; post  
litus

9) „Quadragenarius aetate praeteritâ, tremore universali correptus subito, sine febre cum linguae sorditie adivit me; praescripta phlebotomia, melius se habuit, sequenti die assumptis ipecacuanhae granis quindécim et mannae uncia tribus, ano et cato purgatus est, tertia die iterum „phlebotomia, quartâ iterata catharsi, et sanatus est.“ l. c.

10) SAUVAGES l. c.

11) GALL, *Tremblement métallique*.

litus mercuriales aut diu tractato hydrargyro, ut chemici, speculorum<sup>12)</sup> et barometrorum confectores et maxime aurifabri<sup>13)</sup>. Aegri hujusmodi aspectum exhibent luridum, calorem faciei subflavescentem, et albugineam lividam. Conqueruntur primum de capitis gravedine et obnubilatione, de aurium susurru, anorexia, debilitate, doloribus artuum obtusis, et gingivarum pruritu. Progrediente morbo oculi profunde in orbita jacent, virium jactura augetur, membra cruciatibus, praesertim nocturnis, et sensu gravitatis tentantur. Jam gingivae a dentibus flavis et vacillantibus secedunt et corrumpuntur, ac foedus ichor ex ore depluit. Motus, praesertim ascensus scalarum, ob crurum imbecillitatem, difficilis. Nonnulli in diarrhoeam colliquativam incidunt, vocem naturalem amittunt<sup>14)</sup>; balbutiunt<sup>15)</sup>, difficulter respirant, febricitant, et unguis lividos exhibent. Quibus symptomatibus vix non semper, *tremor extremitatum*, praecipue *manuum* adsociatur, quo aeger continuo ita concutitur, ut nil ori admoventi possit<sup>16)</sup>. Nisi occurratur, et capitis, et dorsi musculi, tremore corripuntur, quo facto aeger neque pedibus instare<sup>17)</sup>, neque sedere valet, ac nonnisi tempore somni, brevi fruitur quiete<sup>18)</sup>. Qui ex plumbo

12) PEYROT l. c.

13) V. CHARANTH l. c.

14) PEYROT l. c. p. 164.

15) ARROWSMITH l. c. hist. 2: „die Stimme zitternd, wie bei einem Frostanfalle.“ Cfr. §. XLIII. 1 (?).

16) ARROWSMITH, PEYROT II. cc. V. CHARANTH l. c. p. 177.

17) V. CHARANTH l. c. HORN l. c.

18) WERNERCK l. c.

plumbo tremorem contraxere, praeterea alvi constipationem, colicam, retractionem umbilici, pulsus lentum et durum, aliaque colicae saturninae symptomata exhibent.

## §. XLV.

*Prognosis. Cura.*

*Semioties.* 1. Tremor in sanis haud raro notat instantem paralyisin, in iis vero, quos paralyisis tenet, redeuntem valetudinem<sup>1)</sup>. In febribus acutis, tempore incrementi, tremor, capitis affectionem praesagit. Mortiferus habetur, ubi in febribus ardentibus post delirium incidit<sup>2)</sup>, quod saltem in encephalitude tremefaciente non semper confirmatur. Minus terrere debet tremor, qui parvus, recens, congenitus, senilis est.

*Pr. tr. primarii.* 2. Tremor inflammatorius recens, ut plurimum recta adhibita medela compescitur. Ita tremor rheumaticus et arthriticus. Secus autem si malum jam diu duraverit. Interea et hic quandoque vim illius saltem frangere potuimus. Tremor ex inedia si praeter debilitatem, nulla alia adsit labes, in junioribus facile abigitur. Tremor senilis et potatorum exhaustorum insanabilis. Quandoque tremorem rebellem et habitualement (eo ex vaporibus mercurialibus non excepto) a morbo acuto e. c. febre nervosa, superveniente fugatum vidimus<sup>3)</sup>. Tremoris metallurgorum prognosis,

1) WEDDEL in Theor. P. II, Sect. 4. §. 37.

2) SWIATEN. Comm. Aph. 741. Vol. II.

3) Cfr. TILLIAU in Journ. de méd. T. 49, p. 241. PARKINSON

a copia metalli corpori inhaerentis, ab aegri constitutione et aetate, maxime a facultate aut impotentia effectus nocivos metallorum fugiendi, pendet; generatim paralysis et atrophia \*) timenda.

3. Facultas illa cum paucis opificibus concessa sit; quaeritur, quo pacto ipsi contra vium nocivam metallorum sese munire possint? Suadetur \*), ut spongia figurae conicae aqua imbuta, orificia narium et oris obturent, — ut balneis tepidis corporis superficiem bis terve mensis curriculo abluent, — ut labores non jejuno ventriculo, sed ingesto prius jentaculo pinguedinoso, oleoso aggre-  
Prophylaxis tr. metallurgorum.

grediantur, — utque officinae, quousque licet, ita construantur, ut afflatus aeris vapores nocivos a corpore removeat \*). Forte vapores sulphurici scopo prophylactico ab indicatis opificibus adhiberi deberent.

4. Sulphur saltem in curando tremore metal-  
Cura tr. metallurgorum.

lurgorum ad praecipua pharmaca spectat ?). Re-

moto

(l. c.) de tremore refert, hemiplegia accedente fugato, sed, hac sanata, rediente.

4) (nec non tabes dorsalis et scoliosis. HUFELAND Journ. 1828. St. 12. p. 37). BROCKMANN in HOLSCHER Hannöv. Annal. 1837. B. 2. II. 4.

5) GOSSE sur l'hygiène des professions insalubres. v. Biblioth. universelle. 1817. Janvier.

6) DARCET (de l'art de dorer. Par. 1818) fornacem aëri permeabilem (fourneau d'appel) proponit.

7) V. CHARANTE (l. c. p. 177) Sulphureto potassae et postea Nucis vomica malum rebelle debellavit. Si autor vero dicit (p. 176): „Bei den Schriftstellern fand ich zu meiner Verwunderung nichts darüber gesagt, weder eine Beschrei-

moto enim aegro a laboribus infensis conciliatisque alimentis facilis digestionis, praemissoque pro re nata vel emetico vel purgante, ante cubitum scrupulus *pulveris sulphuris purissimi*, si lubet cum aequali *nitratis potassae* \*) dosi porrigitur, cui vasculum infusi *florum tiliae* aut alterius decocti dia-pnoici superbibitur. Suadentur porro decocta *radicis smilacis chinae* et *sarsaparillae*, *arctii lappae* et *acori calami*, non neglectis *thermis sulphureis* \*). Praeter ista maxime nobis profuit infusum *radicis inulae Helenii* optimum inter vegetabilia mercurii antidotum <sup>10)</sup>. Laudatur et *electricitas* <sup>11)</sup>.

C. alia-  
rum spe-  
ciorum  
tremoris.

5. Quae quidem *electricitas* <sup>12)</sup> nobis solum in tremoribus ex causis traumaticis profuit. In inflammatorio tremore primum auxilium *venae sectio* <sup>13)</sup> e pede, si firmari possit. Accedunt hi-

rudi-

*bung der Krankheit* (tremoris ex mercurio), noch die *Behandlung angegeben*;“ valde dolemus quod primam hujus operae editionem non legisset.

8) WENBOECK l. c. Fatetur, quod si aeger tela cerata involvatur, haec pulvere nigro cooperiatur.

9) V. CHARANTE l. c. p. 177.

10) Et profuerunt aliis: *Strychnini* gr.  $\frac{1}{2}$  bis de die. ARROWSMITH l. c. *Nucis vomicae Extracti* gr.  $\frac{1}{2}$  bis de die. V. CHARANTE l. c. p. 177.

11) SIGAUD LA FOND op. c. p. 216. MAUDNIT l. c. HARN Rat. med. P. I. p. 188. II, C. 13. p. 202. GÜNTHER in HUFELAND Journ. 1828. St. 1. p. 113. ARROWSMITH l. c.

12) *Galvanismo* cum acupunctura D. G. KLASER (Alin. Beitr. Lpz. 1834. Th. 1) tremorem artuum inveteratum debellavit.

13) HIPPOCRATES II. epid. Sect. 4 (salutarem venasectionis effectum in Stymargi ancilla ex mensium suppressione tremore totius corporis laborante, expertus est).



*rudines* vel ad caput <sup>14</sup>), vel ad vasa haemorrhoidalialia. Quantum *cucurbitulae scarificantes* lateribus columnae vertebralis admotae nobis in *tremore rheumatico* profuerint, dictum est <sup>15</sup>). Jam dudum *cucurbitulae siccae* iisdem in locis celebrabantur <sup>16</sup>). *Tremorem arthriticum* inveteratum, praemissa eadem locali sanguinis evacuatione ope *extracti guajaci officinalis* temperavimus. In sene quodam tremori ex ignota causa orto infuso *herbae chenopodii ambrosioides* frenum injecimus. Morbo ex inanitione et peculiari nervorum affectione pullulante *salviae* <sup>17</sup>), *cinchonae* <sup>18</sup>), *moscho* <sup>19</sup>), *opio* <sup>20</sup>) aliisque hujus generis auxiliis <sup>21</sup>)

locus

- 14) Hoc modo et eceoproticis fortioribus ELLIOTSON (l. c. p. 319) plures aegrotos sanavit.
- 15) §. XLIII. 1. in nota (12). GOWRY (l. c.) cucurbitulae cruentis et hirudinibus ad spinam dorsii applicatis, una cum drasticis, Calomelano et Opio celestissime sanavit.
- 16) HUERN. de capit. morb. C. 27. FORSTUS l. c. HAYFELDER l. c.
- 17) Ab omnibus auctoribus tanquam praecipuum auxilium commendatur.
- 18) TILLHAU l. c. BOUCHER Journ. de méd. T. 12. p. 23. HUFELAND Journ. 1828. St. 2. p. 98 et alii.
- 19) BANG in act. R. S. Hafn. Vol. II. p. 253. Tinctura moschi commendata est in: the monthly gaz. of health, 1827. Febr. N. 134. p. 887.
- 20) THOMANN Annal. Würcab. Vol. I. p. 46 et multi.
- 21) MARTINI ein Dutzend Beobachtungen. N. 2. Porro uti-  
lia fuere: *Nux vomica*: MEYER in HUFELAND Journ. 1827. St. 12. p. 117. RICHTER Heil. ein. Zitterns dreier Finger durch endermat. Anwend. des Strychnin. nitric. in Med. Ver.-Ztg. 1834. N. 10. — *Acidum muriaticum camphera-*

locus est. Nec *vesicatorium* prope partem affectam <sup>22)</sup> negligendum <sup>23)</sup>. Suadentur præterea *frictiones* cum pannis calentibus circa medullam spinalem et partes laborantes <sup>24)</sup>, item cum *spiritu formicarum*, *ammonia*, etc. <sup>25)</sup>. Bibones, ut sensim sensimque a potu liquorum fermentatorum abstinenceant, oportet.

## CAPUT

*tum*, quod EITNERO (l. c.) remedium primum est, praesertim si seminis jactura partes in malo habet. *Argentum muriaticum* (en EITNERI formula: R̄. Argenti nitrici ʒβ. Solve in Aq. destill. ʒij. Instilla Liq. emm. caust. ʒijβ. Adde: Acidi muriat. ʒijj. Vel s. q. ut nihil amplius praecipitetur. Pondus totius massae sit ʒijjβ. Ter quotidie guttul. quinque sumend. et sensim sensimq. augeud.). *Argentum nitricum* laudant GOSSE, PÆVOST, DUPIN et LOMBARD *troisième rapport du dispensaire de Gênes*, ib. 1830. et *Gaz. méd. de Par.* 1832. Août. — *Tinctura Stramon.* temporarie profuit: HUFELAND *Journ.* 1828. St. 12. p. 37. *Zincum*, *Cuprum* et *Nicotiana* profuisse videntur. ib. et 1827. St. 11. p. 91 (HUFELAND et PITTSCHAF).

22) MUYS *Praxis der Wundarzneykunst*, Dec. VII. obs. 3 (Digito trementi).

23) *Fonticulum* inter scromium et ultiores colli vertebrae applicatam intra sex menses fugavit tremorem, qui, illo sanato annis duobus praeterlapsis, redux. ALBERS l. c. Moxerum applicatio suadet ab HUFELANDIO *Journ.* 1827. St. 11. p. 91.

24) HERN. l. c.

25) KRAUSS l. c. Thea. 37. L. W. SACHS in HUFELAND *Journ.* 1828. St. 7. p. 3. — Inter balnea diversa, a GIERL et HRYPOLDER (ll. cc.) incassum adhibita, fluvialis seni, ex causa ignota trementi, solutifera videbam, postquam aliis remediis laudatis sine lavamine usus fuit. — Tremori

## CAPUT X.

*De chorea Sti Viti.*

## §. XLVI.

*Definitio. Literatura.*

1. **I**nobedientia musculorum, jam volunta-  
tis imperio plus minus subtractorum, corporis  
vel partis ejusdem motu abnormi, potissimum  
contorsionibus, et jactationibus, gesticulationibus  
inanibus, ansam praebens, *chorea Sti Viti* <sup>1)</sup>)  
nuncupatur.

## 2. Hir-

digitorum auxilia mechanice HEYFELDER et SIBOLD (ll. cc.)  
opposuerunt.

- 1) *Chorea* a Gr. *Χορεία*, saltatio, *Sti Viti* ex eo, quod  
plebs a sacello Sti Viti, monasterii Corveyensis patroni,  
auxilium adversus morbum, de quo agitur, impetrare so-  
lebat. *St. Vito* sacellum dictum scribit HORSTIUS in *Ul-*  
*mensium* finibus, et conficere ibi saepe sub spe sanationis  
saltaturas quot annis mulierculas prurientes multas (lib. II.  
obs. 45. p. 119). Et *Havensburgi*, oppido *Sueviae*, mons  
ipsi Sancto dicitur, cum imposito templo saecr, quem  
itidem frequens olim tripedientium turba visitevit (CAM-  
MARANTUS hor. Subcisivae cent. II. c. 81). Dicitur adhuc ho-  
die imprecationis modo: *dass Dich Sankt Veits-*  
*Krankheit!* Alio sacella, St. V. dicata et a saltantibus  
visitata, v. HUCKER *die Tanzwuth. Berl.* 1832. p. 8 sq.  
„*Im Luxemburgischen Lande wallte alljährlich eine ganze*  
*Procession bis in das Kloster Echternach. Die Wall-*  
*fahrer wurden die springenden Heiligen genannt. Wenn*

Literatu-  
ra.

2. HIPPOCRATES<sup>2)</sup> perspicuas jam choreae,  
a GALENO<sup>3)</sup> clare descriptae, notiones habuerat<sup>4)</sup>.

Per-

sie in der Kirche anklamen, wurde eine monströse eiserne Krone über sie herabgelassen, worunter sie sich alle drängten.“ MAIER *Haus v. Stromberg. Mannh. 1787. p. 107.* Synonyma: Scelotyrbe (a Gr. Σκῆλος, crux, Τίρβη, tumultus seu cruris perturbatio), Ballismus (a Gr. Βαλλισμός, Saltatio), Choreaomania, Orchestromania, Hieranosos, epilapsia saltatoria (DOLAEUS), gesticulatoria (C. BUCKER); convulsiones admirabiles (LENTILIUS), affactus spasmodicus singularis (FRAUENDORFFER), Viti saltus, saltatio Sti Viti et Tarantismus, quoniam a morsu tarantulae derivabatur. GREEN. *Feistanz, St. Vitstanz, Johannstanz* („diese Namen, docet SCHNURER l. c., Th. 1. p. 347, erhielt die Krankheit, weil ihr Ausbruch am häufigsten in die Jahreszeiten fiel, in welcher gerade die Wallfahrten ihre Richtung zu den Capellen dieser Heiligen, deren Namensfeste begangen wurden, nahmen), *St. Modestanz, Tanzkrankheit*. GALL. *Chorée, danse de Saint-Guy, ou de St. Vit, le Tarantisme*, la Janson. ITAL. *Il Carnèvaletto della Donna, Oestro di ballare, Danza di St. Vito*. POL. *Tanices S. Wita*. ROSS. *Пляска Св. Вита*.

2) Lib. praenot. II. „medulla, inquit, *spinæ affecta*, homo nec *crurum*, nec *vesicae* aut *vantris officii* potens est, nisi urgente necessitate. Si vero morbus invaluerit, tum aliquando praeter voluntatem meam et egerit.“

3) Lib. Definit. Cfr. J. LANGII, Lembergii, Ep. med. Hanov. 1605. L. II, Ep. XIV. p. 568. „Scelotyrbe, ait GALENUS, est species paralysis, qua correpti recto calle progredi non possunt, sed modo a dextris in sinistrum vacillant, ac sinistram pedem in dextrum circumferunt, ac coguntur dextrum in sinistram et in progressu attollere orus, tanquam hi, qui magna et ardua conscendere volunt.“

4) Praetendit nihilominus PARACELSUS se primum esse, qui de saltu illo insano, quam vulgus St. Viti choream no-

Perfecerunt porro hujus morbi doctrinam plurimi<sup>5)</sup>, quibus omnibus BERNI<sup>6)</sup> palmam eripit.

## §. XLVII.

minat, scripsarit. „Illi morbi omnes (inter quos et *chorea* ponit) ante me a nullo usquam descripti sunt.“ Op. T. I. p. m. 251.

- 5) SYDENHAM schedula monitoria de novae febris ingressu. FELIX PLATER obs. Lib. I. p. m. 130. GREGOR, HORST apist. med. Sect. VII. p. 119. WERDEL diss. de chorea Sti Viti. Jen. 1682. MARTINUS diss. cas. de chorea Sti Viti. Argent. 1730. FÜRSTENAU diss. de St. Viti saltu siva chorea, vulgo Vitstanz. Kintel. 1750. CARTHEUSER fundamenta pathol. et therap. Francf. ad Viadr. 1758. DRTHUARDING diss. de chorea St. Viti. Rostoch. 1760. SPANGENBERG diss. de chorea St. Viti. Goett. 1764. SCHWARZ diss. de tarantulismo et chorea Viti quaten. scil. hi morbi aut conveniunt, aut differunt. Vienn. 1766. REER diss. de chorea St. Viti. Viennae 1769. PARSCHAVIN *Abhandl. v. d. Nervenkrankheiten. A. d. Französ. Nürnberg.* 1772. BELIN diss. de chorea St. Viti. Lovan. 1782. EWART diss. de chorea St. Viti. Edinb. 1786. STRACK acta soc. Elect. Mogunt. T. I. BRÜCKMANN ausratio choreae St. Viti. Francf. 1786. MARC diss. sistens hist. morbi rarior. apromod. Erlang. 1792. et in *Gaz. méd. de Paris.* 1831. N. 46. SCHRAUD *Beobacht. a. d. Arzneik. Wien* 1792. SALT diss. de chorea. Edinb. 1793. SALMON diss. de chorea St. Viti. Edinb. 1796. ENGELHART diss. de chorea St. Viti. Lund. 1798. v. RUDOLPHI *Schwed. Annal. 1. B. 2. Heft.* p. 168. BRUNNEN diss. de morbi genere, quem Viti choream dicunt. Fr. ad Viadr. 1799. KETTERLING diss. de chorea St. Viti. Erf. 1803. HERBERDEN *Comment. üb. d. Verlauf d. Krankh. u. ihre Behandl. A. d. Lat. v. NIRMANN. Lpz.* 1805. *Salzb. med.-chir. Ztg.* 1806. B. 2. 1808. B. 4. V. MANNAR diss. de chorea St. V. Landish. 1809. BOUTKILLE *traité de la chorée ou danse de Saint-Guy. Paris* 1810. REEVE obs. on treatm. of chorea St. Viti. v. *Edinb. med. and surg. journ.* Frank Prax. II. 1. 2. 1.

Vol. 8. FORGUES diss. medica de chorea. Edinb. 1811. WIRNIKER in HORN *Archiv*. 1812. JENNER, SWEDIAUR Jatrike, Hal. 1812. T. I. P. II. VAN HOVEN *Vers. üb. d. Nervenkrankheit*. Nürnberg. 1813. ALBERS *Darstell. e. unter d. Schulkindern in der Voigtey Bohnhorst ausgebroch. konvulsiv. Krankh.* v. HUFELAND *Journ.* 1813. April. WATT *cases of periodical jactation or chorea in Med. chir. transact. publ. by the med. and chir. soc. of Lond.* 1814. Vol. 5. J. SCHARFNER diss. de chorea St. Viti. Viena. 1815. ORTMASCHI in *Giorn. med.* T. 2. KINDER-WOOD *med. chir. transact. by the med. and chir. Soc. of Lond.* 1816. Vol. 7. KACZKOWSKI diss. de chorea St. Viti medullae spinel. vitio sarpe assignanda. Vilnae 1816. DORFMÜLLER in HUFELAND *Journ.* 1817. Nov. p. 101. J. G. WAGNER *pathol. therapeut. Abhandl. üb. d. Feistanz.* Nürnberg. 1818. J. LE VISSEUR de risu sardoa. et de chorea St. V. in puero quod. acuti exanthem. regressionem modo secutus. Berol. 1818. BOROS diss. de chorea St. V. Pestin. 1819. J. F. A. SCHULZ diss. de chor. St. V. Berol. 1821. C. J. STRANSEY tract. de St. V. chorea. Vienn. 1822. C. J. L. THALHEIM diss. de chorea St. V. Berol. 1823. B. J. COHEN de Chorea St. V. Hal. 1823. A. KRAFT VON DELMENSINGEN *üb. d. Feistanz.* Würzb. 1825. J. F. WILHELM diss. de chorea St. V. Lips. 1825. *Repertor. med. chir. di Torino.* 1825. N. 66. p. 249. JACHER in GRAEFH u. W. *Journ.* 1828. B. 11. II. 1. p. 143 (duo casus). G. PETRI diss. de chorea St. V. Berol. 1829. F. L. MEISSNER *d. Feistanz, als Entwickelungskrankh. betracht.* in SIEHOLD *Journ.* 1830. B. 9. p. 604—648. Ejusd. *Forschung. des 19. Jahrh. im Geb. d. Geburtsh., Frauenz.- u. Kind.-Krankh.* Lpz. 1833. Th. 5. p. 2—10. E. C. WIECKE *Bruchstücke ein. Monographie d. unwillkührl. Muskelbeweg. u. des grossen Feistanzes;* in HORN *Archiv.* 1830. St. 2. p. 189—233. L. FLECKLES diss. de chorea St. V. Vindob. 1831. BRECHET *neue (?) Behandl. des F. T. ex Journ. hebdom.* 1831. Octbr. et *Gaz. méd.* T. 3. N. 7. in *Summar. des Neuest. a. d. in-*  
u.

u. ausländ. Med. Lpz. 1832. B. 1. p. 434—437 (autor purgantia et magnas doses tartari stibioti commendat). A. TODD THOMSON üb. d. *V. T.*, eine klin. Vorles. ex Lond. med. gaz. 1831. Decbr. in BREHEND Journ. 1832. H. 3. p. 316. FRITSCH Heil. des *Veitstanzes* durch die Beifusswurzel, in HUFELAND Journ. 1832. St. 9. p. 112. BEUTTMÜLLER Beobacht. ein. Falles v. Chorea St. *V.* in Würtemb. med. Correspondenzbl. 1832. N. 15. CAMERRE Gesch. ein. *Veitstanz.* v. nicht gewöhnlicher Art, in ib. N. 25. BRUNN *Veitstanz*, in CASPER Wochenschr. 1833. N. 49. DUPUYTREN Heil. ein. plötzl. entstand. *V. T.* ex Gaz. des hôp. 1833. Vol. 7. p. 18. in GERSON u. JUL. Mag. 1833. Novbr. Decbr. PLATH Beobacht. ein. St. *V. T.* mit selten. Erscheinung., in HECKER Annal. 1834. Juni. F. VOLKMAN diss. de Chorea St. *V.* Berol. 1831. RUFZ Untersuchung. üb. einige Punkte d. Gesch. des *V. T.* bei d. Kindern, ex Archiv. gén. 1834. Févr. in SCHMIDT Jahrb. 1834. B. 3. p. 49. TISCHENDORF üb. d. *V. T.* in CLARUS u. RADIUS Beiträge, B. 1. H. 2. J. H. SCHLOTHANE diss. de chorea St. *V.* Grisew. 1835. GASP. CERIOLO ein Fall v. *V. T.* ex Bull. delle sc. med. 1835. Lugl. e Agost. in SCHMIDT Jahrb. 1836. B. 11. p. 176. SIMON ABELLES diss. de Chor. St. *V.* Pest. 1836. STIEBEL üb. d. *V. T.* in CASPER Wochenschr. 1837. N. 1. SCHLEGEL glückl. Heil. ein. *V. T.* u. Starrkrampfes; in Allg. med. Ztg. 1837. N. 45. R. J. GRAVES Chorea, ex Dublin j. 1837. Jul. in SCHMIDT Jahrb. 1838. B. 18. p. 294. A. MÜLLER diss. de Chor. St. *V.* Ber. 1837. A. ZAWITZ diss. üb. Chor. St. *V.* Würzb. 1837. A. OCHWALDT diss. de Chor. St. *V.* nonnull., adject. morbi histor. Berol. 1837. GRAVES üb. Chor. St. *V.*, ex Lond. med. gaz. 1838. Octbr. in FRORUP Notiz. 1839. B. 9. N. 15. p. 233 sq. SCHENK Beob. ein. sehr heftig. *Veitstanz.* mit gänzl. aufgehobenem Bewusstsein; in HUFELAND Journ. 1839. St. 2. p. 104. R. FRORUP ein Beitrag z. Pathologie des *Veitst.* in Notiz. 1839. B. 11. N. 4. p. 57 plurimique passim citandi.

6) Monographia choreae St. Viti. Pragae 1810 (adco gra-

## §. XLVII.

*Symptomata. Necroscopia.*Genera-  
tim.

1. Nullius morbi symptomata tam varia sunt, quam illa choreae<sup>1)</sup>. Variant e diversitate musculorum affectorum, hanc partem moventium, variant, prout totum vel una tantum pars tentatur; variant situs corporis, in quo malum apparet, ratione temporis, in quo illud recurrit et variant porro ratione status animi et variantque postremo ob faciles complicatio aliis morbis.

Prodroma

2. Nisi chorea extemplo ingruat, illius sunt: morositas, timiditas, solitudo tristitia, anxietas<sup>2)</sup>, suspiria, palpitatio ventris inflatio<sup>3)</sup>, manuum tremor<sup>4)</sup>, sterni<sup>5)</sup>, extremitatum praecipue inferior

phica choreae symptomata delineavit, ut ver-  
scriptionis suae vel omittere vel mutare pro-  
buissem). Accessit: *Abhandl. üb. d. Feitstanz*  
SOHLER, deutsch bearb., vermehrte u. verbess  
*Monographia Chor. St. V. v. J. BERNT. Wien*

1) „Der Feitstanz ist in allen seinen Symptomen ei-  
delbare u. ins Unglaubliche abwechselnde Krank-  
es gewiss Jedem unmöglich ist, die Symptome  
Ordnung darzustellen, in welcher sie in einem  
auftreten.“ SOHLER l. c. p. 31.

2) R. KROHNE l. c. p. 59 (ex medullae oblongatae)

3) J. COPPLAND v. ein. Feitst. mit merkwürd. i  
ex Lond. med. repository. 1821. Jan. in GENS  
Mag. 1821. B. 2. p. 149. In valle Tux l. citat

4) ALBERS l. c.

5) C. RUS



rigor musculorum colli<sup>6)</sup>, oris involuntaria ductio, rauceo<sup>7)</sup>, frontis rugatio, frequens et inconsueta nictitatio, risus et fletus involuntarius<sup>8)</sup>, claudigo, frequens in terram lapsus, sine mentis tamen obfuscatione. Quaedam ex his, si accidunt in pueris, eoque malae consuetudini, imitationi pravae, aut ineptiae juvenili a parentibus et institutoribus adscribi solent, quousque morbosa inconsueti sese gerendi modi origo non palam fiat, ac objurgationum et maxime punitionum immerito inflictarum tarde nimis poeniteat<sup>9)</sup>. De symptomatibus constitutivis speciatim.

3. Quibus *caput* acrius affectum est, agitatur <sup>Relate ad caput.</sup> convulsione tegumentum capillatum cranii, attoluntur supercilia, rugatur frons et explicatur vicissim<sup>12)</sup>, moventur nonnunquam et aures; supercilia saepe, sicut indignantium est, contrahuntur et

6) Apud R. DE HAUTESIERRE (*recueil d'observat. de méd.* T. 2. p. 452) habetur exemplum choreae in puella undecim annorum, quae cum dolore sterni acuto et nisu in lacrymas incepit; inquietudo et jactatio accessere cum summa voracitate.

7) In puella Vilnensi tredecim annorum (1815).

8) In puella Vilnensi.

9) MAX. JAC. DU MAN in *Abh. f. pr. Aerzte.* 1. B. 3. St. p. 23.

10) *Summl. auserles. Abh. f. pr. Aerzte.* B. 1. St. 3. p. 184. CHEVALIER in *Méd. Vcr.-Ztg.* 1836. N. 35. STAVENHAGEN l. citando.

11) *Abh. f. pr. Aerzte.* 16. B. 1. St. p. 120. Acta mea inst. clin. Viln. T. III. p. 62.

12) R. FROEYER l. c. p. 58.

et deprimuntur, palpebrae plerumque nictitantes<sup>13)</sup> mire quoque agitantur; ipsi afficiuntur oculi, subinde in orbem rotantur<sup>14)</sup> vel oscillant<sup>15)</sup>. Os nonnunquam ringitur, nunc ad aures fere diducitur; nunc quasi ad gustandum osculandumve componitur<sup>16)</sup>; facies<sup>17)</sup> mox risum, mox fletum exhibet<sup>18)</sup>. Labia nonnunquam saliunt, buccaeque universa tremit; sursum deorsumque convulsa, infinitas in facie et innumerabiles distorsiones excitant<sup>19)</sup>. Caput miris modis movetur, rotatur<sup>20)</sup>, jacta-

13) Observatur nictitatio tam in pueris quam in adultis, praecipue tunc, quando hominem intuari coguntur, cujus adspectum prae nimia reverentia reformidant (BERTI l. c. p. 30). Inter ea nictitationem per se pro speciei choreae declarare vix liceat. Cfr. STIEBEL l. c.

14) STIEBEL l. c. (in pluribus observavit).

15) Die 21. Februarii 1815 puerum septennem vidi, qui accedente choreae paroxysmo praeterquam quod capite nictitabat, et digitis quid concervare videbatur, oculorum oscillationem exhibebat. V. casum apud SCHLEIBL l. c. („die Augäpfel bewegten sich ziemlich schnell, wie Pendikel, von einer Seite zur andern“).

16) Sic in puella undecim annorum in Clinico Vindob. Ann. 1815.

17) De chorea faciei v. S. VOGEL med.-diagnost. Untersuch. B. I. p. 50. HILDEBRAND ann. schol. clin. Ticin. P. II. p. 138.

18) Casum talem FELIX PLATER annotavit l. c.

19) F. PLATER l. c. RENNOLD in Med. Ver.-Ztg. 1836. N. 35.

20) Chorea circumrotatoria BERNTH. Misc. n. cur. in Dac. III. obs. 8. p. 131 exemplum monachi 30 annorum continet, quae sub choreae insultu talem totius capitis retractionem circumrotatoriam experiebatur, ut retracto ad tergum vultu adspicientibus horrori esset. Pater meus

jactatur in omnem partem<sup>21)</sup>, aliquando retrahitur versus scapulas, aut celerrime atque vehementissime concutitur instar mallei<sup>22)</sup>, machinae hydraulicae vi rotati<sup>23)</sup>, aut totum adeo retorquetur, ut occipite tergo quasi adpresso<sup>24)</sup>, vultu horribilem praebeat adspectum.

4. *Cervix* etiam varie movetur, modo enim Relate ad cervicem. columnae instar riget<sup>25)</sup>, modo adversus pectus curvatur, uti anserum et cygnorum colla flecti solent, nunc retro jactatur<sup>26)</sup>, nunc ad latus utrumque<sup>27)</sup>.

## 5. In

choreae exemplum vidit, ubi rotatio capitis tanta cum celeritate contingebat, ut illud totum circulum revera absolvere videretur. SCHLEGELI (l. c.) aegra „schüttelte  $\frac{1}{2}$  Stunde lang den Kopf.“

21) R. FRORIEP l. c. (ad latus utrumque).

22) Sic in primo casu apud FRITSCH l. c. apud ROSSER l. citando.

23) Quem capitis involuntarium motum euctores vocant *maltelationem*. Cfr. TULPIUS obs. med. C. XVI. p. 37. Misc. cur. natur. Dec. III. an. 3. obs. 87. et WICHMANN *Ideen z. Diagnostik*. I. B. p. 233.

24) Misc. n. e. dec. III. an. 3. obs. 87. p. 131.

25) BRUNN l. c. SCHLEGEL l. c.

26) Miles equestri Polonus, exercitus Napoleontis, unum et triginta annos natus, cum vera enoi 1815 sub urbe Chateau-Thierry, in aëria contra Russos dimicans, globo tormenti ad summas dorsi vertebrae percussus et ex equo dejectus esset, in morbum, quo die 2. Aprilis 1814 in Clinicum Viloense susceptus est, incidit. *Convulsiva servicia motitatio* primum oculis hic objicitur. Nempe nucae muscoli occiput per frequentissima intervalla summo impetu in tergum trahunt, et quasi dorso adfigunt, totum vero caput paullo ad dextram torquent, unde collum enterius in arcum porrigitur, preminet essurgitque larynx,

Relate ad  
extremi-  
tates.

5. In humeris, brachiis, ulnis, digitis et ipsis  
eorum phalangibus fiunt motus fidem excedentes,

ac

cutis submentalis tenditur, os quandoque reseratum hiat, ac spatium cartilagini thyrenoidae et cricoideae interjectum mirum in modum explicatur. Eodem illo, quo cervix conquassatur tempore, brachium dextrum, penitus extensum et supinum, tanta vi a trunco repellitur, ut hominem saepius fulcrum lecti aut mensae corripere cogat, mox vero iterum arcte thoraci adprimitur. Sinistra interim extremitas, pariter extensa, sed penna, ita ut dextram projicitur, ut illam per medium faciet, ipsumque cubiti articulum comprehendat. Praeter has apertissimas, totaque membra commoventes jactationes, singulas etiam utriusque brachii carnes leviter micant et succutuntur. Invalens convulsionum vis inter deambulandum, ubi aeger manu dextra, quamquam ipsa tremente, occiput sustinere cogitur; quod si faceret, caput tanto impetu post tergum premeretur, ut centro gravitatis ultra spatium pedibus interceptum cadente, supinus corrueret. Potius aut nutrimentum oblatum non sine magno labore ori ingerere potest. Non solum enim cubitorum flexio huic operi necessaria, multiplici extensionum serie implicatur, verum etiam os ipsum, capita erga dorsum propulso, poculum aut coablaare effugere videtur. Spiritus breves at cum insigni difficultate trahit fateturque, se aërem pleno ore ac necessaria copia haurire non posse. Columna vertebralis undique lustrata, superiores dorsi vertebrae, paulo introrsum pulsas monstrabat. Arteriarum motus naturales. Agitationes musculorum e spinæ ictu male adfectae regione vim accipientium, ad earum, quas in chorea omnes carnes medullae spinali servientes exercent, similitudinem tantopere accedebant, ut illas *choream partialem* haberemus, medendi viam, huic eidem opportunam cognitam, persecuturi. Itaque cucurbitulis multis sanguinem ex incisa columnae vertebralis cute sugentibus, cura institue-

ac artem gesticulatoris exercitissimi eludentes<sup>20)</sup>; sunt qui cymbali pulsationem imitentur<sup>21)</sup>, aut manu fortiter super objecta vicina, ad sonum elicendum pulsant<sup>22)</sup>. Manus continuo jactantur, vel inanibus ictibus auram verberant, vel movetur, ac si affectus flumen transnataret<sup>23)</sup>, aut se ad volandum accingeret<sup>24)</sup>. In quibusdam manus, aut

latur, quo mox spirandi difficultas sese remisit, capitis-qua multum repressa est agitatio. Tum duo fonticuli juxta summam dorsalem vertebrae aperti fuere. Debatur infusum chenopodii ambrosioidis continuo magis saturatum, arnica; digitalis et calomel aliquando interponabantur. Quo post duorum mensium moram factum est, ut et cervicis jactatio consederit et recte, quamvis occipitis manu non sustentato, aeger graderetur et libere spirare posset, ut cibum potumque multo facilius capesseret.

27) „Kopf u. Hals waren in unaufhörlicher Bewegung, die bald rotirend, bald vor- u. rückwärts, bald in seitlicher Richtung statt fand“ PLATH l. c.

28) SCHLEGEL l. c.

29) Sic in puella, de qua supra.

30) KINDER- WOOD l. c.

31) Samml. auserl. Abb. 7. B. 2. St. p. 279.

32) Manse Martio 1819 virgo sedecim annorum plethorice, fratris melancholici soror, menstrua semel tantum ante nonnullos menses perpassa, praeviis solitudinis amore, tristitia et occipitis nec non nuchae dolore, in concussionibus et motibus abnormibus scapularum et brachiorum incidit, motibus iis, quos solent anseres, quae sese ad volandum accingunt, similes. Malum per accessus redibat adeo fortiter, ut aegra, animi compos, aequilibrium incedendo amitteret, quamvis reliquae corporis partes superio voluntatis plana obedirent. Nulla causa inveniri potuerat, praeter lapsum in terram, sub quo occiput contusionem expertum erat. Susceptae in Clinicum venaesectio e pede

aut sola dextra, vel sinistra<sup>31)</sup>, motus exercent tudentis vel ferientis, vel motus diversissimos rotatorios<sup>32)</sup> incertos<sup>33)</sup>. Saepe quidem manus voluntati parent, sed inepte, comprehensurae enim aliquid v. g. poculum, hoc aut subvertunt<sup>34)</sup>, aut non ori sed aliis faciei partibus admovent<sup>35)</sup>, ita ut cibus et potus administrari debeat<sup>36)</sup>. Alias manus invitis aegris capillare detrahunt, crines dispergunt<sup>37)</sup>, stragula convoluta rejiciunt, corpusque denudant<sup>38)</sup>. Manus jussu medici quandoque mira celeritate porrigitur, sed quo primum amplexu ejus liberatur, protinus saltu quodam retrahitur. Alii irritis omnibus conaminibus brachium porrigere nequeunt. Nonnullis pulsus vix explorari potest. Etiam pedes continuo sunt in motu; decumbentibus modo dextrorsum, modo sin-

morbum valde imminuit et applicitae dela hirudines ad caput eum illico fugarunt.

33) *Latus corporis sinistrum symptomata choreae majeri in gradu quam dextrum exhibuisse, in plurimis aegris observavi. Cfr. infra, Nota 61.*

34) Anno 1813. Vilnae puerum judaeum sex annorum vidi, cujus brachium dextrum continuo in gyrum movebatur, ac si aeger sese ad fundam projiciendam praeparet. Simile exemplum et pater meus observavit (v. ejusd. Epitome. lib. VII, P. II. p. 304). In valla Tux l. citand. p. 96.

35) *Samml. auserl. Abh. T. B. 2. St. p. 279. FRITSCH l. c.*

36) SYDENHAM l. c. p. 605.

37) Vidi pluries.

38) *Misc. nat. cur. Dec. II. ann. 9. obs. 142. p. 244.*

39) SCHLEGEL l. c.

40) Quod in duabus puellis Vilnensibus observavi. Sic GRAEVA (l. c.) in aegrotâ sua.

sinistrorsum jactantur<sup>41)</sup>, modo quasi calcitrant, aut uterque alternatim ad nates, quin immo ad occiput<sup>42)</sup> usque, invito aegro, flectitur<sup>43)</sup>. Progreddientes quandoque, aut saltantium more rhythmum servando<sup>44)</sup>, incedunt, semper lineam curvam describentes<sup>45)</sup>, aut revera saltant ad summam usque corporis defatigationem, vel ad profundissimum somnum<sup>46)</sup>. Ejusmodi autem saltationes modo in distantiam fiunt, modo in altum, quin immo super aliorum hominum capita<sup>47)</sup>. Nonnulli via plana unum alterumve pedem attollunt, ac si scalam ascendere, aut lapidem impediens transcendere vellent; alii firmo talo insistere haud possunt, sed stantes hinc inde corpus reclinare solent; quidam etiam claudi plerumque pede sinistro incedunt<sup>48)</sup>, dantur etiam, quibus usus pedum,

41) GRAVENS l. c.

42) Sic vidi. 43) Misc. cur. nat. Dec. I, an. 6. 7. p. 284.

44) KINDER - WOOD l. c.

45) „Die meisten konnten die Hände nicht anders, als in einer krummen Linie zum Munde führen, nur auf einem Umwege im Halbzirkel an eine bestimmte Stelle gehen u. s. w.“ In valle TEX l. citando. p. 96.

46) Misc. nat. cur. Dec. III, an. 1. obs. 126. p. 188.

47) DORNMÜLLER l. c. (Aegra puella novam annorum, vigente paroxysmo felis fugati velocitate super patris caput saltabat, sese reclinabat, ac paulo post ante pedes parentis humilis jacebat, propriam sortem deplorans). Simile quid KEANER (l. citando) de suis aegrotis narrat. Sic et TRANNOY (l. citando).

48) HAEN rat. med. P. I. p. 147. DARYSIO Handb. d. Pathol. d. so genannt. chron. Krankh. Lpz. 1796. p. 338. Sic puer septennis, quem mense Februario in Clinico curavi.

dum, propter continuum motum convulsivum<sup>49</sup>), vel propter trepidationem<sup>50</sup>), denegatus est. Alii e contrario stare<sup>51</sup>), currere<sup>52</sup>), in verticem muri aut arboris eniti<sup>53</sup>), aut retrogredi<sup>54</sup>) coguntur.

## 6. Di-

49) *Aegrotu* de qua CHEVALIER (l. c.), ex eo decumbere coacta erat, GROSSHEIM in *Med. Ver.-Ztg.* 1836. N. 35, OLLENROTH l. citand.

50) Puella anno 1815, in clinico decumbens tanta pedum trepidatione incesserat, ut, quominus prolaberetur, ab adstantibus sustineri deberet. Casum similem describit FRITSCH l. c.

51) *Chorea stataria* BERNTH. THIRMATERUS narrat de quodam Religioso, qui durante paroxysmo pedibus adeo firmiter insisteret, ut, licet saepius ab adstantibus vel in sellam aliquam vel in lectum traderetur, illico tamen in pedes sese erigeret, stansque convulsionis momenta absolveret (Concil. L. II. C. 12). Contra ea vero sunt, qui stando et situm horizontalem conservando bene se habeant; sedendo autem extemplo convulsionibus corripiantur (DEKLARICH *üb. eine besondere Abänderung des F. T.*, in *Physik. med. Journ.* 1800. Jun. p. 58).

52) *Chorea procursiva vel festinans* BERNTH. Exempla habentur apud TULPIUM, in homine, qui dies et noctes curraitabat (Obs. med. L. I. C. XVI, p. 36), apud HESERDHN (comment. de morb. hist. et curat. p. 82), apud GAU-RIUM (pathol. instit. p. 751), apud SACAR, in viro, qui invitatus currebat, nec capax erat directionem mutandi ad declinanda obstacula (Syst. morb. Ed. alt. Viennae 1783. P. II. Scelotyrbe), apud BERNTH. in famulo, qui cum prandentibus operam daret, per aliquot horas momenta invitatus circa triclinium oberraverat (l. c. p. 25), et apud ONOFREI (ann. univ. 1832. Gennaio. p. 151): „intorno la tendenza irresistibile al corsa onde era periodicamente inferma una contadina.“ Viennae 1798 puellam undecim annorum vidi, jam a quatuor annis chorea laborentem, quae satna et ridendo, cubiculum per gyros tenta cele-



6. Diversissimis etiam motibus *truncus* agi-  
tari solet. Prostrati nonnunquam humum, spas-  
morum et convulsionum vi, instar serpentis in-  
curvantur, identidem in altum feruntur, post iterum  
prosternuntur, haud secus ac si carpionem vel  
luciam in pavimento, ut solet, subsultantem con-  
spiceres<sup>55</sup>), nunc opisthotonon<sup>56</sup>), nunc empro-  
sthotonon, nunc alias figuras referunt, nunc corpus  
super propriam axin circumgyratur<sup>57</sup>), trunco ad  
pedes defluente, vel capiti insistente<sup>58</sup>). Sunt  
qui speciem saltus sic dicti mortalis<sup>59</sup>) perficiant.

Relate ad  
truncum.

Quan-

ritate percurrerat, ut adstantes vertiginosi fierent. Aegra  
haec obstacula evitabat.

53) Etsi affectus nervosus a J. A. WAGNER (in HUCKER *lit.*  
*Annal. d. gesamt. Heilk. B.* 15. p. 411) nomine „die  
*Klettersucht*“ insignitus, non omnes morbi nostri chara-  
cteres exhibeat, illum tamen potius ad choream quam ad  
alias nervorum aegritudines revocandum esse, censeo.

54) MAGENDIE (*journ. de phys. expér. et de pathol.* 1822.  
T. 2. N. 2) memorabilem casum describit aegroti, qui,  
quia paralyticus sit, membris suis tamen, ut decet, im-  
perare nequit. Cogitur ipse ad motus extraordinarios et  
ingratos, inter quos retrogradus ille.

55) Misc. nat. cur. Dec. II. sn. 2. obs. 149. p. 326. SCHLEGEL l. c.

56) Nova act. n. cur. T. IV. obs. 28. p. 120. BRUNN l. c.

57) WATT l. c. (Sexagesies in sexagesima horae parte).  
SCHENK obs. med. rar. lib. I. obs. 2. p. 103. OLLEROTH  
l. citand.

58) WATT l. c. (Eadem aegra, de qua supra). KERNER  
l. citand. (de pluribus aegrotis refert).

59) GRUB. Parzelbaum, GALL. Culbute, v. ALBERS l. c.  
MERO l. c. SCHNECK l. c.

Quandoque chorea unum tantum corporis latus detinet<sup>60)</sup>, aut saltem magis opposito affligit<sup>61)</sup>.

Relata ad  
partes in-  
ternas.

7. *Lingua* nonnunquam afficitur ita, ut tremat, ore exseratur<sup>62)</sup>, vacillet<sup>63)</sup>, balbutiat<sup>64)</sup>, et vix effingere queat vocabula rerum<sup>65)</sup>. Aliàs illius volubilitas, quâ præcurrit mentem<sup>66)</sup>. Sunt etiam ventriloquæ<sup>67)</sup>. *Fauces* bibentibus aut cibum

60) *Chorea semilateralis* BEENTIL. Exempla describuntur a WAGNERO alternatim lateris sinistri at dextri (Misc. N. eur. Dec. II. an. 9. p. 55), a STALPERTO VAN DER WIEL (obs. cent. prior. Leid. 1724. p. 75) et a PELARGO med. Jahrgänge. 3. B. MONTAULT (HERRND Journ. 1830. II. 1. p. 89) de foemina, uno tantum latere chorea correpta, refert. EBERS (l. citando) aegrote dextro latere affecta fuit. Puella apud GRAVES (l. c.) ab initio choreæ uno tantum latere cruciabatur.

61) Semel pater meus vidit choream plus in latera sinistro aevientem. DRYSG (l. c. p. 338) et R. A. VOERL (acad. Vorles. übersetzt v. POHL p. 484) choream samilateralem præcipue in latere sinistro occurrere, contendunt. CONSTANT l. c. cas. II.

62) Vidi in Clinico Vilmensi. FAITSCH l. c. CHEVALIER l. c. OLLENROTH l. citand.

63) OLLENROTH l. citand. („in steter Oscillation oder Rotation“).

64) BRUTTENMÜLLER l. c. CHEVALIER l. c.

65) Aegrote, de quo CAMERER (l. c.), muta at elinguis fiebat; usus loquendi tarda rediit. GROSSHIM l. c. STIEREL l. c. GRAVES l. c. (aegre 3 hebdomadae muta erat).

66) GAUNIUS l. c.

67) Exstant duo exempla. MARC (l. c.) scribit de aegrote sua: „Nunc vero novo quodam angabatur phaenomeno difficillime explicando! strepitu scilicet in articulationibus, illi simili, quem mures rodendo in parietibus excitare

bum deglutientibus quasi laqueo injecto constringuntur, cum imminente suffocationis periculo<sup>68</sup>). Quidam sub choreae furore potum deglutire non valent, sed suborta tussi per os et nares rejiciunt. *Respiratio* saepe difficilis, anhelans<sup>69</sup>). *Lotium* et *faeces* in quibusdam sub choreae impetu emittuntur; accedit immo nonnunquam dysuria, ita quidem, ut nil excernant durante paroxysmo; quo tamen absoluto, urinam emittunt<sup>70</sup>). *Mens* quo-

solent, vel qui auditur, dum unguibus assares transverse radimus. Illic strapitus in quamcunque suppellectilem, ab aegrotata tactam, transire videbatur, ac si ex illa proveniret, non ea hujus corpore, et suppellectilis ingenio respondabat et iadole et vi; ita ut, e. c., sacre sella imposita, strapitus in sellae ligno quasi perciperetur.<sup>64</sup> Symptomata plane similia ПЛАХИ (l. c.) in sua aegrotata observabat. Utrique autor, nec non HUCKER eadem ventriloquentiae ascribunt.

68) THOMANNUS obs. L. II. p. 79. GREG. HORAT l. c. sect. 7. p. 119. Aegrotula nostra ann. 1815 porrecti cibi cochleare antequam sumpisset, quasi dubitare videbatur, num illum deglutire posset. Laryngis constrictio, suffocationem minitans, in quatuor aegrotulis observabatur a FR. DONPR Notiz. üb. d. K. Erziehungsh. z. St. Petersburg, in Med. pr. Abh. v. deutsch. in Russland lebend. Aerzt. Hamb. 1835. B. 1. p. 306. OLLENROTH l. citend. (difficilis deglutitio).

69) SCHNEER in HEPPLAND Journ. B. 3. St. 4. p. 613. ПЛАХИ, COPELAND, STINDEL II. cc.

70) BEERT l. c. p. 12. Mirabilem historiam choreae in puella 12 annorum refert F. H. BRÜCKMANN (diss. exhib. de morb. nervor. observation. quasd. singular. e. episcrisi. Gott. 1780. p. 2. 6). Malum oriebatur stranguria cum atroci dolore, signis calculi aliquando post editis, Jute-sium at vermes excreti. Tandem morbus aliis incipit:

quoque morbo affectorum non uno modo se habet; in plurimis nec sensuum, nec rationis usus deletur; alii imbecilles<sup>71)</sup> sunt, fere omnes ad iram proni. Quocunque in casu neque precibus, neque minis, neque increpatione coerceri possunt, saltem sine gravi damno et inquietudine<sup>72)</sup>. Affecti, vigente paroxysmo, raro de dolore conqueruntur, nisi forte de anxietate, pressione pectoris, dolore capitis. Somnus saepe placidus, quandoque concussionibus, ploratu<sup>73)</sup>, somniis terrificis<sup>74)</sup> perturbatus. In multis viget ciborum

appe-

nam subito auditu, loquela et facultate cibos ac potus deglutendi privata est, et spasmus organa ad has functiones necessaria impedire coepit; pulsus fortis, facies rubra et tumida; tandem totum corpus spasmis occupatum veram choream Villi ideam prae se ferebat etc. In causa erant terror a cane et vermes.

71) ENGELHARD l. citando, de aegrotā sua scribit: „*sie hatte während der, 3 Monate dauernden, Krankheit Sprechen, Lesen, Schreiben u. alle weiblichen Arbeiten so durchaus verlernt u. vergessen, dass sie im eigentlichen Sinne alles wieder vom Anfange erlernen musste, was geraume Zeit erforderte.*“ JAEGER (l. c.) aegrotā paroxysmi praeteriti plane iascia, et alia, de qua CAMERER (l. c.), morbo finito omnium, quae quatuor hebdomadas evenerant, immemor fuit: totum tempus praeterlapsum ei somnus erat. Cfr. SCHLER l. c. p. 49. „*Im leichtern Grade der Krankheit war während der Verschlimmerungen oder Anfälle das Bewusstsein unverletzt, im heftigen aber zeitweise so getrübt, dass die Kranken sich des Geschehenen nur wie im Traume erinnerten.*“ In valle Tux l. c. p. 96.

72) ECKHOLDT in Epist. ad HORSTIUM l. c. WILLIS de morb. convulsiv. et scorbuto. cap. 7. p. 41.

73) Aegra Clinici an. 1815.

74) HORST l. c. p. 112.

appetitus<sup>74)</sup>; ac nonnulli quaevis obvia, e. c. ligna, pilos, vitrorum fragmenta etc. devorant<sup>75)</sup>, dentibus lacerant<sup>76)</sup>, mordent. Omnes autem, etiamsi valde esurierint, comestibiliaque ingesserint, male digerunt, sensimque flaccescunt, pallent et emaciuntur.

8. Morbus nunc paroxysmis et liberis intervallis iisque vel aequabili<sup>77)</sup>, vel inconstanti ratione obvenientibus<sup>78)</sup>, componitur; nunc, excepto somno<sup>79)</sup>, continuo, speciatim dum aegrotos allo-

74) *Samml. auserl. Abh.* 1. B. 3. St. p. 484. ECKHOLDT l. c. p. 360. J. KEIL l. citando p. 233.

75) Hinc varia ab aegrotis clam ingesta, per stvum postea aut vomitum excreta, diabolo et sagarum artibus adscripta sunt. BERNI l. c. p. 15.

76) *Misc. N. cur.* Dec. l. an. 9. obs. 61. p. 163.

77) Puellae 23 annos aetate paroxysmi, duas horas durantes, quotidie hora matutina 9. et pomeridiana 5. accesserunt. CERIOLO l. c.

78) J. MERTIUS refert historiam pueri undecim annorum, cujus paroxysmus ad primum horologii pulsum quater inter diu periodice, noctu erratico aliquoties redibat. (*Misc. N. cur.* Dec. III. an. 4. obs. 41. p. 108). Cfr. WENDT l. c.

80) Qui interdum dissipatur; e. c. CHEVALIER refert de aegrotis suis: „die Anfälle hielten ununterbrochen Tag u. Nacht an, so dass aller Schlaf wich“ (l. c.). LÖWENHARD curavit puerum 8 annorum, qui et in somno convalescebat (*Med. Ver. - Ztg.* 1836. N. 35). Sic aeger ab OLLENROTH (l. c.) observatus. R. FROBERG l. c. (de aegrotis refert: „das Zucken hörte kaum in der Nacht auf kurze Zeit auf; selbst während des Schlafes bewegte sich der Kranke fast fortwährend u. nach kurzem unruhigen Schlummer wurde er durch, aufs neue ausbrechende, heftigere Krampfzufälle bald wieder geweckt“).

*Frauk Prax.* II. 1. 2. v.

alloquuntur, viget \*<sup>1</sup>). Paroxysmus vel singulis diebus semel, bis aut saepius, vel longiori intervallo, e. c. omni mense \*<sup>2</sup>), recurrit, et nunc intra dimidiam horam, nunc longius \*<sup>3</sup>) et brevius finitur. Nonnulli finito paroxysmo, si lassitudinem quandam corporis excipias, bene valent, et obeundis muneribus consuetis apti sunt; alii vero, morbo remittente, de maxima artuum lassitudine conqueri solent et veluti paresi extremitatum inferiorum laborant \*<sup>4</sup>) et sub minimo motu sudore cooperiuntur \*<sup>5</sup>).

## 9. Ca-

81) Plures choreas *continuae* quam *periodicae* mihi obvennerunt, quare miror egregium BRANT dixisse (l. c. p. 119), choream continuam stricta non observari. Exemplum illius et PLATER narrat. ENGLHARD refert in concione medicorum Friburgensium (*Verhandl. d. vereing. ärztl. Gesellschaft, d. Schweiz., Zür.* 1830. p. 280) de puella 15 annorum, chorea St. Viti afflita: „*die charakteristischen Bewegungen der Extremitäten steigerten sich bald dergestalt, dass Patientin drei Wochen lang Tag u. Nacht die heftigsten convulsivischen Bewegungen erlitt, ohne auch nur einen Augenblick Ruhe zu haben: sie zerkratzte sich Gesicht, Brust u. Kleidung.*“ JAM SOHLER (l. c. p. 50), testantibus STARKIO et VOGELIO, edixerat: „*die Krankheit macht entweder gar keine Intermissionen*“ etc.

82) CASIMIR MEDICUS v. d. *period. Krankheiten*, p. 35.

83) JARVIS (l. c.) paroxysmos vehementissimos et diversissimos 1—6 horas saevire vidit. SCHERER (l. c. p. 614) de duratione trium hebdomadarum testatur. Casus ejusdem mirabilis est; si vero autor contendit, fortiori musculorum contractione paroxysmos breviores, alias longiores esse, observationibus adhuc institutis non probatur.

84) ALBERS l. c. COPPLAND l. c. p. 150.

85) In valle TEX l. citando, p. 96.

9. Cadavera ex chorea demortuorum exhi-<sup>Necroscopis.</sup>  
buerunt pseudomembranas circa cerebrum a prae-  
via inflammatione superstites<sup>86)</sup>, ossificationes in  
dura<sup>87)</sup> et pia matre<sup>88)</sup>, arachnoideam in basi  
cranii exsudato lacteo luteolo detectam<sup>89)</sup>, arte-  
riam basilarem ossificatam<sup>90)</sup>, vasa superficialia  
et substantiae cerebri cruore turgida<sup>91)</sup>; totum  
cerebrum hypertrophicum<sup>92)</sup>, mollius<sup>93)</sup>, aridum,  
plus quam par est densum durumque<sup>94)</sup>, substan-  
tiam, quam dicunt griseam, coloris fuscis<sup>95)</sup>, la-  
bes corporum quadrigeminorum<sup>96)</sup>; foramen ma-

Y 2 gnum,

86) SOEMMERING in nol. 513, vers. op. HAILLE.

87) R. FRORIEP I. c. p. 60 („an beiden Seiten des Sinus longitudinalis mehrere platte Ossificationen von der Größe einer Linse bis zu der eines Silbergroschens“).

88) FORRERS I. c.

89) R. FRORIEP I. c.

90) Ibidem.

91) Ibidem p. 59 et 60.

92) CROVEILLIER in KALISCH med. Ztg. des Ausl. 1833, N. 16 (durchaus in aegrotis).

93) JAMES KNIR Fülle, welche d. Pathol. der ... Chorea erläutern; ex Edinb. Journ. 1825, N. 122. in SCHMIDT Jahrb. 1836. Spptb. I. p. 234 („die Gehirnschubstanz weicher als gewöhnlich“).

94) HENZOG (Feistanz, in RYB Mag. H. 54. H. 1): „das Gehirn in seiner ganzen Substanz trocken, ungewöhnlich fest u. hart.“

95) MONOD (BARRAUD Journ. 1830. II. 1. p. 66): „die graue Substanz im ganzen Gehirn auffallend dunkel.“

96) Logo in Revue méd. T. 3. p. 518, Dr. SERRAS dixime: „avant examiné l'encéphale de quatre personnes qui avaient surcumbées à la danse de St. Gui, j'ai trouvé les tubercules quadrijumeaux altérés. Dans l'un une tumeur lardacée implantée sur ces tubercules; dans le second, une irritation vive avec épanchement sanguin occupait la base de ces

gnum, ob processum odontoidem epistrophei tumidum (ex quo medullam oblongatam impressam ejusque membranas opacas partimque crassatas), fabae forme<sup>97)</sup>, et eundem processum vertebrae cervicalis secundae duas, tresve lineas prolongatum<sup>98)</sup>; medullae spinalis involucria<sup>99)</sup> et immo nervi phrenici ac nervorum plexus cardiaci<sup>100)</sup> phlogosi correpta, medullam ipsam hypertrophicam<sup>101)</sup>, emollitam<sup>102)</sup> rubram<sup>103)</sup>, membranas inter atque chordam spinalem cruorem<sup>104)</sup> et serum<sup>105)</sup> extravasatum, serum et in peri-

*renflemens; dans les deux autres la masse entière des tubercules était enflammée. L'inflammation se prolongeait plus ou moins loin sur le plancher du quatrième ventricule.*<sup>97</sup>

97) R. FRORIER l. c. p. 59.

98) Ibidem p. 60.

99) THOMSON (l. c. p. 316) „Entzündung der Rückenmarkshüllen.“ BRUNN (l. c.): „alle Rückenmarkshäute stark entzündet.“ KEIR (l. c.): „an der äußeren Fläche der Rückenmarkshäute eine ungewöhnliche Röthe.“ Vestigia phlogosis praegressae reperiebat J. COPELAND l. c. p. 150. 151.

100) THOMSON l. c.

101) CRUVEILHIER l. c.

102) THOMSON (l. c.): „Erweichung des Rückenmarks.“ BRUNN (l. c.): „der in dem letzten Rückenwirbel liegende Theil des Rückenmarks erweicht.“ KEIR (l. c.): „dessen (medullae spinalis) Substanz war in eine breiartige Masse erweicht.“

103) BRUNN, KEIR II. cc.

104) BRUNN (l. c.): „hin u. wieder mit kleinen Blutextravasaten bedeckt.“ KEIR (l. c.): „der ganze Rückenmarkstrang schien gleichsam in weiches Blutcoagulum eingebettet.“

105) COPELAND l. c. BRUNN (l. c.): „in der Gegend der Cauda equina blutiges Serum ausgeschwitzt.“ KEIR (l. c.): „Nach dem Ausschneiden der Hülle drang viel Fluss hervor.“



pericardio<sup>106</sup>), cor naturali minus<sup>107</sup>) majusve<sup>108</sup>);  
vermes in tractu intestinorum<sup>109</sup>) et interdum ni-  
hil quod ad morbum pertinere videtur<sup>110</sup>).

## §. XLVIII.

## C a u s s a e.

1. *Disponunt ad choream*: vitium hæredita-  
rium<sup>1</sup>), sexus femineus<sup>2</sup>), vitæ periodus den-  
titio-  
C. præ-  
disposi-  
tes.

106) FORGERS l. c. COPELAND l. c. p. 151 (sex uncias).

107) KEIR l. c. (in puero tredecim annos nato).

108) COPELAND l. c. p. 151.

109) HERZOG (l. c.): „im Dünndarme mehrere Knäule von  
Spulwürmern.“ KEIR (l. c.): „7 *Ascarides lumbricoides*  
wurden im Ileum gefunden.“

110) Sic in necroscopia a HAWKINS (*The Lond. med. and  
phys. journ.* 1827. March). Cfr. *BIRMINGH JOURN.* 1830.  
II, 2 p. 224. OLLIVIER (l. c. T. 2. p. 817): „j'ai eu l'oc-  
casion d'ouvrir sous les yeux le rachis d'un enfant qui  
était également affecté de chorée, chez lequel la moelle  
épinière n'offrit aucune altération sensible . . . c'est ce qu'on  
observe le plus souvent.“

1) DUBOIS in *Samml. auserl. Abh.* 15. B. 3. St. p. 462  
(In duabus sororibus, nam utraq; dum primum instaret  
menstrua fluxus, sensim corripiebatur chorea, quarum  
mater, eodem pubertatis tempore ante primam menstru-  
rum eruptionem, vehementibus nervorum affectionibus  
fuerat obnoxia. Nullum simile exemplum præcis matris sup-  
peditat). DORNÜLLER l. c. (Duæ sorores, quarum pater  
simil quodam morbo datantus erat). RICHTER *apex. The-  
rap.* B. 7. p. 584 (Puella, cujus mater 13.—15. aëta-  
tis suæ choream perpessa erat, iidem annis eodem modo  
correpta est). STIBBEL de pluribus familiis, quibus cho-  
rea familiaris, narrat (l. c.).

2) REAVY l. c. (Inter 84 ægrotos chorea laborantes 57 fe-

titionem secundam inter et pubertatem<sup>3)</sup>, clima rigidum<sup>4)</sup>, corpus gracile, studia praematura<sup>5)</sup>, edu-

miune et 27 morus numerabantur in *Norwichhospital*).

THILENIUS *med. u. chir. Bemerk. Frankf. am M.* 1814. (Inter 21 aegrotos, solum mares 4). RUFZ l. c. p. 49 (inter 189 chorea affectos 51 pueri et 138 puellas fuerunt). Inter 14 proprios aegrotos, 9. sexus feminei numero. Saepissime solunimodo puellas correptae sunt, a. c. in valle Tux (l. c. p. 96 et 99) numero 27 et 30.

- 3) Quamvis (SYDENHAMO op. omnia, p. 743 et BOUTHILLI l. c. contradicentibus) exempla choreae non desiderantur ab anno aetatis 4. (J. P. FRANK) usque ad 22. (WINIKER, LEO *Beobacht. am Krankenbette*, in ejusd. *Mug. f. Heilk. u. Naturwissensch. Warschau* 1829. II. 1. p. 33), 45. (J. P. FRANK) 50. (POWELL v. FORBES l. c.) et 70. (MASON in *med. transact. publ. by the college of physic. in Lond.* 1815. Vol. 5); attamen consensu communi jure admittitur, hunc morbum maxime ab anno 9. ad 14. obvenire. THILENIUS (l. c.) puellas inter annum 4. et 16; pueri autem inter annum 10. et 12. versabantur. Inter meos aegrotos, juniores erant pueri, seniores puellas. Cfr. SCHAEFER in *Samml. auserl. Abh.* 2 B. p. 108. HUPKLAND *Journ.* 1832. Nr. 8 (pueri 5—6, puellae 7—12 annorum). KERNER l. citando (infantes 7—12 annorum). Illi 189 aegroti, de quibus supra, quoad aetatem ita se habebant: annos 1—4 numerabant 3 pueri et 2 puellae; ann. 4—6, pi. 2, pae. 3; a. 6—10, pi. 16, pae. 45; a. 10—15, pi. 30, pae. 88 (l. c.). Ergo occurrit chorea saepissime inter 6—15. aetatis annum at puellarum et puerorum. Contendunt itaque WILHELM (l. c.), MEISSNER (l. c.), CREUTTI (*7. Jahresber. des poliklin. Instit. zu Lpz.* 1831), STIEBEL l. c. alique, choream corporis evolutionis morbum esse, quod varo minime da omni ejusdem forma valet.

- 4) Choream longe crebrius in Lithuania observo, quam in Lombardia et in Austria. Spatio 14 annorum in Clinico

educatio effeminata<sup>6)</sup>, stirps judaica<sup>7)</sup>, idiosyncrasia<sup>8)</sup>, diathesis scrophulosa et rhachitica<sup>9)</sup>.

2. *Excitatur* chorea a suppressa transpiratione<sup>10)</sup> et sudore pedum<sup>11)</sup>, ab animi pathematibus, inprimis terrore<sup>12)</sup>, moerore<sup>13)</sup>, non

ex-

Vilnensi 9 huiusmodi aegri suscepti sunt; inter quos duo pueri. Choram sub aetate calidioribus rarissime aut minime obvenire, ex his elucet, quae RUYZ (l. c. p. 50) retulit.

5) OLLENBACH l. citat.

6) BERRY l. c. p. 52. Ex propriis tamen observationibus id non confirmatur, nam maxima pars aegrorum meorum ex inferioribus societatis ordinibus proficiscabatur.

7) Inter meos quidem aegros duo solum judaei chorea laborantes obvianiunt, at eorum plurimos pater meus curavit. Nec mirum, gentem generatim gasticulationibus aduetam, praecipue morbo gasticulario obnoxiam esse. Choram inter Judaeos frequentius occurrere, testatur STIEBEL l. c.

8) Miranda scilicet hominis temperies, qua praeditus a rebus externis, innocentibus, v. g. strepitu volarum (Misc. N. Cur. Dec. II. ann. 2. obs. 149), hominum Intuitu (ib. Dec. I.), inganter afficitur.

9) Maxima aegrorum meorum pars notas harum diathesium exhibebat. Idem pater meus de suis aegrotis affirmat. JÄGER l. c. cas. I.

10) FLOUQUET diss. Triga obs. med. Tüb. 1787. HASSE *Kur d. chron. Krankheit*, B. 2. §. 120. RAIMANN *Hdb. d. spec. Pathol. u. Therap.* Wien 1823. B. 2. p. 641. JÄGER, BRUTTENMÜLLER II. co. (puer 15 annorum tribus vicibus, capillis nimis tonsis, in choream incidit). BRUNN l. c. STRINHAL in HORN *Archiv.* 1834. St. 5. C. J. KUNK *Jahresber. üb. d. Charité-Kr.-Haus z. Berlin: Abtheil. f. kr. Kind.* in RUYZ *Mag.* B. 43. H. 2. Acta mea clin. l. c. et plurimae serins collect. observationes.

11) THILENIUS l. c.

12) Misc. N. Cur. Dec. I. ann. 8. p. 119. Dec. II. ann. 6.

excepto quandoque amore infelici<sup>14)</sup>, ab imaginatione<sup>15)</sup> et nisu imitandi<sup>16)</sup>, ab incaute fugatis praora<sup>17)</sup>, linea<sup>18)</sup>; aliisque impetiginibus<sup>19)</sup>, a reli-

- p. 64. 81. anno. 7. p. 14. STOLL rat. medendi P. III. p. 406. Puella cadaver matris osculari cogebatur: a terrore nata mox est chorea St. V. ROSENATHIUS sanabat, sed praedicabat recidivam sub menstrui apparitione: hoc accidit et letum tunc intulit. TODE *med. chir. Bibl. B. 1. St. 1. p. 118*. Una ex nostris aegrotis, puella tredacim annorum, fabri lignarii filia, Januario 1815 cum a temerario quodam larva, tempore bacchanalium, induta, exterrita fuisset, triduo inde exacto in choream incidit. Altera undecim annos egressa, eodem anno mense Aprili a gallo gallinaceo improvisè in caput insiliente, eundem acquisivit morbum. Puer septennis rusticus ann. 1819 in clinico decumbens, ab urso primum viso in choream coniectus est. Terrorem frequentissime choream excitare, et RUX (l. c.) expertus est. GUHRENT (*Kalisch med. Ztg. des Ausland. 1833. N. 76*) rite monet, id non terrore per se, sed corporis ad hunc morbum dispositione, ex qua infantes facile terreantur, fieri. CONSTANT l. citand. cas. 1. et 3. HOSPITAL l. citand. (duo casus). SCHOTT, WANDHOLMBEN et BRACH ll. citand. SCHENK l. c.
- 13) Misc. N. cur. Dec. III. an. 3. p. 131. An. 2. p. 241. Pansonis et Pythagorae exercitationes. p. 166.
- 14) BERT l. c. p. 55. 15) ALBERS l. c.
- 16) WERLHOFF v. WICHMANN l. c. HOFFENGÄRTNER *üb. menschl. Entwicklung*. p. 99. ALBERS l. c. Cfr. P. II. ed. alt. Vol. I. Sect. I. C. l. §. III. N. 6. KOTTMANN *Mittheilung des F. T. durch Sympathie*, in *Med. Fer.-Ztg.* 1833. N. 9.
- 17) THILENIUS l. c.
- 18) *Samml. auserl. Abhandl. 7. B. 2. St. p. 450 et 453.* WENDT 5te u. 6te Nachricht. SOHLER l. c. p. 119. JAGGER l. c. (tinea, fots frigido repente retro pulsa). CAMBERG l. c.
- 19) PELARGUS 3. Jahrg. p. 69.

reliquiis miliarium<sup>20)</sup>, inorbillorum<sup>21)</sup> et vario-  
larum<sup>22)</sup>, ab ulceribus intempestive occlusis<sup>23)</sup>,  
a vermibus intestinalibus<sup>24)</sup>, et viliis gastricis<sup>25)</sup>,  
a datura stramonio<sup>26)</sup> etc.<sup>27)</sup>, a vaporibus  
plumbi,

20) Misc. N. cur. Dec. II. an. 7. obs. 260. DUMAN I. c.

21) SIBREGUNDI *Bemerk. üb. d. Masernepidem. des J. 1821*  
u. 25. in HARLESS *N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chr.*  
1827. Spptb. 2. p. 1 sq. LE VIKER I. c.

22) SALLABA de morb. variol. posth. Viennae 1798.

23) Misc. N. cur. Dec. II. an. 6. obs. 201. GOUDINER in  
*Annal. de la soc. de méd. pr. de Montp.* 1806. Decr. (cho-  
rea ex canterio sauto).

24) STOLL I. c. BALDINGER *neues Magaz.* 9. II. p. 185.  
THILENIUS I. c. (Inter 21. choreae casus 15 dies vermes  
accuandi erant). ALBERS in HUFELAND *Journ.* B. 1.  
p. 152. HENNING *zweiter Ausz. u. Physikat-Bericht.* in  
*Dresd. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk.* 1827. B. 5. II. 1. p. 57.  
PH. CARRIST selectae e proximi quindena in nosocom. ac  
municipio Montis a. Sabini. Senis 1830. Dec. 8. Cfr. FRO-  
RIER *Notiz.* 1831. B. 29. N. 20 (taenia) et UENNING *Journ.*  
1831. II. 7. p. 14. SCHOTT *ein Fall u. Chor. St. F., haupt-  
sächtl. v. Madenwürm. hervorgerufen.* in *Würtemb. med.*  
*Corr.-Bl.* B. 7. N. 28. BRYSCH I. citand. Propriis in  
aegris vermes plerumque simul praesto erant, at in uno  
solum casu, iis fugatis, chorea siluit. Quid de *acarabasis*  
a puero novem annorum chorea laborante cum lavamina  
evacuatis, de quibus DORFMELLER I. c. p. 188. et de ranis  
viventibus a puella eodem affectu per annum dactis, de  
quibus J. H. G. SCHLICKEL (*PABST allg. Ztg.* 1837. N. 45)  
loquitur, cogitandum sit, non audeo determinare.

25) BRÜCKMANN I. c. Misc. N. cur. Dec. II. an. 8. p. 163.  
Dec. IV. an. 6. 7. obs. 110. MARTINUS I. c. THOMASUS  
I. c. (incusat praecipuis oxygalactos mumi!). STARCK I. c.  
HENNING I. c. (faeces induratae). D. CRAIGIN in SCHNITT  
*Jahrb.* 1835. B. 6. p. 114 (faeces induratae).

plumbi, mercurii<sup>28</sup>), a morsu et ictu animalium, e. c. muscae majoris<sup>29</sup>), araneae<sup>30</sup>), tarantulae<sup>31</sup>),

a

26) Commer. Lit. Norimb. an. 1744. p. 14.

27) Chinini hydrocyanici dosin granorum quinquaginta choream excitasse, fertur (JANSON *Beobacht. ein. V. T., welcher nach ein. übermäss. Gabe Chinin bei ein. Wechselfieb.-Kr. sich bildete*; ex *Annal. de méd. belge.* 1835. Août, in SCHMIDT *Jahrb.* 1838. B. 18. p. 202); est multum abfuit, quin symptomata choreae pathognomica evoluta assent.

28) BRENT l. c. p. 60 (!). SOHLER l. c. p. 127.

29) Misc. N. cur. Dec. I. an. 9. obs. 65.

30) COMSTOCK in *med. repository* 2. Hexade. Vol. I. N. 1. Cfr. P. II. ed. alter. Vol. I. Sect. 1. C. XII. §. LII. 1 (10).

31) NICOLAO PEROTTI in *Cornucopia sua*, Basil. 1536. fol. edita. p. 51. 52. BAGLIVIT diis. de anatome, morsu et effectib. Tarant. (1595). Op. omni. Lugd. 1710. p. 599. LUD. VALETTAE de Tarant. RICH. MRAO da tarant. Opp. T. 2. „Aestivis mensibus, ait, cum maximus est calor, ut in canicularibus diebus, tarantula inter segetem repens, mordet messores et iter facientes. Etsi dolor ex morsu non major primum sit, quam forte est ex ictu apis; mox tamen locus deturbatur, livido nigro aut fusco circulo et cum inflammatione tumet. Inter paucas horas sasar opprimitur etc. . . .“ Ex morsu araneae tarant. L. revera somnolentiam et constrictionem pactoris oriri et da MATTHEUS prof. Clin. Romae confirmavit, at vero ortum choreae ex morsu hujus insecti pro fabula declarat (*Lettera di Fr. Cancelli al S. Dr. Koreff, sopra il tarantismo etc.* Roma 1817). Idem jam declararunt, FRANC. SERAO della Tarantola o vero Folangio di Puglia. Nap. 1742. et DOMINICUS CIRILLO some account of the Tarantula, in *Phil. Transact.* Vol. 60. 1770. (v. Traneaz. filosofiche di Londra 1770. p. 233). Quam sententiam tenent atque plurimi observatorum ultiorum: FROMENT v. ein. neuen Art Tarantelkrankh. ex Séance . . . de la soc. de méd. de

a laesionibus mechanicis<sup>32</sup>), e. c. compressione pedis ex reflexo ungue<sup>33</sup>), vulnere oculi et cerebri<sup>34</sup>), columnae vertebralis<sup>35</sup>), kyphosi cervicis<sup>36</sup>), a mensium difficili eruptione<sup>37</sup>), a gravi-

dita-

Marseille 1820. in GERSON u. *Jul. Mag.* 1821. B. 2. p. 511. *Bullet. des sc. méd.* 1826. *Maj.* p. 90 (ex *Foienno Meditsinsky Journ.* 1824). FN. MAZZALONI *Full v. Tarantelhas*, ex *Osservat. med. di Napoli*, in *Hamb. Mag.* 1826. *St.* 1. p. 112. *Bullet. des sc. méd.* 1828. *Sptbr.* p. 59. OMIDEI *annal. univ.* 1833. *Ottbr. Noubr.* p. 331. SALVATORE DI RENZI *ib. d. Tarantism.* in *Künigr. Neapel*; ex *Gaz. méd. de Par.* 1833. *Sptbr. N.* 63. in *SCHMIDT Jahrb.* 1834. B. 1. p. 22. et *FRONIER Notiz. B.* 38. N. 12. p. 185. MAGLIARI *Tarantelkrankh.* ex *Osservatore med. di Nap.* 1834. *Jun.* 15. in *SCHMIDT l. c.* 1835. B. 6. p. 76. Maxime nobis arridet, quod RENZI docet. Venenum tarantulae, illi Colubri Beri quovis validiori, non absimile, systema nervorum afficiendo monomaniam hypochondriacam provocat cum angustis, oppensione pectoris, vertigine, tremore universali, nausea, vomitione etc.: *est certe non choream.*

32) v. C. RUST l. citand. (chorea post panaritium tendinosum acupunctura exortum).

33) *Misc. N. cur.* Dec. I. an. 6. 7. obs. 77. choreae exemplum Vilnae vidi, ubi digiti sub ungue vulneratio a festuca, morbum excitasse videbatur.

34) *Samml. auserl. Abh.* 5. B. p. 257.

35) Vide supra §. XLVII. 4 (26).

36) Choreae pueri judaei (de qua supra §. XLVII. 5 (34)) causam primum in vermibus quesiivi, et sine successu. Cum paulo post de hoc aegro somniaverim, sub ipso somno me ita allocutus eum: nonne vides puerum istum rhechiticum esse? hinc nonne probabile, kyphosin nervos brachium adeuntes comprimere et illius motum abnormem excitare? — Aegro postridie probe examinato, rem revera

ditate<sup>36</sup>) et forte ab onania<sup>37</sup>). Quondam magia<sup>38</sup>) accusabatur.

### 3. *Causa*

se ita habere detexi. Applicitis fonticulis ad cervicem aeger plane convaleuit. STRIEBL (l. c.) loquitur de puella, chorea partiali affecta, in cujus vertebra cervicali quinta die morbi decima quarta *curvus Pottii* exoriebatur, addens autem, vertebra aliquam dolentem ac tumidam in chorea rarissime se desiderasse. WENZEL (l. c. p. 411) contradicit.

37) *Samml. vuserl. Abh.* 15. B. 3. St. p. 462.

38) RINDLIN lin. med. an. 1696. p. 437. Pater uetus an. 1800 virginem judaeam a chorea sanavit. Incolamem inde vitam duxit, donec an. 1815 matrimonio inito, gravis evaserit. Tunc vero vix menstrua fluere desierant, cum chorea de novo recrudesceret, et tanta cum vi, ut patri meo in quinquaginta annorum praxi, exemplum tam vehemens nentiquam obvenerit. Convulsiones diu nocturnae aegrum, mentis quidem compotem, verum furibundam, detinebant, ac cutis universa *furunculis* et hinc inde *eschariis gangraenosis* cooperiebatur. Tentatis incassum omnibus artis auxiliis, venesectione excepta, salutem nonnisi ab *abortu* expectabat, quo quinto graviditatis mense secuto, pristina valetudo rediit. G. TURNER *Feitstanz bei einer Schwangeren*; ex *Lond. med. gaz. Vol. XXI*, p. 532, in SCHMIDT *Jahrb.* 1839. B. 21 (chorea prodiit graviditate incipiente; est autem ante hujus decursum sanata).

39) Unum saltem choreae exemplum mihi obvenerit, ubi aegri mores admodum suspecti erant; ac generatim onaniae dediti in contorsiones habituales incidunt, praesertim musculorum faciei, et potissimum masseteris, quo fit, ut vacuo ore quidquam morsurare videantur. PIONNY (v. SCHMIDT *Jahrb.* 1834. B. 4. p. 91) chorea affectam sanavit, quae ab infantia masturbationi dedita fuit.

40) Saeculis ista, quae notat historia universalis caligine superstitiois obruta, plerisque medicis et theologis axioma fuit: si patiens membrorum ejusmodi aut totius corporis contorsiones aut gesticulationes perficit, quae nemo sanus,



3. *Causa proxima* choreae, veluti aliarum C. proxima. convulsionum, quaerebatur in repletionem et inanitione<sup>41)</sup>, in irritatione<sup>42)</sup>, in nervorum abnormi vibratione<sup>43)</sup> et obstructione<sup>44)</sup>, in vapore e sanguine manante et nervorum poros subintrante<sup>45)</sup>, in archaico<sup>46)</sup>, in impetuoso et inordinato liquidi nervei, per nervos musculosque fluxu<sup>47)</sup>, in asithenia<sup>48)</sup>, in nervorum sensibilitate imminuta et musculorum irritabilitate aucta<sup>49)</sup>, in systematici nervosi incitamento nimio, deficiente, vel modo peccante<sup>50)</sup> etc.<sup>51)</sup>. Nostram et hinc fatemur igno-

nequidem minus aut gesticulator quispiam imitari solet; dubium non esse, quin in hac tragoedia *diabolus* partes suas agat. MERCLINUS in sylloge phys. med. cas. incantat, adscribi solit. Norimb. 1698. WILLISIUS in tract. de morb. convuls. C. 7. p. 101. F. PLATER prax. med. T. I. p. 86. Et nostro aevo similis, a laicis quidem, creduntur, JAEGER I. c.

41) HIPPOCRATES Lib. VI. Aph. 39.

42) SENNERATUS Lib. I. P. II. Sect. 28. quaest. I. Prox. 586.

43) ECKHOLDT in epist. ad GREG. HORST.

44) C. PISO obs. de colluv. et illuv. serosa.

45) De med. hist. mirab. L. VI. MARCI DONATI. Venet. p. 40. GREG. HORSTIUS I. c. TULPIUS obs. C. XIV. p. 33.

46) Schola STAHLII, v. JENCKER conspect. pathol.

47) Schola BORRHAVII, v. Samml. anserl. Abh. 1. B. 3. St. p. 184.

48) Schola BRUNONIS, v. elem. med.

49) STARK Handb. z. Kenntn. u. Heil. inn. Krankh. 2. Th.

50) BRANT I. c. p. 68.

51) „Eine der Hauptursachen ist die Metastase einer rheumatischen Entzündung auf das Rückenmark u. die Nerven.“ THOMSON I. c. p. 317. Ex STIRRELIO (I. c.) choreas

ignorantiam, contenti nos *sedem* causae choream efficientis jure meritoque quaerere posse nunc in *encephalo*<sup>42)</sup>, nunc (et quidem maxime) in *specu vertebrali*<sup>43)</sup>, nunc in *corde*<sup>44)</sup>, nunc in *plexibus nervorum abdominalibus*<sup>45)</sup>.

### §. XLIX.

causae proxima est irritatio nervorum motatoriorum medullae spinalis aut oblongatae, vel phlogosi vel turgentia effecta. Si nervorum paria unius lateris irritentur: chorea aemilateralis; si trunci nervorum singulorum: partialis prodit.

52) *SERRES* et *LIEFRANC* in *FRORIER Notiz*, N. 423. Praeter necroscopias (§. XLVII. 9) etiam ad vivisectiones provocare possem, si phaenomenis per hujus tormenta excitatis, multum tribuerem. Vide interea *MAGENDIE* in *adance de l'ac. des sc. le 7. Novbr.* 1825. et *FRORIER Notiz*, 1825. N. 207.

53) Ex pathologia vulneraria (cfr. §. cit. 4 (26)). Ex necroscopia (ib. 9). Ex doctrina aliorum morborum columnae vertebralis. Ex auctoritate *HIPPOCRATIS*, *GALeni* (ll. cc.). Legantur et *BIENT* l. c. p. 17. 69. *MAX. JAK. DU MAN* l. c. *RACZKOWSKI* l. c. *STIERHL* *ll. Beitr. z. Heilw. Frankf. u. M.* 1823. et l. c. (centum circiter casus, in quibus omnibus choream ex nervorum spinalium irritatione exortam esse, asserit autor, se observasse). *COLSON* in *bull. des ac. méd.* 1826. *Octbr.* Legitur in *FRORIER Notiz*, B. 25. N. 11. p. 175 morbi historia majoris momenti. Ex viso, congestionibus ad cerebrum, medullam oblongatam et superiorem saltem medullae spinalis partem, cujus ergo malum in utroque centro systematis nervosi radicabat, symptomata prodierunt, quae inter ea choreae reperiuntur. Praeprimis in periculo versabatur, retrorsum cadere, et impadire non potuit, quominus involuntarie retrogredere-tur, saepe novem ad decem passes. Sanabatur aegrotus. Ex modo ambulandi morbos paritoeaei, *spinac* et systematis nervosi, e. c. *choreae*, cognoscere, docet *GURBERT*,

## §. XLIX.

## D i a g n o s i s.

1. Cum chorea confundi possunt: *contorsio-Genera-*  
*nes et gesticulationes simulatae* aut *aliorum morbo-*  
*rum symptomata*, porro *somniatio*, *mania*, *morbus*  
*cerealis*, *tremores* et *epilepsia*. tim.

2. Mendicantes alique sortis vilioris homi-  
*nes* <sup>1)</sup>, interdum ipsae virgines coelibatus voto  
*adstrictae, choream* quandoque *simulant*. Nec de-  
*fuere saecula peculiari furore saltatorio insignita* <sup>2)</sup>. Chor. si-  
mulata.

## 3. Con-

ex *jour. hebdom.* 1829, N. 38. et 40. in FRORIER *Notiz*,  
 I. a. RAIMANN *Handb. d. spez. Pathol. u. Therap.* 4. Aufl.  
*Wien* 1831. E. ENZ *chorea rhaschitica*, in *RUST Mag.*  
 1834. H. 41. H. 2. HEUSINGER in *SCHMIDT Jahrb.* 1837.  
 B. 16. p. 330. S. ANNAN in *the Amer. j. of med. sc.*  
*Cincinnati* 1837. *Mai* (de fonte choreae in medulla spinæ  
 luculenter disserit).

54) Sic suspicor saltem ex symptomatibus morbi prodromis  
 (§. XLVII. 2) et ex observatione allata in HUYKLAND *Journ.*  
 1828, St. 11. p. 54. (J. ROSSER *Carditis unter der Form v.*  
*Chorea St. V.*). Cordis coactionem in chorea non alie-  
 nam esse, observavit STIEBEL I. c.

55) Teste chorea verminosa et gastrica. Prae caeteris huc  
 pertinet, quem SCHLUGEL (I. c.) descripsit, casus memo-  
 ratu dignus. Puella 13 anorum duas ranas viventes per  
 suum deposuit, quo facto chorea crudelis siluit. v. 2 (24).

1) Quod imprimis in Italia, relate ad morsum tarantulae  
 contigisse, legimus in DE MEZA *compend. med.* p. 55 de  
 tarantismo. BRENT I. c. p. 44. Choream vero caeteris  
 peribis cum Tarantismo interitum magnam similitudinem  
 alere, docet casus a KINDER - WOOD (apud THOMPSON I. c.)  
 designatus.

2) J. F. L. HECKER *die Tanzwuth* I. c.

Ch. alio-  
rum mic-  
horum  
sympto-  
ma.

3. Contingit haud raro in *encephalitis* <sup>3)</sup>, *hydrocephalo* <sup>4)</sup>, *apoplexia* <sup>5)</sup>, in *hydrophobia* <sup>6)</sup> contorsiones vel gesticulationes oriri; quae cum ex aliis evidentibus aegritudinibus originem trahant, nequaquam ad *choream Sti Viti*, saltem *essentialem* <sup>7)</sup>, revocandae sunt. Intelligitur tamen inde, quantum in hoc morbo ad illas aegritudines, saepe latentes, respiciendum sit <sup>8)</sup>.

Dist. a  
somnia-  
tione.

4. Cum aegri *somniatione* affecti, vel ciliis uictitent, vel gestibus scenam ludant <sup>9)</sup>, quaedam inde cum *chorea* similitudo apparet. At illo in morbo gestus non sunt, uti in chorea, *inanes*, sed ad factum aliquod repraesentandum instituti <sup>10)</sup>.

Cae-

3) P. II. ed. alter. Vol. I. Sect. I. C. III. §. XIV. 7.

4) Ibidem. Cap. IV. §. XXII. 4.

5) Cap. V. §. XXV. 1 (24). FRANCON *Apoplexie mit darauf folgender Chorea*, in KALISCH *med. Ztg. des Ausland.* 1833. N. 23.

6) *Hannöv. Magazin.* 1. Jahrgang 1763. Cfr. SOHLER l. c. p. 103. CLARKER apud THOMSON l. c. (e. c. egrotus omne fluidum parhorrescebat etc.). SCHENK l. c. p. 107 (paroxysmi hydrophobici cum aphonis).

7) BOUTILLON (l. c.) choream in *essentialem* et in *secundariam* dividit: illa morbum *per se*, haec aliorum morborum *symptomata* constituit. Nonne hic confusio inextricabili via sternitur? C. WIECKE (HORN *Archiv.* 1830. II. 2), duce GITTERMANNO, diagnosin motus musculorum involuntarii et choreae essentialis enucleavit.

8) G. JAEGER *einige der Chorea St. V. verwandte Krankheitszustände*; in HUFELAND *Journ.* 1827. St. 10. p. 3 (auctor undecim propriae observationes vulgavit. quas legisse non poenitebit).

9) P. II. ed. alter. Vol. I. Sect. I. C. XII. §. LII. 1.

10) l. c. (2).

Caeterum non desunt exempla *complicationis* choreae cum somniatione <sup>11)</sup>; immo chorea detenti quandoque actiones *somnambulorum* peragunt <sup>12)</sup>.

5. Quamvis chorea affecti quandoque imbecilles sint et maniacy haud pauci gesticulatores; attamen *chorea* a *mania* toto coelo differt; cum illo in malo gesticulationes nunquam conditioni mentis adaptentur, sed semper, qualiscunque fuerit mentis conditio, *inanes* exsistent. Quod vero non impedit, quominus quandoque *complicatio* cho-

11) a. c. aegri precantur, psalmos et cantica recitant, audita narrant, secreta propalant, adstantem vel absentem sibi infestum conviciis lacessunt (Misc. N. cur. Dec. II. an. 2. obs. 152. p. 24), vel peregrinas, quas nunquam rite didicerint, linguas strepere et instar fatidicorum futura praesagire (FORESTI obs. med. L. X. obs. 56. ach. p. 486). Ipse an. 1818 in clinico aegram curevi, quae complicatam somniationis et choreae Sti Viti exhibebat. Vigente paroxysmo choreas nationales (*mazur*) secundum proprium cantum absolvebat. Inter ea cum dubium, quamvis lave, aegram potuisse quid simulare, subsit, historiam, caeterum mirandam, silentio praestereo. Iluc atiam aegrola pertinere videtur, cujus historiam memorabilem PLATH (l. c.) narravit; et observatio a BERTSCH in ERNHART v. ERNHARTSTFEN *Sanitätsber.* v. J. 1836.

12) e. c. adstantium manus subterfugiunt, parietibus se adhaerent, et mira celeritate transcendunt (TIM. e GULDENKLEB apist. L. I. E. IX. p. 20), circe foras extremates decurrunt (GR. HORSTII opp. T. II. obs. 45. p. 112). v. choream e KERNER (l. citando) descriptam. STAYENHAGEN *Chorea mit Somnambulismus*, in *Med. Ver.-Ztg. in Preuss.* 1837. N. 30. et in CASPER *Wochenschr.* 1839. N. 30. p. 486. *Chorea Somnambul.* BERNITI p. 21. WICHMANN choream somnambulismo affinem esse asseruerat.

Frank Prax. II. I. 2. 1.

*choreae cum mania* aut saltem cum *delirio* admittatur<sup>13)</sup>.

Dist. a  
morbo  
cereali.

6. Qui contendunt *choream Sti Viti* anno 1374 per totam fere Germaniam *epidemicè* grassatam esse<sup>14)</sup>, eam evidenter cum *morbo cereali* confundunt<sup>15)</sup>. Enim vero chorea nunquam per

*pro-*

13) *Chorea insaniens* BERNTII l. c. p. 21. JAEGERSCHMID de puella 9 annorum convulsionibus (num chorea?) ex vermicibus detenta enarrat, quae quid in hypocausto offenderet, per fenestram ejecit, per eandem fenestram in hypocaustum descendebat, mox duos hircos in stabulo alligatos solvebat, illis insidens in hypocaustum equitabat (Misc. N. cur. Dec. III. an. 3. obs. 99. p. 191). STRACK (l. c.) vesaniam inter choreae symptomata recepit, quin immo, *insaniae speciem* choream vocarunt FELIX PLATER (Prax. med. C. 3. p. 881) et TULPIUS (obs. med. L. I. C. XVI. p. 30). SOHLER (l. c. p. 102) complicationem choreae cum leviori gradu vesaniae statuit, et CERUTTI (7. Jahresber. des poliklin. Instit. zu Lpz. 1831) talem casum observavit. J. FRIEDLÄNDER (Oesterr. med. Jahrb. 1836. B. 10. St. 1. p. 40. 41) melancholicum observavit, qui non raro paroxysmos maniae saevientis perpeusus at quotidie pluries se rotandi furore correptus est. Se rotare non desinebat, nisi viribus exhaustus et sudore madidus procidebat. Afferamus quoque BRACH *Gesch. ein. Phantasma visionis in Verbind. mit Veitstanz ähnlichen Krämpfen bei einem 12jähr. Mädchen*, in *Med. Ver.-Ztg.* 1837. N. 5.

14) e. c. H. v. MARTIUS *Auszüge a. d. Chronik v. Altenzelle*; in *Dresdner Ztschr. f. Nat.- u. Heilk.* 1827. B. 5. H. 1. p. 105.

15) SPRENGEL monet: choream St. V. magnam affinitatem habere cum *raphania*; sed tamen per exitum suum distinguui, at, per illud, quod chorea St. V. sit *sporadica*, et *raphania* sit *epidemica* (*Handb. d. Pathol.* B. 3. §. 494).

*provincias epidemica est, et paucis exceptis casibus* <sup>16)</sup> *non nisi sporadice obvenit. Praeterea chorea hucusque nunquam inter sua symptomata fornicationem agnovit. Tamen notas gangraenae habuisse, exemplum supra allatum docet* <sup>17)</sup>.

7. *Chorea a tremore in eo differt, quod in* <sup>Dist. a tremore.</sup> *tremore partes non multiformi illo gestu et jactationibus, quae choreae genuinae sunt, torquentur; sed fere inter motus voluntarios nutant, et aequabili quadam ratione, modo sursum aut deorsum, modo ad latus utrumque fluctuant* <sup>18)</sup>. Posse

## Z 2

vero

Sed jam PELAEUS hanc affinitatem oluit; differentiam vero agnovit (l. c. p. 864). Alibi (l. c. 4. Jahrg. p. 36) vero inquit: „Schon zu Horstii Zeiten, oder zu Anfange des 17. Saeculi, hat man den Nahmen *Chorea St. Viti* entlehnt, u. einen *effectum spasmodico convulsivum*, welcher in seinen Symptomatibus der *Sächsischen Krabbelkrankheit* ähnlich sieht, damit belegt.“ NISMANN in HUSELAND Journ. 1823. St. 8. p. 13. BRENT l. c.

- 16) e. c. ubi *Chorea* infantes scholae *Bohnhorstianae* aggressa eret (ALBERS l. c.), vel illos in velle *Tirolensi Tux* (*Merkwürd. Feitstanz-Epidemie, in Oesterr. med. Jahrb. 1829. B. 1. St. 3. p. 95—100. Anno 1827 viginti septem, ann. 1828 triginta personae correptae sunt*), vel istos singuli pagi (J. KERNER *Nachr. v. ein. z. Neuheiten in Würtemb. unter den Kindern epidemisch geherrsch. Feitstanz, in Hohenbaum med. Conversat. - Bl. 1831. N. 43. p. 340* (14 infantes)). Cfr. H. TRANNOT *epidem. V. T. in BEHNND neueste med.-chir. Journalist. des Ausland. Berl. 1830. H. 7. p. 112.*

- 17) §. XLVIII. 2 (38).

- 18) Similitudinem inter choream et tremorem (*paralysin agitantem*), subultus, delirium etc. se observasse credunt GRAVES et ELLIOTSON l. c.

vero choream cum tremoribus connubium inire, ipsi observavimus <sup>19)</sup>).

Chorea  
indoles.

§. *Choreae Sti Viti* indoles secundum praecepta generalia eruenda, modo *traumatica*, modo *inflammatoria*<sup>20)</sup>, *rheumatica*, *metastatica*, *gastrica*, inprimis *verminosa* et *nervea* est.

### §. L.

#### *P r o g n o s i s.*

Pericu-  
lum.

1. *Chorea genuina* <sup>1)</sup>) morbus quidem diuturnus est <sup>2)</sup>), at vix periculo vitae stipatus <sup>3)</sup>).

Mor-

19) In femina an. 1817 in Clinico Vilnensi decumbente. *Chorea tremula* BERNTH I. c. p. 27. Num vero exemplum, ad quod vir Cl. provocat, ad choream pertinuerit, vehementer dubito.

20) Caveat autem medicus, ne ob faciei ruborem, oculorum prominentiam, ferocitatem animi, pulsum fortem et celerem, sub *paroxysmo* vigentes, jam ad diathesin inflammatoriam concludat. Oriri enim possunt haec omnia in corporibus exhaustis, spasmis internis congestionibus humorum caput versus gignentibus.

1) In prognosi enim maxime refert genuinam choream a spuria illa et symptomatice, utpote quae aliorum morborum pericula agnoscit, distinguere.

2) Choream raro extemplo auferre licet, ac plerumque mensis unus alterve ad illius sanationem requiritur.

3) Inter 84 aegros 2 mortui sunt (REYRE I. c.). „*Der Veitstanz ist nicht leicht tödlich . . . bewirkt er den Tod, so ist dieser selten oder gar nie die unmittelbare Wirkung des Veitstanzes, sondern gewöhnlich die mittelbare durch Nachkrankheit herbeigeführt*“ SONLER I. c. p. 53. 146. 147. v. Casus mortales apud WIGAND Hamb. Magaz. f. d. Gbtsch. 1808. St. 2; MÜLLER in PIERER Annal. 1813. Apr. p. 324; J. ROESER I. c. ELLIOTSON Bemerkung. üb. Chorea; in



Morbus neglectus, in epilepsiam, maniam fatuam, apoplexiam, paralyisin et maxime in tabem \*) transire solet.

2. Sexus sequior choream quidem majori in gradu pati, sed facilius sustinere \*) solet. Animad-  
versio. Choream continuam difficiliter curam admittere, quam periodicam credunt \*), at contrarium potius observavimus. Quae ex causis mechanicis et ex animi pathematibus oritur chorea, inprimis si vitium haereditarium subsit, difficiliter sanationem admittit. Ita chorea cum notis epilepticis et maniacis. Quamvis observatum fuerit 7), virgines diu antea chorea vexatas, post vero feliciter curatas, non tantum constante gavisas esse valetudine, sed etiam prolium fecunditate excelluisse; verum tamen observationibus hujus generis haud paucas opponere possumus, ubi morbus minima porrecta opportunitate recrudit \*). Sanatur aliquando

KALISCH *med. Ztg. des Ausland*, 1833. N. 23 (mors apoplectica). R. FRONIER l. c. (duo casus, quorum prior mortis apoplectica finitus). Cfr. §. XLVII. 9.

4) Ex tabe aegrum chorea laborantem in nosocomio Vienneensi amisi.

5) Duo aegri, qui inter 84 mortui sunt, pueri erant. Sic et aeger meus, taba peremptus.

6) BERNI l. c. p. 73.

7) WICHMANN l. c.

8) Cfr. §. XLVIII. 2 (38). et infra (10). Puer, qui ab urso terrafactus in choream incidit (§. XLVIII. 2 (12)), jam sanitati restitutus erat, cum ab aspectu patris, qui convalescentem in Clinico domum ducendi gratia advenerat, in pristinum morbum praecepitaretur.

quando febre superveniente \*). Aliàs illa, aut exanthemate <sup>10)</sup> supervenientibus recrudescit.

## §. LI.

## C u r a.

Genera-  
tim.

1. Aeger chorea laborans, habeat lectum super solum stratum, duriusculum et pelle alcis vel caprae obtectum (ne spina exaestuatur) atque pulvinaribus undique circumdatum, ut motus libere et sine periculo audique concedatur <sup>1)</sup>). Removeantur ligamenta quot quot sunt, praesertim circa collum, ne circuitus cruoris impediatur et aeger stranguletur. Praescribatur custodibus, ut aegrotò, qui ipse cibum capere non potest, alimenta debitis horis sensim sensimque ingerant. Si chorea laborans, in sinu numerosae familiae, aut in domo educationi dicata, aut in nosocomio decumbat, a sociis separandus est, ne et hi morbo attingantur <sup>2)</sup>).

C. choreae  
traumati-  
cae.

2. *Chorea traumatica* exposcit, ut caussa mechanica partem systematis nervosi lacescens removeatur, aut si hoc fieri non possit, ut saltem effectus illius temperentur. Cui scopo plerumque

*eua-*

9) SROLL rat. medandi, T. V. p. 27.

10) Virgo quindacim annorum quam a. 1815 a chorea ex terrore orta sanaveram, a. 1818 sub curriculo scarlatinae recidivam perpassa est. HORN *Uebersicht* etc. in ejusd. *Archiv*, 1834. H. 5 (complicatio choreae cum scarlatina).

1) Rite momente SCHLICKEL (*Hufeland Journ.* 1822. St. 1. p. 36), aegros non retinendos esse.

2) Epidemia choreae inter infantes *Bohnhorstenses* prius, quam scholae clausae fuerint, non cessavit.

*evacuationes sanguinis locales*, circa caput, vel columnam vertebralem, *fotus frigidus*<sup>3)</sup>, *fonticuli vel setacea* ad eadem loca inserviunt, non neglectis lenibus *alvum evacuantibus*, affluxum humorum ad encephalum vel ad medullam spinalem impredientibus.

3. *Choreae inflammatoriae* medendi rationem C. choreae inflammatoriae. pulcherrime SYDENHAM exposuit<sup>4)</sup>. *Venaesectioni* ex pede eo securior locus est; quo floridior et robustior aeger, quo proximior periodo pubertatis, quo magis symptomata diatheseos inflammatoriae vel extra paroxysmum vigent, quoque recentior morbus<sup>5)</sup>. Cujus caussa si in encephalo vigeret, jugularis secari posset<sup>6)</sup>. Quocunque in casu moneatur ante operationem chirurgus, quantae eum, ob continuos partis sauciandae motus, expectent difficultates! Peracta venaesectione aut ea, nisi plane indicata, omissâ, *hirudines ad caput*, si chorea originis cephalicae<sup>7)</sup>, alioquin ad

co-

3) E. HARRISON *an example of St. Vitus dance from an extraordinary cause, and which was cured by applications directed to the back*, in *gaz. of health*, 1829. March. N. 159. p. 466.

4) l. c.

5) Venaesectionis stupendos, indicatae sub rarum positiona, effectus casus supra allatus (§. XLVII. 5 (32)) docet. Alii consequntur: JAEGER l. c. (V. 3. unciar. VI. ex pede pueri 12. annor.).

6) WATT *cases of diabetes, consumption etc.*

7) „M. SHERES fait remarquer que les malades affectés de chorée se plaignent, presque tous, d'une douleur plus ou moins vive à la partie postérieure et inférieure du crâne

*columnam vertebralem*<sup>8)</sup>, aut ad *regionem epigastricam*<sup>9)</sup>, ponendae. A cucurbitulis scarificantibus in tenellis aegrotis abstinendum. Alvus *sero lactis*, si opus sit, *tamarandinati* vel *mannati* ope, aperta tenetur. *Diaeta vegetabilis* et *lactea* esto<sup>10)</sup>. Potus *aqua*. Inter pharmaca *nitras potassae* in *emulsione*, ex *seminibus hyoscyami nigri* et *amygdalis dulcibus* parata<sup>11)</sup>, valde nobis inserviat.

C. chorea  
rheumati-  
cae et me-  
tastaticae.

4. *Choream rheumaticam* et *metastaticam* recentem secure methodo antiphlogistica aggredimur<sup>12)</sup>, qua praemissa ad *regimen diapnoicum*

con-

... C'est ce qui l'a engagé à porter ces médications à la partie supérieure de la région cervicale ... M. PIORRY a annoncé aussi avoir guéri un enfant atteint de chorée par plusieurs applications de sangsues à l'endroit précisé. "Revue méd. T. 3. p. 519. Cfr. FRORIER Notiz. 1828. B. 20. N. 5 (LISFRANC duxit SERRES, mali sedem in cerebello suspiciens, ad nucham sanguisugis applicavit: chorea dispersuit). BARDELEY l. citando.

8) RAIMANN Hdb. d. spez. Path. u. Therap. 1831. M. HEINE in SCHMIDT Jahrb. 1835. B. 8. p. 211. E. ENZ l. c. STIEHNEL l. c. KÖHLER in Pamiętnik towarzystwa lekarskiego warszawskiego. w Warszawie 1837. T. I (laudat hirudinum applicationem ad vertebrae cervicales).

9) In casu, a JANGER l. c., relato.

10) Lac recens malsum quammaxime aegrotis hujusmodi aridet, ac medicamenti vices agit (Lega SWAINSTON, Thoughts physiol. and pract. with observ. York 1796. v. Abh. f. pr. Aerzte. 17. B. p. 548).

11) Pro aegrotis 9 annorum. R. *Seminum hyoscyami nigri* grana decem. *Amygdalarum dulcium* decorticatarum, sacchari albi *ss* drachm. duas. *Nitri puri* drachm. semis. Triturando f. c. s. q. aquae fontis *emulsio* ad colaturam librae unius. Cap. quater de die unciam unam et semis.

confugiendum. *Antimonialia* aegroti sensiles vix ferre solent; eo magis infusa florum tiliae europaeae, sambuci nigrae additis guttis nonnullis *spiritus cornu cervi succinati* et *syrupo*. A balneis et semicupis tepidis cum herbis aromaticis<sup>12)</sup> aut sapone et lacte<sup>14)</sup> potius detrimentum vidimus<sup>13)</sup>. Contra vero maxime nobis profuit *vesicatorii striae* duae latitudinis pollicis lateribus columnae vertebralis admotae<sup>14)</sup>. Diuturniorem virtutem *fonticuli* praestant, pro re nata ad basin cranii, ad cervicem. Item *unguenta irritantia* ad varia cutis loca<sup>17)</sup>, ut fugatorum ibi impetiginum vices agantur.

## 5. Cho-

- 12) SALLANA l. c. Cfr. STOLL rat. med. T. IV. p. 78.
- 13) THOMSON *med. Rathschläge*. v. *Samml. auserl. Abh.* 3. B. p. 30.
- 14) SCHARFFER *Bemerk. üb. Kinderkrankh.*
- 15) Attamen balnea sulphurea prodesse fertur: BAUDELOCQUE in *archiv. gén. de méd. Par.* 1833. *Novbr.* RUFZ l. c. p. 52. GUERSENT, PIGNY II. cc. FORGET ex *bull. de thérap.* 1837. *Débr.* in *Analekten f. Frauenkrankheit*, Lpz. 1839. B. 2. H. 2. p. 317.
- 16) SUNEIR in *journal. de méd.* T. 85. N. 2 (nuchae). DE LA RIVE in KÜHN *phye. med. Journ.* 1800. Jan. 60 (ad os sacrum). SCHARFFER *gewöhnl. Kinderkrankh. u. deren Behandlung*, p. 175 (in caput totum). WANDELSTEEN vorzögl. *Nutz. d. Blasenpflast. bei d. Chor.*, in *Med. Ver.-Ztg.* 1837. N. 34 (ad brachium, tribus in casibus perutile).
- 17) R. HUNTER *case of rotatio or chorea, treat. successfully by rubbing tartar emetic in the scalp, and along the course of the vertebral column; etc.* in the *Edinb. m. and s. j.* 1825. Apr. p. 200. v. *Samml. auserl. Abh. f. pr. A.* 1826. B. 9. St. 2. JEFFREYS ib. p. 278. Cfr. WHITE in *Edinb. med. comment. Vol. IV.* p. 326. WATT in *med.*

C. choreae  
gastricae  
et vermi-  
nosae.

5. Choreae gastricae <sup>18)</sup> et verminosae <sup>19)</sup> methodus a HAMILTONO <sup>20)</sup>, praeceuntibus SYDENHAMI <sup>21)</sup> et BASSEVILLE <sup>22)</sup> celebrata, accommodata est, quam vero rudis empiria, rite monente

REK-

*chir. transact.* Vol. 5. BLUM in *Vermischte Abh. a. d. Geb. d. Heilk. v. ein. Gesellsch. pr. A. zu St. Petersburg.* 3. Samml. ib. 1825. p. 256 (unguento ad cordis regionem illinito chorea sanabatur). M'ANDREW in *the Lond. m. and phys. j.* 1826. Vol. 1. (ad occiput et partem spinæ superiorē). CHARL. BYRN in *monthly gaz. of health.* 1830. Maj. p. 936. Cfr. BEHRND *Journ.* 1830. H. 8. p. 177. STRAMBIO in *KLEINERT Repertor.* 1830. H. 8. p. 138 (intra paucos dies choream ex medallae spinalis irritatione unice unguento tartari stibietī, ad spinam illinito debellavit). BRUTTENMÜLLER l. c. (c. Euphorbio et Cantherid.). CAMMERER l. c. (duobus in casibus; impetigine scabiosa et tinea retropulsa provocatis, choreae sanatio). ANGLE in *Mittheil. des Würtemb. ärztl. Ver. Stuttg.* 1831. p. 543. LÖWENHARDT l. c. STIEBEL l. c. (Ung. Autear. acre ad latera loci spinæ dolentis illinitum).

18) R. VERRAULT in *the Lond. med. repository.* 1825. Maj.

19) In duobus infantibus selectissime remedia morbum violentiorem propellere non poterant, donec tandem vermium copie, anthelminthicis ejectorum, morbus cessaret. J. HINKKEN diss. de morb. nervor. eorumq. frequentissima ex abdomine origina. Gött. 1788. f. 20. p. 41. Similia de puero verminoso 13 annorum, tandem Gummiguttæ granis 9 a vermibus et chorea St. Viti liberato, narrantur. l. c. p. 45. Cfr. DE HAEN de vermib. eb ictero. Ed. WASSERBURG p. 50. 51.

20) *Obs. on the utility of purgative med. chap. 6.*

21) l. c.

22) An choreae St. Viti evacuantia narcoticis et cardiacis interpolata, Paris 1758.

REEVE<sup>23)</sup>, ultra debitos limites extendere conatur. Plerumque *calomel*<sup>24)</sup> aut *oleum ricini*<sup>25)</sup> exhibemus. Drastica potius suadet STRACK<sup>26)</sup>, at quanto cum periculo adhibeantur, ex aliorum<sup>27)</sup> et propria<sup>28)</sup> experientia nimis edocti sumus. Infantibus tenellis *pulvis conchyliorum limacum exsiccatorum* saepe conducit<sup>29)</sup>. Aliàs pulvis, verisimi-

23) l. c. Cfr. *Götting. Anzeig.* 1813. Febr. 30. St. Plurimi recantiorum consentiunt.

24) Pro aegro 9 annorum. Ry. Pulv. calomel grana quinquaginta. Radicis convolvuli jalappae et seminum artemisiae contra aa grana decem. M. S. Cap. mane jejuno ventriculo. Trecentos ascarides Imbricoides vivos evacuatos vidit ex uno aegroto ALBERS l. c. Ut inter anthelmintica remedia ea, quae simul antispasmodice agant, aliquas et cum purgantibus jungas, rite suadet SOHLER l. c. p. 181. Et omni in casu, quo eccoprotica indicata sint, ea cum antispasmodicis unienda esse, docet J. L. BARDLEY *hosp. facta* etc. in *Froriep Notiz.* 1830. B. 27. N. 9. Cfr. *BERNARD Journ.* 1831. N. 8. p. 183. Calomel et Jalappa etiam a THOMSON (l. c. p. 317) laudantur. STIBBEL l. c. (calomel).

25) Pro aegro aequae aetatis. Ter de die cochleare coffeanum.

26) l. c.

27) Quantum detrimentum afferant drastica, quin immo et diu protracta solvantia, elucet ex *Samml. auserl. Abh. f. pr. Aerzte.* 11. B. 4. St. p. 642.

28) Ann. 1793 in nosocomio Ticinensi puerum octo annorum chorea laborantem curavi. Chirurgo socio formulam dictavi pulveris *radicis jalappae* ad grana quindecim; ille autem *resinam* scripsit, qua porrecta diarrhoea amplius haud sistenda, in enteritidem chronicam lethalem desinens, orta est.

similiter *ungulam alcis* continens, reliquis pharmacis palmam praeripuit<sup>30)</sup>.

C. ch.  
nerveae.

6. Quae singula si morbum non debellarent, ad medendi methodum *chorcae*, quam *nerveam* vocamus, deveniendum foret. Consistit ea in usu *radicis valerianae sylvestris*<sup>31)</sup>, *artemisiae vulgaris*<sup>32)</sup>, *cimicifugae (actaeae) racemosae*<sup>33)</sup>, *corticis cinchonae officinalis*<sup>34)</sup>, *foliorum aurantiorum*<sup>35)</sup>,  
semi-

29) GÖLLIS v. *Salzb. med. chir. Zeitung*. 1812. N. 81. p. 47.  
(Ter de die ad grana X).

30) ALBERS l. c. (specificum sub nomine *das Kurkessche Pulver*, notum).

31) *Samml. auserl. Abh. f. pr. Aerzte*, 4. B. 2. St. p. 311.  
BERTH l. c. p. 93. BOUTEILLH l. c. *Oesterr. med. Jahrb.*, 1829. B. 1. St. 3. p. 98. JAEGER, CAMERER, KUHNEN, CHEVALIER, RUFFELD II. CC. OBLERNEBERGER in *Oesterr. med. Jahrb.* 1832. B. 3. p. 432 (meis aegris non profuit).

32) HUFFBLAND *Journ.* 1825. St. 11. 1826. St. 1. p. 61. *The med. recorder*. 1826. N. 34. p. 417 (casus rebellis intra nonnullas hebdomadas sanatus). GUHL ex *Mittheil. a. d. Semestralbericht. Badisch. Medicinalbeamt.* N. 5. in *Annal. f. d. gesammt. Heilh. unter d. Redact. . . der Bad. Sanitätscommission*. Jahrg. 2. H. 2. p. 126 sq. (Pulv. red. gr. XV. ter de die. Intra quindacim dies chorea pueri 13 annor. sanata est). FRITSCH l. c. (duo aegroti radicaliter eoque se celeriter curati). FRIEDLANDER in *Oesterr. med. Jahrb.* 1838. B. 25. St. 4. p. 626.

33) J. YOUNG in *the Amer. journ. of the med. soc.* 1832. Febr. et in *FRANKE Notiz.* B. 35. N. 22. p. 346. Cfr. BREMBEND *allg. Repert.* 1833. N. 1. p. 62. et KALISCH *med. Ztg. des Ausl.* 1833. N. 6 (Pulv. rad. cochlear coffeae. ter de die. Sanatio velox.).

34) SYDENHAM l. c. WERLHOF de febr. intermitt. Hennov. p. 45. MAHON in *journ. de méd.* T. 58. p. 553 (Sub ipso



*seminum sinapis nigrae*<sup>36</sup>), *tincturae colchici*<sup>37</sup>); *florum cardamines*<sup>38</sup>), *extracti succi radiceis atropae belladonnae*<sup>39</sup>), *camphorae*<sup>40</sup>), *olei cajeputi*<sup>41</sup>) *asae foetidae*<sup>42</sup>), *succi sempervivi tectorum*<sup>43</sup>),  
*acidi*

morbi carriculo plus detrimenti quem homi inde vidi, conducit convalescentibus, sub forma infusi frigidi. Chininum sulphuricum convalescentibus propinavit JAEGER I. C. MAGENDIE (*Journ. de phys. expériment. et pathol.* 1822. T. 2.) melancholicum, musculorum motibus involuntariis effectam, hoc remedio sanavit).

35) *Samml. auserl. Abhandl.* 17. B. 2. St. p. 266 (3j—3ß Pulveris, eut 3jj—jjj que infusum). JAEGER, CHEVALIER II. CO.

36) WINIKER I. C. (tinctura da alcohol paret).

37) RAVEN in the *Lond. medical and physical journal* by FOTHERGILL. Vol. 20. 1816. Sept.

38) MICHAELIS in RICHTER *chir. Bibliothek*, 5. B. p. 120 (ad drachmam unam omni sexte hora).

39) STOLL *rat. med.* P. III. p. 120 (a grani sexte, dein quarta parte omni quadrihorio). KETTERLING I. C. KERISON in the *Lond. med. repos.* Vol. 6. Octob. Oesterr. med. Jahrb. 1829. B. 1. St. 3. p. 98. *Miscell. pruss. Aerzte* etc. in HUFELAND *Journ.* 1832. St. 8 (gr.  $\frac{1}{8}$  c. Zync. oxyd.). SCHENK I. C. p. 107 (gr.  $\frac{1}{2}$  p. d.).

40) D. MONRO in *Samml. auserles. Abh. f. pr. A. B.* 5. St. 2. p. 213. DESPREZIERES in *hist. de la Soc. R. de méd.* ad 1782. *Abh. f. pr. Aerzte*, 15. B. p. 462 (adhiuit camphoram vitello ovorum subiectem ad drechmes duas in semicupis tepidis ex decocto florum chamomillae). WILSON in *Med. Commentar. v. ein. Gesellsch. v. Aerzt. zu Edinburg.* 2. Decade. B. 11. p. 22. BARDELEY I. C.

41) WREELHOF opera, edit. WICHMANNI. p. 711.

42) WARTENS *Journ. de méd.* Vol. 56. p. 115. DU MAN in *Samml. auserles. Abh. f. pr. A. B.* 1. St. 3. p. 23. SCHAEFFER *ib.* B. 16. St. 1. p. 125. BARDELEY I. C. (in

*acidi hydrocyanici* <sup>44)</sup>, *potassae* <sup>45)</sup>, *oxydi zinci* <sup>46)</sup>,  
cupri

clysmate). KERNER l. c. SCHNEIDER *med. klin. Ber.* in SCHMIDT *Jahrb.* 1834, B. 3. p. 331 (internus usus). (Clysteras ex asa foetida in plurimis aegrorum meorum profuerunt; ore enim hoc pharmacum difficulter in junioribus, utpote pilulas plerumque respuantibus, adhibetur. Absente hac difficultate profuit Patri meo sequens formula: R. Extracti gantianae, asa foetidae l. a. subactae et pulveris radiciae Valerianae aa drachmam unam. F. pilulae granorum trium. Consperg. etc. cap. ter de die No. quinque).

43) PENEROOMIUS v. *Abh. f. pr. Aerzte.* 1. B. 1. St. p. 13 (R. Succu sempervivi tectorum, spirit. vini aa uncias duas. Cap. inter diei spatium).

44) J. STUART in *the Edinb. med. and surg. journ.* 1827. Octbr. p. 271. Cfr. *Neue Samml. auserles. Abhandl.* 1828. B. 11. St. 2. p. 213 (gutt. ij p. dosi, intra 40 horas 96 guttulas dedit et spatio hebdomadum 8—9 sanavit!! Talem medicum nemo imitabitur!) *Salzb. med.-chir. Zig.* 1828. B. 2. N. 43.

45) Oleum tartari per deliquium optimo cum successu adhibuit WENDELSTADT in *HUFELAND Journ.* B. 24. St. 1. p. 150, et balnea cum Kali JAEGER l. c. GROSSEHM l. c.

46) BURSERIUS edixerat: „nuper confirmatam et omnibus numeris absolutam choream St. V. solo srorum zinci una tuto, cito et jucunde curavi“ (instit. Vol. III. p. 242). Quam laudem plus minusve sustulere: HART diss. de Zinco in *Med. Comment. v. Edinb.* B. 1. p. 94. ROSEL *Samml. auserl. Abh.* 7. B. 2. St. p. 447. STARCK *Handb.* 2. Th. p. 163. ALEXANDER in *DUCAN annals of med. Lustr.* II. Vol. I. THILHNUS *med. chir. Bemerk.* p. 115. WRIGHT in *mem. of the med. soc. of Lond.* Vol. 3. app. N. 24. *Salzb. med. chir. Zeit.* 1818. N. 3. p. 41. USTERI *Ber. üb. d. Krankh. im Zürich. Krankenhause v. J. 1825.* in *Verhandl. d. med. chir. Gesellsch. des Canton Zürich.* ib. 1827. *The med. recar-*

*cupri ammoniacalis*<sup>42</sup>), *ferri*<sup>43</sup>), *carbonatis ferri*<sup>44</sup>),

*arsc-*

*der of origin. papers.* 1826. N. 34. p. 417. CAMERER I. C. *Miscell. pruss. Aerzte u. d. Sanitätsber.* in HUFELAND *Journ.* 1832. St. 8. OLENDORGER in *Oesterr. med. Jahrb.* 1832. B. 3. p. 432. JÄGER I. C. GÜNTHER in HUFELAND *Journ.* 1835. St. 12. KUNK I. C. REHFELD in *Med. Ver.-Ztg.* 1836. N. 35. HEINE I. C. (ad grana Vj, ter de die). *Mihi nil praestitit, quod etiam STOLL* (I. C. p. 465), SCHAEFFER (*Samml. auserl. Abh.* 16. B. 1. St. p. 126), BRECHET (*Journ. hebdom. de méd. et de chir. pr.* 1831. Octobr.), BODENSTADT I. citande fatentur.

47) WALKER in *med. comment. Edinb.* X. B. p. 33. v. *Abh. f. pr. Aerzte.* II. B. 3. St. p. 672 (in negotiis teneris, debilibus). DELARIVE in KÜHN *phys. med. Journ.* 1800. Jan. p. 58. THOM. A. THURSSINK *Samml. auserl. Abh.* 17. B. 2. St. p. 266. WILLAN in *Lond. med. journ.* 7. Vol. v. *Abh. f. pr. Aerzte.* 12. B. p. 62 (Dosis sexta vel quarta pars grani bis terve de die). NIRMANN in HUFELAND *Journ.* 1823. St. 8. p. 13 (3ß in Aq. 3j sol. ter in die gutt. V). SANDROCK in SIEBOLD *Journ.* 1832. B. 12. St. 1. p. 137 (Liq. cupr. ammon.-muriatici i. e. Aq. antimiasmatica 3ij, Aq. destill. 3XX. Cochleatim sumendum. Magna effecit in chorea rebelli). C. G. NEUMANN v. d. *Krankheit. des Gehirns des Mensch.* Coblenz 1833. Kap. 7. TOTT in *Allg. med. Ztg.* 1834. Jan. Cas. II. *CRAWE cuprum sulphur.-ammoniat.* gegen Chorea St. V. in *Med. Ver.-Ztg.* 1834. N. 18 (grana tria soluta in Aq. destill. 3j. Ter de die gutt. 12. Dosis omni triduo gutt. 3 augenda). MALIN in *Med. Ver.-Ztg.* 1838. N. 8 (sanationes duae).

48) BEKSTRIN in HORN *Archiv.* 3. B. 2. Heft. p. 241 (praestitum balneae martialia). Et externe applicatum, id est forficem, clevem manui aegrorum tradendo, ferrum mirabiles effectus exserere solet, teste WICHMANN (I. C.) et STANKIO (I. C.). Cfr. BRENT (I. C.) p. 105.

49) J. SWAN in *the Edinb. m. and s. j.* 1824. N. 80. C. F.

*arsenici*<sup>50</sup>), *nitratis argenti*<sup>51</sup>), *castorei*<sup>52</sup>), *olei*  
*ani-*

VANDEBROUGH Fall ein. Chorea St. V., d. durch kohlen-  
saur. Eisen geheilt wurde; in *Med. chir. Ztg.* 1825, Octbr.  
p. 25. J. ELLIOTSON in the *Lond. med. gaz.* 1831. Vol. 7.  
Febr. Vol. 8. June. Cfr. *BERREND Journ.* 1831. II. 9. p. 384.  
II. 12. p. 309. Idem in *Lond. m. and s. j.* 1832 et 1833.  
v. GRAEFF u. W. *Journ.* 1833. B. 20. St. 1. p. 171. et GER-  
SON u. JUL. *Mag.* 1833. Novbr. Decbr. in *med. and s.*  
*transact.* Vol. 13. p. 450. Vol. 15. et 1833. Jan. v. N.  
*Samml. auserles. Abh.* 1828. B. 11. St. 2. p. 308, 1830.  
B. 13. St. 2. KALISCH *med. Ztg. des Ausland.* 1833. N. 23.  
et FROBIEP *Notiz.* B. 35. N. 17. p. 265 (autor remedium  
fere specificum nominat; attamen choream non breviori  
spatio quam 6—10 hebdomadum debellavit). HUTCHIN-  
SON in the *Lancet.* Lond. 1833. Septbr. v. GERSON u. JUL.  
*Mag.* 1834. St. 4. p. 49 (angrotus sensim sensimque 1½  
Libras (!) ferri carbonici deglutivit). THOMSON l. c. p. 318.  
Chorea, durch kohlensaur. Eisen glücklich behandelt im St.  
Thomas-Hospit. zu London, ex *Lond. m. and s. j.* 1833.  
Vol. 4. N. 90. Octbr. 19. in SCHMIDT *Jahrb.* 1834. B. 1.  
p. 207. BERNDT ib. B. 4. p. 228 (3ß per nychthemeron.  
Duo negotii sedati). BRAUN in *Königsb. Provinz.-Sani-  
täte-Ber. f. das 1. Semester 1834. Königsb.* 1835. HEU-  
SINGER l. c. HEINE in SCHMIDT *Jahrb.* 1838. B. 17. p. 212  
(ad 3ß ter de die). FORGET ex *bull. de therap.* 1837.  
Decbr. in *Analekten f. Frauenkrankheit.* Lpz. 1839. B. 2.  
H. 2. p. 317 (Ry. Ferri subcarbon. 3ß. Pulv. cort. Chin. ʒij.  
Mucil. Gi. arab. q. s. et f. pilul. XX. Cap. duas de die,  
una cum infuso flor. Naphae aut Tilline, et balneois sul-  
phureis. Autor hanc methodum certam appellat).

50) MARTIN in *med. and chir. transact. publish. by the med.  
and chir. soc. of Lond.* Vol. 4. 1813 (Ter de die tinctura  
ad guttas quinque, in puella 15. annorum. Spatio sex  
hebdomadum (!) sanata est). RABEDOW *Arsenik bei Tic*  
u. Chorea, in CASPER *Wochenschr.* 1835. N. 30 (Solu-

*animalis Dippelii*<sup>51)</sup>, *electricitatis*<sup>52)</sup>, *magnetismi animalis*<sup>53)</sup>, *balneorum frigidorum*<sup>54)</sup>, *musicae*<sup>55)</sup>  
 alio-

tionis Fowleri gtt. 7—12; bis de die apud aegrotam 24 annorum). STEINTHAL l. c. (sine fausto successu).

51) FRANKLYN in *med. and phys. journ. publish. by FOTHERGILL* 1815. April (ad grana tria de die). Et BRUCE in *medico-chir. transact. publish. by the medico-chir. soc. of Lond.* 1818. Vol. 9. p. 1. J. CRAMPTON in *transact. of the associated fellows and licent. etc. Dublin* 1825. Vol. 4. PRION *Hül. v. St. Veitstanz durch Hollensteiner; ex Journ. gén. de méd.* 1824. T. 87. p. 299. in *Hamb. Magaz.* 1826. St. 1. p. 112.

52) BONIFAZ *Abh. f. pr. Aerzte.* 1. B. 3. St. p. 134. 4. St. p. 7. DONALD MONRO ib. 5. B. 2. St. p. 216 (gr. ij—liij, ter quaterve in die). MADIER ib. 1. B. 4. St. p. 7 (in clymate et ut corrigens opii).

53) WERLHOFF op. c. Sect. 2. §. 4 (ad guttas triginta).

54) HÄHN *Int. med.* P. I. p. 142. P. II. C. 13. P. III. C. 6. p. 221. DUMAN l. c. p. 23 (secundum curriculum spinæ vertebralis). Cfr. BERNT l. c. p. 103 sq. FOTHERGILL in *philos. transact.* ad ann. 1799. p. 1. SIGAUD LA FOND op. c. p. 241. DU BOUEIX v. *journ. de méd.* T. 58. p. 132. CURRIE in *mem. of the med. soc. of Lond.* Vol. 3. MAUDSLEY in *FOURCROY méd. éclairée.* T. 3. v. HUFELAND u. GÜTTING *Aufklärungen.* 1. B. p. 356.

55) L. BOCHARD in *Archiv f. d. thier. Magnetism.* Lpz. 1824. B. 12. BAUMHACH *Veitstanz, geheilt durch animal. Magnetism.*, in *SIEBOLD Journ.* 1830. B. 10. St. 1. p. 138 (Dia altero curae inceptae diarrhoea salutifera accessit: utrum sponte, an magnetismi effectu? incertum videtur).

56) W. CULLEN *Anfangsgr. d. pr. Ael. Lpz.* 1789. B. 3. p. 400. JAHN *Klin. d. chron. Krankh.* B. 1. p. 251. D. MONRO in *Samml. ausleses. Abh. f. pr. A. B.* 5. St. 2. p. 213 (cum submersione in aqua frigida). TENNIX *Veitstanz, durch kalte Bäder geheilt; ex gaz. de santé.* 1825. Avril, in *Frank Proz.* II. 1. 2. 1.

aliorumque<sup>55)</sup>, quibus singulis remediis minus uai  
su-

HUFELAND *Journ.* 1827. *St.* 2. p. 123 (balneis frigidis herpete furfuraceo provocato chorea disparuit). G. JAEGER l. c. historia 7 (Chorea atrocissima puellae 9 annorum, mutae et suae insciae balneis frigidissimis fugata, recessit quatuor annis praeterlapsis et disparuit eodem remedio iterum adhibito). D'HUC in *revue méd.* 1832. *Noubr.* (duae sanationes). DUPUYTREN *Behandl. des F. T. durch kalte Uebergiessungen*; in BEHRND *Journ.* 1830. *H.* 11. p. 260. et in *gaz. méd. de Par.* 1835. *Débr.* HOSPITAL *gute Wirk. d. kalten Bäder im F. T. ex bull. de thérap.* T. 6. l. 7. in SCHMIDT *Jahrb.* 1834. *B.* 4. p. 8 (chorea 9 annorum cum ejusdem sequelis sanabatur). T. CONSTANT *kalte Bäder gegen F. T. ex bull. de thérap.* 1835. T. 8. l. 11. in SCHMIDT *Jahrb.* 1836. *B.* 10. p. 11. Idem: *Glückliche Behandl. des F. T. durch Tauchbäder*, ex *gaz. méd. de Par.* 1836. *N.* 7. in SCHMIDT l. c. *B.* 14. p. 94. STIEBEL l. c. (psychrolusiae frigidae ad spinam). REUFELD, GROSSMANN II. cc. R. J. GRAVES in *the Dublin j. of med. sc.* 1837. *Jul.* N. 33 (psychrolusiarum utilitatem testatur pluribus factis). OLLENROTH *Heil. d. Chorea St. F. durch kalte Bäd. u. Woschung.*, in *med. Ver.-Ztg.* 1838. *N.* 8 (chorea pueri 7 annos nati unice balneis et lotionibus aquae frigidae iatre sex hebdomadas radicaliter debellata). C. RUST *Heil. d. Chor. St. F. durch kalt. Woss.*, in *Form u. Uebergiess. u. Douchen.* ibid. (duo aegrotuli, itidem curati). VEDDER *Foll u. Choreo*; ex *Americ. med. library* 1838. *Fol.* 2. *Jul.* 2. *N.* 7. in FRICKE u. OPPENH. *Ztschr.* 1839. *B.* 10. *H.* 3. p. 413 (embrocatio aq. frigid.).

- 57) Musices adversus morbos nervosos tam saepe mentionem injeci, ut mirum videri non dabeat, si eam etiam adversus choream commendem. Leg. GR. HORST (l. c.) et BAGLIVIVS (l. c.). WICHMANN *Ideen z. Diagnostik.* B. 1. p. 161. Cfr. ALBRECHT tract. phys. de effect. musicae in corp. animale. Lips. 1731. la aigre, de qua KINDER-

sumus, cum in tribus aliis in floribus scilicet ar-

A a 2

ni-

WOOD (l. c.), cum ea, secundum rhythmum saltavit, et eo rhythmum amisso quiescerat, sub paroxysmo duos tympana inordinata pulsabantur, quo facto duo paroxysmi illico cessabant. R. PAPINI sull' uso della musica nella chorea St. V. in OMIDDI ann. univers. 1822. Vol. 21. URSATO BETTOLI opusc. med. Parm. 1834 (religiosam, chorea reballi correptam, musica medio sanavit). BURTON l. c. Da musices effectu mirabili refertur ex repertor. med. chir. di Torino in FRONTIER Natia. R. 42. N. 1. p. 16 (femina 28 annos nata, primum musicon tractari audians, furibundas instar plures dies saltare non cessavit. Festivis diebus praeinterlapis adlucinata est et sex post mensas marasmo diem supremum obiit).

58) o. o. Strychnini acetici (gr.  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  endermice c. successu applicata): BOROX at ROMBERG apud R. A. MAGNUS diss. obs. in method. enderm. Berol. 1831. ROMBERG enderm. Heilversuche in CASPER Wochenschr. 1833. N. 13. p. 242 (in uno casu cum affectu faustissimo, in altero incusum). — Rad. Selini palustris: RAHN in Verhandl. d. med. chir. Gesellsch. des Cant. Zürich. ib. 1828. p. 19. — Secalis cornuti (gr. 8 omni trihorio. Juvenis 17 annor. mox sanatus est): RODENSTAD Fall ein. acuten (?) Veitstanz, durch Secale cornutum geheilt; in med. Ver.-Ztg. 1839. N. 10. p. 32. — Indigo (ad 3j ter in die): HEINE l. c. HEINSIUS in Sanitäts-Ber. f. d. Prov. Brandenb. v. J. 1835. Berl. 1837. — Infusi Nicotianae: KROKER in Gen.-Ber. v. Schlesien f. d. J. 1834. Bresl. 1837. — Amanitae muscar. Camtschadalicae: Med. Conversat.-Bl. 1832. N. 32. — Zinci cyanici: MÜLLER in Ruat Mag. 1825. B. 20. St. 2 (gr. j quater da die). Miscell. pract. Aerzte a. d. 1jühr. Sanitäts-Ber. in HUPFELD Journ. 1823. St. 9. p. 129 (gr.  $\frac{1}{16}$  —  $\frac{1}{4}$  p. d. cum optimo effectu apud puellam 36 annorum, 12 ann. chorea affectam). ASCH in Mitchell. des Württemb. ärztl. Ver. Stuttgart. 1834. p. 543 (gr. iij quotidie sa-

*nicac*<sup>49)</sup>, in *moscho*<sup>50)</sup>, inprimis cum *calomel*<sup>61)</sup>  
et

nabent tribus habdomadibus praeterlapsis). GÜNTHER in *HUFFLAND Journ.* 1835. St. 12 (dosis: gr.  $\beta$ —j omni tribusio. Sanatio). — *Zinci chlorati* (remedii audacissimi): HANKE in *Rust Mag.* B. 22. II. 2 (gr.  $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{4}$ ). CANKQUOIN in *Journ. chimie méd. Par.* 1835. Févr. — *Liquoris argenti mur.-ammoniaci*: GUSTORFF in *Brandenb. San.-Ber.* f. 1833. Berl. 1835. — *Compositorum*: *Pilulas Meratii* (℞. Argenti nitrici gr. VI. Extr. Opii 3j. Moschi ʒij. Camphor. ʒiV. M. F. pil. XCVI. S. Mana et vespere una sumenda et dosis augenda et levamine accessu iterum minuenda) commendat PRION in *Journ. gén. de méd. Par.* 1825. (℞. Extr. Valer., Fumar. et Hyosc., Zinc. oxydst. ana Part. seq. M. F. pil.) DUPUYTRON in *gaz. des hôp. Par.* 1833. N. 13. — *Thermas Amisienses* commendat BRÜCKMANN l. c. *Liebensteinsenes*: J. H. SCHLEGEL *die Mineralq. zu Liebenst. Meinung.* 1827. *Muscavienses*: STERN in *Rust Mag.* B. 26. H. 1. p. 31. *Cervimontanas*: OLLENROTH l. c. — *Ung. Veratr.*, ad dorsum illinitum, tarda debellavit malum: EBERS in *CASPER Wochenschr.* 1835. N. 46. — *Ferri frustulum* aut *clavis*, in aegroti manibus posita, stitit affectiones choreae referante WICHMANN (Ideen z. Diagnostik. B. 1. p. 159); CAMERER (l. c.) autem negat. In tanta remediorum laudatorum copia omnibus persuasum esse debet, veram choreae medelam et naturae maxime convenientem adhuc desiderari.

59) Infusum forte, inprimis in chorea a violentiis capiti aut spinæ illatis, et post inflammationem cerebri ac medullæ spinalis. Porro laudat MOSINA in *Oesterr. med. Jahrb.* 1829. B. 1. St. 4. p. 65.

60) In aegrotis admodum sensibilibus, ac ubi sedes morbi incassum in una systematis nervosi parte quaeritur, *moschus* egregium sistit pharmacum, quod tum ex experientia Patris mei (l. c. p. 310), tum ex propria fateor. Cfr. ZANETTI in *N. Act. nat. cur. T. V. obs. 40. p. 148.*



et maxime in *herba chenopodii ambrosioidis* \*\*), omne, quod desiderare potuimus, auxilium hucusque invenerimus. Multum quoque lucri ab *emplastro vel asae foetidae* vel de *galbano crocato* cum *camphora* et *opio*, super universam spinam posito, obtinuimus, obtinueruntque discipuli nostri. Venus aegro quaedam prodesse videbatur \*\*).

## CAPUT

D. MONAO in *Samml. auserl. Abh.* 5. B. 2. St. p. 216. THURVENEL ib. 10. B. 2. St. p. 352. BARDELEY l. c.

61) Illico chorea fugata est ope horum pharmacorum, moscho scilicet et calomel in filia professoris Viliensis W. (Mense Februario 1819).

62) Sacra mihi ancora in chorea, praesertim ex vitio spinalis medullae, est; ac L'LENKIO toto corde assentior, dicenti *ex omnibus remediis, contra hunc morbum laudatis, chenopodium efficacissimum esse* (De morb. infant. Viennae 1807. p. 31). Exhibetur pulvis bis de die ad scrupulum unum; plerumque tamen infuso utor, incipiendo a drachma una herbae et sensim sensimque ascendendo ad naciā semis pro libra colaturae. Sub usu hujus pharmaci saepe febris ephemera, admodum salutaris, accenditur, quae dein simul cum chorea cessat. Non nisi pravae qualitatis herbae chenopodii ambrosioidis in pharmacopoliis Insubris tribuere possum, pharmacum istud meam in hac Italiae parte saepe pluries frustrasse. — Cfr. de hujus plantae effectui saluti in chorea St. V.: BOKKINS in *Hufeland Journ.* B. 14. St. 2. p. 201. LENTIN *Beitr.* B. 2. p. 211. RAIMANN *Handb. d. spez. Path. u. Therap.* B. 2. p. 632. JAEGER l. c. C. OLEBERGER in *Oesterr. med. Jahrb.* 1832. B. 3. p. 432. CHEVALIER l. c.

63) „Die 13. Decembris 1795 consilium meum petiit Comes\*\*\*, qui ob masturbationis vitium jam 13. aetatis suae anno, symptomata choreae St. Viti passus est: ita ut bra-

## CAPUT XI.

*D e e p i l e p s i a.*

## §. LII.

*Definitio. Literatura.*

Definitio. 1. *Epilepsia*<sup>1)</sup> est morbus chronicus, ex paroxysmis et liberis intervallis compositus, quo-

rum

chiis erubibusque bino inde convulsis, ille, faciei frontique admoveret, hisce violenter per cubile egigaretur, sui non potens, clemens ssepe, et gesticulans. Praetitorum temen non protinus immemor erat. Atque haec ter quaterve in die petiebatur. Cum omnis incassum adhibita fuissent, servus illum ad meretrices duxit, cum quibus cum decubuisset, convulsiones illae longe rarius accedebant; mox vero, si supra diem quintam a meretrice abstinuisset, iterum redierunt, sub hujus usu vix non avertendae. Uxorem igitur dederunt parentes, imprimis cum veros simul peroxysmos epilepticos hinc inde pateretur et memoriam actorum tunc amitteret. Ast vero cum virgine sponse rem, nisi difficulter, hebere vix potuit; introduxit tandem membrum vaginae, sed viribus exhausto, hoc mox collabebatur, et adhuc collabatur *quin semen emittat*, quod semen cum meretrice decumbens emittere solebat. Pollutio nocturna nulla." Ex schedis J. P. FRANK.

- 1) A Gr. *Ἐπιληψία*, desuper prebendo. Synonyma (quorum docta explicatio in HULDRICHI diss. de grav. cerebri affectu, epilepsia. Giss. 1617. §. 1—6. apud SWIFTENICK in Commentar. ad Aph. BORRAAVII §. 1071 invenitur). Morbus secer HIPPOCRATIS, m. major CELSI, m. herculeus ARISTOTELIS, m. comitielis PLINII, convivalis, mensalis,

rum illi insigniuntur motibus abnormibus musculorum, feriatione sensuum ac facultatum animi, nulla inde relicta recordatione.

2. *Litteraturae* extensio argumenti dignitati <sup>Litteraturae</sup> respondet. De epilepsia enim scripsere medicorum principes<sup>1)</sup>, exstantque praeterea de ea monogra-

insepultus PLAUTI, viridellus, vitriolatus, soticus, caducus, lunaticus, fonsus, sideratus, scolasticus, daemonicus (cfr. WILLIS path. cerebri c. 2. „Quoniam — ait ARISTARUS de caus. et sign. epileps. Lib. I. cap. 4. p. 28. — daemone correptus esse videatur“), daifica lues, m. dei-ficus, astralis, snelempsia, analepsia, apopixia parva, adiva gutta, caduce passio, cetalempsia, cataptosis, eclatissima, epilansia, epileptica passio, epilepticus morbus, hiera nosos, mater puerorum, paditlo, Sti Valentis, Sti Joannis morbus, etc. GERM. *Fallaucht, Fallende Nacht, Jammer, Schwere Noth, Böse Wesen, Böse Staup, Böses Zeug, Siechtag.* GALL. *Epilepsie, mal-caduc, haut-mal, mal de terre, mal de St. Jean, mal des enfans.* ANGL. *Epilepsy, the falling sickness.* ROSS. *Падучая болѣзнь.* POL. *Choroba wielka, choroba S. Walentego.*

- 2) HIPPOCRATES de morbo sacro. C. I. CHARTER. T. X. p. 475. Cfr. FR. DINZ Hippocrates de morbo sacro liber. Recensuit, nov. interpretat. lat., notasq. addidit. Lips. 1828. CARLIUS AURELIANUS chron. morb. Lib. I. C. 4. CELAUS Lib. 3. C. 23. p. 172. ARISTARUS acut. Lib. I. C. 5. Chronic. L. I. C. 4 (Optimus inter antiquos de epilepsia scriptor). GALENUS de loc. affect. L. III. C. 7. De puero epileptico. ORIBASIIUS synopsis. L. VIII. C. 3. 4. ANTIUS Tetrab. II. Serm. 2. C. 13. ALEXANDER TRALLIANUS L. I. c. 21. PAULUS ARGENTAE L. III. c. 13. AVICENNA canon. Lib. III. Fem. I. Tract. 5. C. 8. 9. MERCURIALIS consil. T. I. N. 26. 54. 77. T. III. N. 85. IV. N. 30. 56. AMATUS LUSITANUS Cent. II. cur. 6. RIVERIUS Prax. med. Lib.

nographiae permultae<sup>3)</sup>, ducenae et ultra dissertatio-

cap. 7. de epilepsia. Obs. Cent. II. N. 93. THOMAS WILLIS patholog. cerebri. C. 2. 3. PISO de morbis ex serosa coluvie p. 100. 150. BALLONIUS consil. Vol. I. p. 33. 61. II. p. 4. III. p. 43. 52. 118. HORATIUS opp. Vol. II. p. 75. MARCELLUS DONATUS Lib. II. c. 4. ETTMÜLLERUS opp. T. II. P. II. p. 779. Disp. de epilepsia. SENNERTUS Lib. I. med. pract. FACHLINUS Lib. II. obs. 29. WEPFER obs. p. 581. BOERHAAVIUS de morbis nervorum. FR. HOFFMANNUS de vera mali epileptici causa. Hal. 1732. v. Opp. smm. Genév. 1748. 3. Vol. p. 9. SWIETENIUS l. c. (egregius tractatus). HARNIUS rat. med. P. V. c. 4. LENTINUS Beytr. z. auctüb. Arzneyw. 2. B. p. 227. 3. B. p. 144. et in HUFBLAND Journ. 14. B. 1. St. p. 44. 3. St. p. 5. PORTAL mém. sur la nature et le traitement de plus. mal. Vol. II. p. 229. v. Abb. f. pr. Aerzte. 19. B. p. 617.

- 3) GARUCCINI de morbo comitiali. Venet. 1608. v. HALLER Bibl. med. P. II. p. 87. TAXIL traité de l'épilepsie. Tournon 1602. ALSARIUS A CRUCH de epilepsie seu comitiali morbo lection. Bononiens. L. III. Venet. 1603. CARTER exercitationes in epilepsiam. Tolos. 1617. DE VEGA gemule de epilepsia. Append. ad pacem methodicorum cum spagyricis. Genév. 1628. SANTACRUOS praelectiones Vallisolanæ in Hippocratem de morbo sacro. Madrit. 1631. BOUCHÉ de morbo scelesto. Aven. 1634. UNZER tractat. de epilepsia. Hal. 1634. R. A. CASTRO discept. posth. de epileps. Florent. 1640. SCHOENFELDT Tractat. v. d. Kinderwehe, Frais, Hinfallen. Ingolst. 1644. DINERBROECK disp. XV. de Epilepsia. Ultraj. 1652. A KRONKLAND liturgia montis seu disceptatio med. philol. et opt. de nat. epilepsiae, illiusque ortu et causa. Ratisb. 1678. MARCI opusc. med. de natura, ortu et caus. epileps. Ratisb. 1678. MOON tract. de epileps. et convuls. Amstel. 1704. BRISCON traité de l'épileps. avec sa description, ses différences, ses caus. etc. Bordeaux 1742. PIETSCH Erkl., Ursach. u.

Kur v. d. Ohnmacht, u. Convulsionen; vornahml. ab. d. eigentl. fall. Sucht. Hamb. u. Leipz. 1753. WESTPHAL de epilepsia et motuum convulsivorum infantum praecipuis causis. Gryphiae 1766. ANDRÉN *cases of epilepsy, hysteric fits and St. Vits Dance.* Lond. 1764. MANGOLD progr. de epilepsiae speciebus nonnullis, in ejusdem opusculis medic. phys. Altenb. 1769. THREVEL *essay on epilepsy.* Lond. 1772. HINSENEL *Gedanken, die Heilungsart der fallenden Sucht betreffend.* Berlin 1770. MIETAN 1774. SAILLANT *mém. de l'acad. r. de méd.* 1779. N. 17. TISSOT *traité de l'épilepsie in oeuvres.* Edit. Lausan. T. VII. 1781 (tractatus classici). Germ. Berol. 1771 et Lips. eod. anno. BATT *essai medico-pratique sur l'épilepsie.* Genève. HENNING *analecta lit. epileps. spect.* Lips. 1798. DOUBREVILLE *de l'épilepsie en général et particulièrement de celle déterminée p. des caus. moral.* Lips. 1798. Germ. Mannh. 1799. DIÜTOPHILUS *phys. u. physiolog. Geschichte ein. 7jähr. Epilepsie, v. d. Genesen. selbst u. s. w.* Zür. 1798. *Ausführl. Krankengesch. ein. Fallsüchtig. mit d. Rathgeb. u. d. Verfahr.* Thedens u. Stoll's. A. d. Latein. Brem. 1799. FRAZER *treatise on epilepsy.* Lond. 1800. DREYSSIG *Handwörterbuch der med. Klinik.* 3. B. 2. Th. Erfurt 1817. p. 187—398. ESQUIROL *dict. des sc. méd.* T. XII. p. 510. MAISONNEUVE *recherches et observ. sur l'épilepsie.* Paris 1800 (Opusculum commendationis dignum). LULLIER *propos. méd. sur l'épilepsie.* Paris 1803. BEYERLE *Gesch. s. merkw. Epilepsie unter manch. Gestalten u. Verbindungen.* Mannh. 1814 et 1818. E. LÖBENSTEIN-LÖHRL *Wissen u. Heil. d. Epilepsie.* Lpz. 1818. B. STRUBEL *Gesch. ein. glüchl. behandelt. Epilepsie.* in HUFELAND *Journ.* 1821. St. 1. p. 39. LARRET *üb. d. Fallsucht, ex revue méd.* 1822. Juill. in GREGSON u. JUL. *Mag.* 1822. B. 4. p. 334. J. G. MANSFORD *Untersuch. üb. d. Nat. u. Ursach. d. Epilepsie, nebst ein. neuen u. glüchl. Heilmethode derselb.* A. d. Engl. übers. v. L. CERETTI. Lpz. 1822. M. GEORGET *üb. d. Physiol. des Nervensyst. . . .* Untersuch. üb. d. Sitz, d. Nat. u. Behandl.

handl. . . d. *Epileps.* A. d. Fr. v. G. J. KUMMER. Lps. 1823 (opus archetypum prodiit Par. 1821). J. COOKE *hist. and method of cure of the var. spec. of epilepsy; being the second part of the second Vol. of a tr. on nerv. diseases.* Lond. 1823. CALMEIL *de l'épileps. étudiée de son siège etc.* Par. 1824. D. WILLIAMS *case of epilepsy; in the Edinb. m. and s. j.* 1825. Octbr. p. 297. G. J. MOST *Nachr. üb. mein Krankeninat. z. Kur epilept. Person., nebst einig. Erfahrung.* üb. d. Nat. u. Heil. d. *Epileps.*, in *Horn Archiv* 1825. II. 3. p. 396. II. 4. p. 1. BOUCHET et CAZAU-  
VIEILLE *de l'épileps. considérée dans ses rapports avec alié-  
nation mentale. Recherch. sur la nat. et le siège de ces  
deux malad.; mém. qui a remporté le prix etc.* Par. 1826.  
PORTAL obs. sur la nat. et le traitem. de l'épileps. Par. 1827.  
Vers. germ. (qua ntor) a C. CH. HILLE. Leipz. 1828. et  
J. A. L. W. HERMEL. Stendal 1830. SCHNEFFER *Heil. ein.  
Epileps.* in *Hufeland Journ.* 1830. St. 4. p. 127. D. RI-  
DAIL *essai sur l'épileps. et en particul. sur son traitem. ra-  
dical.* Par. 1830 (artatum commendat). ELLIOTSON *Epi-  
leptis in Verb. mit Hypochondrie in Folge v. Onanie,* ex  
*the Lancet.* 1831. Jan. in *BEHREND allg. Repert.* 1831. Jul.  
p. 32. et ex *The Lond. med. Gaz.* 1831. Noubr. et 1832.  
March, Apr. in *BEHREND l. c.* 1832. Apr. p. 25. et Spébr.  
p. 250. F. HAWKINS üb. *Gesch. u. Behandl. d. Epilepsie,*  
in *BEHREND l. c.* 1831. Dezbr. p. 351. SIEDLER *Erfahrung.*  
üb. d. *Epileps.*, durch mehr. Fälle glüchl. Heil. dies. Ueb.  
dargest. in *Hufeland Journ.* 1831. St. 2. p. 3. 1832. St. 5.  
p. 3. 1833. St. 3. p. 3. 1834. St. 5. p. 3. 1837. St. 3. p. 78.  
F. F. G. EGGER *das Wesen d. Epileps.* in *HUCKER lit.  
Ann.* 1832. II. 7. p. 241. C. A. TOTT *einige Fälle v. Epi-  
leps. u. Veitstanz, nebst ein. neuen Beweise üb. d. Mit-  
theilbarh. d. Falleucht;* in *Allg. med. Ztg.* 1834. N. 1.  
R. W. SCOTT üb. d. *Epileps. u. d. Mittel, ihre Paroxysm.*  
*zu mildern;* ex *Liverpool m. j.* 1834. Mai in *SCHMIDT  
Jahrb.* 1835. II. 6. p. 80. SCHWALZ *Epileps. gehéilt;* in  
*Summar. des Neuest. u. Wissenswertigst.* 1835. H. 12. p. 256.

BRUN

tationes inaugurales \*) et totidem fere memoriae academicae †).

## §. LIII.

BEAU statist. *Untersuch. z. Gesch. d. Epileps. u. Hysterie;* ex *Archiv. gén. de Par.* 1836. Juill. in SCHMIDT *Jahrb.* 1837. B. 13. p. 297. B. RITTER *merkwürd. Fall ein. Epileps.* in GRAYE u. W. *Journ.* 1839. B. 28. H. 2. p. 257 et plurimi, passim citendi.

- 4) PLOUQUEUR *Littérature med. digeste.* T. II. Tübing. 1808. Art. Epilepsie. Quibus recentiores addi debent: E. F. BILLY diss. de epilepsia. Vienn. 1814. E. F. W. SCHMAUS diss. de epileps. et speciatim de epileps. mad. spia. propria. Erl. 1814. C. E. GHEHMANN diss. de morbo comit. Berol. 1821. F. A. STAHR diss. da epilaps. Vratisl. 1822. E. J. MATTERSDOERFF diss. da epileps. Berol. 1823. J. J. C. TH. RÖHL diss. de morbi comitial. singulis speciebus. eorumq. cures. Berol. 1823. B. E. NUNOV diss. morbi arcuati singular. hist. aist. Lips. 1826. P. J. RICHTER diss. de epileps. Berol. 1826. C. F. G. RIENSCH nonnulla da paroxysm. epilept. Berol. 1827. W. MARINKOVITS diss. de epilaps. Pest. 1830. F. H. RING diss. de epileps. Pest. 1831. J. E. ROHRER diss. de epileps. Vian. 1832. G. STANLY diss. de epilaps. Budae 1832. F. J. N. LINSSE diss. de epileps. Berol. 1832. DIFFENGRABEN diss. de epileps. praecipue ad simulationem respectu. Wiasbad. 1833. C. MUSA diss. de epilepsia. Prag. 1834. FR. BUKKEN diss. de epileps. Berol. 1834. J. KANDLER diss. de epileps. Vindob. 1834. J. HOMANN diss. de epileps. Vindob. 1834. W. STABENOW diss. de epilaps. Gryfiav. 1835. M. MOSING diss. de epileps. Vindob. 1835. TH. A. KIERMACHER diss. de epileps. Berol. 1835. L. MALTIN diss. quaed. de epileps. Peduae 1836. K. W. RADTKE *Diss. üb. d. Epilepsie.* Würzb. 1836. Osw. RUSMANN diss. de morbo ratio. Pad. 1836. A. FR. TH. RACHOW diss. de epileps. Rostock. 1836. A. BODINI diss. de epileps. Pav. 1837. F. H. FREDERICHs diss. de epileps. Rost. 1837. C. J. KANZLER diss. de epi-

## §. LIII.

*S y m p t o m a t a.*genera-  
tim.

1. Epilepsiae *symptomatologiam* sequenti exponemus ordine <sup>1)</sup>, scilicet: 1° de phaenomenis morbi, evolutionem praecedere solitis; 2° de prodromis singulorum paroxysmorum; 3° de paroxysmo et 4° de intervallis liberis.

De phaenomenis morbum praecedentibus.

2. Epilepsia rarissime homines, qui per totum vitae curriculum omnino sani fuerunt, invadit <sup>2)</sup>. Eligit praecipue illos, qui obnoxii fuere: convulsionibus tempore primae dentitionis<sup>3)</sup>, achoribus et lineae capitis, cephalalgias, hemicraniae, vertigini, delirio <sup>4)</sup>, animi pathematibus effrenis, praecipue irae; epistaxi <sup>5)</sup>, ophthalmiis, aurium blennorrhoeae et susurrui, balbutiei, glandularum submaxillarium tumori, strumae <sup>6)</sup>, anxietati, cordis

lepsia. Berol. 1838. FR. A. RANIER diss. nonnulla de pathologia epilepsiae. Berol. 1838. FRANZ GIRARDI diss. nonnulla de epilepsia. Pav. 1838.

5) REUSS repert. commentat. a Societat. literar. editar. T. XIII. Goett. 1818. p. 74—101.

1) „Imminentis epilepsiae signa dupliciter considerari possunt: vel prout primam morbi invasionem praesagiunt, vel prout imminentem paroxysmum significant.“ RIVERTUS Prax. Med. l. c.

2) Lege TISSOTUM op. c. art. 13. *Des maladies qui précèdent l'épilepsie.*

3) Hanc observationem pluries confirmatam habeo

4) TISSOT l. c. p. 175.

5) In pueris epilepticis fere omnibus. SIEDLER l. c. cas. quartus.

6) In puero 12 annorum Ann. 1815 in Clinico Viliensi. Cfr. STANL theoria med. pathol. dec. 2. memb. 4. p. 1017.



dis palpitationi, lipothymiis, cardialgiis<sup>7)</sup>, colicæ<sup>8)</sup>, ictero<sup>9)</sup>, physconiae, alvi obstructioni, diarrhoeis, vermibus, febribus intermittentibus, continuis, exanthematibus, imprimis variolis, morbil-  
lis, et scarlatinae, psorae, herpeti, hysteriae<sup>10)</sup>,  
crampis, tremoribus, paralysi<sup>11)</sup>, catalepsi<sup>12)</sup>,  
choreae Sti Viti<sup>13)</sup>, contusionibus, vulneribus,  
praesertim encephali et specus vertebralis.

3. *Epilepsiae singuli paroxysmi rarissime in-* Prodroma  
singulo-  
rum paro-  
xysmo-  
rum.  
*gruunt, quin quodam signo non annuntientur*<sup>14)</sup>.  
Dari tamen epilepsias, quorum paroxysmi, nullo  
praevio nuncio, extemplo, fulminisque instar in-

VA-

7) PORTAL l. c. p. 181.

8) Eph. nat. cur. Dec. III. an. obs. 6. GALEBUCHNER Cent. I.  
p. 169.

9) HORATIUS Opp. Vol. II.

10) ANDRÉ on hysteric fits. p. 27.

11) G. HORST obs. med. L. IV. libr. prior Ulmæ 1628.  
L. II. obs. 41. POTZ Beob. e. Hemiplegie die v. e. Erhölt.  
herkam, u. in e. period. Epilepsie übergieng (Museum d.  
Heilk. 4. B. p. 279).

12) WUPPER de morb. capitis. obs. 125. 126. p. 573. 574.  
Cfr. P. II. ed. alt. Vol. I. Sect. I. C. XIV. §. LXII. 1 (9).

13) In virgine 18 annorum, an. 1812 in Clinico Vilmensi  
decumbente, sex ante epilepsiae evolutionem menses.

14) WROELIUS (epist. prax. clin. p. 119) de viro scribit,  
qui cum sponse ludens elee, cum paroxysmum imminere  
sentiret epilepticum, properavit in conclave eum, et  
lecto incidens facie prona, cum nemo sciret, quare seces-  
sisset, hinc aliquo tempore post, mortuus fuit repertus.  
GRONERT contenderet, inter centenos epilepticos non plu-  
res, quam quinque sentire prodroma; et BEAU (l. c.  
p. 299) merito ei repugnat.

vadant, et aliorum<sup>15)</sup> et nostrae observationes<sup>16)</sup> docent. Generatim *signa* paroxysmi *prodroma* sunt: sensus formicationis nunc in universa corporis superficie, nunc una tantum in parte<sup>17)</sup>, e. c. in brachiis, ad dorsum; vitiligines<sup>18)</sup>, crampus<sup>19)</sup>, rubor faciei<sup>20)</sup>, vasa capitis turgida<sup>21)</sup>, illius gravitas, obnubilatio, dolor obtusus, vertigo<sup>22)</sup>, somnus profundior solito<sup>23)</sup>, insomniis, concussionibus<sup>24)</sup> gestibusque peculiaribus<sup>25)</sup> perturbatus; vigiliae<sup>26)</sup>, visiones<sup>27)</sup>, halucinationes

va-

15) HENKE *Handb. d. spec. Pathol.* 2. B. p. 358. §. 1175 (Errat vero, dum contendit, saepius prodroma deesse).

16) Ne de pueris epilepticis loquar, utpote qui de propriis sensationibus difficulter debitam rationem reddunt, ad adultos provoco, quorum plurimi ex meis aegrotis paroxysmi advantum neutiquam praevidebant, ita ut nullo securitatis momento vel domi vel foras fruerentur. Terribilis conditio!

17) In crucibus: KAHLERT in CLARUS u. RADTKE *wöchentl. Beitr.* 1834. B. 3. N. 22.

18) An. 1816 mense januario judaeus pilcosus 25 annorum consilium meum pro epilepsia exposcebat, quae ab octo jam annis sine nota causa laborabat, cujusque paroxysmi omni mense, praevia *vitilagine alba*, ancepta facie, universum corpus obtegant, annuntiabantur. Finito paroxysmo impetigo evenescebat per tres septimanas. Alias impetigines, ut epilepsiae prodroma, observavit TISSOT et PORTAL l. c. p. 123. 124.

19) LOCHNER obs. pract. p. 41. v. POMMER l. citando.

20) SINDLER l. c. cas. VI. 21) PORTAL *cours d'anat. méd.*

22) PORTAL superiori l. c. p. 116.

23) GOMBER l. citando. SINDLER l. c. cas. VIII.

24) GOMBER l. citando.

25) a. c. frictione labiorum (DREYER l. c. p. 192).

variae<sup>26</sup>), tristities cum proclivitate ad iram<sup>27</sup>), timor<sup>28</sup>), serenitas mentis inconsueta<sup>29</sup>), amnesia<sup>30</sup>), temulentia, scintillae, iridis colores<sup>31</sup>) ante oculos, a caligine obfuscatos, corruscantes; caecitas<sup>32</sup>), lacrymatio, strabismus, susurrus aurium<sup>33</sup>), perceptio morbosa odorum<sup>34</sup>), saporis dulcis<sup>35</sup>); sternutatio, salivae profluvium<sup>36</sup>), lingua debita volubilitate destituta, gravis, oscitatio<sup>37</sup>), pandiculationes, singultus<sup>38</sup>), anxietas, incubus<sup>39</sup>), cordis palpitatio<sup>40</sup>), constrictio faucium,

26) SIEDLER l. c. cas. VI. VII.

27) GODART in *journal, de méd.* T. 13. p. 393 (objectis justo majora apparentia) FORTIUS med. consider. rar. (femina visa sibi quasi in speculo suam imaginem videre).

28) PERRONX obs. med. p. 90. PORTAL l. c. p. 116. 117.

29) SIEDLER l. c. cas. VIII. KAMLER l. o.

30) In puella 13 annorum, ann. 1816 in clinico Vilsensi degente, eppropinquans paroxysmus peculiari *timiditate* annuntiabatur.

31) PAULLINI obs. phys. med. Cent. III. obs. 13.

32) GODIER l. citando.

33) ARETAUS de caus. et sign. morb. ecut. L. I. c. 5.

34) Eph. nat. cur. Dec. II. an. 7. obs. 161. Dec. III. An. 5. 6. obs. 28.

35) DREYSSIG l. c. p. 197.

36) An. 1815 puer duodecim annorum quondam tinea capitis et epistaxi obnoxius in clinico Vilsensi degens, qui sine evidenter causa in epilepsiam incidit, quorum paroxysmi a vertigine et anxietate nec non a *saporis dulcis perceptione* annuntiantur.

37) Idem puer. PORTAL l. c. p. 121.

38) In multis.

39) In ancilla an. 1798 in nosocomio Viadobonensi degente.

40) FORRATUS L. X. Obs. 53. — Cfr. P. II. ed. alt. Vol. I. Sect. I. C. X. §. XLVI. 1.

cium, pectoris<sup>41)</sup>, abdominis, nausea, vomitus<sup>42)</sup>, borborygmi<sup>43)</sup>, faeces peculiari foetore insignitae, urina copiosa aquea, cruenta; priapismus<sup>44)</sup> et maxime *aura* sic dicta *epileptica*, sensus scilicet afflatus frigidi vel calidi, a quodam corporis loco ad caput ascendentis, interdum inde descendens<sup>45)</sup>, vel in epigastrio desinentis<sup>46)</sup>. Loca, ex quibus aura originem ducere solet, testantibus propriis et aliorum observationibus, sunt: extremitates superiores<sup>47)</sup>, inferiores<sup>48)</sup>, digiti manuum<sup>49)</sup>,

41) *Anfall v. Epilepsie*. Ex the Lond. med. and phys. j. 1827. *Declr.* in *FROHNE Notiz*. 1828. B. 19. N. 16 (aeger de samatipso epileptico refert). PORTAL l. c. p. 181.

42) SIEDLER l. c. cas. VI. KAHLERT l. c.

43) Inter 21 epilepticos, in clinico Vilsensi pertractatos, vomitus apud septem appropinquantem annuntiabat paroxysmum.

44) v. POMMER in *Heidelb. klin. Annal*. 1827. B. 3. H. 1. p. 119. Puer, de quo infra.

45) „Priapismum patiebatur, antequam in paroxysmum epilepticum laboraret, vir a me observatus.“ Ex sched. J. P. FRANK.

46) Aura epileptica a partibus superioribus descendens fuerat observata a SCHULHAMMER in M. N. C. Dec. II. an. 7. p. 374.

47) *Anfall v. Epilepsie*. l. c. KAHLERT l. c. COLLEN (*Anfanggr. d. pr. Ark.* 2. Aufl. nach d. 4. Engl. Übers. B. 3. p. 346) fatatur, anam epilepticam nequaquam nervorum curriculum saqui, quod certe difficulter demonstrandum foret.

48) Eph. nat. cur. Cent. I. obs. 88. E manu dextra: PR. DENIS l. citando.

49) RADENACHER in *Lodov. Journ. f. d. Chirurg.* 4. B. 1. St. p. 53. M. v. WOLFF in L. LEO *Mag. f. Heilk. u. Nat.*—

num<sup>50</sup>), pedum<sup>51</sup>), inguina<sup>52</sup>), hypochondria<sup>53</sup>), abdomen<sup>54</sup>), lumbi<sup>55</sup>), columna vertebralis<sup>56</sup>), vertex<sup>57</sup>) etc.<sup>58</sup>). Quacunque vero ex parte aura epileptica veniat, dum extinguitur, paroxysmus ingruit.

4. Ingruit, inquam, et ut plurimum cum eju-Paroxys-  
latu<sup>59</sup>), quandoque cum exclamatione<sup>60</sup>), quorum<sup>mus.</sup>  
tamen miser jam conscius non est. Maxima aegrorum pars illico retrorsum humum prosternitur. Sunt tamen, qui prius gressus adhuc instituant<sup>61</sup>),

OC-

*Wissenschaft, in Polen. Warschau 1828. I. II. 4. p. 522. obs. 2.*  
SENNOLA I. citendo.

50) LANOTTE Chirurgie. obs. 177. In digito minimo manus  
sinistras. F. FERRARA in BEHREND *allgem. Repertor.* 1831.  
Aug. p. 178.

51) Eph. nat. cur. Dec. II. an. 1. obs. 161.

52) BONETUS sepulchr. anat. L. I. Sect. 12. obs. 44. C. F.  
DÜRR in *Schweizer. Zeitschr. B. 2. H. 1.*

53) Eph. nat. cur. Dec. I. an. I. obs. 81.

54) GODART *journal. de méd. T. 18. p. 40.*

55) HELLWIG obs. phys. med. Aug. Vind. 1680. N. 56.

56) In encilla 17 annorum, an. 1816 in clinico Vilnensi decumbente, aura frigida per spinam vertebralem ascendebat.

57) FERNELIUS Patholog. Lib. V. C. 3.

58) Maxilla inferior: EILSNER in HUFSLAND *Journal.* 1832.  
St. 11.

59) DE HAEN I. citendo. PORTAL I. c. p. 120 (uxor epileptica summi belli ducis, d'Etrée, ut patittecus clamorem edidit).

60) Puella 15 annorum, an. 1816 in clinico instituto Vilnensi observata, (de qua supra) ingruente paroxysmo *Jesus* exclamabat.

61) BOOR de effect. omist. c. 6. SCHENK obs. med. L. I.  
N. 202. PORTAL I. c. p. 120 („Ich kannte eine Dame, die  
Frank Prax. II. I. 2. 1.

Bb

occurrent<sup>62</sup>), in gyrum trahantur<sup>63</sup>), in circulo decurrant<sup>64</sup>), saltent<sup>65</sup>), aut totum stante corpore absolvant paroxysmum<sup>66</sup>). Quocunque in casu evoluto paroxysmo pungi et uri possunt, quin  
vel

*biweilen zu ihrem Bette oder zu dem ihrer Kammerfrau noch gehen konnte, um sich darauf zu werfen*“). (Plurimus vidi).

- 62) ESQUIROL in *dict. des sc. méd. Art. Epilepsie*, p. 514. *SEMOLA sopra una finora non osservata malattia (epilepsie cursoria)*, in *Il filatro Sebenio*, 1834. Agosto. *Gaz. méd.* 1834. Octbr. N. 40. v. GIBSON u. JUL. *Mag.* 1835. H. 2. GODIER l. citando („Einmal war sogar der Anfall so heftig, dass der Kranke in demselben aufsprang u. durch mehrere Zimmer lief“).
- 63) KRIEGER *diss. de epilepsia rotatoria*. L. Bat. 1792. Puer 11 annos natus, an. 1808 in clinicam Vilmense susceptus, (de quo in actis mais clinicis fortuito quaestio instituta non est) ingruente paroxysmo gressus adhuc faciens, in gyrum rotabatur, ita ut a custodibus, antequam humum caderet, lacto fera semper committi potuerit. Cfr. VALENTIN in *prax. med. infall.* p. 436. WEDER in WIELSCHU *diss. de epilepsia*. Jenae 1719. p. 26. ESQUIROL l. c.
- 64) BANG *prax. med.* Hafn. 1789. p. 357.
- 65) FAENICIUS *diss. de epilepsia saltator*. Giesse. 1738. Eph. ac. nat. cur. Dec. III. an. 4. obs. 68. an. 9. 10. App. 175. PHILIP *hist. epilepsiae saltatoriae a causa abdominali et rheumatica ortae, magnetismo animali felicitur curatae*; in *comment. soc. phys.-med. Mosquensis* 1827.
- 66) Puer 14 annorum in clinico Vilmensi anno 1816 degens, praeter magnos epilepsiae paroxysmos, sub quibus humum prosternebatur, minores quoque patiebatur, sub quibus quasi meditabundas capita retracto, oculis sursum conversis, sensibus internis at externis faliantibus, *situm erectum sustinebat*. Duratio paroxysmi ad pence horae momenta protrahabatur.

vel minimum doloris indicium manifestent. Paucis epilepsiae exemplis cum motibus abnormibus *partialibus*<sup>67)</sup> aut *unius lateris*<sup>68)</sup> exceptis, *universum corpus* modo adeo horrendo concutitur convelliturque, „ut, si se mutuo in accessionibus spectantes aegroti, quaecunque patiuntur, cerne-  
rent, non ultra vitam ducere tolerarent“<sup>69)</sup>. Caput mira velocitate et vi undique tractum rotatur, flectitur, et, nisi praesentes succurrant, occipite humum, temporibusque parietes, vicissim allidit. Quandoque collum riget inflexile, aliquando pronum incurvatur, ut maxilla pectori adhaerescat, in aliis versus scapulas retroflexum caput jacet, velut in illis, qui per vim crinibus trahuntur. Frons et cutis capillata capitis miro quandoque agitantur modo, pili eriguntur, supercilia moventur, deprimuntur et ad se mutuo accedunt simul, ut fit in hominibus indignantibus: oculi tunc fixi,

B b 2

tensi,

67) BALLONIUS *paradigmata*. N. 184. MARCELLUS DONATUS de hist. med. mirabili. Frcf. 1613. L. II. C. 4. p. 156.

68) AMELUNGEN de epilepsia e sinistro latere. (Misc. acad. nat. cur. Dec. II. an. 4. p. 194). MARCLIN de epilepsia solius sinistri lateris eaque period. feliciter curata. (Ibid. Dec. III. an. 5. et 6. p. 580).

69) Sunt verba ARETAEI I. c. c. IV. de curatione morbi comitialis. Sequuntur illa SWERTENII I. c. §. 1073. paucis additis animadversionibus. Cum TISSOTO enim fateor (I. c. p. 3. Art. 1), summum BORNHAVII interpretem curriculum morbi tam graphice conscripsisse, ut nil supersit quam illius uti verbis. Interim SWERTENII epilepsiae descriptionem ex ARETAEANO maxime depromptam esse, ipse magnus vir candida fatetur.

tensi, prominuli, ut in iratis apparent. Palpebrae agitantur, et clauduntur plerumque, sed palpitantes et tremulae raro integre clauduntur, sed inter palpebrarum distantes limbos oculi album apparet; saepe et sub palpebris clausis oculi magna velocitate rotantur<sup>70)</sup>, ita tamen ut fere semper cornea sub palpebra superiori occultetur. Oculi hinc, et imprimis pupillae, exploratio non sine difficultate locum obtinet. Attamen in multis corneam invenimus, splendore destitutam, fere rugosam, veluti cadaverosam, atque in nonnullis pupillam modo normalem, modo dilatatam, modo angustam, cum iridis motu nunc protracto, nunc deleto, nec semper sibi in utroque oculo simili<sup>71)</sup>. Nunquam vero indicium obvenit, aegros lucem percipere, aut inde male affici<sup>72)</sup>. Facies tumida, rubra, pallida, saepissime livida celerrima vicissitudine omnes animi affectus exprimit; labia con-

70) „Die Augen gerathen in convulsivische Bewegung, Blitze erscheinen“ etc. *Anfall v. Epilepsie*, l. c.

71) Pupillam dextram normalem, sinistram dilatatam vidi in femina 28 annorum, quae epilepsiae insultum an. 1811 in clinico Vilsensi perpesa est.

72) Facile hinc est, varias euctorum observationes de conditione pupillae sub paroxysmo epileptico conciliare. Angustam esse contendunt SPRENGEL *Inst. med.* T. IV. Path. spec. p. 610. §. 596. HENKE *Handb. d. spec. Therap.* 2. H. p. 368. Contrarium defendunt METZGER *Syst. d. gerichtl. Arzneyw.* 4. Aug. 1814. p. 383. 384. SCHMIDTMÜLLER *Handb. d. Staatsarzneyl. Landst.* 1804. p. 238. SCHMALT *Vers. v. med. chir. Diagnostik in Tabellen.* 2. Aufl. Dresd. 1812. p. 115 N. 9. Cfr. DARTRE l. c. p. 200 sq.



contracta et elongata in acutum exporriguntur rostrum; mox retracta oris rictum ad aures fere neque producunt<sup>73)</sup>. Spuma tenax, ductilis, alba, saepe eruenta ore expellitur, labisque ac nares obducit. In nonnullis saliva odoris cadaverosi<sup>74)</sup>, ac sanguis ex auribus manans<sup>75)</sup>, observabatur. Haud raro occurrit stridor dentium, quorum fragmenta eliminantur<sup>76)</sup>. Maxilla inferior quandoque a superiore abducitur tanta vi, ut luxetur antrosum<sup>77)</sup>. Aliàs ea trisimi instar superiori adhaeret. Saepissime mutuo adductis maxillis, lingua ex ore forte hians prominens et intercepta, graviter dentibus vulneratur<sup>78)</sup>, vel pars ejus integra abscinditur<sup>79)</sup>. Venter et praecordia intumescunt. Respiratio miris turbatur modis; in multis oritur nisus validus respirationis, ut in illis, quibus suffocatio imminet, et edunt talem sonum, qualem vidimus in robustissimis hominibus, dum valido nisu grave pondus elevare, vel obstaculum quoddam removeere conantur. Plurimi rhon-

73) Quod tam celeri reciprocatione factum vidit BOERHAAVE, ut in vertiginam reperet videntem.

74) TISSOT l. c. p. 5.

75) MACBIDE *system. Eintl. in die theoret. u. prakt. Arzneyl.* 2. Th. p. 296.

76) SWINTEN l. c. Eph. nat. chr. Dec. II, an. 7. obs. 110. Cfr. hist. mirabil. §. LVIII. N. 4 (46).

77) SWINTEN l. c. BURNHUIS Vol. III. P. II. §. 263. C. J. KIRSCHNER diss. de maxillae inferioris divaricatione teratode. Berol. 1823.

78) Pluries glossitidem inde ortam vidi.

79) ARTHURUS. TURNER *Art of surg.* T. I. obs. 54. p. 358.

rhonchos ducunt et stertore prehensi, suffocari videntur. Alii murmurant verba intersecta et incohaerentia, mugitus edunt<sup>80</sup>), animalium voces imitantur, rident<sup>81</sup>) et cantant<sup>82</sup>). In brachiis, manibus et digitis fiunt omnes motus extensionis, flexionis, rotationis, pronationis, supinationis. Tanta interdum occurrit convulsionum vis, ut aegri nullo pacto coerceri possint<sup>83</sup>), aut, si coercerentur, ossa frangantur<sup>84</sup>). Praesertim vero contrahuntur manus, incluso pollice. Pugno pectus immaniter feriunt<sup>85</sup>). In femoribus, cruribus et pedibus similes motus obveniunt, ac aegri, jugulatis tauris hand absimiles<sup>86</sup>), valide calcitrant. Pedum digiti quandoque adeo incurvati, ut apex hallucis calcaneum attingat. Pulsus incipiente paroxysmo celer et parvus, in fine vero major, sed languidus et tardior, in universum inordinatus. Cor nonnunquam vehementer vibrat<sup>87</sup>), sanguis

80) Cfr. §. LVIII. N. 4 (45). SEMMOLA l. c.

81) ROESLER de risu involunt. in paroxysmo epilept. Misc. ac. nat. sur. Dec. I. an. 3. p. 526. Dec. III: an. 5. 6. Opp. p. 132.

82) Commerc. lit. Norimb. 1741. p. 71. v. §. LVI. N. 6.

83) ROSEATUS SIBSALDUS in *Scotia illustrata* exemplum habet da puella epileptica, quae patrem suum, alius virum robustum, in coercenda aegra intentum, secum ad altitudinem trium pedum et ultra a solo elevabat.

84) J. SMITH in *the Lond. med. repos.* Vol. 4. 1815. Sept. Crus utrumque in aethiope fractum refertur in *Götting. Anzeig.* 1771. 3. St. Hujusmodi exempla plura collegit PORTAL l. c. p. 125 sq.

85) DE HÄHN rat. med. T. II. p. 291.

86) Comparatio ARETAEL. l. c.

e naribus erumpit<sup>87)</sup>, singultus<sup>88)</sup> urget. In plurimis borborygmi<sup>89)</sup> per abdomen tumidum decurrunt, flatus<sup>90)</sup>, faeces, urina<sup>91)</sup> et sperma involuntarie et cum vi<sup>92)</sup> excernuntur<sup>93)</sup> ac anus prolabitur<sup>94)</sup>. Gravidæ sub paroxysmo partum absolvisse sunt visæ<sup>95)</sup>. Testiculi saepe ad annulum abdominalem usque, nunc cum, nunc sine penis erectione retrahuntur. Haud raro vomitus et copiosa flatuum eructatio<sup>96)</sup> urget. Somnus,

sive

87) PACHLIN l. c. L. II. obs. 29. p. 285. Pluries ipse observavi. Asgar, qui de samat ipso refert (l. c.), hoc symptoma observavit et addit „das Herz wie von einer Hand umfasst.“

88) STAHL. Ther. med. ver. p. 1366.

89) WHEISS de singultu epilapico in Act. acad. nat. cur. Vol. 3. p. 225. Pluries vidi.

90) Et fragor. v. HAGEDORN Cent. I. obs. 10.

91) Praesertim declinante paroxysmo. v. Ephem. nat. cur. Dec. II. an. 8. obs. 101. Ex historie virginis epilepticae etque maniacae a Dr. WOLFF, medico Limburgensi, ad me missa, comparuit, hanc aegram, sub ipsis epilepsiae paroxysmis, flatus quam foetidissimos emisisse. Ex schedis J. P. FRANK.

92) DE HAHN l. c.

93) Urina in infante epileptico ad decem pedum altitudinem prosiliebat. v. BAUERS v. d. Konvuls. d. Kinder. A. d. Fr. Leipz. 1791. §. 418. p. 328. Idem vidit PONTAL l. c. p. 129.

94) Haec symptomata aliquando initium paroxysmi constituerent, jure monent WEPFER hist. cicut. aquat. Bas. 1716. p. 6. et SCHENK obs. med. C. p. 119.

95) SALMUTH Cent. I. obs. 31.

96) AMBLUNKEN mulier epileptica in paroxysmo periens gemellos, Misc. sc. N. c. Dec. II. an. 4. p. 213.

sive potius sopor<sup>99</sup>), sudor copiosus, et aliquando foetidus<sup>99</sup>), praesertim ad caput, collum et pectus, nec non apnoea<sup>100</sup>), aphonia<sup>101</sup>), et pollicum explicatio<sup>102</sup>), finem paroxysmi praesagiunt. Aeger, quid illo vigente contigerat, plane ignorat. Duratio paroxysmi varia, a paucis horae momentis ad horam unam alteramve usque<sup>103</sup>). Saepe unus isque diuturnus paroxysmus ex plurimis aliis iisque brevibus componitur, concessa quadam quiete intermedia. Redeunt paroxysmi, quovis anno<sup>104</sup>), mense<sup>105</sup>), quavis hebdomade<sup>106</sup>),

vel

97) De epilepsia cum ejectione per gulem scorabessorum (!)  
legitur in Misc. nat. cur. Dec. II. en. 1. 1682. p. 316.

98) CILIANO de epilepsia somnifera (Act. acad. N. cur. Vol. 9.  
p. 361).

99) De HAEN ratio medendi P. V. C. 3. §. 5.

100) In femine 30 annorum in clinico Vilnensi an. 1811.

101) Sic in puero illo duodecim annorum, qui an. 1815 in  
clinico Vilnensi decumbebat.

102) WUNDERLICH.

103) BARNETTE praxis medicinae et chirurgiae p. 14. *Voyage  
de la Perouse. T. IV.* p. 65.

104) Tale exemplum sub oculis habui. Cfr. TESTA Bemerk. üb. d. period. Veränd. u. Erscheinen in krank. u. gesund. Zustände d. menschl. Körper. Leipz. 1790. p. 293 (Omni anno festo Sti Joannis rediens). AMELUNGEN Misc. N. cur. Dec. II. en. 4. p. 198 (Die natali parentum). SEYMKEWICZ, medicus quondam Vilnensis, mihi an. 1816 retulit, se curare epilepticum, cujus paroxysmi semel de anno die aequinoctii autumnalis jam per lustrum regulariter redeunt.

105) Plurima mihi obvenērunt exempla, inter quae illud saltatoris Itali *Angiolini*, qui omni mense lunari aeque regulariter in paroxysmum incidebat, ac feminae cata-

vel semel<sup>(107)</sup>, bis, ter<sup>(108)</sup>, sexies<sup>(109)</sup> et ultra<sup>(110)</sup> de nycthemero, nunc diurno solum tempore, nunc noctu tantum, nunc indiscriminatim, sine omni ordine.

5. „Superato paroxysmo aegri ab initio mem-  
bris segnes sunt, caput grave sentiunt, dissoluti,  
languidi, pallentes, pusillanimes, ob lassitudinem  
et morbi verecundiam<sup>(111)</sup> contristati<sup>(112)</sup>. To-  
tum quoque corpus a paroxysmo dolet, ceu fu-  
stibus contusum esset. Multi reliquias paroxysmo-  
rum patientur, scilicet affectionem linguae<sup>(113)</sup>,  
lae-

Intervalla  
libera.

menia accipere solent. Similia occurrunt in Eph. nat. cur.  
Dec. II, an. 2. obs. 148.

106) Puer an. 14 clinici Vilnensis an. 1816, omni die *Veneris* paroxysmum epilepticum experiebatur.

107) St. GEORGE mention of a person having a regular epileptik fit every day of a cert. hour (*Phil. trans.* y. 1696. p. 223).

108) Virgo an. 17 an. 1816 in clinico Vilnensi curata, ter de die, horis scilicet sexta matutina et vespertina nec non circa meridiem, paroxysmum epilepticum a horae dimidio ad horam integram protractum experiebatur. Cfr. LEWENHEIM de epileps. period. ter singulis dieb. invadente, cum addend. GEORGE DETHARDING in M. an. cur. nat. Dec. I. an. 2. Dec. III. an. 78. App. p. 71.

109) TULPIUS obs. med. Amstel. 1672. L. I. C. H.

110) TRINCARELLI consil. L. I. cons. 26. v. Mercur. compilat. p. 167 (centum quinquaginta de die). Cfr. PORTAL l. c. p. 137. Innumerabiles parvas paroxysmos in puero vidi.

111) Ita pudet nos adhuc nostrae miseriae!

112) AUSTRIUS de causa et sign. morb. acut. L. I. C. 6. p. 3.

113) UXOR 39 annorum post insultum epilepticum vehement-

laesiones capitis, extremitatum, ecchymomata faciei<sup>114</sup>), vomitum et diarrhoeam cruentam<sup>115</sup>) aliaque in prognosi recensenda. Post insultus epilepticos hydrophobia observata est<sup>116</sup>). Nonnulli epileptici absoluto paroxysmo non solum nil amplius patiuntur, sed sese recreatos persentiunt, quod tum serenitate mentis, tum alacritate corporis, tum somno et appetitu optimo patefaciunt, eousque certe, donec novus non appropinquetur paroxysmus. Nonnulli absurdorum esu delectabantur<sup>117</sup>). Qui diu epilepsia affliguntur, tandem peculiarem solent contrahere physiognomiam<sup>118</sup>).

## §. LIV.

tem, etsi plane sibi conscia et grammaticae convenienter loquens, ad res designandas aut notiones evolvendas verbis non aptis semper usa est. Immo, lapsus in dicendo intelligebat, ast hebes fuit, ad inveniende verbe rectius ad imitande, quae ei quis dixit; et legendo atque scribendo male substituit. GAULTIER DE CLAUDEY ex *Journ. hebdom.* in *BEHRND Journ.* 1830. H. 1. p. 67.

114) TISSOT l. c. p. 12. „Il est surtout très fréquent que le visage reste parsemé de petites taches rouges, suites du sang extravasé, qui se dissipent quelquefois au bout de quelques heures, mais que j'ai vu durer plusieurs jours.“

115) SWIETEN l. c. §. 1077.

116) VANDELLI atq. BRIEN apud TISSOT l. c.

117) LENTILIUS in *Misc. acad. nat. cur.* Dec. II. a. 2. 1683. p. 327. Alii cibos aversantur. G. JAHN in *HENKE Ztschr. f. St. Ark.* 1827. B. 14. H. 4. p. 282.

118) DUMAS obs. sur la physiognomie propre à quelq. mal. chroniques, et en particul. à l'épilepsie. In *nouv. bulletin de la soc. philomat.* T. 2. an. 3. (1810). p. 165. et *SEDILLOT recueil périod. de la soc. de méd. de Paris.* T. 39. p. 380. Agroti, de quo J. FERRARA (*BEHRND allg. Report.* 1831.

## §. LIV.

## Necropsopia.

1. Pathologia anatomica epilepticorum spe-<sup>Genera-</sup>  
 ciatim exculpta est a WEPFERO<sup>1)</sup>, CRELLIO<sup>2)</sup>, LA  
 ROCHE<sup>3)</sup>, POUFARTIO<sup>4)</sup>, GREDINGIO<sup>5)</sup>, RHAKTO<sup>6)</sup>,  
 ESQUIROLIO<sup>7)</sup>, WENZELIO<sup>8)</sup>, LARREY<sup>9)</sup>, WETZ-  
 LER<sup>10)</sup>, PORTAL<sup>11)</sup> aliisque enumerandis.

2. Epilepticorum *encephala*<sup>12)</sup> exhibuerunt <sup>Vitia en-</sup>  
*crania parva*<sup>13)</sup>, peculiari modo conformata<sup>14)</sup>, <sup>cephali.</sup>

CRAS-

*Aug.* p. 178), physiognomia idiotica fuit. SIBLER l. c.  
 cas. VII.

1) De epilepsiae anatome. Misc. N. cur. Dec. III. an. 2. 1694.  
 p. 196.

2) Notatu maximo digna valdeque singularia in cadavere  
 mulieris a pueritia claudicantis et epilepticae observata.  
 Acta acad. N. cur. Vol. 9. p. 233.

3) *A case of epilepsy, with an account of the appearances  
 upon dissect. Med. and phil. comment. by a soc. in Edinb.  
 Vol. I. p. 200.*

4) *Ouverture et descript. d'un garçon de 17 ans mort de  
 l'épilepsie. Mém. de l'ac. r. de Paris. A. 1705. p. 49.*

5) *Sämmtl. med. Schriften. Greiz 1790.*

6) Quaedam notabilia in cerebris trium ex epilepsia mor-  
 tuorum observata. *Phil. trans. T. 1727. p. 315.*

7) v. infra (92).

8) v. infra (95).

9) *Revue méd. 1822. Juil. T. 8. et Chirurg. Klin. etc. Im  
 Auszuge v. F. ANELUNG. Lpz. 1831. B. 1.*

10) In HARLESS *Rhein.-Westphäl. Jahrb. B. 2. H. 2. p. 59.*

11) l. c. p. 1—112.

12) F. A. WISLICHENUS diss. de propria cranii in puella epi-  
 lept. deformatione. Zür. 1834 (ossa cranii pluribus in locis  
 tenuissima, translucida (cfr. PORTAL l. c. p. 62), perforata;  
 os occipitis singulariter deforme).

crassa<sup>14)</sup>, cum fronte plana<sup>15)</sup>, suturis male posit<sup>16)</sup>, diploë interna incurvata<sup>17)</sup>, lamina cribrosa depressa<sup>18)</sup>, vestigiis violentiarum quondam perpassarum<sup>19)</sup>, sincipite complanato et compresso<sup>20)</sup>, intumescentiis abnormibus cartilagineis externis<sup>21)</sup>, tophis<sup>22)</sup>, exostosi<sup>23)</sup>; carie<sup>24)</sup>,  
glo-

13) OTTO *Seltene Betrachtungen zur Anatomie, Physiologie und Pathologie gehörig*. Breslau 1816.

14) BOHRT *seculahr. anat.* L. I. Sect. 12. add. obs. 4. Freesentim ad basin. v. WENZEL opus cit. PORTAL l. c. p. 306.

15) FANTONIUS obs. med. sel. BOUCHET at CAZAUVILH l. c. p. 9. PORTAL l. c. p. 22. 55. *Obductionsbefund ein. an Epileps. Verstorb. ex Erfahr. am Krankenbette*, in RUST *Mag.* 1829. B. 30. H. 1. p. 163. W. DAVIDSON *Beitr. z. Pathol. des Gehirns in ... Epileps.* ex Lond. m. gaz. Vol. 9. in HARNEL *Summar. etc.* 1832. B. 3. p. 283. cas. V. Cfr. SCHMIDT *Jahrb.* 1835. B. 6. p. 195. B. RITTER l. c. p. 250.

16) HINER in BALDINGER n. *Magazin*. 14. B. p. 472. BOUCHET at CAZAUVILH l. c. p. 14. 18. ADLMANN *klin. Memorab.* in *Allg. med. Ztg.* 1835. Apr.

17) BARTHOLINUS *anatom. reform.* L. IV. C. 6. BOHRT l. c. Append.

18) Eph. N. c. Dec. I. an. 2. obs. 35.

19) OTTO l. c. WETZEL l. c.

20) BOHRT *diss. de epilepsia ex depresso cran.* Ratiomont. 1734. HALLERI *coll. diss. pr.* Vol. I. N. 5. §. 18. GARDINO l. c. I. B. p. 290. (*Impressio extus et eminentia intus magnitudinis nucis juglandis ad suturam coronalem et sagittalem, ab ictu in juventute accepto*). CLOSER *observ. taken of morbid bodies. Sect. I.* (Tumor in ossa frontis ab ictu).

21) BALDINGER n. *Magazin*. 14. B. 9. St. p. 472.

22) WEPFER *de morbis capitis* p. 35. PORTAL l. c. p. 48.

23) LOCHER obs. *praet.* p. 81.



globulo sclopetario intra ossa cranii haerente<sup>20</sup>),  
 — duram matrem<sup>21</sup>) cranio firmiter adhaeren-  
 tem<sup>22</sup>), a lamina ossea<sup>23</sup>) irritatam<sup>24</sup>), ero-  
 sam<sup>25</sup>), densam et partim fere cartilagineam<sup>26</sup>),  
 asperam<sup>27</sup>), cum tumore<sup>28</sup>) et exorescentiis<sup>29</sup>)  
 scirrho-

20) LÖNNEL de morbis ossium in genere. p. 22. QUAIN animadversiones. p. 19. 22. SIEBAGUNDI Beschreibung, ein. abnorm. Vergrößer. des Process. spin. des Stirnbeins u. der Crista galli des Siebbein., als höchst wahrscheinl. Ursache d. Epileps. in HANLUSE Jahrb. I. c. p. 19. PORTAL I. c. p. 60.

21) BONET I. c. obs. 3. ZNOCHTUS consil. N. 9. LEVELING diss. de carie cranii militis quondam venerai, postea epilept. Ingolst. 1774. VESINAC in Verhandelingen van Haarlem. XIV. p. 49. LARRET I. c. (1822). p. 337. obs. 1. ELLIOTSON ex the lancet. 1831. in BEHARND allg. Repert. 1831. Jul. p. 31 (carie cristae galli ossis ethmoidalis).

22) DIDIER Pathol. p. 316.

23) Cruore repletam: ROSEN Epilepsie mit schnell tödtl. Verlaufe, in RUST Mag. 1831. B. 34. St. 2. p. 401.

24) BERTHAN diss. de spasmo ab inanitione conjecturae. Hal. 1781. DAVIDSON I. c. p. 263. B. RITZER I. c.

25) Et a glandulis Paccionii multo majoribus: A. H. NICOLAI Können bedeutend grosse Paccion. Drüsen Ursache d. Epileps. sein? in RUST Mag. 1832. B. 38. H. 1. p. 144. FASER I. citand.

26) MUCKEL recherch. sur les caus. de la fol. obs. 44. B. RITZER I. c. p. 260.

27) RUMLER obs. N. 53.

28) ANDERSEN transact. of the r. soc. of Edinb. T. II. 1790. v. Abh. f. pr. Aerzte. 13. B. p. 711. MATZGER verm. med. Schriften. 1. B. p. 193.

29) LEMSTADT histor. anat. med. L. III. obs. 18.

30) SCHUTER de epileps. et dol. cap. ex tumore durae matris scirrhoso in advers. med. pract. Vol. II. P. III. p. 493.

scirrhusis<sup>36</sup>), fungosis<sup>37</sup>), abscessu<sup>38</sup>), concretis<sup>39</sup>) calculosis<sup>40</sup>), ossiculo in falce cerebri<sup>41</sup>) et in tentorio<sup>42</sup>), gelatina sub illa<sup>43</sup>), polypum in sinu longitudinali<sup>44</sup>), ad parietem lateralem illius ossiculam punctis acutissimis instructum<sup>45</sup>); —

piam

BALDINGER diss. de epilepsia ex tumore duræ matris scirrhoso at caria cranii. Jen. 1771.

35) DAVIDSON l. 2. p. 284 (*„ungewöhnlich viele erbsenähnliche Erhabenheiten“*).

36) *Journal de médecine*. T. XIX. p. 319. LARREY l. c.

37) LARREY in *bulletin de la faculté de méd. de Paris* 1811. N. 1. et l. c. (1822). p. 337. obs. 1. ALÈGRE l. citando, cas. III. HOLSCHER *med.-chir. . . Wahrnehm. Erste Decade, hist. I.* in *ajust. Annal.* 1837. B. 2. II. 1 (fungus hæmatodes valde sensibilis, magnitudinis nucis avellanæ).

38) FERNELIUS *Patholog.* L. V. C. 3.

39) Caseosis, puri non absimilibus, sed duris: ROESER l. c.

40) BONET l. c. addit. obs. 9. p. 276. BLANCARDI *anat. pract. cent.* I. obs. 41. p. 96.

41) Eph. N. cur. Dec. I. an. 4. 5. obs. 36. HENKEL *Samml. med. chir. Anmerk.* 8. B. N. 25. BONET l. c. obs. 27. CONRADI *Handb. d. pathol. Anat.* p. 352. LA MOTTE *chirurg.* obs. 171. *Istor. med. concern. la descriz. di una malattia accompagn. da una ossificazione della falce messoria, di T. MANOTTI v. atti di Siena.* T. 2. p. 176.

42) BOERHAAVE l. c. p. 53. FASCH diss. c. p. 15. WILLISIIUS *anim. brut.* Oxon. 1672. C. XI. p. 167. C. XII. p. 179. C. XIII. p. 187. GREDING l. c. p. 295. Cfr. PORTAL l. c. p. 55.

43) POUPART in *hist. de l'ac. r. des sc. à Paris* 1705. DRE-LINCOURT in BONET *sepulc.* l. c. addit. obs. 8 (ad altitudinem digiti minimi transversi). PORTAL l. c. p. 65. 73.

44) WAGNER *epist. de morb. insanabil. curat.* Lips. 1792.

45) HENAUD in *mémoires de l'acad. r. des sciences à Paris* 1731. *Hist.* p. 44.

*piam matrem* justo crassiorem, mucosam, coloris caerulei <sup>46)</sup>, cum tumoribus spongiosis <sup>47)</sup>, vasa sanguinea repleta <sup>48)</sup>, calculos <sup>49)</sup>, vesiculas <sup>50)</sup> inter meninges, illarum ossificationem <sup>51)</sup> et concretionem cum cerebro <sup>52)</sup>; — *cerebrum* <sup>53)</sup> foetidum <sup>54)</sup>, siccum <sup>55)</sup>, molle <sup>56)</sup>, pultaceum <sup>57)</sup>,

aquo-

46) GRADING l. c. p. 296.

47) GRADING l. c. p. 296. GUNZ prolusio II. de cerebro. Lips. 1744.

48) JOHNSTONE *account of an epilepsy*, in *med. observ. by a soc. of phys. in Lond. Vol. 2*, p. 115. PORTAL l. c. p. 55, 63, 65.

49) MICHAELIS v. SIEBOLD *Beobacht. u. Erfahr. 3. B.* p. 88.

50) *Hist. de l'ac. r. des sciences 1711.* p. 35. DAVIDSON l. c. p. 284 („die Arachnoidea in Form kleiner Blasen aufgetrieben, mit Serum gefüllt“). PORTAL l. c. p. 65.

51) KORTUM in HUFELAND *Journ.* 1812. April.

52) MORGAGNI de sed. et caus. morb. Ep. IX. 25. HESSELBACH in ENRRARDT *med. chir. Ztg.* 1820. N. 62. ALGER l. citando, cas. IV. DAVIDSON l. c. BURGERHAF l. citando (substantia grisea). RANN-ESCHER in *Schweiz. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. Zür.* 1837. B. 2. H. 3.

53) Hypertrophicum: PORTAL l. c. p. 39. ANDRAL, BURGERHAF II. cc. W. SWERTING *Section des Leichnam einer Epileptischen*; ex *Lond. m. gaz.* 1836. Jul. in *SCHMIDT Jahrb.* 1837. B. 14. p. 187.

54) GRADING l. c. p. 306 (inter 5 epilepticos ter id observatur). PORTAL l. c. p. 67.

55) SALEMANN obs. anat. p. 49.

56) ROXNER l. c. PORTAL l. c. p. 17. 21. 62. OTTO in *CAEPER Wochenschr.* 1835. N. 15. BURGERHAF l. citando.

57) ROXNER l. c. (arachnoidea, pia mater et substantia corticalis cum gyris sulcisque disparuerant et in massam homogeneam conversae erant). FR. DENIS ex *journ. hebdom.* 1833. Decbr. N. 167, in *SCHMIDT Jahrb.* 1834. B. 2. p. 24.

aquosum<sup>58)</sup>, partim in gelatinam conversum<sup>59)</sup>, laxum simulque tenax<sup>60)</sup>, tuberculosum<sup>61)</sup>, durum<sup>62)</sup>, et elasticum<sup>63)</sup> cum<sup>64)</sup> scirrhus substantiae corticalis<sup>65)</sup>, concremento<sup>66)</sup>, callo<sup>67)</sup> et nodo<sup>68)</sup> scirrhoso, steatomate<sup>69)</sup>, osse<sup>70)</sup>, globo

tor-

58) GREDING l. c. p. 308 (Inter 20 epilepticos 8 fuere, in quibus indicata cerebri conditio locum obtinuit).

59) SCHMIDT observat. chir. obs. 5.

60) SOMMERHINE in nota ad opus BAILLIE, p. 278.

61) BADRE obs. 25. 31. PORTAL l. c. p. 60.

62) ANDERSON l. c. RUDOLPHI *Resultate d. Obduct. eines am Schlagfluss verstorb. Epileptischen*, in HORN *Archiv.* 1813. Mai—Dec. J. SMITH l. citando. PORTAL l. c. p. 63. BURGHAUSEN üb. d. Verhärtung d. Hirnsubstanz, namentlich der Oliven bei Epileptischen; ex ann. de méd. belge. 1835. Mars. in SCHMIDT *Jahrb.* 1836. Septb. 1. p. 257. RAHN-ESCHER l. c. („so fest, als hätte es lange Zeit im Hingeist gelegen“). B. RITTER l. c. p. 261.

63) MORGAONI op. c. epist. VIII. 4. 6. 8. 9. 11. 12. 15. Ep. IX. 19. Ep. 10. 7. MUCKE in *hist. de l'ac. r. de Berl.* 1766. T. XX.

64) Tumores in hemisphaeriis: PR. DENIS l. c.

65) PACCHIONI apud MORGAONI l. c. Ep. IX. 24.

66) FANTONI animadv. in opusc. PACCHIONI. Anim. 22. — Idem opusc. med. phys. Gansv. 1738. p. 37. PORTAL l. c. p. 55.

67) FLATHE observ. L. I. p. 109.

68) KAAU BOERHAAVE in Nov. comment. Ac. scient. Petrop. T. I. obs. anat. 3. MORGAONI Ep. IX. 24.

69) RHODIUS obs. cent. I. obs. 55. F. E. KRAHNE quaed. de morb. cerebri organic. et observat. steatomatis in cerebro. Berolin. 1829.

70) BOWEN l. c. obs. 118. ANT. DE POZZI in miscel. nat. cur. Dec. I. an. 4. obs. 34. VIRGASINI *hist. de mal. internes.* PORTAL l. c. p. 28. Cfr. ibi p. 23.

tormentario<sup>71)</sup>, tumore cystico<sup>72)</sup>, substantiam erosam, sero bruneo<sup>73)</sup>, vel pure<sup>74)</sup> repletam, aquae innatantem<sup>75)</sup>, ulcus<sup>76)</sup>, sphacelum<sup>77)</sup>, serum in ventriculis anterioribus<sup>78)</sup> et in ventriculo tertio<sup>79)</sup>, commissura anteriore orbato<sup>80)</sup>, ventricu-

71) DIDIER pethol. p. 316 (Miles globum tormentarium in anteriori cerebri parte circumgerabat, sanitate nil laesâ; quoties vero in dorsum decumberebat, insultu epileptico corripiebatur). Similem casum vide apud PORTAL l. c. p. 65.

72) REDOLPHI l. c. *Obductionsbefund*, l. 2.

73) MORGAGNI l. c. epist. IX. 20.

74) BORRICHIVS in BONAT' sepulc. l. c. Sect. XV. obs. 18. p. 371 (similitudinis ovi gallinaei).

75) BARTHOLINUS hist. anat. Cent. III. N. 80. BONAT l. c. Sect. XII. obs. 1. 2 (omnis cerebri substantia, ventriculi, medulle spinalis aqua pleni in femine epileptice). BANG in act. soc. r. Havn. Vol. I. p. 283.

76) MUELL *Wahrnehm.* 2. B. N. 31. ALKORN l. citando, cas. II (ulceris progressi cicatricem 6—7 linearum invenit in substantia alba et in parte anteriori superiorique lobuli medii).

77) SALMUTH obs. Cent. III. N. 22. Cfr. SCHMIDT l. c. N. 2.

78) RIVIERI opp. Genev. 1737. p. 473. MORGAGNI ep. IX. 2. GARDING l. c. p. 311. 312. 313. 317. MEINER in BALDWINN n. *Magaz.* 4. B. 1. St. p. 1. LA ROCHE in *med. Comment.* v. Edinb. 1. B. p. 229. PORTAL l. c. p. 65. 67. 69. *Obductionsbefund*, l. c. ALKORN l. citando, cas. I. FARUM l. citando. J. SMITH *Fälle v. Störung. des Geistes*, welche einen tödlichen Ausgang hatten, nebst d. Resultat. d. Leichenöffn. ex Edinb. m. and s. j. 1834. Jan. N. 118, in SCHMIDT *Jahrb.* 1834. B. 3. p. 190. cas. 5 (10 Unc. seri in ventriculo sinistro, Unc. 1 in dextro).

79) GARDING l. c. p. 317. PORTAL l. c. p. 305 (in omnibus ventriculis).

Frank *Prax.* II. 1. 2. 1.

Cc

triculos illos exsiccatos<sup>80)</sup>, augustos<sup>82)</sup>, materie adiposa<sup>83)</sup>, pure<sup>84)</sup> repletos, hydatides<sup>85)</sup> in plexu choroideo<sup>86)</sup>, corpus striatum coloris brunei profundi<sup>87)</sup>, vasa sanguinea encephali turgida<sup>88)</sup>, rupta<sup>89)</sup>, ad basin cranii variis in locis ossificata<sup>90)</sup>, steatoma molle nucis magnitudinis in ventriculo quarto<sup>91)</sup>, item glandulam pinealem<sup>92)</sup>, et glandulam pituitariam abnormes<sup>93)</sup>; — cere-  
bel-

80) GREYING op. c. 2. Th. p. 322 (In tribus cadaveribus).

81) Idem l. c. p. 312.

82) SCHULTZ in Misc. acad. n. c. Dec. I. an. 2. 1671. p. 120.

83) BORRELLI obs. med. phys. Cent. II. obs. 78.

84) Misc. n. cur. Dec. II. an. 3. p. 150.

85) C. RENDTORFF diss. de hydatidib. in corp. hum., praesertim in cerebro repertis. Berol. 1822. BUCQUERRE *Hydatiden im Gehirn* etc. ex gaz. méd. de Par. 1837. Juin. p. 359. in DIEFFENBACH *Ztschrift*. 1837. B. 6. H. 1. p. 198.

86) GREYING l. c. p. 314 (creberrime). JOHNSTON in *medical observ. and inquir.* Vol. II. N. 6. PORTAL l. c. p. 17. CO. 86. 89.

87) MORGAGNI l. c. epist. IX. 20.

88) RUDOLPHI l. c. PORTAL l. c. p. 55. 63. 83.

89) *Mém. sur l'hémorragie de la couche corticale du cerveau*, in *revue méd.* 1827. Mars. p. 402. BURROWS l. citando.

90) ESQUIROL obs. sur les altérat. trouvées chez plus. individ. morts d'épileps. v. LEROUX  *Journ. de méd.* T. 39. 1817. p. 421—422.

91) HORN l. c.

92) DESPORTS in *hist. de mal. de St. Dominique.* Vol. 2. p. 209. LIBOTAUD *hist. anat. med.* lib. III. sect. 8. obs. 552. T. II. p. 466. KRIMM in *Hewland Journ.* 1821. St. 6. p. 54. *Obductionsbefund*, l. c. PORTAL l. c. p. 305.

93) JOH. WENZEL *Beobacht. üb. d. Hirnanhang fallsücht.* Pers. Frankf. a. M. 1810. (Légi circa WENZELII observa-

*bellum*<sup>94)</sup> cum tumore<sup>94)</sup>, osse<sup>96)</sup>; — *medullam oblongatam* duram<sup>97)</sup>, fere cartilagineam<sup>98)</sup>.

3. *Medulla spinalis*<sup>99)</sup> detecta est modo mol-<sup>Vitis co-</sup>  
lior<sup>100)</sup>, modo durior<sup>101)</sup>, membrana illius va-<sup>lumnæ</sup>  
scularis brunei coloris, arachnoidea lamellis osseis <sup>vertebra-</sup>  
obsessa<sup>102)</sup>. In puero atlas binos articulos ex-  
hibuit, ac capite vertente insultus epileptici ex-  
citabantur<sup>103)</sup> etc.<sup>104)</sup>.

## C c 2

## 4. Ex-

tiones meretur HORN *Archiv.* 1823. p. 253, nec non PARRY et SPURZENHEIM *observations on the deranged manifestat. of mind or insanity.* Lond. 1817. P. I. chap. 1). KEBLCH *Erythr. z. pathol. Anatomie.* Berlin 1813.

94) MOLLE: OTTO in CASPER *Wochenschr.* 1835. N. 15.

95) MEIER I. c.

96) *Observ. anat. sur un corps osseux trouvé dans le cerveau d'un jeune homme épilept.* p. LEBOTAUD in *mém. de l'Académie de Paris* a. 1737. hist. p. 91. Ed. oct. an. 1737. p. 91.

97) PORTAL I. c. p. 56. 89. BURGGRAEVE I. c.

98) AUBERNATH *Physiol.* §. 1041. Sic et pons Varolii: PORTAL I. c. p. 305.

99) ESQUIROL (apud OLLIVIER I. c. p. 815) inter decem epilepticos apud novem medullam spinalem alteratam, plurimum ejusdem partem lumbalem emollitam reperiebat et alia signa inflammationis praegressae. Cfr. CLOX *recherches et obs. sur le spinet.* Montpell. 1820 (in duobus epilepticis).

100) RAHN-ESCHER I. c. BOUCHET et CAZAUVILLE I. c. p. 9. 14.

101) BURGGRAEVE I. c. BOUCHET et CAZAUVILLE I. c. p. 20.

102) ESQUIROL obs. c. Cfr. RHID in *transact. of the associat. of the King's and Queen's college of physicians in Ireland.* Vol. I. Dublin 1817. CALNEIL I. c. (in duobus epilepticis). BOUCHET et CAZAUVILLE in *Archiv. gén.* T. 9. 10.

103) FROHNE *Notiz.* B. 23. N. 22. p. 341.

104) RAHN-ESCHER (I. c.) inter duram matrem et vertebrae

Vitia nervorum.

4. Exhibuerant *nervus phrenicus* in medio curricula sui et prope diaphragma tumores scirrhosos<sup>104</sup>), *nervus vagus* similem tumorem<sup>105</sup>), *nervus ischiadicus*<sup>107</sup>), *nervus cruralis*<sup>108</sup>) concretamenta. Epilepticorum unus, *nervos olfactorios* firmissimos habuit<sup>109</sup>).

Vitia aliarum partium.

5. Epilepticorum *pulmones* observabantur flacidi, veluti humoribus destituti<sup>110</sup>); *cor* magnum<sup>111</sup>) et cum pericardio concretum<sup>112</sup>), illius parietes crassiores<sup>113</sup>) cavitatis diametro imminuta<sup>114</sup>), polypum continens<sup>115</sup>); *ventriculus*<sup>116</sup>) tenuis<sup>117</sup>),

te-

cruris coagulum crassum, densum reperiebat; PORTAL (l. c. p. 49. 56) serum, nec non vertebrae nonnullas emol-litas, et (p. 62) caria dentatas.

105) HAEN Rat. med. P. V. p. 123. LIEUTAUD bist. anat. med. Lib. II. Sect. VI. obs. 787. T. II. p. 251.

106) CAPPEL diss. de epilepsia e tumore, nervo vago in-haerente, orta. Helmst. 1781.

107) MASON et COVERCELLI. *Epilepsie déterminées p. une concrét. sur le trajet du nerf sciat. v. Bulletin des sc. méd. T. II. p. 187.*

108) FLOUQUET diss. Trige obs. med. Tab. 1787. Philos. transact. Vol. 7. 1.

109) RUDOLPHI l. c.

110) SWINTEN l. c. GREEDING l. c. 1. B. p. 341. Cfr. BONNET l. c. Sect. XII. obs. 34.

111) PORTAL l. c. p. 86; et parvum. MASSEAU apud PORTAL l. c. p. 67 (cor puellae epilepticae 12 annor. vix magnitudinem ovi gallinae exhibuit) et p. 305.

112) WARREN. v. BERRA giorn. di med. prat. Vol. 4.

113) PORTAL l. c. p. 69. 86. 181 (parietes mirifice crassae, stentometosae).

114) ESQUIROL l. c.



tenax<sup>115</sup>), inflammatus<sup>116</sup>), erosus<sup>117</sup>); *intestina* cum moneta quondam deglutita, ad valvulam coli haerente<sup>118</sup>), cum concremento carnoso<sup>119</sup>), cum globulis pinguibus illis inhaerentibus<sup>120</sup>), erosa<sup>121</sup>).

6. Tandem cadavera epilepticorum, in qui-  
bus *nil plane morbosum* reperiatur, aperta sunt<sup>122</sup>).  
Etsi hic dubitare liceat an cerebrum et medulla  
spinalis, nec non singuli nervi eorumque plexus  
et ganglia debito modo semper perlustrata fuerint,  
nihilominus fateri adigimur, inter causas epi-  
lepticae dari haud paucas, a quibus effectus evi-  
dentes in textum corporis neutiquam expectari  
licet, unde SWARTZIUS sapienter ait<sup>123</sup>): „Dum,  
visio

115) GOULD *an account of a polyp, found in the heart of a person died epilept.* Phil. trans. I. 1684. p. 537.

116) Valde coarctatus. *Obductionabefund* l. c., sanguinis coagulum vermesque includens, PH. CARRERI, selectae a praxi quindense in nosocom. ec municip. mort. a. Sabini. Sen. 1830. Dec. 8.

117) Misc. N. cur. Dec. I. an. 7. obs. 177. Dec. III. an. 7. 8. obs. 159. Eph. N. cur. Cent. III. IV. app. p. 9. Cent. VI. obs. 91.

118) Eph. N. cur. Dec. I. an. 6. 7. obs. 187.

119) MOREAGNI op. c. epist. 62. Art. 2. BOUCHAY et CAU-  
VINILH l. c. p. 9. 18. PORTAL l. c. p. 56. 63.

120) SORBALY univers. medicine theoret. et pract.

121) *Breslauer Samml.* 1721. I. Th. p. 413.

122) *Ibidem* 1725. p. 421.

123) Eph. net. cur. Dec. II. an. 2. obs. 152. schol.

124) HARDEN apist. obs. 99.

125) WILLISIUS *pathol. cerebri cap.* IV. p. 49. TISSOT l. c.  
art. X. p. 147. Cfr. PORTAL l. c. p. 106 sq.

126) l. c. §. 1076.

viso epileptico territus, homo corripitur eodem morbo, quis definire audebit, quid tunc mutatum fuerit in corpore?" Et paululum infra: „Quis dabit rationem, quare nobilis femina toto graviditatis tempore epileptica esset, dum marem utero gestaret, minime vero si sequioris sexus foetum?"

## §. LV.

## C a u s s a e.

C. prae-  
disponen-  
tes.

1. *Praedisponunt* ad epilepsiam: vitium hereditarium <sup>1)</sup>, congenitum <sup>2)</sup>, idiosyncrasia <sup>3)</sup>, aetas

1) Facta huc spectantia inveniuntur praecipue apud STAHL diss. de heredit. dispositione ad var. affect. Halae 1706. p. 48. ELMENFELD diss. epilepsiae heredit. cas. exhibens. Duisburg 1705. BAUMES v. d. *Convulsion. d. Kinder. A. d. Fr. Lépz.* 1791. §. 6. p. 7. ROCHERONT *Abhandl. üb. d. erbl. Krankh. A. d. Fr. Frankf.* 1794. p. 111. MICHAELIS *med. Bibl. I. II.* p. 360. DUBYSSE l. c. p. 218 aliosque. (Cfr. P. II. ed. alt. Vol. I. S. I. §. III. 2 (2)). ZACUTUS LUTANUS de viro epileptico testatur, cujus non solum octo filii sed et tres nepotes epilepsia laborabant. Luculentissima tandem exempla epilepsiae in familiis quibusdam praesenti aevi thronum occupantibus occurrunt. Cfr. BATT l. c. BEAU l. c. p. 300 (epilepsiarum 273 reperit 28 hereditarias; fatetur autem autor, saepe se operam perdere, cum plurimi hereditatem mali dissimulent).

2) Observationes generales circa morbos nervosos *congenitos* (l. c. 3) et speciatim relate ad epilepsiam valent. Maxime imaginatio matris, excitata per conspectum epileptici, hic consideranda venit. De quo argumento legantur HIL-DANUS obs. chir. Cent. 3. obs. 8. p. 191. Eph. N. cur. Dec. II. an. 4. App. HOFFMANN diss. de morbo foetuum in utero materno. Hal. 1702. p. 9. REINIGER diss. de prole parent. culpam luente. Lips. 1774. p. 37. BOERHAAVE et

aetas juvenilis, infantilis<sup>4</sup>), pubertatis epocha<sup>4</sup>), sexus, ut contendunt, femineus<sup>6</sup>), ingenium perspi-

SWIETEN l. c. §. 1075. Curas protractae idem efficiunt teste CHAMBERLAIN *ib. d. Krankh. d. Kinder. A. d. Fr. 1. B.* p. 333. SENNERTUS (L. I. P. 2. C. XXI. p. 590) opinionem refert „in eclipsi lunari natos epilepsiae esse obnoxios.“ Inter 273 epilepticos malum duodecies connatum fuit: BRAU l. c. p. 299.

- 3) Nisi enim peculiaris admittatur *idiocynerasia*, de effectu multarum causarum epilepsiam aut illius paroxysmos excitantium, nulla plane ratio reddi potest.
- 4) FOEXER diss. de epilepsia pueror. L. B. 1680. JACHEN-SCHMIDT de infante epilept. cognoscendo, curandoque. Altdorf 1684. JOHNSTON diss. de mot. convulsiv. et epilepsia infant. L. B. 1693. PIERSTEN de epilepsia pueror. L. B. 1694. B. BRUNO diss. de epilepsia puerili. Altd. 1699. ZHIT diss. de convuls. infant. in STOLL. diss. ad morb. chron. pertin. ex ed. EVEREL Vol 3. p. 179. BAUNES l. c. p. 324. ROSEN diss. de epilepsia juvenili. Upsal. 1764. DREYER l. c. p. 215. Causa cur infantes et juvenes praecipue ad epilepsiam dispositi sint, in majori sensibilitate et irritabilitate nervorum et musculorum, quibus insituntur, quaeritur (BOER *Versuch e. Darstellung d. kindl. Organismus in physiol., pathol. u. therapeut. Hinsicht. Wien 1813.* p. 66). Inter 25 epilepticos MASTUS numeravit 5 infantes septem annorum, 4 inter 8 et 16. annum, et 27 adultos, 15 viros, et 12 feminas (Heob. *ib. d. Wirkosamk. d. Valeriana u. d. Arseniks in d. Epilepsie v. HOFELAND Journ. 1813. März.* p. 43).
- 5) BECHAN *Hausarzneyl.*, *übersetzt mit Anmerk. von SPRENGEL.* p. 801. HOPFENGARTNER *Bemerk. üb. d. menschl. Entwicklungen u. die mit derselb. in Verbind. stehenden Krankh. Stuttg. 1782.* p. 10. Epocham pubertatis plurimum proclivem esse ad epilepsiam, et BRAU (l. c. p. 300) in suis aegrotis observavit.

spicax, altum'), clima frigidum'), tempus vernale'),

6) Ad eunum aetatis septimum epilepsia indiscriminatim utrumque sexum egredi, serius autem feminas mares superare esserunt. Revera ultime die en. 1813 in nosocomio Parisiensi *Bicetre* 162 epileptici at in alio ejusdem urbis *la salpêtrière* 289 epilepticae numerabantur (*dict. des sc. m éd. T. XII. 1815. p. 518*). Ego inter 75 epilepticos 40 feminas numero; at *strictè convulsiones hystericas a vera epilepsia distinguendo*. Nimirum suspicor, quod, si quis severissime in diagnosi incedere vellet, ille exquisitam ac omnibus numeris absolutam epilepsiam frequentius apud mares, quam feminas inveniret; quae est etiam opinio HESBURDNI in commentar. de morb. historia et curat. Ed. SOEMMERINGII 1804. p. 125. Causa frequentiae epilepsiae et convulsionum epilepticarum in feminis, illis aetatis infantilis similis videtur. Cfr. FALK diss. de epilepsia s. convulsivis motibus virginum. Goett. 1754. PORTAL l. c. p. 204.

7) Pauca, sed magne exempla hic recensere sufficiet, ait SWIFTEN l. c.: „*Julius Caesar* . . . comitili quoque morbo his inter res ageudas correptus est“ (SUTTON. Lib. I. C. 45. p. 59). Epilepsiae obnoxii fuerunt *Petrarca* (in vite praefixa ejus operibus), *Fabius Columna* (in praefatione *Phytobasani*), *Fr. Redi* (in vita praefixa ejus operibus). Et nostrum aevum exempla suppeditat.

8) De epilepsiae quidem frequentia jure conqueruntur *Itali* (PANABOLUS *Pentecost.* IV. obs. 42); *Galli* (RONDELLET meth. L. I. C. 36. PORTAL l. c. p. 149); *Germani* (CAMERARIUS diss. cur epilepsie hodie inter nos tam frequens sit? Tüb. 1690, THOMASIVS de epilepsiae frequentioribus causis, quare scilicet tam frequens Norimbergae occurrat. Miscel. acad. n. c. Dec. III. en. 3. p. 323); et *Sueci* (LINNAEUS *Untersuch. u. Ursach. d. fall. Suchts in Schonen u. Wernskörad v. Schwed. Abhandl. J. 1742. p. 309*), at nullibi, ni fallor, querae hujusmodi majori jure institui possent,

nale<sup>9</sup>), diathesis scrophulosa, rhachitica<sup>10</sup>), plicosa<sup>11</sup>).

2. Praeter caussas, quae ex necroscopia elucent<sup>12</sup>), epilepsiam vel saltem singulos illius insultus, *excitant* concussiones cerebri<sup>13</sup>) et columnae vertebralis<sup>14</sup>), aliaeque<sup>15</sup>); eorum vulnera<sup>16</sup>), fractu-

quam in *Rossia* septentrionali, in *Curlandia* (LICHTE-  
N-  
STERN in *HUFELAND Journ.* 1819. 8. St. p. 77) et in *Polo-*  
*nia*: spatio anim sedacim annorum sexaginta et ultra epi-  
lepsiae observationes in *Lithuania* colligari potui.

9) HIPPOCRATES epilepsiam morbis vernalibus adnumerat  
(Aphorismi Lib. III. aph. 20) et TISSOTUS l. c. fetetur epi-  
lepticos plus verno pati, quae observatio me hucusque  
aufugit.

10) Sic in dimidia aegrorum meorum parte: sique cum aliis  
*habitu epilepticum* admittere vellem (PETIT Ergo tantum  
ab habitu epilepsiae. Paris 1662), foret ille certe *scrophu-*  
*losus et rhachiticus*. Sic GRANTHAM (in *the Lond. med.*  
*gaz.* 1837. *Spibr.*) persuasum sibi habet, cretali ossificatio-  
nem imperfectam epilepsiae causam esse, ab aetatis mense  
decimo ad undevigesimum usque occurrentis. Cfr. PORTAL  
l. c. p. 298. 299. 302.

11) Plurimi epilepticorum meorum Lithuanorum ex stirpe  
plicosa descendebant.

12) §. LIV.

13) ALBERTI jurisprudent. med. P. I. p. 411. MERCKLIN de  
epilepsia ex contus. cap. Misc. ac. n. c. Dec. II. an. 1.  
p. 217. SCHELHAMMER epilepsia ex ictu in sinciput ec-  
cepto post octennium gravis (Ib. Dec. II. an. 6. p. 218).  
Puella 13 annorum, quae an. 1816 in clinico degebat,  
epilepsiam eb *alapa* infecta, subsequente epistaxi, ec-  
quisivit. H. L. RANKEN *Epileps. durch ein. Schlag auf d.*  
*Kopf erzeugt*, in *FRORIEF Notiz*, 1831. B. 29. N. 12.

14) Columna vertebralis praesertim a casu ex alto in natu,

fracturae; luxationes ossium<sup>17)</sup>, laesio brachii<sup>18)</sup>, tibiae<sup>19)</sup>, tendinis Achillis<sup>20)</sup>, corpus durum in genu<sup>21)</sup>, tumor illius<sup>22)</sup>, caries<sup>23)</sup> hallucis<sup>24)</sup>, aurium affectiones, e. c. corpora extranea in iis haerentia<sup>25)</sup>, ut globulus vitreus<sup>26)</sup>, avenae granum<sup>27)</sup>, mercurius<sup>28)</sup>, illarum purulentia<sup>29)</sup> aut flu-

pati videtur, ex qua causa pluries epilepsia ortum duxit, v. MANARDUS L. XIII. Ep. 6. HORNSTETTER obs. Dec. II. obs. 5. HORNUNG acta med. p. 590.

15) E. c. totius systematis nervosi, ipse peripherice excitatae. Sic BODCHER (*Journal de méd.* T. 12. p. 20) de viro refert, qui cote forficis pannarius acuendo epilepticus evadit. De titillatione etc. postea.

16) §. LIII. 2. obs. DIDIER BONET op. c. L. I. Sect. XII. obs. 24. BERENGARIUS de fract. calvariae. Bonon. 1518. p. 71. BONETUS L. c. ODIER apud PORTAL l. c. p. 223.

17) TISSOT op. c.

18) MARET in *nouv. mém. de Dijon* 1784—15. Semestre. PORTAL l. c. p. 223 (epilepsia ex nervo brachii in venae-sectione laeso). HASBACH *Epileps.* in *Folge cin. Nervenverletz.* in HUFELAND *Journal*. 1832. St. 12 (vulnus cubiti).

19) RAHN *med. Briefwechsel*. I. B. p. 510.

20) An. 1815 mense Aprili pro centusione Polono epilepticus in consilium vocatus fui, qui istam morbi sui causam accusabat. In juventute onaniam deditus erat.

21) LOEPLER *Beitr. z. Fundarzneyk*. I. B.

22) RHODIUS Cent. I. obs. 58.

23) Et vulnus: MERKLIN apud PORTAL l. c. p. 223 (tumore hallucis aperto, epilepsia insanabilis exorta est).

24) BONET l. c.

25) BETHENDER obs. sur l'épilepsie produite p. un corps étranger entré dans l'oreille. (VILLARS et CÉPELLE *Journal de la soc. de santé et d'inst. nat. de Bordeaux*. T. I. p. 89).

26) FARR. HILDANUS Cent. I. obs. 4.

fluxus cohibitus<sup>20)</sup>; oculi laesiones<sup>21)</sup>, dentitio difficilis<sup>22)</sup>, inprimis eruptio dentium caninorum<sup>23)</sup>, tumor in angulo mandibulae<sup>24)</sup>, vitia laryngis<sup>25)</sup>, vulnera thoracis<sup>26)</sup>, caries vertebrarum<sup>27)</sup>, ulcera pulmonum<sup>28)</sup>, diaphragmatis<sup>29)</sup>, laesio pollicis<sup>30)</sup>, morbi mesenterii<sup>31)</sup>, lienis<sup>32)</sup>, calculi fellei<sup>33)</sup>, intestinales<sup>34)</sup>, renales<sup>35)</sup>, vesicae

27) BETHEDER in CAPELLI *journal. de santé. T. I.*

28) ERASTUS *disp. p. 58.*

29) HORNUNG *Cista. p. 394.*

30) DEMENRUNC DE LA CONSEILLERE in *dis. de auditu. Ultraj. 1710.*

31) SALMUTH *Cent. I. obs. 74.*

32) Eph. n. cur. Dec. I. an. 2. obs. 27. Dec. II. an. 10. obs. 100. IDLER in HUEHLAND *Journal. 10. B. 3. St. p. 201.* MOSMAN *accès d'épilepsie déterminée p. la pousse des dents, cessant p. l'écartement forcé des mâchoires* (GRAPHERON *bulletin des sc. méd. T. 2. p. 128*). Cfr. PORTAL l. c. p. 179. Immo eruptionem dentium sapientiae epilepsia concomitavit. *Idem. p. 219.*

33) HIPPOCRATES *aph. 25. S. 3. Chart. T. IX. p. 120.*

34) PETRANTI *Epilepsie u. Medullar - Sarcom; Ausrottung u. hierdurch Behebung beider Uebel ex Filiastr Sebenio in Oesterr. med. Jahrb. 1839. B. 28. p. 319.*

35) ARNET in *journal. de méd. T. 91. p. 117. Juin. N. 3* (infarctus).

36) LAENZNERDE *append. ad SCULTETI armament. chirurg. (turunda in vulnus immissa).*

37) DANIEL *Pathologie. 1. Th. p. 259.*

38) HAEN *rat. medendi P. III. c. 2.*

39) DANIEL l. c.

40) MERKLIN *de epilepsia recurrente, a sinistri pedis pollicis laesione orta* (*Observat. med. physic. Dec. I. an. 6. et 7. p. 112*).

41) RHODIUS *cent. I. obs. 61.*

42) SENBUNK L. I. N. 193. TULPIUS L. I. c. 9.

sicae urinariae <sup>43</sup>), sanguis grumosus in collo vesicae retentus <sup>47</sup>), callus in pene <sup>42</sup>), funiculi spermatici ligatura <sup>44</sup>), violentiae testiculis <sup>40</sup>), hypochondrio dextro <sup>41</sup>) illatae, mala uteri, conceptio <sup>45</sup>), mola <sup>42</sup>), graviditas <sup>46</sup>), inprimis delitescente

43) BAUMES in *journal. de méd.* T. 47. p. 320. PORTAL l. c. p. 189.

44) LA MOTTE *chirurgie* obs. 174.

45) LA MOTTE l. c. obs. 173. REIL *Fieberlehre*. 4. B. p. 81 (per ureteres transsentes). BRUNDEL de calculo vesicae urin. renumque natal. Opusc. T. I. p. 59. TRAUS *Abh. d. Krankh. d. Nieren, Harnblase etc.* in *n. Samml. d. auserl. u. neuest. Abh. f. Wundärzte*. 18. St. p. 258.

46) BONET *sepulc. auct.* p. 288. TUCKER in *the lancet*. Lond. 1826. Jul. (calculo extracto, epilepsia cessavit).

47) ZACUTUS LUSITANUS *prax. hist.* L. VII. obs. 6.

48) WEIGANT de setyriasi epileptica infantis (act. acad. nat. cur. Vol. 2. p. 402).

49) TREDEN n. *Bemerk. u. Erfahrung*. 2. Th. p. 50. BROMFIELD *chir. Wahrnehm. a. d. Engl.* p. 113.

50) Cfr. hist. §. LVIII. N. 4 (45).

51) SCHUBERT exempl. casus epilepsiae cum symptom. rarioribus (Misc. ec. n. cur. Dec. I. an. 2. p. 388).

52) VOGEL *praelect. ac. edit.* TISSOTI p. 499.

53) BENIGN. de ebdit. morb. causa. C. 99. praegnentium. FERNEL L. V. *pathol.* C. 3. SCHENK in obs. ex FORBETO L. X. obs. 66. GULLMANN motus epileptici falsae conceptioni supervenientes (Eph. nat. cur. cent. 9. et 10. p. 296).

54) Eph. nat. cur. Dec. I. an. 3. obs. 160. Dec. II. an. 10. obs. 89. Dec. III. an. 9. obs. 208. cent. X. obs. 27. FERNELIUS *path.* L. V. C. 3. SCHENK L. I. obs. 205. RHODIUS cent. I. obs. 60. SUGNER *praes.* REIL *diss. continens enalecta ad doctr. epileps.* Hal. 1801. p. 22. HAASE *vierzehnter Jahresber.* etc. in *gemeinsame deutsche Zechr. f.*



tescente in utero puero<sup>55</sup>), partus laboriosus<sup>56</sup>),  
relicta secundina<sup>57</sup>); suppressio menstruorum<sup>58</sup>),  
lochiorum<sup>59</sup>), haemorrhoidum<sup>60</sup>), epistaxeos<sup>61</sup>),  
inter-

*Gebtsk.* 1829. B. 4. H. 3. p. 428 (primipara, antehac epileptica, quarta hebdomade ante partum novos perpeses est insultus). VOK in *Uebers. der Verhandl. d. med. Gesellsch. des Kant. Aargau v. J. 1827. II. Quartal*, in *Verhandl. d. vereinigt. ärztl. Gesellsch. d. Schweiz, Zür.* 1830. p. 240. KRATZENSTEIN *Epilepsie durch Schwangersch. erzeugt*, in *CASPER Wochenschr.* 1835. N. 20.

55) LA MOTTE chir. compl. T. 3. p. 420. QUARIN l. c. T. II. p. 16.

56) FREEMOON in *nov. act. nat. cur.* T. 3. p. 30. MAURICHAU obs. *sur la grossesse et l'accouchement*. T. 2. obs. 2. 36. 51. 86. 90. 156. 194. BAUMBACH *Ausbr. schr. heftig. epilept. Krämpfe während d. Geburtsarbeit*; in *RUST Mag.* 1828. B. 26. H. 1. p. 196. PORTAL l. c. p. 335 (post partum neonati mortali desit epilepsia) 336 sq. SINGOLD *Journ.* 1830. B. 9. St. 3. p. 573.

57) HULDERICHUS l. c. §. 15.

58) STEWART diss. sistens cas. puellae post mensium suppressionem. epilept. Tub. 1780. B. STURHEL l. c. SINGOLD *Journ.* 1828. B. 8. p. 536 (amenorrhoea epilepsiam excitans). PORTAL l. c. p. 262. *Merkwürdiger Criminalf. ein. in d. Zustande ein. Entwickelungehr. verübt. Brandstift.* in *N. Archiv des Criminalrechts v. ARNO etc.* B. 14. St. 3 (Puella epileptica 19 annorum, nondum menstruata vaginam hymene habebat clausam. Que membrane discissae menses apparuerunt et epilepsia dispersit). Fasti medici exemplis hujus generis abundant et in propriis prexi vidi.

59) HÄRDER in *misc. ec. nat. cur.* Dec. III. an. 2. obs. 100 (primipara) TIMAEUS A GULDENKLES epist. p. 476. GARDING l. c. p. 56.

60) HÖNERWOLF *misc. ec. nat. cur.* Dec. III. an. I. obs. 119.

intermissio venae sectionis<sup>62)</sup> et coitus<sup>63)</sup>, abusus potus vini<sup>64)</sup>, alcohol<sup>65)</sup>, theae<sup>66)</sup>, coffeae<sup>67)</sup>, motus nimius<sup>68)</sup>, morborum cutis impedita evolutio aut incauta fuga, e. c. erysipelatis<sup>69)</sup>, variolarum<sup>70)</sup>, morbillorum<sup>71)</sup>, scarlatinae<sup>72)</sup>, miliaria-

GESNER *Entdeck. d. neuest. Zeit in d. Arzneigelahrth.* 3. B. p. 217. Tria hujus generis mihi in viris obvenerunt exempla.

61) HAGENBORN obs. med. cent. I. obs. 20. cfr. §. LIII. 2 (5).

62) HOFFMANN de epileps. obs. 12. opp. T. III. p. 23.

63) BONET l. c. obs. 44. TESTA l. c. p. 385 (post longos excessus venereos). CHAMBERLAIN DE MONTAUX *Abh. v. d. Krankh. unv. u. v. d. Frauenzimmer. A. d. J. Leipz.* 1787. p. 446. DRYASIS l. c. p. 239. Epilepticum novi caste viventem, qui paroxysmi adventum ex peculiari morositate et gravitate capitis praesagit. Praesagium toties eventum non confirmatur, quoties pollutio nocturna ingruit. Referente Dr. HABERD inter 162 epilepticos nosocomii Parisiensis Bicêtre numerabantur 119 non collocati in matrimonio; 33 nupti, et 7 vidui. v. *dict. des ac. méd.* l. c. p. 523.

64) FORRESTUS L. IX. obs. 27. SCHENK L. I. obs. 218. GARNIER cent. IV. p. 125. MITHOF diss. de sede irritamenti in epilepsia. Goett. 1788. p. 14. GODIER l. citando.

65) RIEDLIN obs. cent. III. N. 90. Commer. liter. Norimb. 1736. p. 154. — 1745. p. 215. Eph. nat. cur. Dec. II. an. 8. obs. 85. PSLARUS *med. Jahrgänge.* 2. B. p. 183. GREDING l. c. h. B. p. 131. Terribiles insultus epilepticos, ex ebrietate ope aquae vitae contracta observavi, ac in ea versor opinione, epilepsiam in regionibus septentrionalibus maxime ob absum potus alcohol tam familiarem esse. De hac re consentit LICHTENSTEIN l. c. p. 73.

66) BOGHERT in TODD *med. chir. Bibl.* 7. B. p. 199.

67) DE MEZA in collect. soc. med. Havn. Vol. I. N. 19.

68) BIERLING *adversaria curiosa.* p. 218.

69) Misc. ac. nat. cur. Dec. III. an. 9. et 10. obs. 200.

liarium<sup>73)</sup>, psoræ<sup>74)</sup>, herpetis<sup>74)</sup>, achorum et tine-

70) Quamvis convulsiones variolarum invasionem saepe concomitantes (P. 1. ed. ult. Vol. III. Sect. 1. C. IV. §. XX. 1)<sup>70</sup> ad epilepsiam nequaquam revocari possint; attamen variolæ hic silentio præteriri nequeunt, quum doctrinam convulsionem in genere illamque epilepsiae in specie illustrent. Docent nempe, symptomate epileptici actioni irritanti coetegii variolosi in systeme nervosum adscribende esse, et veluti crisis in exanthemate agnoscere. Lego de hoc argumento SWIETENIUM l. c. §. 1075. et HUFELANDUM *Bemerk. üb. d. natürl. u. inoculirt. Blattern.* 3. Aufl. Berl. 1793. PORTAL l. c. p. 280.

71) LAUR drei verschied. casus practici in *Samml. der med. Soc. in Rudissin.* p. 269 (— 2. casus de puella ex morbillorum retrocessione epileptici convulsionibus tentata et per tempus in aphonium intercurrente). SWIETEN l. c. PORTAL l. c. p. 278.

72) CAPPEL *Abh. v. d. Scharlachauschlags.* Gött. 1803. p. 75. an. 1848 scarlatina Vilnæ epidemice grassabatur, ac paucæ vel nulle desquamatione terminari solebat. Frequens lade erat anasarca et hydrocephalus acutus. Hoc morbo, seu potius encephalite ingruente, in multis status apoplectici cum repetitis insultibus epilepticis ingruebat, ite ut de aegrotorum vite actum videretur. Nihilominus fere omnes ex orci faucibus eripere licuit, in primo morbi limine ope hiradieu ad tempora aliorumque antiphlogisticorum, sazius per vesicatorium dermo capiti applicitum et calomel. Legi merentur, quæ hoc de argumento in actis societatis Vilnensis auditor quondam meus, Dr. WRIDLEWSKI scripsit (*Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Wileńskiego.* T. 2). Cfr. quoque PRISCU *epilept. Krämpfe mit Erblindung, im Zeitraume der Abschuppung des Scharlachs entstanden; in med. Ver-Ztg. in Pr.* 1839. N. 28. p. 141.

73) BARNETON in *hist. de l'ac. r. de méd.* an. 1776. p. 220.

74) TRINCVELLIUS *consil. L. I. N. 29.* RIEDLIN *lin. med.*

tineae<sup>76</sup>), plicae<sup>77</sup>), ulcerum<sup>78</sup>); suppressio su-  
do-

1696. p. 305. MARCELLUS DONATUS L. IV. c. 19. p. 412.  
SCHENK L. I. obs. 199. LENTILIUS misc. T. I. p. 32. SEN-  
BERTUS paralip. ed lib. V. Pr. N. 2. HOFFMANN. consult.  
cent. I. N. 18. BANG *Auswahl aus d. Tageb. d. K. Kran-*  
*kenhaus*, p. 165. LOEFLER *Beytr. z. Wundarzneyk*, 1. B.  
ACKERMAN *Bemerk. üb. d. Kenntnisse u. Kur einiger Krankh.*  
4. *Heft. Altd.* 1798. p. 66. 67. AUTENRIETH et WAGNER  
diss. de morb. ex scabie orietibus. Tub. 1807. AUTEN-  
RIETH *Versuche f. d. pr. Heilk. aus d. klin. Anstalten v.*  
*Tübingen*, 1808. p. 304. Ejusdem diss. de morb. mulier.  
ex scab. repulse propullulant. Tub. 1813. VICQDÉ epud  
PORTAL l. c. p. 311. RIBKEN *üb. einige antipsorische Heil-*  
*method.* u. *die Heilung ein. Epilepsie* (ex scabie suppressa  
exitatae) *durch die engl. Methode*; in CASPER *Wochenschr.*  
1838. N. 39. EISELT *Epileps.* each zurückgetrieben. *Scab-*  
*ies*, in *Oesterr. med. Jahrb.* 1839. B. 28. St. 4. p. 533.  
Ipse plurimas epilepsias observavi, ubi saltem verisimile erat,  
morbum posse psorae iacoegrae fegetae originem debere.
- 75) Eph. n. cur. Dec. II. an. 4. obs. 89. RHODIUS cent. I.  
obs. 62. GILBERT advers. pract. p. 195. TISSOT l. c.  
p. 268 (fago herpetis frontis). *Journ. de méd.* 1822. Juill.  
PORTAL l. c. p. 309.
- 76) Eph. n. cur. Dec. II. an. 4. obs. 89. Schol. TIMANUS  
responsa N. 43. HAGENDORN cent. I. obs. 8. DIEMERBROECK  
obs. et curat. c. N. 60. COSCHWIZ diss. de exanthem. se-  
roso-lymphat. retrocedent. noxis. Hel. 1728. p. 13. LEN-  
TIN *Beytr. Einleit.* p. 13. SPERAT in *nuovo giorn. della*  
*più recente letteratura medico-chir.* T. 7. p. 114. MAISON-  
NEUVE l. c. p. 275. ESQUIROL in *dictionn. des sc. m. l. c.*
- 77) LAFONTAINE op. c. et SEDILLOX *journ. gén. de méd.*  
T. 34. p. 109. CERNITEKY de singulari pilor. vegetat.  
morbosa, quem trichoma polon. dicunt. Erf. 1808. p. 24.  
Iater tot male, ex resecta praepostere plica observata,  
epilepsia mihi hucusque non obtenerat.

doris<sup>78)</sup>, ptyalism<sup>79)</sup>, refrigerium<sup>80)</sup>, frigus<sup>81)</sup>, inanitio<sup>82)</sup>, ingluvies<sup>83)</sup>, lac ab infantibus deglutitum depravatæ (aliquando in una tantum mamma<sup>84)</sup>) conditionis<sup>85)</sup>, vel facile nimis in

aci-

78) Eph. n. cur. Dec. II. an. 6. obs. 201. an. 7. obs. 144.

ZACUT. LUSITANUS pr. admir. L. I. obs. 29. TULPIUS obs. LI. C. 8. PSCHLIN L. II. obs. 30. BANG in act. soc. med. Hafn. Vol. III. N. 10. MANGOR ib. Vol. II. N. 35. TRAMPPEL med. chir. Bemerk. p. 66. LANZONI de epilepsia ex ulcere in crure seneto (Misc. sc. n. car. Dec. III. an. 2. p. 38).

79) Eph. n. car. Dec. III. an. 3. obs. 106. MONRO account of disens. most frequent in the british military hospit. p. 237. Idem fatentur medici militares Galliae. v. dict. des sc. méd. I. c. p. 518.

80) TISSOT l. c.

81) DOLAEUS encyclopaed. p. 106. LENTIN in HOFFBLAND Journ. 14. B. 3. St. p. 13.

82) Eph. nat. car. Dec. II. an. 2. obs. 160. BENIVENIUS de abdit. morbor. causa. C. 46. DOLAEUS in encycl. dogmet. (Habet exemplum de Principe quodam epilepsia aliâ obnoxio, qui frigori intentissimo se committens statim in vie hoc malo correptus, tante vehementia, ut confestim vitam cum morte commutaverit). BOERHAAVE epilepsia pedis symptomatica; in ejusd. consult. II. P. 1. MARCARD üb. d. Gebrauch d. Bäder. p. 410.

83) e. c. infantes ex defectu lactis nutriti. ROSENSTEIN Anweis. u. Kenntniss u. Kur d. Kinderkrankh.; übersetzt mit Anmerk. v. MURRAY. p. 8. Cfr. LEDER de epilepsia ex inanitione. Misc. sc. n. cur. Dec. III. an. 5. et 6. p. 615. Cfr. PORTAL l. c. p. 256 sq.

84) MEINOM diss. de epilepsie stomach. Helmat. 1740. HAISTEK Wahrnehm. 1. B. N. 484. LENTIN l. c. p. 10.

85) ANBLUNKEN observationem narrat, ubi infans, si e dextra mamma sugeret, optime valuit, si e sinistra, ster-

Dd

acidum conversum<sup>87</sup>), item sanguinis a sectione frenuli pullulantis deglutitio<sup>88</sup>); diaeta vitiosa nutritricis<sup>89</sup>), esus lentis<sup>90</sup>), fragae<sup>91</sup>), cerebri<sup>92</sup>), vitrum<sup>93</sup>), acus<sup>94</sup>), ligni frustulum<sup>95</sup>), linum<sup>96</sup>)

et

tim passus est insultus epilepticos (Misc. ac. n. cur. Dec. II. an. 4. 1685. append. p. 212).

86) Infans, matris valde perterritae mammam sugens, epilepticus evadit. SCHNEIDER *Mittheil. a. d. Fache d. Geburtshilfe*, in *gemeinsame deutsche Ztschr. f. Gbtsk.* B. 1. II. 3. p. 473. Cfr. PRUIT apud PORTAL l. c. p. 331.

87) *Ueb. d. gewöhnl. Kinderkrankh. nach ARMSTRONG neu bearb. v. SCHAEFFER. Regensb.* 1792. p. 47.

88) ROSENSTEIN l. c.

89) WOLF in *act. ac. nat. cur.* Vol. 6. p. 160.

90) SCHENK obs. L. I. N. 219. — Ex esu fabae epilepsiam. puellae 7—8 annos natae curavit PORTAL l. c. p. 251.

91) RUMLEN obs. N. 99.

92) GRUEBER de cerebris passerum comestis epilepsiam inducentibus (Misc. ac. n. cur. Dec. II. an. 3. p. 372). Confirmat SCHENK esum cerebri passerum vel coturnicum epilepsiam excitasse. BEHLING diss. de epilepsia. Altorf. 1736. §. XXIV. VOIGT in *Summar. des Neuest. u. Wissenswürdigst.* 1836. B. 2. p. 40 (uvae passae earumque acini).

93) BARTHOLINUS hist. anat. C. V. hist. 66.

94) WIDENFELD diss. obs. med. trig. Goett. 1768.

95) Filius triennis Dr. Bonelli, medici egregii Vindobonensis, inopinatum in convulsiones incidit. Ventre simul meteorismum exhibente adhibitis clysteribus evacuabantur silices, fructus ribesiorum et tandem, praevio summo ad anum dolore, in conspectum venit *clava* formae digiti minoris. Convalnit, sed omni mense accessit *epilepsia*, qua hodie (1824) novemdecim annos habens adhuc excrucietur, tamen longioribus liberis intervallis. Annuntiant futurum paroxysmum borborygmi, tæpiditas aut tristities

et venena deglutita<sup>97</sup>); hydatides<sup>98</sup>), vermes<sup>99</sup>), inprimis ascarides lumbricoides<sup>100</sup>), quandoque et ascarides vermiculares<sup>101</sup>), ipsaeque taeniae<sup>102</sup>), ne de alijs hujus generis hospitibus, utpote dubiis

## D d 2

## sub-

inconsueta, rhonchi sub somno et voracitas. Ex schedia autoris.

96) RUST *Mag. B.* 18. H. 3, p. 456.

97) v. infra, narcotica. Et Jodiani nuperrime accusabatur, scilicet unguentum kali hydrojod. ad collum illinitum. v. G. E. F. DÜRR *Convulsion. epileptischer Art, durch Anwendung der Jodsalbe entstanden; in schweiz. Zeitschr.* 1837. B. 2. H. 1.

98) DE MERSESMANN *heftige epilept. Zufälle, durch Hydatiden im Darmkanale hervorgebracht; ex obs. méd. belge.* 1834. Novbr. in SCHMIDT *Jahrb.* 1835. B. 8. p. 42.

99) RAHN *Ber. üb. d. Besorg. d. Kr. im Zür. Spit.* 1827. in *Verhandl. d. vereinigt. ärztl. Gesellsch. d. Schweiz. Jahrg.* 1828. Zür. 1829. et ib. *Jahrg.* 1829. 2. Hülft. CARRHAT l. c. (cas. duo).

100) SCHMID diss. de epilepsia verminosa. Argent. 1708. ACKERMANN diss. de epilepsiae motuumque convulsivorum infant. caus. praecip. Gryph. 1765. DAWOSKY *epilept. Anfall in Folge v. Würmern; in n. Ztschr. f. Geburtsk. B.* 7. H. 3. PORTAL l. c. p. 349. *Exempla et praxis mea suppeditat.*

101) ROBIN. LENTILIUS in *misc. med. pract.* P. III. p. 24. RAY Beob. u. Schlüsse. Th. II. N. 6. WICHMANN *Ideen z. Diagnostik.* 3. Th. p. 81.

102) LEBONTE in *journ. de méd.* T. 84. p. 40. HUFELAND *neueste Annal. d. franz. Arzneik.* 2. B. p. 57. THILNIUS *med. chir. Bemerk.* 2. Th. Frankf. 1814. GAUBE in *revue méd. Par.* 1826. Juil. (taenia expulsa, epilepsia siluit). Sic etiam PORTAL l. c. p. 348. et GOUFIL in SCHMIDT *Jahrb.* 1835. B. 6. p. 250.

subjectis, dicamus<sup>103</sup>), meconium<sup>104</sup>), flatus<sup>105</sup>), diarrhoea suppressa<sup>106</sup>), drastica<sup>107</sup>), clyisma acre<sup>108</sup>), bilis<sup>109</sup>), strangulatio<sup>110</sup>), aegritudo<sup>111</sup>), ira<sup>112</sup>), gaudium<sup>113</sup>), amor delusus<sup>114</sup>), timor

et

103) e. t. de lacertis. v. eph. n. cur. Dec. II. en. 10.

obs. 166. GÖCKELIUS consil. et obs. Dec. IV. N. 8. SCHLICKEL eine Epilepsie, nach mehr als 1000 in ein. Jahre erfolgt. Paroxysm., binnen 2 Tagen gehilt; in allg. med. Ztg. 1837. B. 40. N. 44 (duobus lacertis viventibus per os aditus, puella 12 annorum epilepsia crudelissima liberata est). — Puer rusticus, octo annos natus, bonae valetudinis, repente et sine ulla causa nota convellitur et epilepticus evadit. Paroxysmi quotidie et crebrius redeunt sine complicatione sineque alius morbi symptomatibus. Quarta tandem morbi die in auxilium vocatus ecoproticum ordinevi. Remedio praesente quinque millesimos viventes ex ano aegroti in conspectum venerunt; quo facto epilepsia siluit. Ex schedis editoris.

104) CHAMBERLAIN üb. d. Krankh. d. Kinder. 1. B. Abth. 2. p. 334.

105) Sætem ad sensum veterum (SCHENK obs. L. I. obs. 200) at in infantibus (FESCHLIN obs. phys. med. L. II. obs. 29).

106) Eph. n. cur. Dec. I. an. I. obs. 88.

107) CLAUDE in misc. ec. net. cur. Dec. II. en. 7. obs. 162. HAGENBORN cent. I. obs. 21. RANON in ect. r. soc. med. Hev. Vol. II. N. 8. p. 108.

108) Misc. ec. n. cur. Dec. II. en. 3. obs. 77.

109) DU CLUDET ergo ab humore bilioso epilepsie. Paria 1643. UNZER Arzt. 6. B. p. 137. FISCHER in STARK Archiv. 1. B. 4. St. p. 187. PORTAL l. c. p. 186. 187. 266 sq. 287.

110) EMMANUEL obs. et refl. sur un accès épileptique, suite de la strangulation par la suspension (SEDILLÔT rec. périod. de la soc. de méd. de Paris. T. 26. p. 381).

111) KANLEIT l. c. (poenas publicas inmeruisse). KRIMMER in HUFELAND Joura. 1834. St. 9. H. RITTER l. c. p. 261.

112) WIENUS de ira morbo v. opp. p. 771. GLATCHEVNA



et terror<sup>113</sup>), imaginatio laesa<sup>114</sup>), intus in-  
sul-

obs. cent. IV. N. 59. GREDING *vern. Schrift.* 1. B. p. 54.  
57. 70. Inter 70 casus iure decies causae epilepsiae fuit.  
BOUCHER et CARAUVISILH l. c. p. 76. Cfr. P. II. ed. alt.  
Vol. I. Sect. I. C. XX. §. LXXXVII. 2 (14).

113) BOHRHAAVE de morbis nervorum. p. 804. De MARESS  
diss. de animi perturbationum in corpus hūm. potentia.  
Goett. 1775. p. 15 (studiosus, gaudio ex sex praemiis uno  
eodemque tempore acceptis, epilepticus). Capite damna-  
tus, cui in loco supplicii venia delicti dabatur, apilepti-  
cus evadit (v. POMMER in *Heidelb. klin. Annal.* 1827. B. 3.  
H. 1. p. 119).

114) AASKOW in coll. soc. med. Hafn. Vol. II. p. 16. LÖ-  
WENHARD in *HUFELAND Journ.* 1835. St. 6.

115) KORNZWEIG diss. de epilepsia a terrore orta. Gies.  
1713. FISCHER diss. de convulsionibus epilept. habitual.  
ex terrore. Erf. 1727. LUDWIG diss. de vi terror. in corp.  
hūm. Lips. 1790. ZIMMERMANN v. d. *Erfahr.* 2. B.  
p. 444. Calculo aetiologico propriorum egrorum insti-  
tuto inter 80 apilepsias 60 a terrore excitatas invenio  
(cfr. LOCHNER obs. practicae, circa lūem veneream, apilaps.  
et maniam. Vienn. 1736. p. 36); inter 273 casus, centies  
et quinquies timor fuit causae epilepsiae (BAU l. c. p. 299).  
Causae speciales fatalis illius terroris erant, pater super-  
veniens dnm filius exercebat coitum; punitiones severae  
parentum, institutorum et praecipue dominorum, lepus  
in flumen, explosio sclopeti a tergo, incendium, aggressio  
latronum; in infantibus speciatim conspectus larvae bac-  
chanalis nunquam antea visas, vitulus, capra sub cra-  
pusculo cubiculum intrantes, fales sub oestro venereo con-  
iunctae puellas in horreo dormienti super pectus insidentes,  
et creberrime canes, quorum Vilna, Byzantii instar, abun-  
dat. Greges illorum ipsas pletas obsident, et si plerum-  
que ab urbe horis vespertinis recesseris, veluti ferae sese  
ex solitariis domibus, super advenas praecipitant. De

sultus epileptici<sup>117</sup>), illius imitatio<sup>118</sup>), dolor<sup>119</sup>),  
titil-

spectris, credulis terrorem, subsequente epilepsia, inca-  
tientibus narrant Eph. n. cur. Dec. I. an. 6. 7. obs. 32. cent. I.  
et II. app. p. 189. Cfr. MAISONNEUVE l. c. Intuitus per  
manus carnificis in areis publicis intereuntium, plurimis  
funestus esse solet, sexui praecipue sequiori (BORRIS dis-  
de epilepsia. Jenae 1686. p. 14). Puellam quondam ad stu-  
prum sollicitatam, propter terrorem, gravissimam in epi-  
lepsiā incidisse notavit HERR in obs. HILMONT. in tract.  
ort. imag. morb. Habentur e contrario exempla epilepsiae  
a terrore ex levissimis causis excitatae, e. c. a conspectu  
mitrae passerum plumis infarctae. Eph. nat. cur. Dec. II.  
an. 2. obs. 190. MAIER de puella 17 annorum narrat, quae  
redux ex tragoedia *Maria Stuart* primum peroxysmum  
epilepsiae perpessa est (l. c. p. 49). Cfr. LICHTENSTEIN  
l. c. D'ALGUEN in HORN Archiv 1829. H. 1. SUFFERT  
in HUFELAND Journ. 1830. St. 2. p. 124. GARTANO ALLE-  
GRETTI ex observat. med. di Napoli 1830. Ottobr. in BER-  
NARD allg. Repert. 1831. Septbr. p. 364. NASSE in HORN  
Archiv 1834. H. 1. p. 5. ADELWANN klin. Memorabil. in  
allg. med. Ztg. 1835. Apr. (miles, epilepticus mortarium  
ingens bellicum explodendo).

116) Pastoris filii ambo in ea imaginatione ac timore versa-  
bantur, ut quoties orarent, toties necessario epilepsia  
correpti conciderent (PETERSEN disp. sistens epileps. con-  
sensual. singular. spec. Francf. ad Viadr. 1727).

117) Acta n. cur. Vol. II. obs. 133. Vol. III. obs. 58. Eph.  
n. cur. Dec. I. an. 4. et 5. obs. 43. Cum nosocomium civi-  
cum, quod Vindobonae est, ut medicas primarius es.  
1796 ingressus fuero, epileptici in communis cubicals  
aegrorum suscipiebantur. Rarissime id contigerat, quin  
ex intuitu insultus epileptici, unus alterve aliorum aegro-  
rum, praesertim sexus sequioris, eundem novum non ac-  
quisiverit morbum. Quae cum ita fuerint, Directori no-  
socomii, patri meo, proposui, ut epilepticorum receptioni

titillatio <sup>120</sup>), coitus <sup>121</sup>), onania <sup>122</sup>), contagium  
syphi-

peculiaris dicaret cubicula. Arrisit propositum, at novum inde emergebat melius. Eius vero paroxysmus vix unum invadebat aegrotum, cum jam reliqui, ejulatum aut lapsum percipientes in propinquis cubiculis, exemplum idem sequerentur, ex quo insultuum epilepticorum concursu, spectaculum vix verbis designandum oriebatur. Quae singula, cum vix ex terrore a conspectu insultus epileptici repeti possint, aliter explicari nequeunt, nisi deducto in auxilium *nisi imitationis* (P. II. ed. ult. Vol. I. S. I. §. III. 6). Lege de hoc argumento TURPIN l. c. p. 255. TOTY l. c. GODIER l. citando. HACKER *Epilepsie v. bloss. Ansehen*, in *Summar. des Neuest. u. Wissenswertigst.* 1836. B. I. p. 136. N. MEYER *Epilepsie durch Uebertragung*; in *med. Ver.-Ztg.* 1838. N. 8 (in schola gratuita Bielefeldae et in ea Ristbergae plurimae puellae ex illa causa in epilepsiam ceciderant. Idem accidit in ergastulo Sonnenburgi. Vide:) ZIMMERHANN *Mittheilung epileptischer Krämpfe*; in *med. Ver.-Ztg.* 1838. N. 8.

- 118) Accidit pluries, quod frendatores epilepsiam simulantes, tractu temporis re vera in hunc morbum inciderint, uti videre est apud CULLERIAN in *recueil périod.* etc. T. XIV. p. 290. MORHAU v. *mém. de la soc. méd. d'émul.* T. II. p. 189. METZGER *neue gerichtl.-medizin. Beob.* I. B. N. 1. DREYASIG l. c. p. 255.
- 119) MÜLLER diss. convulsion. et epileps. infant. ex lev. dolore prodeunt. rationes med. Hal. 1757.
- 120) SWISTEN l. c. p. 1075. ROBINSON *new syst. of the spleen, vapours etc.* Lond. 1719. p. 148. ESQUIROL in *dict. des sc. méd.* T. 12. p. 520 (puella 10 annorum, in plenta pedis titillata, in epilepsiam incidit. Paroxysmi deinde quotiescunque titillationem illae minitante redierunt).
- 121) HENRIS obs. med. 18. p. 176. FAUPEL diss. de epilepsia. Gött. 1792. p. 83 (Coitus a multis parva dicitur epilepsia). Die 19. mensis Septembris 1800 vocatus sum

sypiliticum<sup>123</sup>), abusus<sup>124</sup>) venaesectionum<sup>125</sup>),  
vigi-

ad foeminam 30 annorum in suburbio Gumpendorf. A tribus annis foemina haec pignus admodum reddebatur. Mense Martio 1800 cum marito rem bebans, praeter morem, validissime sub concubitu delectebatur, movebatur; post dimidiam horam convulsiones epilepticas similes, succedebant. Ab eo tempore satis bene velens, fame magnasaepe laborans, teeniae (ut mibi referunt) letae partem, alnae fere longitudine excrevit. Ante 7 dies cum maritus ab itinere 15 dierum redisset, et cum uxore coiret, haec iterum violentos in motus sub coitu rusbat, sibi aliis insolitos; post dimidiam horam denuo fortiter convalsa. Ter vero ehhinc rediere convulsiones, etsi mitiores. — Hujus foeminae exemplum alterum in mentem mihi revocet, scilicet uxoris medici Göttingensis quondam, formosae et juvenis. Maritus me pro hac 1784 consuluit, referens, quod uxor, quam ante annum duxerat, quovis sub concubitu in epilepsiam raparetur, antehac sibi insolentem, ite ut e coitu prorsus sibi abstinendum esset. Goettingam mox hic medicus deseruit, ita ut exitum hujus meli ignorem. Ex schadis J. P. FRANK. — Cfr. PORTAL l. c. p. 258. GODIER l. citando. v. WINDISCH *klin. Bericht* etc. in SCHMIDT *Jahrb.* 1836. B. 9. p. 218.

122) TISSOT u. d. *Onanie*, Tom. 2. 4. 11. *Abesch.* Virum egregium etro nimis colore effectus onaniae depinxisse eoque credidi, quousque in magnis urbibus proxia non exercuissim; tunc etenim persuasus sum, eum necdum setis effectus terribiles omnium vitiorum delineasse, quod praecipue relate ad epilepsiam valet. Si enim terrorem et vermes excipiam, nulla epilepsiae existit frequentior causa, quam onania. FLANDER in *Würtemb. med. Corresp.-Blatt* 1835. N. 9. SCHNEIDER in *Hufeland Journ.* 1837. St. 3. cas. I.

123) v. infra §. LVI. N. 29.

124) Cosmeticorum: PORTAL *anat. méd.* T. 4. p. 368 (juvenis,

vigiliae<sup>128</sup>), inprimis ob incubationes<sup>129</sup>); insomnium<sup>130</sup>), narcotica ut opium<sup>131</sup>), hyoscyamus<sup>132</sup>), nicotiana<sup>133</sup>), baccæ atropæ belladonnae<sup>134</sup>), oenanthæ crocatae<sup>135</sup>), conium maculatum<sup>136</sup>), cicuta aquatica<sup>137</sup>), rhus coriaria<sup>138</sup>), folia pruni laurocerasi<sup>139</sup>), oleum juniperinum<sup>140</sup>), sudo-

ut capillo rufo alium colorem induceret, arcano, i. e. solutione argenti nitrici usus est. Deinde cephalalgia terribili tentatur, in epilepsiam transiente).

125) MEYER  *Syst. Handb. u. Erkenntn. u. Heil. d. Blutflüsse. Wien 1804. 1. Th. §. 3. p. 82, 83.*

126) LANCIVS, opp. III. p. 62.

127) GALIENUS de locis affect. L. V. C. 6. ed. Chast. T. VII. p. 492. TISSOT *maladies des gens des lettres.* p. 70. BRUNN in *Verhand. von Flissing.* 17. B.

128) Eph. n. cur. Dec. II. an. 4. app. p. 209. PAULLINI cent. IV. obs. 74. Legatur historia a me ipso allata. Vol. II. ed. alt. P. I. Sect. 1. C. IX. §. XLII. 1 (5).

129) BACKER in observationibus ad tract. de submemorum morte N. 6. MUELL. *Wahrnehm.* 2. B. N. 20 (Praesertim ut causa convulsionum infantum, si a nutricibus ignavis ad somnum conciliandum adhibeatur).

130) Misc. n. cur. Dec. II. an. 1. p. 340 (Ex decocto hyoscyami contra cephalalgiam fomentations).

131) Eph. nat. cur. Dec. II. an. 7. obs. 196.

132) UNZER *med. Handbuch.* 1789. p. 555.

133) *London. med. Journ.* 5. Vol. 1784.

134) CULLEN *Mat. med.* Edit. HANNMANNI. 2. Th. p. 336. — MURRAY (apparatus medicum. Vol. I. p. 482) alique observatores fide digni testantur, esu apii petroselinii et in epilepticiis paroxysmos excitatos esse, et sanos epilepticos avasisse. An a conio maculato, illi non raro intermixto?

135) WERFFER hist. ciculae aquaticae. p. 61.

136) DANIEL *Pathologia.* 1. Th. p. 260.

sudorifera<sup>133</sup>), morsus araneae<sup>134</sup>), vapores varii<sup>135</sup>), odores e. c. halitus ranunculi hortensis<sup>136</sup>), foliorum juglandis<sup>137</sup>), cannabis<sup>138</sup>), panis recentis<sup>139</sup>), fumi candelae sebaceae<sup>140</sup>), mercurii<sup>141</sup>), conspectus coloris rubri<sup>142</sup>), intuitus homi-

137) MORTIMER in *phil. transact.* Vol. 37. p. 137.

138) SINGER in *misc. ac. nat. cur.* Dec. I. an. 2. p. 27.

139) LEDEL in *misc. ac. nat. cur.* Dec. III. an. 2. p. 56.

140) SALMUTH cent. III. obs. 35. CAMERARIUS dissertatio de epilepsia p. 15.

141) VALLIENRI opp. Vol. III. p. 204. PETIT ergo tantam ab halitu epilepsia. Paris 1662. PORTAL l. c. p. 282 (gas mephiticum). SOLON üb. *Epileps, saturnina u. die damit verbund. Hypertrophie des Gehirns*; ex *bull. gén. de thérap.* T. 6. livr. 8. in SCHMIDT *Jahrb.* 1834. B. 4. p. 309 (morbus ex vaporibus saturninis recenter exortus, lethalis est). *Epilepsia saturnina bei einem Kinde* (XI annor.) ex *bull. de thérap.* T. 7. livr. 10. in SCHMIDT *Jahrb.* 1835. B. 8. p. 41. NIVET d. *Bleiepilepsie*; ex *gaz. méd.* 1837. Jan. in FROHNE Notiz. 1837. N. 15. BROCKMANN *pathol. therap. Bemerkg. üb. d. Bleikrankh. d. Hüttenarbeiter*; in HOLSCHER *Hannöv. Annal.* 1837. B. 2. H. 3. p. 556 (epilepsiam saturninam describit).

142) Eph. n. cur. Dec. III. an. 9. et 10. obs. 92.

143) TIMANUS a GULDENKLEE L. VII. caa. 8.

144) CLERC medicus veri amator p. 189.

145) SCHUBART *traité du cancer des mammelles* p. 175.

146) ANMAN med. critica. Cons. 59.

147) WALTHER Thes. obs. 59. ZANETTI de epilepsia mercurialib. inducta. Nov. act. nat. cur. T. VII. p. 181. PORTAL l. c. p. 293.

148) BOCHAN de rhechitide perfect. Argent. 1715. HANNUS *Brief an BALDINGER über den Friesel.* Leipz. 1770. p. 110. TISSOT l. c. p. 161. E. c. cruoris e vulnere profluentie: ADRELMANN *klin. Memorabil.* in *allg. med. Ztg.* 1836. April.

hominis, quisquis denique sit, obvii<sup>148</sup>), leporis etiamsi depicti<sup>149</sup>), potus cioccolata<sup>151</sup>), phases lunae<sup>152</sup>), inprimis novilunium et plenilunium<sup>153</sup>), tenebrae<sup>154</sup>), campanarum<sup>155</sup>), tubarum<sup>156</sup>) sonitus,

149) LENTILIUS in misc. ac. n. cur. Dec. II. an. 2. obs. 149.

p. 326 (Dum obvelata facie neminem praetercuntium conspiceret, nil tale experiebatur).

150) Eph. nat. cur. Dec. II. an. 4. app. obs. 45. p. 200 (Dicitur quod praegrans aegri mater a lepusculo e frutice surgente et viam interturbante in insomnio viso perterrita fuerit).

151) TISSOT l. c.

152) Evangel. MATTHAEUS C. 17. v. 15. GALLENUS de dieb. crit. L. III. c. 2. ALEXANDER TRALLIANUS L. I. c. 21. STAHL diss. de haereditaria disposit. ad morb. Hal. 1706. p. 48. MRAD de imperio sol. et lun. in corp. hum. Lond. 1704. BOURNESTER diss. de morbo spat. Goett. 1791. p. 20. OTTO diss. de planetarum in corp. hum. influxu. Francf. ad Viadr. 1805. Datur epilepsia ad singulas lunae quadras recurrens et quidem tam exacto calculo, ut virgo epileptica, de qua WEDEL narrat (Eph. germ. an. 2. decur. 2. obs. 116), ipso momento quadras lunaris et in scia saepe penitus hujus mutationis in coelo, rhythnum lunarem in suis paroxysmis explicaret.

153) CAMERARIUS memorab. cent. II. N. 36. Num ex novilunio aut plenilunio, sed certe illorum tempore, plurimi epilepsiarum paroxysmi excitantur. G. J. MOST (l. c. in HORN Archiv) de epilepsia macrocosma, a lunae phasibus excitata, cui novi- et plenilunio nati submissi sunt, loquitur. De lunae influxu in epilepticos cfr. PITTSCHAF in HUFELAND Journ. 1829. St. 10. J. S. ROSENTHAL Bemerkung. üb. d. Salubrität v. Güstrow, Sommer 1826. in HORN Archiv 1834. H. 3 (duo pueri sub plenilunio epileptici).

154) NASS vir Cl. juvenem Westphaliensem, epilepsia affe-

nitus, afflatus venti frigidi in aurem<sup>157</sup>), mora in ecclesia<sup>158</sup>), otium et solitudo<sup>159</sup>), ne de caussis, quas vocant supernaturales<sup>160</sup>), loquamur.

C. proxima.

3. Si simplicissimae licet febris caussam proximam adhuc ignoramus<sup>161</sup>), quid mirum, si eandem ignorantiam circa intimam naturam morbi adeo intricati<sup>162</sup>), ut epilepsia, fateri adigamur. Hypothesium variarum scholarum<sup>163</sup>) curiosi, hinc alios<sup>164</sup>) adeant, nosque cum pace dimittant<sup>165</sup>).

#### §. LVI.

etum curavit, cujus insultus nunquam, nisi in tenebris, redibent. Quamdiu candela totas per noctas arderet, nunquam dormiens morbo prehenderetur; quo primum vero lux nocte quadam exstingueretur, constantissimus erat epilepsiae reditus (MACKEL *Arch. f. d. Physiol. Hal.* 1816. 2. B. 1. H. p. 132).

155) Eph. n. cur. Dec. II, an. 2. obs. 149. — Dec. III. an. 5. 6. obs. 27.

156) Mendicantem vidit FORESTUS (lib. X. de cerebri morbis, obs. 54. Schol. p. 382), qui toties in epilepsiam incidebat, ac pueri *tuba tortili* in plateis sonnum sdebant.

157) RONDELET meth. curand. morb. L. I. C. 36. p. 170.

158) PAULLINI obs. meth. phys. Lips. 1700. cent. IV. obs. 68. SAUVAGES nos. meth. Ed. DANIEL T. III. p. 117.

159) Filias duodecim annorum Comitissae Pedemontani C.\*\*, qui Novocomii consilium meum petiit d. 22. Jun. 1831, nunquam insultum epilepsiae petiit, dum aut occupatus aut in societate est.

160) Legatur de hoc argumento SWIRYEN l. c. §. 1072.

161) P. I. ed. alt. Vol. I. S. I. C. I. §. XIX. 1 (6).

162) Notissimum est JOH. CRATONIS A KRAFTHEIM votum, quo proptavit, ut sibi ante vitae suae exitum intimius epilepsiae cognoscere liceret genium (Epist. med.).

163) HIPPOCRATES et GALENUS pituitam praesertim acidam accusabant. Veteres et recentiores, vexilla spirituum se-



## §. LVI.

## D i a g n o s i s.

1. Epilepsia frequentissime ab iis, qui e ser- Epilepsia  
simulata.  
vitio dimitti, aut poenam effugere, aut miseri-  
cor-

quentes, epilepsiam ab explosivo spirituum animalium, per nervos ad partes musculosas motu et influxu derivant. PARACELSUS (lib. paragr. III. C. 2. in Schol. ad §. 1) ait: „Causa totius morbi in chabs est“ et §. 3. „*Wann nun der Chabs da ist, ad nequitiam gehet, so wird morbus endacus: sub so viel species Mercarii sind, so viel sind auch species caduci.*“ Comparavit etiam PARACELSUS epilepsiam cum terrae motu, cum tonitru et fulgure, tempestate improvisa (v. CROLL de intern. rarum sign. p. 53). STAHL causam proximam hujus morbi collocandam reputavit in generali quadam intentione animi excussioe, ubi in sublatum aequilibrium inter actionem nervorum et musculosum. Cfr. EGMONT I. c. Ant, quod idem est, in abundantia seu interpellatione sensibilitatis nervorum ac irritabilitate musculosum. Cfr. PORTAL I. c. p. 202—203.

164) MONSIEUR diss. solennis de epilepsia. Francf. ad Viadr. 1700. FA. HOFFMANN diss. de vera mali epilept. causa. Hal. 1732. BEHLING diss. de epilepsia. Altorf. 1737. WESTPHAL de epilepsia motuumque convulsivorum. infant. caus. praecipuis. Gryphisw. 1765. WOLFFERTH diss. de causis quae epileps. produxissae viae sunt. Harderov. 1786. HENNING diss. analecta ad theor. epileps. Gryphisw. 1788. TISSOT I. c. DREISSIG I. c. p. 246. 249.

165) ESQUIROL, postquam varias circa causam epilepsiae effectas hypotheses attulerit, pulchre ait: „*C'est trop s'arrêter à ces furies de l'imagination*“ (I. c. p. 524). Et concludit PORTAL (I. c. p. 205): „*Indess gestehe ich, dass die Kenntniss aller dieser besondern Ursachen der Fallsucht so dunkel, dass es klüger ist, sich zu begnügen, allgemein erkannte Erfahrungssätze anzunehmen, als sie erklären zu*

cordiam excitare volunt, *simulatur*<sup>1)</sup>). Fraudatores enim simulare solent: livorem tumoremque faciei, — laqueo collum arctè circumdante et sub vestibis recondito; spumam oris, frustulo saponis aut baccis rubris in cavitate illius revolutis; convulsiones, — motibus musculorum extremitatum, faciei et oculorum artificialibus; et tandem anæsthesiam, — firma voluntate cruciatibus experimenti caussa adhibitis resistendi. Quæ cum ita sint, cavendum, ne ex uno tantum signo de præsentia aut absentia epilepsiae testemur. Respicendum imprimis est:

a. *ad modum invasionis*. Epilepticus, nisi prodromo quodam signo admonitus, extemplo et sine selectu loci, nunc solus, nunc coram testibus omnis generis, *præsternitur*. Qui epilepsiam simulat, sese ad cadendum quodammodo accingit,

ac

wollen, um daraus einige nützliche Folgerungen für die Behandlung zu ziehen, oder diese mehr oder weniger darnach zu bestimmen.“

- 1) SEDACHER diss. de epilepsia simulata. Lips. 1732. VOGEL de morb. simulat. Goett. 1769. SCHNEIDER diss. de morb. fictione. Francf. ad Viadr. 1794. TISSOT Art. XXXVI. *Epilepsie feinte*. MARC dict. des sc. méd. Vol. cit. *Epilepsie simulée*. H. MARSHALL pract. Bemerk. üb. d. Inspection d. Rekrut. . . u. üb. simulirte Krankheiten, in HORN Archiv 1827. H. 1. p. 35. PORTAL l. c. p. 357. C. F. L. WILDBERG üb. d. Mittel, eine simulirte Epileps. v. ein. wahr. zu unterscheid., in ejusd. Mag. f. d. g. A.W. 1831. B. 1. H. 3. p. 285. DIEFFENGRABEN diss. cit. SALOMON epilepsia simulata, in CASPER Wochenschr. 1834. N. 13 (puer 8 annor. paroxysmos epilepticos simulavit, nec non miles tiro).

ac locum idoneum pro lapsu eligit, et scenam libentissime coram testibus notionum medicarum ignaris ludere solet <sup>2)</sup>).

b. *Ad conditionem oculorum.* Palpebrarum quidem et oculorum motus, quales indicavimus, magna adhibita arte simulare licet <sup>3)</sup>; at nunquam corneae descriptum statum ac capacitatem, lucem inopinate admotam immobiliter perferendi.

c. *Ad statum pulsuum.* Remittente insultu epileptico, aut eo cessato, *pulsus* plus minus contractus et irregularis tangitur. Quodsi malum simulatum fuerit, pulsum non nisi crebriorem expectabis, nisi forte fraudator modum arterias brachii alternatim comprimendi invenerit, ad quam fraudem detegendam manicarum examen non negligendum.

d. *Ad conditionem extremitatum.* Quamvis *adductio pollicis* ad volam manuum nequaquam pro symptomate pathognomonico epilepsiae haberi possit <sup>4)</sup>; attamen illa adductio raro desideratur. Praeterea tanto in gradu ea observatur, ut digi-

tus

2) Epileptici de morbo suo loqui nunquam cupiunt; aliis fraudatores. Cfr. MARSHALL l. c.

3) MARSHALL l. c. adnotat: „Bei Verstellten sehen die Muskelverdrungen (faciei) eher wie Grimassen, als wie kräftige, unwillkührliche Muskelbewegungen aus.“

4) Lege de hoc argumento (in MECKEL n. *Archiv d. pr. Arzneyk.* 2. Th. Leipz. 1790. p. 21. 61) celebritatem hitem inter medicum Numbergensem et facultatem quendam medicam, quae aegrum ab illo pro epileptico declaratum ob id, quod spuma oris deerat, et pollex non fuerat adductus, alio morbo laborasse affirmaverat.

tus magnus non nisi summa cum vi explicari possit. Porro explicatus pollex, jam non amplius, nisi forte novo quondam adventante spasmo, adduci solet<sup>5)</sup>. E contrario pugnus hominis epilepsiam fingentis non solum facilius explicatur, sed explicatus illico de novo adducitur.

e. *Ad statum sensibilitatis et perceptionis.* Cum epilepsia *feriatione sensuum et facultatum animi* insigniatur, omne phaenomenon statum illorum activum denotans, paucis concessis exceptionibus<sup>6)</sup>, fraudis exhibet testimonium. Sensuum vero et perceptionis *improvisa* instituenda est exploratio, aliàs enim, ut monuimus, fraudator, voluntate firma munitus, ipsis dolorificis tentaminibus, quin vel minimum sensus et perceptionis indicium manifestet, resistere valet<sup>7)</sup>. Explosio inexpectata sclopeti, vellicatio narium ope nicotianae<sup>8)</sup> aut calami scriptorii, vapor sulphuris accensi sub naribus, ac praeparatio tormentorum, ut ignis<sup>9)</sup>, ferri caudentis<sup>10)</sup>, cerae sigillatoris  
funae

5) MARC in dict. des sciences méd. l. c. p. 542. PORTAL l. c. p. 363.

6) Cfr. infra 2 (14).

7) HARN l. c. MARSHALL l. c. („mit unglaublicher Ausdauer ertrugen Manche die schmerzhaftesten Mittel“).

8) Suadet in Lond. med. j. 1825. Aug. p. 90. Pulvis stru-  
nutatorius autem acerrimus esse debet. MARSHALL (l. c.)  
saltem ait: „von Reizmitteln auf die Nase werden nicht  
alle Subjecte afficirt.“ WILDSCHNIG l. c. (spargit nicotianae  
pauxillum in oculi conjunctivam).

9) DE HARN (l. c.) jussit, ut saccus stramineo repletus, in  
quem fraudator epilepticus positus fuit, incendatur; quo

fusae (vix unquam tamen cuti revera admoventur), optime reconditam patefaciunt fraudem<sup>11)</sup>.

f. *Ad durationem paroxysmi et conditionem aegroti post insultum.* Paroxysmi epileptici reales plerumque fictis breviores sunt. Illis absolutis, cutis temperatura imminuta, sudor universalis uno impetu prorumpens, pulsus irregularis, et urina aquea observari solent. Contra vero post insultum fictum, nil nisi hominis a continua jactatione defatigati animadvertuntur signa.

g. *Ad habitum.* Qui epilepsia diu laborant, musculos faciei plus solito exaratos, motibus involuntariis agitados, palpebras inferiores tumidas, intuitum torvum, oculos vacillantes, albugineam decolorem, pupillam dilatatam, dentes inferiores incisivos retusos<sup>12)</sup>, et brachia nec non crura

ex-

facto fraudator fugit. Contra aa de femina refert, quae dolores ferri candentis sustinuerat et fraudem epilepticam longe postea fassa est.

10) Et MARSHALL l. c. proponit et immo applicat. Cfr. WILDBERG l. c.

11) Eo inducunt quoque medicamina odore et sepora ingratissima, et extra paroxysmum porrecte. SALOMON l. c. cas. II.

12) Observatio magis momenti MOUTON chirurgi quosdam militaris, nam qui epilepsiam fingunt, vix adeo maxillum inferiorem superiori adducunt, ut ex attritu dentes raturdantur. v. MARC. l. c. p. 544. Illud signum observavit in epileptico C. J. v. POMMER in *Heidelh. klin. Ann.* 1827. B. 3. H. 1. p. 119 („es waren nicht nur die untern Schneidezähne schneidenartig abgeschliffen, sondern auch noch, in Folge des öftern Aufeinanderbeissens, besonders der vordern Zähne, in den epileptischen Anfällen; beide mittlern  
 Frank Prax. II. 1. 2. 1.

Es

extenuata, exhibere solent; quae singula in illis, qui morbum fingunt, non observari sponte intelligitur.

Epilepsiae  
varii gre-  
dus.

2. Interea ad epilepsiam constituendam singulae; quas descripsimus, turbae non semper requiruntur. *Varii* enim istiusmodi morbi exstant *gradus*<sup>13)</sup>. Epilepticos non omnes humum prosterni, ex propria experientia monuimus<sup>14)</sup> et ex aliena<sup>15)</sup> monemus. Nec abolitio omnium fa- cul-

*Schneidezähne in der untern u. obern Kinnlade zugleich merklich kürzer geworden, als die andern, u. zeigten auch noch kleine Lücken oder Kerben von ausgesprungenem Email*<sup>16)</sup>.

13) Quos ELLIOTSON II. cc. p. 33 et 250 enumerat, perfectam epilepsiam et imperfectam statuens.

14) §. LIII. 4 (61).

15) „J'ai été consulté pour une jeune dame, dont le père est épileptique, qui est prise de ces accès dans un cercle, à la promenade, à cheval; elle n'est point renversée, elle pousse un cri très foible, les yeux sont convulsifs, l'accès ne dure qu'une minute, et la malade reprend la conversation, à la phrase où elle l'a laissé, sans se douter nullement de ce qui vient de lui arriver.“ ESQUIROL l. c. p. 512. Simile exemplum a POUFARTIO in *mém. de l'ac. r. des sc.* 1705, enarratur. Jam HULDRICHUS l. c. §. 13 dixerat: „imo deri aliquendo epilepsiam, quae nullam habere videtur convulsionem, nisi obscurissimam et in modum singultus ex GALENO (L. III. de loc. aff. C. 7 in fine) quidam volunt, cujus proprium exemplum febr. ferrarii addit HERCULES SAXONIA (in *Pantheo suo* c. prop.) et AVICENNA cum, CILSO conciliare studet MERRILLIE (in *Præx.*)“ Cfr. eph. ac. n. chr. cent. 3. 4. et SCHWEDER de spasmo insolito frequenti, successive in motus convulsivos

cultatum animi sub paroxysmo, absolute exposci-  
tur, dammodo eo finito nulla restet recordatio<sup>16)</sup>.

3. Præter abolitam rerum sub paroxysmo Distinctio  
epilepsiae  
ab ec-  
lempsia. peractarum memoriam, ad epilepsiam constituen-  
dam, ut *morbis chronicus* sit, et *periodicus*, quoque  
requiritur. Ne enim epilepsiae auditu terribilem  
vocem profanemus, pro insultibus convulsivis  
(etiāsi reliquis epilepsiae characteribus stipatis),  
qui aut sub curriculo morborum acutorum e. c.  
in febribus nervosis, verminosis, in encephali-  
tide<sup>17)</sup>, rhachialgitide, apoplexia<sup>18)</sup>, — aut aliis,

Re 2 e.

et vehementes insultos epilepticos degenerantem, tandem-  
que mortem egrotanti adferentem.

16) An. 1814 puellam quindecim annorum in clinico meo  
observavi, quæ ob terrorem e latronibus excitatum in  
convulsiones inciderat, sub quibus humum prosternabatur,  
non sine quadam pris spama. Interrogeta congrue debet  
response, at paroxysmo terminato nec illorum, nec hujus  
restaret memoria. Et EsQUIROL ait: „*Il est même des ac-  
cès, dans lesquels on n'observe pas la perte de connois-  
sances.*“ l. c. Cæterum vix ad genuinas epilepsias perti-  
nerat casus WURFFBAHNII de epilepsia sine motibus  
convulsivis, sine visus et auditus interceptione (misc. ac.  
nat. cur. Dec. II. an. 9. p. 430) et CAMERARII de epilepsia  
sensu atque rat. salv. (ib. Dec. III. an. 5. et 6. p. 89).

17) In formis morborum, sub quibus encephalitis acce  
hibere solat (v. P. II. ed. alt. Vol. I. Sect. 1. C. III. §. XIV. 2),  
describendis, *convulsiones epilepticas seu eclampsiam*, si-  
lentic non præterit. Plurimas enim mihi encephalitides,  
quas cum eclampsia inguere, præsertim inter infantes  
et potiores, obtulerunt.

18) An. 1816 femina triginta sex annorum ad clinicum ad-  
portata est cum apoplexia et hemiplegia lateris sinistri,

e. c. sub opere dentitionis, partûs, fortuito apparent, nomen *eclampsiae* reservamus<sup>19)</sup>. Qua stabilita distinctione facile etiam erit quaestioni quondam jactatae<sup>20)</sup>: *utrum epilepsia morbus, an vero symptoma sit?* respondere.

Dist. epilepsia a convulsionibus.

4. *Epilepsia* a *convulsionibus* in eo differt, quod istae, illaesis sensibus et facultatibus animi<sup>21)</sup>, praesertim perstante memoria et ut plurimum sine oris spuma<sup>22)</sup> pollicisque adductione, obveniunt. Caeterum dari convulsiones, potissimum hysteriarum, quae characterem epilepticum induunt, alio docebitur loco<sup>23)</sup>.

Dist. epilepsia a chorea Sti Viti.

5. *Epilepsia* quidem et *chorea Sti Viti*, modo consueto decurrentes facile inter se distinguuntur; non

cui abusus potius ligueorum fermentatorum et refrigerium ansam praeberant. Spatio quatuordecim dierum, quinq; praeterea paroxysmos epilepticos totum corpus efficientes, quorum quivis vigesimam horae partem perdurabat, experiebatur. A cunctis malis liberata Institutum dereliquit. 19) Cum SAUVAGESIO, VOGELIO, SACARIO aliisque sub nomine *eclampsiae* circiter *epilepsiam acutam* intelligo. Circiter dico, nam ad epilepsiam quanquam *acutam* constituendam, requireretur, ut morbus saltem ex accessibus et liberis intervallis componeretur; *eclampsia* autem in unico insultu consistere potest. Caeterum vox *Eclampsia* ab *Ἐκλαμψις* venit, quod *splendorem* significat. KUHN, progr. de *eclampsiae* causis. Lips. 1812.

20) HULDERICHII diss. c. §. 6. 9.

21) GALENI III. de locis affectis. C. 3. 4.

22) HIPPOCRATES de morbo sacro. FORESTUS L. X. obs. 68. Cfr. HULDERICHII diss. c. §. 8, ubi quaestio: *an epilepsia et convulsio sint eadem*, docte tractatur.

23) Cap. XIV. De motibus spasmodicis vagis.



non ita vero, quando symptomata choreae in aegro epileptico alternatim insultus epilepticos sequuntur, vel in uno eodemque paroxysmo utriusque affectionis complicatio obvenit<sup>24</sup>).

6. *Epilepsiam* etiam cum *mania* complicari Complicatio epilepsiae cum mania furibunda. posse jam monuimus<sup>25</sup>). Complicatio istiusmodi bifaria est. Nunc enim maniacus passim insultus epilepticos patitur; nunc insultus epileptici delirio feroci insigniuntur. Terribile hoc spectaculum ESQUIROLIO<sup>26</sup>) et nobis visum est<sup>27</sup>).

## 7. Epi-

24) Exempla huiusmodi e GÖKKELIO misc. nat. cur. Dec. II, an. 8. obs. 64. p. 163. MURCLINO misc. nat. cur. Dec. I, an. 6 7. obs. 78. p. 112. PAULLINO de epilepsia cursiva. Misc. ac. nat. cur. Dec. III, an. 7. LANZONIO de epilept. saltante. Misc. ac. n. c. Dec. III, an. 4. p. 154. VALENTINO prax. med. infall. (ex BOUTIO adducit exemplum de fabro ferrario, qui paroxysmo epileptico prehensus, insani instar decurrere coactus fuerit, adeo quidem, ut de officina tandem praecipitatus, vitam finierit) describuntur.

25) P. II. ed. alt. Vol. I. Sect. 1. C. XXV. §. CX, 1 (6). Cfr. BOUCHET et CARAUVIELH in archiv. gén. de méd. Par. 1825, Dcbr. 1826, Jan. et l. c. G. M. BURROWS comment. of the cause, forms, sympt. and treatm., moral and med. of insanity, Lond. 1828. the 9. considerat. MÜLLER Nachr. üb. das Sirenenhaus in Pforzheim; in Bad. Annal. f. d. gesammte Heilk. 1831. Jnhrg. 4. H. 1. p. 69. BRAU l. c. p. 300. F. W. HAGBN üb. Verwandtschaft zwisch. Tob-sucht u. Epilepsie; in FRIEDRICH u. BLUMENRÖDER Blätter f. Psychiatrie, 1837. H. 2. Abh. III.

26) „Dans quelques cas les accès d'épilepsie sont suivis ou accompagnés de la fureur la plus nueugle: ce sont les maniaques les plus dangereux. Dans les provinces méridionales, les furieux les plus atroces ce que l'on redoute le plus, sont les épileptiques.“ l. c. p. 515.

Alias comp-  
plication-  
nes.

7. Epilepsia exhibet aliquando complicatio-  
nem cum <sup>20</sup>) *ecstasi* <sup>21</sup>), *catalepsi* <sup>22</sup>), *somniatione* <sup>23</sup>)  
et *somnambulismo* <sup>24</sup>).

De sede  
causarum  
epilepsiae.

8. Ad *sedem caussarum epilepsiae* et ad *illius*  
*indolem* eruendam nos accingimus <sup>25</sup>).

9. Sy-

27) v. infra §. LVIII. N. 4 (45).

28) *Hypochondria*. Observationem affert PORTAL l. c. p. 320,  
et ELLIOTSON l. c. — Cum tremore et rigore artuum:  
SCHNIDER in CLARUS u. RAD. wöchentl. Beiträge 1833.  
N. 22. — Cum delirio potatorum: G. BLUMRÖDER Dumm-  
heit ..., *Delirium tremens mit Epilepsie* etc. in FRIED-  
RICH Archiv f. Psycholog. 1834. M. 3. cas. II. — Cum  
*hysteria*: PORTAL l. c. p. 315. BRAU l. c. p. 298.

29) FRIEDR de epilepsie nure, melancholico - hypochon-  
driaca, vere ecstatice in misc. ac. n. cur. Dec. I. an. 4.  
et 5. p. 69.

30) PATRISON disp. I. p. 18. KAHNKE in HUFELAND Journ.  
1829. St. 2 (catalepsis in epilepsiam transit).

31) Huc spectere videntur exempla epilepticorum, qui lin-  
guas entes ignotas loquuntur. WESTPHAL (pathol. des-  
mon. p. 30) recenset observationem HANNEMANNI, de ad-  
olescentis militari octodécim annorum, qui epilepsie effectus,  
eodem lingue, quæ ipsum ellocuti sunt, sive gallice, sive  
latine, vel etiam alia responderit. Et FERNEL de juvene  
quodam, qui tertio epilepsie mense, lingua Greeca, hujus  
entes igneros, locutus sit, multaque assidentium, inpr-  
mis medicorum arcana detexit (WELSEN diss. de epilepsia.  
Jen. 1719. p. 23). Præterea lego: de epileptico conciona-  
tore et cantore (misc. ec. u. c. Dec. II. an. 7. p. 311), —  
de epileptica cantatrice (ib. Dec. III. an. 2. p. 248), de  
epileptica singulis sub peroxysmis cantante (ect. ec. net.  
cur. Vol. 6. p. 269), de alio vise et audita etiam secreta  
revelante (ib. Dec. II. an. 6. p. 471).

32) *Obs. d'épilepsie et de somnambulisme* p. M. A. MARTINEY  
v. bibl. méd. 1819. Fév. p. 214.

9. *Systema nervosum universum* posse quandoque ita laborare, ut sensus et facultates animi inde suspendantur, ac corpus verae anarchiae praeda fiat, epilepsiae docent, quae ex peculiari idiosyncrasia, ex inanitione, ex dolore et narcoticis oriuntur. Multa phaenomena electrica tunc obveniunt<sup>33</sup>). Longe autem frequentius epilepsiae causas in una dumtaxat systematis nervosi parte agnoscunt<sup>34</sup>).

Ep. ex viti-  
tio totius  
systema-  
tis ner-  
vosi.

10. Quas inter partes *encephalum* primum obtinet locum<sup>35</sup>). Epilepsia ista, quam *encephalicam* seu *cerebralem* vocabimus, quamque alii *idopathicam*, *essentialem*, *legitimam* denominant, ut plurimum in prima evolvitur infantia. Ansam illi tunc praebere solent res imaginationem matris gravidæ ferientes, violentiae capiti sub partu, vel tardius illatae<sup>36</sup>), peculiaris cranii structura<sup>37</sup>),

Ep. enceph-  
halica.

ence-

33) Qui vero vult curationem recte instituere, is probe scire debet, quo in loco materia epileptica haereat, an scilicet in cerebro, an vero ex alia parte ad cerebrum deducatur. ARGENT. L. III. de re med. C. 13.

34) BRETON obs. d'un développement de phénomènes électriq., qui se sont manifestés pendant un accès d'épilepsie; in bull. des sc. méd. 1825. Fév. p. 199.

35) Set bene de hoc argumento H. S. SIMOCOWITZ (Rust Mag. 1826. B. 23. St. 2) disseruit, epilepsiam cerebralem, spinalem et gangliorum edmittendo.

36) LARREY l. c. (1822). GOSNÉ klin. Ber. des 1. Viertelj. 1834. ex obs. belg. 1834. Juin, in SCHMIDT Jahrb. 1834. B. 3. p. 338.

37) SIBLER l. c. cas. II. HARTMANN in HUFELAND Journ. 1831. St. 3. p. 136.

38) Cfr. PONTAL l. c. p. 176 sq.

encephalitis imperfecte resoluta<sup>39</sup>), hydrocephalus non penitus sanatus, affectiones aurium, tineae incauta fuga, tandemque terror, cujus tamen actionem necdum accurate determinare audemus. Serius epilepsiam encephalicam excitant studia<sup>40</sup>), vigiliae, potus liquorum fermentatorum, tempus aestivum, plethora, inprimis congestiones sanguinis circa cerebrum<sup>41</sup>), topi, caries, vulnera, tumores glandularum, steatomata aliaque vitia ex anatomia pathologica emergentia<sup>42</sup>). Epilepsia encephalica, aura aliisque prodromis (praeter affectionem sensuum et animi) destitui, convulsioneibus mitioribus, iis faciei exceptis, insigniri, pupillâ

39) P. II. ed. alt. Vol. I. Sect. I. C. III. §. XVII. 3. Cfr. МЕНДЫКОВ *nöthige Vorsicht bei Anwend. d. sogenannt. Specifica gegen Epileps.* in *Russ Mag.* 1829. B. 29. H. 1 (epilepsia ex encephalite chronica pullulans).

40) Aliorum argumentorum loco vide pericule, a PORTAL (l. c. p. 159) in animalibus vivis instituta.

41) J. C. PRITCHARD *a treat. on diseases of the nerv. syst.* Lond. 1822. P. 1 (plathora et circuletio sanguinis in cerebro vitiosa, ut epilepsiae causae). BUNNORS (l. c.) de epileptico nerret, cujus totum cranium in peroxysmo sanguine, ut sudore, medidum fuit. Tante est interdum sanguinis congestio ad caput! BRIERE DE BOISMONT *ib.* *Blutcongest. z. Gehirne mit epilept. Symptom. bei Verrückt.* ex *archiv. gén. de méd.* 1829. T. 19. février. in *FRONIER Notiz.* 1829. B. 24. N. 3. SCOTT l. c.

42) §. LIII. 2. Quondam epilepsiam ex contractione meningum repetebant, aut ex earum vellicatione. (VOLKNER *diss. de morbo comitiali.* Erf. 1688. p. 6). LARRET (*chir. Clinik*, l. c.) monet, epilepsiae causas plerumque in cranii ossibus, in membranis cerebri et in hoc ipso locatas esse.

pillâ dilatatâ, pulsu potius lento cum respiratione neutiquam cohaerente<sup>43)</sup>, notari solet. Praeterea cerebri affecti symptomata et absoluto insultu epileptico remanent, ut sopor<sup>44)</sup>, et imbecillitas mentis. Evolutionem epilepsiae encephalicae ingentem et fere continuum capitis dolorem aut gravitatem praecedere, jam diu docebatnr<sup>45)</sup>:

11. *Epilepsia ex vitiis specus vertebralis* pro-E.spinalis. *ficiscens*, a nobis *spinalis* dicta, pulchre a HALLERUS descripta<sup>46)</sup>, praesertim in rhachiticis, ex violentiis columnae vertebralis, ex transpiratione, miliaribus<sup>47)</sup> et impetiginibus male curatis, ex onania, ex rhachialgitide imperfecte resoluta, aut in hydrorhachitidem terminata<sup>48)</sup> oritur. Variis ea prodromis, affectionem nervi sympathici et systematis dermoidei indicantibus, et inter haec saepe aura ex abdomine aut pectore ad caput ascendente, formicationis sensu, vitilagine<sup>49)</sup>, insigni-

43) LARREY *mém. de chir. milit. sur une épilepsie cérébrale.*

44) LARREY l. c. (1822), p. 337. obs. 1.

45) TRALLIAN. Lib. I. C. 15. Miror ergo post tot tantaque argumenta G. F. MOST (l. c.) negantem, epilepsiam unquam ex cerebro pullulare. Attamen statuit, cerebelli functiones perturbatas, et dissensum inter hoc organon, medullam spinalem et systema gangliorum epilepsiam excitare posse, quamvis eam cerebelli spinali rariorem esse. Nec non WENZEL sedem epilepsiae in cerebello suspicatur.

46) Op. min. ac. med. T. I. 1815. II. Analect. V. De epilepsia. Cfr. E. F. W. SCHNAUS diss. cit. 1814.

47) Cfr. ea, quae plurimis hujus operis in locis de imperio miliarium in spinam dicta sunt.

48) Cap. III. §. XIV.

signitur. Convulsiones exhibere solet maximas, minoremque capitis affectionem. Forte huic epilepsiae magis familiaria sunt jactura seminis et resolutio vesicae urinariae. Ab illa nequaquam convulsiones gravidarum et parturientium alienae esse videntur. Constat enim graviditatem et labores partus quammaxime *plethorae columnae vertebralis* favere. Quae cum ita sint, ex irritatione medullae spinalis et nervorum inde proficiscantium non solum facile de convulsionibus gravidarum et parturientium, sed et de earum summo periculo ratio redditur. Quo altior nempe mali sedes, eo citius illud medullae oblongatae communicatur, quam plane imparem ad violentias sustinendas esse, saepe saepius monitum est<sup>49)</sup>.

Epilepsia  
ex affecti-  
one sin-  
gularum  
nervorum.

12. Sicuti affectio cerebri et medullae spinalis epilepsiae occasionem praebere potest; ita *affectio singulorum nervorum*. Suspiciamus eam: dum prodroma constanter ex pectore, abdomine, pelvi,

49) Cfr. C. I. de imperio medullae spinalis in cutem.

50) Quot non parturientes convulsae moriuntur, quin mortis debita ratio deri possit, et certa ob neglectum columnae vertebralis examen. Hujus neglectus quondam exemplum in *Regia Principissa Anglicana Carolina* habuimus. Fertur quidam in relatione necroscopiae cadaveris illius, quae publici juris reddita est, quod medici in tribus adeptis corporis cavitatibus nil morborum detexerint. Et cur de quarta cavitate, de spina scilicet vertebrali, quaestionem non instituerunt? Hic tamen morbi sedes expectanda fuisset! Lega de hoc argumento *FRIED. HOFFMANNUM* (med. rat. syst. T. IV. C. I. obs. 3) et compare *RACCHETTI* op. c. p. 281.

pelvi, aut extremitatibus evolvuntur<sup>51)</sup>: dum aegritudines praegressae, aut cum epilepsia complicatae, affectionem visceris, arteriae, venae, vasis glandulaeque lymphaticae, aut ossis cujusdam, a quibus nervi propinqui aut eorum plexus et ganglia lacessiri possent, designant; dumque aetiology nullam, quae cerebrum aut medullam spinalem offendere potuisset, causam indicat.

13. *Nervos cardiacos* evolutioni epilepsiae <sup>Epilepsia cardiaca.</sup> non semper alienos esse, QUERCTANUS, sedem morbi illius in corde quaerendo<sup>52)</sup>, quodammodo indicavit. Et revera exempla epilepsiarum ex vitiis cordis MORGAGNI<sup>53)</sup>, LANGISI<sup>54)</sup>, TESTA<sup>55)</sup> et GOULD<sup>56)</sup> enarrarunt, vidimusque saltem convulsiones diras ex cordis affectione pullulantes<sup>57)</sup>. MORGAGNI aegrotus sensum quasi fumi ex ventriculo ascendentis percipiebat, et pulsum raram exhibebat: „ea autem perpetua a plurimis jam men-

51) Quamvis enim plurimi in eo erraverint, quod locum, ex quo aura epileptica proficiscitur, pro sede constante causae morbosae, et nervos pro conductoribus mali habuerint; errant tamen et illi, qui rem nunquam ita esse habere contendunt; quod plurimis exemplis infra tredendis palam fiet.

52) Tetrad. de affect. capitis, Cap. 8.

53) Epist. 64. art. §. 6 (Dilatatio universi cordis et magnae arteriae).

54) De mortib. subitan. p. 113. De aneur. L. II. p. 82.

55) Ueb. d. Krankh. d. Herzens. Ein Ausz. aus d. Ital. mit Anmerk. v. KURT SPRENGEL. I. Th. p. 139.

56) Philos. transact. Vol. XIV. N. 157. p. 537.

57) Cap. XIV.

mensibus raritas, quotiescunque paroxysmus imminebat vel multo major percipiebatur; ut ex hoc hujus incremento nunquam fallerentur medici, si instantem praedicerent insultum: quo durante pulsus frequens fiebat.“ Morbo terror, timor, iraque demum et moestitia praegressa fuerant. Aeger unus TESTAZ pulsum in carpo sinistro parvum et irregularem, in dextro normalem et cordis palpitationem exhibebat; alter pulsu filiformi instructus erat, et hora decima matutina paroxysmos epilepticos patiebatur. Aeger GOULDI praeter epilepsiam, palpitatione cordis et lipothymiis laborabat, ac inopinate mortuus, polypum in camera dextra obtulit. Lypothymiis alternatim cum insultibus epilepticis aeger, de quo K. SPÄNGEL narrat<sup>58)</sup>, afficiebatur: necroscopia fissuras, dilataciones et concrementa cartilaginea arcus aortae exhibuit.

Ep. abdominalis.

14. *Plexuum nervorum abdominalium affectio* frequentissime epilepsiam provocat; *hypochondriacam* quondam<sup>59)</sup>, nunc *abdominalem* aut *umbilicalem* dictam<sup>60)</sup>. Epilepsia ista, pauperum magis quam divitum morbus, frequentius in pueris quam in puellis<sup>61)</sup>, et frequentissime nono et decimo

aeta-

58) Op. cit. TESTA p. 141 in nota.

59) Si quis animi crederet, investigationem in variam sedem epilepsiae novam asse, sdeat, quaeso, SYLVII aliorumque opera, et contrarium intelliget.

60) LINDY (AUTENRIETH) diss. de epilepsia praesert. puerorum umbilicali. Tub. 1814. SINDLER l. c. csa. III. et V.

61) AUTENRIETH l. c. p. 20. Pueri viginti tres, puellae septem.



aetatis anno ingruit, magisque hyemali tempore et crescente luna. Paroxysmi utplurimum sine manifesta caussa, haud raro post iram, praeviis dysuria <sup>62)</sup>, dolore abdominis, nausea et vomitione atque aura ab umbilico ascendente, evolvuntur. Quandoque, imprimis in recenti morbo, haec abdominis incommoda, sine subsequente epilepsia obveniunt, ac parentes facile de imminente periculo fallunt. Habitus aegrotantium, de quibus agitur, haud cernitur cachecticus, nec tamen florens sanitate; functiones, quotquot sunt, extra paroxysmum rite absolvuntur. Nonnulli vermium indicia exhibent; ac vermes sponte aut anthelminthicorum ope evacuantur, quin tamen in hisce animalibus caussa morbi inveniri possit <sup>63)</sup>. Enim vero experientia nos cum aliis <sup>64)</sup> certiores reddidit, vermes intestinales quidem haud raro convulsionibus transitoriis aut eclampsiae ansam porrigere, raro <sup>65)</sup> autem epilepsiae omnibus numeris absolutae. Idem de acidis primarum viarum et de saburris existimamus. Quae cum ita sint, restat solum, ut causam genuinae epilepsiae umbilicalis in *affectione glandularum mesenterii*, directe plexui nervorum mesenterico superiori, et indirecte plexui coeliaco infensarum, quaeramus.

Cae-

62) PETERSON disp. c.

63) SINDLER l. c. cap. II.

64) AUTENRIETH l. c. p. 37.

65) Luculentissimum exemplum genuinae epilepsiae vermimosae narrat MONSIEUR in diss. solenni de epilepsia, Francf. ad Viadr. 1700. edita, p. 9 pueri scilicet pro obsessio habitus, ubi daemon, adhibitis anthelminthicis, sub forma vermium exiit.

Caeterum epilepsia originis abdominalis et in adultis obvenire potest. Causa tunc plerumque in *ventriculo*, praesertim ore illius<sup>66)</sup>, in *hepate*, aut *cystide fellea* quaerenda. Quibus in casibus insultus epilepticos ardor ventris, inediae intolerantia, ructus, borborygmi, singultus, respiratio intersecta, palpitatio cordis, praecedere et icterus quandoque intercurrere solent. Et *lienem* quandoque causam epilepsiae amplecti ex TULPII<sup>67)</sup> aliorumque<sup>68)</sup> observationibus elucet. Ita *pancreas*<sup>69)</sup>.

Epilepsia  
ex vicio  
uteri.

15. Frequentissime vero epilepsiae sexus sequioris focus in *utero* invenitur, quod tum ex observationibus supra allatis<sup>70)</sup>, tum ex fastis  
medi-

66) GALENUS (L. III. de loc. affect. C. 7) exemplum epilepsiae stomachicae abducit, in juvena Grammatico Diodoro, qui ab inedia et vehementi animi intentione, quoties docebat, convalescebat. Cfr. FARNER in consil. 7. VALLEMIOLA L. III. obs. 7. FORREST. L. X. obs. 64. MEIBOM diss. de epilepsia stomach. Helms. 1740. RITTER: de puella epilepsia stomachica laborante, visu, auditu motibus epilepticis tam orbata, quam aadam denuo sub illis recuperante (Nova act. n. cur. Vol. 3. p. 386).

67) I. c. Pressa vel solo digito lienis regione aeger illico in paroxysmum incidebat.

68) Ex liene indurato puerum epilepticum recitat obs. 133. Misc. n. c. Dec. I. an. 6. p. 180.

69) „Quando insultus epileptici oriuntur a *pancreate* mala se habente, id arguunt dolor lateris sinistri et calor vehementior in lumbis, cui ut plurimum conjunctus est vomitus flavorum at porraceorum humorum frequens, quandoque pertinax alvi obstructio (VÖLKER diss. c.).

70) §. LV. 2 (52-57).

medicis <sup>71)</sup> apparet. Dignoscitur *epilepsia uterina*, habitâ ratione conditionis singularis aegrotæ, morborum præcedentium, caussarum aegritudinis præsentis, phaenomenorum sub paroxysmo locum habentium <sup>72)</sup>, et temporis ingressus illorum. Interea ob id quod insultus circa catameniorum periodum ingruat, ad originem morbi uterinam tuto concludere haud licet. Vidimus enim epilepsias certe non uterinas, quæ nihilominus appropinquante menstrualui periodo, saeviebant.

16. Epilepsiam ex irritamento *renibus, ureteribus* et *vesicae urinariae*, inprimis a calculo illatis, originem nancisci posse, observationes *PARNON* <sup>73)</sup> et *TISSOT* <sup>74)</sup> docent; vidimusque in colica nephritica, nisi genuinam epilepsiam, saltem eclampsiam. De terribili epilepsia ex *testiculis* proficiscente infra quaestio erit <sup>75)</sup>.

17. Ob consensum *externarum partium* non minorem epilepticorum copiam notavit medicorum

Epilepsia  
ex vitio  
organorum  
uro-  
poietico-  
rum, et  
testiculo-  
rum.

expe-  
ri-  
mentum  
externarum.

71) GRÜCH de epilepsia uterius horrenda et contumaci ejusque curatione (misc. ac. n. c. Dec. III. an. 7. 8. p. 172).  
WENDT diss. de epilepsia hyster. Jen. 1676. ЕКОУНУН diss. de epilepsia uterina. Ultraj. 1639. SCHULZ cas. hysterico-epileptici resolutio. Hal. 1737. МАЛЕОННУВА l. c.

72) Pater meus Viennæ nobilem feminam epilepsia uterina laborentem curavit. Sub maxime terribili paroxysmo advocatus, et variis incassum tentatis; amasius aegrotæ ait: domina doctor! visne ut convulsionibus finem imponam? Utique. Ac revera menti sue pertractatis partibus gaulilibus aegrotæ, pro tempore quies obtinebatur.

73) Nova acta n. c. T. III. obs. 2. p. 20.

74) Op. c. act. 4. p. 68.

75) §. LVIII. 4.

experientia, videlicet ex tibia<sup>76)</sup>, crure<sup>77)</sup>, sura<sup>78)</sup>, pede<sup>79)</sup>, digito<sup>80)</sup>, mamma<sup>81)</sup>, coxa<sup>82)</sup> et vola manus<sup>83)</sup>. Interea timemus, medicorum plurimos epilepsiarum fontem ex partibus externis ob id solum false derivasse, quod *aura* inde ortum traxerit. Saltem ait RIVERIUS<sup>84)</sup>: „Si a parte aliqua externa epilepsia oriunda sit, aura quaedam percipitur a parte illa elevari et minera morbi in eo delitescens, vellicat interdum, aut titillat, quod imminuentem paroxysmum praenunciat. Et si pars illa constringatur vinculo, impeditur paroxysmus.“

E. indoles. 18. Detecto, si fieri licet, loco, ex quo epilepsia ortum ducit, ut *indoles* illius saltem conjectura attingatur, restat. Quo in opere, ut necessario cum ordine incedere possimus, epilepsiarum varia genera statuere juvabit; scilicet *atonicas, traumaticas, inflammatorias, rheumaticas, metastaticas, arthriticas, carcinomaticas, gastricas, scrophulosas, syphiliticas et complicatas.*

19. Pau-

76) GALENUS L. III. Loc. affect. C. 5.

77) JACHIN comment. in RHASIN. cap. de epilepsia. TAINCAVELLI L. III. C. 6. DONZELL in consil. 38. ad. SCHOLZII. MERCURIAL. consil. 61. MORT. an *epilepsy from an uncommon cause* (concrementum cartilagineum pisiforme in crure) v. *med. essays and obs. by a soc. in Edinb. Vol. 3.* p. 416.

78) HOLLER in schol. ad praxin. L. I. C. 10.

79) FORESTUS L. alleg. obs. 68.

80) FAVENT. C. II. de med. morb. — BRASSAYOL. comment. ad aph. 45. L. II. HIPPOCRATIS.

81) MARCELL. DONAT. LII. hist. mirab. C. 4.

82) SYLVIVS in lib. de morb. intern. c. propr.

83) PLATER L. I. obs.

84) PRAX. med. L. I. C. 7.

19. Paucae illae epilepsiae, quas ex vitio <sup>Epil. atonica seu nerva.</sup> universi systematis nervosi pullulare diximus <sup>85)</sup>, non inanem suspicionem movent, *atoniam cum sensibilitate morbosa* primum illarum fontem constituere posse. Sic saltem causae debilitantes, quae illis ansam porrigunt, constitutio delicata aegrotorum, qui inde affliguntur, felix hinc inde exitus morbi, corroborato per annorum curriculum corpore, et maxime effectus propitius methodi tonicae, gradui sensibilitatis accommodatae, ostendere videntur.

20. Si epilepticorum singulorum semper ex <sup>Ep. traumatica.</sup> acta haberetur historia, palam fieret, *epilepsiam traumaticam* frequentem esse <sup>86)</sup>. Juvat ideo morbos epilepsiae perpassos, casus fortuitosque eruere, et corpus aegroti, praecipue autem cranium et columnam vertebralem, stricto examini submittere <sup>87)</sup>.

21. *Epilepsiae*, quae ex sanguinis evacuationibus intermissis, ex potu liquorum fermentatorum aliorumque narcoticorum, ex motu nimio, et ex violentis animi pathematibus oriuntur, quaeque in hominibus floridis, juvenibus, praesertim tempore vernali locum obtinent, nobis sunt *inflammatoriae* <sup>88)</sup>. De iis legatur TISSOT <sup>89)</sup>, qui ori-

85) N. X.

86) Cfr. P. II. ed. ult. Vol. I. Sect. 1. C. 1. §. 17. 22. C. II. et §. X. 14.

87) Legi merentur tres observationes epilepsiae traumaticae apud PORTAL l. c. p. 165—168.

88) Sub allatis animi rerum positionibus aliter fieri aequit, Frank Prax. II. 1. 2. 1.

originem epilepsiarum ex plethora, observationibus DRELINCOURTI<sup>89)</sup>, WEPFERI<sup>91)</sup>, MORGAGNI<sup>92)</sup>, JOHNSTONI<sup>93)</sup>, MECKELII<sup>94)</sup> et propriis innixus, meridiana luce clarius patefecit<sup>95)</sup>; et praxi felici, qua et nos hinc inde gloriari potuimus, confirmavit. Quodsi vero methodus medendi plethorae non semper in epilepsiis inde derivatis succedit, caussa in eo invenitur, quod, nisi in primo morbi limine occurratur, ex congestionibus sanguinis circa cerebrum, cerebellum, medullam oblongatam et spinalem iterum iterumque repetitis, diu neglectis, forteque incongrue curatis, tandem alia evolvuntur istis in partibus aut in vicinis vitia, in paragrapho, anatomiam pathologicam epilepti-

co-

quominus sanguis vel majori, quam par est, vi in cerebrum at medullam spinalem irruat, vel in reditu suo ad cor obstaculis multifariis prematur. Nac requiritur ad epilepsiam inflammatoriam excitandam, ut plethora directe systema nervosum afficiat, cum similes effectus ex congestionibus sanguinis circa viscera in illud systema imperium magnum exercentia e. c. cor, hepatis, ventriculus et imprimis uterus, locum obtinere possint.

89) l. c. art. 8. p. 122—138. Cfr. SAILLANT *expériences faites sur les animaux pour découvrir le siège et la cause proch. de l'épilepsie* (Hist. et mém. de la soc. r. de méd. de Paris 1782, et 1783. mém. p. 88).

90) BONET sepulchr. 16. addit. obs. 6. p. 294.

91) Op. c. p. 303.

92) Epist. 9. N. 12. 14.

93) *Med. obs. and inquir. Vol. 2. N. 6. p. 115.*

94) *Recherches anatomico-physiol. sur les causes de la folie. Mém. de Berlin. 1760. obs. 10.*

95) Legi meretur et HORNBAUM in MARCUS *Eph. d. Heilk. 7. B. MAISONNEUVE l. c. obs. 1—7. PORTAL l. c. p. 228sq.*

corum continente, abunde indicata. Effectus isti processus inflammatorii pluries in encephalo aut in specu vertebrali, reiterati, etiamsi plethora fugata sit, perstant, ac instar caussarum traumaticarum, pulpa nerveae vim inferendo, terribiles mali epileptici insultus gignunt. Quodsi miraris, cur vitia illa, *continuo* praesentia, solum *periodice* potestatem exercean, tibi respondere liceret, per multos stimulos morbosos, posse in corpore humano eoque innocue latitare, quousque aliae non superveniant caussae, ut mutationes anni temporum, atmosphaerae, huiusque conditio plus minus electrica, victus solito diversus, abusus liquorum spirituosorum, somnus vigiliis non respondens, animi pathemata etc., quae aut sanguinem exagitando, aut nervorum sensibilitatem augendo, mali explosionem excitent. Praeterea cum SANCTORII experimenta <sup>96</sup>) doceant, corpus humanum omni mense sine nota causa per aliquot dies pondere increescere, dein vero iterum decreescere et sic alternatim, nonne primo in casu *turgor* expectandus erit, quo vigente recondita vitia variis partibus inhaerentia, caput attollere, et effectus in pulpam nerveam producere, quae serius cessante turgore evanescere debent? <sup>97</sup>).

Ff 2

22. Si

96) Statica medicina.

97) STALPARIUS VAN DER WIEL (obs. cent. I. obs. 8. p. 36) historiam comitis *Philippi a Nassau Weichheim* refert, qui post lapsum de equo eb gravem contusionem cranii *viginti septies* terebretus fuit, priusquam latens extravasatum detegi potueret. Sanatus, plus vini quem antea, quin ebrietas sequeretur, epotare illi licuit, *verisimiliter*

Ep. rheu-  
matica.

22. Si *rheumatis effectus generales in systema nervosum perpendis* \*\*), et inprimis, si factorum in doctrina encephalitidis, rhachialgitidis et neuralgitidis rheumaticae traditorum recordaberis, facile originem plurimarum epilepsiarum inde explicabis. Ac re quidem vera, plurimae epilepsiae, quae in hominibus aliàs sanis et ad morbos nervosos minime dispositis, ex transpiratione suppressa oriuntur, vitiis nisi omnino rheumaticis, saltem a rheumate proficiscentibus, ortum debent. Spectant praecipue huc vitia *membranarum*, cerebri, cerebellum, medullam oblongatam et spinalem nec non singulos nervos involventium, atque *extravasata*, *adhaesiones* morbosae aliaeque mala supra exposita \*\*). Ab epilepsia rheumatica vix catarrhalis illa differt, de qua SCHNEIDERUS loquitur <sup>100</sup>), asserens causam catarrhalem hinc nervos (certe membranae pituitariae narium) vellicare <sup>101</sup>). Generatim vero sedem causae epilepsiae, cui transpiratio suppressa ortum dat, minus in cerebro quam in columna vertebrali quaerimus; notum enim est systema dermoideum nervos suos hoc ex specu accipere, quod si cutem imperio medullae spi-

concessa cerebri majori expansione. Cfr. TISSOT l. c. p. 264. §. 131. CARUS (*Analekt. z. Nat.-Wissensch. auf ein. Reise* 1829) narret, se Florantiis vidisse puerum hernia cerebri et epilepsia laborantem. Illa ante paroxysmos epilepticos semper emergebat, post eos retrocedebat.

98) P. II. ed. alt. Vol. I. Sect. I. §. IV. 15.

99) §. LIV.

100) De catarrhis. Lib. II. p. 103.

101) Cfr. cap. XXV. de Coryza.



spinalis subjiat, subjiat vicissim et medullam spinalem imperio cutis.

23. Hanc ipsam ob causam et *epilepsiae me-* E. metastatica.  
*tastaticae*, quatenus scilicet ex imperfecta evolutione, aut ex fuga praepostera exanthematum, impetiginum et ulcerum chronicorum cutis, originem nanciscuntur, maxime ad *spinales* amandamus. Atque hic iterum confirmatur, *miliaria* peculiarem nexum cum medulla spinali habere <sup>102</sup>); constat enim <sup>103</sup>) epilepsiam epidemicam post illa obvenisse.

24. *Arthritis*, systemati nervoso generatim E. arthritica.  
infensa <sup>104</sup>), inter alios morbos et *epilepsiam* excitat <sup>105</sup>). Quod fieri videtur nunc *directe*, per irritationem a causa arthritica parti cuidam systematis nervosi e. c. cerebri, medullae spinali illatam; nunc *indirecte*, per morbos viscerum e. c. cordis, uteri, indolis arthriticae, nervis vicinis infensos. Vestigia arthritidis, ut concrementa calculosa, ipsa epilepticorum cadavera exhibent. Ad epilepsias arthriticas et illae spectare videntur, quae olim ab *acredine humorum* derivabantur <sup>106</sup>). Pathologiae enim humoralis istam partem non plane in doctrina epilepsiae rejiciendam esse praeter alia  
et

102) P. I. ed. alt. Vol. I. Sect. 2. C. VIII. §. XLVII. 2 (19).

103) BARAILLON l. c.

104) P. II. ed. alt. Vol. I. Sect. 1. cap. 1. §. IV. 17.

105) Eph. n. cur. Dec. II. an. 6. obs. 42. Schol. p. 112. GERHARD de arthrit. vaga, convolutionibus epilept. soluta (Act. acad. n. cur. Vol. III. p. 330). SIEBLER l. c. cas. I.

106) TISSOT l. c. Art. IX. des *épilepsies occasionnées par l'acreté des humeurs*.

et MANGOLTI casus<sup>107)</sup> docet, viri scilicet, eadem ratione qua plus esui salis culinaris indulgebat, fortius ab epilepsia affecti, a quo tandem malo solum per abstinentiam a sale liberari potuerat. Sic duobus in pueris epilepsia originem ab esu protracto porri sectilis trahebat<sup>108)</sup>. Et epilepsiae, quibus retentiones evacuationum habitualium e. c. diarrhoeae<sup>109)</sup>, ansam porrigunt, nec non eae, quae ab intempestiva febrium intermittentium suppressione oriuntur<sup>110)</sup>, sibi locum hinc vindicare videntur. Epilepsiae indolem arthriticam conjecturamus, si aeger ex stirpe arthritica descendat<sup>111)</sup>, si prius aliis affectionibus arthriticis obnoxius fuerit, si paroxysmi determinatis anni temporibus alligati sint, sique iis absolutis urina sedimentum sic dictum arthriticum deponat. Interea fieri potest, quod epilepsia primam originem causae arthriticae debeat, serius autem a reliquiis illius excitetur.

E. inter-  
mittens  
larvata.

25. Dari *febrem intermittentem larvata* per-  
*niciosam*, sub forma *epilepsiae*, seu potius *eclampsiae*  
comparentem, tum ex aliorum<sup>112)</sup> tum ex pro-  
pria

107) Progr. da epilepsiae nonnull. specieb. Erf. 1764.

108) SCHENK obs. 117.

109) Med. sept. de epileps. C. 31. T. I. p. 20.

110) BOEHMER at TITUS de axanthematum differentie et origine. Wittamb. 1766. p. 7.

111) Juvenis octodecim annos habens, cujus pater arthritide labefactatus fuit, epilepsia repta est, quae, cum arthritide in conspectum venisset, plane siluit. PORTAL l. a. p. 314.

112) WERLHOFF de febr. Sect. 1. §. 1. et Sect. 2. §. 4. Sto-

pria experientia constat. Diagnosis secundum regulas alibi traditas <sup>113)</sup> instituitur.

26. Scirrhi in cerebro et prope nervos epilepti-  
corum detecti <sup>114)</sup>, imperium principii can-  
crosi in systema nervosum <sup>115)</sup>, et in nervorum  
singulorum morbos <sup>116)</sup>, ac tandem commercium  
cancri mammae cum insultibus epilepticis <sup>117)</sup>, no-  
bis jus, *epilepsiam carcinomaticam* statuendi, im-  
pertunt. Imo similitudo quaedam inter auram  
epilepticam, et neuralgias carcinomaticas, utpote  
fulminis instar contingentes <sup>118)</sup>, animadvertitur.  
Caeterum epilepsiae carcinomaticae diagnosis, ma-

E. carci-  
nomatica.

xime

*ria d'una epileps. period. col tipo d'una terzana, guarita al sopraggiungere d'un tifo peteech. Giorn. della soc. med. chir. di Parma. Vol. 14, p. 3. BARDE als Fallsucht verlarvt. böseartig. Wechselfieb. ex revue méd. 1820. 3. livr. p. 160. in GERSON u. JUL. Magaz. 1821. B. 1. p. 114. MENLHAUSEN üb. d. Wechselfieb. dies. Jahr., besonders ihre larvirt. u. pernicios. Formen; in HUFELAND Journ. 1828. St. 12. p. 123. PORTAL l. c. p. 270 sq. HAUSEBRAND Epileps. intermitt. mit tödl. Ausg. in RUST Mag. 1831. B. 33. H. 3. p. 317. LIPPERT Complicat. ein. febr. intermitt. tert. mit epileptischen Anfällen; in Summar. des Neuest. u. Wissenswertigst. etc. Lpz. 1835. B. 10. p. 15. VOIGT ib. 1836. B. 2. p. 39. cas. II. LANGGUTH larvirtes Wechselfieber in Form v. Epileps. mit sieben tägigen Typus; in med. Ver.-Ztg. 1839. N. 21. p. 110.*

113) P. I. ed. alt. Vol. I. Sect. 1. C. II. §. XXII. 3.

114) §. LIV. 115) P. II. ed. alt. Vol. I. Sect. 1. C. 1. §. IV. 20.

116) Cap. VI. §. XXX. 10.

117) LE WACHER *traité du cancer des mammelles*. p. 176.

(Epileptica simul cancro laborans, ex doloribus hac in parte auctis, futurum insultum epilepticum praedicebat).

118) Cap. VI. §. XXVIII. 1.

xime habita ratione stirpis et aetatis aegrorum nec non morborum praegressorum aut sociorum instituenda foret.

*E.gastrica.* 27. Minus problematica *epilepsia* est, ex affectionibus gastricis ortum ducens, ideoque *gastrica* dicenda. Hujus generis esse solent epilepsiae, aut saltem eclampsiae recens natorum et infantum, quatenus meconio, acidis primarum viarum, erroribus in diaeta et vermibus ortum debent. Ex cadaverum epilepticorum autopsia intelligitur, ventriculorum et intestina quandoque inflammatione laborare. Tum hanc ob causam tum ob facilem errorem, affectionem abdominis per consensum cum cerebro ortam<sup>119)</sup>, pro primaria habendi, praesentia epilepsiae gastricae non praecipitanter judicanda est.

*E. scrophulosa et rhachitica.* 28. Quae regula eo magis sacra esto, cum epilepsiae originis abdominalis saepius, ut monuimus<sup>120)</sup>, ex *affectione scrophulosa glandularum mesenterii*, quam ex vermibus, bile, saburra, et acidis primarum viarum pullulent. Verum scrophulae non solum respectu mesenterii vim in epilepsiam exercent. Generatim enim scrophulos ad morbum illum dispositi sunt<sup>121)</sup>; quod non mirum est, si perpendamus: inflammationem cerebri et medullae spinalis in illis facillime in hydro-

119) De hac re legi meretur MONSIEUR *Wahrnehmung. ein durch jede Stuhlverstopfung (ex intestini strictura) wiederkehrend. epilept.-apoplect. Anfall*; in HUFSLAND *Journ.* 1833. St. 9.

120) N. 13.

121) §. LV. 1

dropem encephali et specus vertebralis transire<sup>122)</sup>, ac epilepsiam *encephalicam* et *spinalem* saepe ex istis morbis imperfecte resolutis, ortum ducere<sup>123)</sup>. Praeterea ex ipsa epilepticorum cadaverum sectione effectus scrophularum in cerebrum aliasque systematis nervosi partes elucet. Ac re quidem vera, facile vis, quam tumores glandularum pulpa nerveae inferre debent, intelligitur. Porro epilepticorum crania<sup>124)</sup> et *rhachitidis* in epilepsiam imperium abunde demonstrant; ne amplius de conditione columnae vertebralis rhachiticorum et effectibus illius, in nervos e spina proficiscentibus, loquamur.

29. Vis *diatheseos venereae* in epilepsiis exci-  
tandis observationibus BONETI<sup>125)</sup>, PELARGI<sup>126)</sup>,  
KÄEMPFII<sup>127)</sup>, ROEBERI<sup>128)</sup> aliorumque<sup>129)</sup> et  
nostrarum<sup>130)</sup> ita confirmata est, ut in stabilienda

Ep. syphilitica.

epi-

122) P. II. ed. alt. Vol. I. Sect. I. C. IV. §. XXII. 6 (135).

C. III. §. XIV. N. 3.

123) N. 9.

124) §. LIV. 2.

125) Sepulch. L. I. Sect. XII. add. obs. 3.

126) Med. Jahrgänge. 2. B. p. 317.

127) Acta Hassiae. Vol. I. p. 152.

128) Von e. Epilepsie v. vener. Knochenauswüchsen (Museum d. Heilk. 4. B. p. 290).

129) Eph. n. cur. cent. I. obs. 136. PORTAL l. c. p. 293 (infans a nutrice syphilitica infectus, rhachiticus et epilepticus), 300. R. MACLEOD Epilepsie durch Knochenkrankh. bedingt; ex Lond. med. gaz. Vol. 19. p. 691. in SCHMIDT Jahrb. 1839. B. 22. p. 101.

130) An. 1800. Polonns 40 circiter annorum Viennam advenerat, epilepsia rebeli affectus. Curas tandem mense

*epilepsia syphilitica* a nullo premamur dubio. Syphilis epilepsiam vix per actionem directam in systema nervosum, sed indirecte, cariem<sup>131</sup>), exostoses et tophos<sup>132</sup>), pulpa nerveae variis in locis infensos, excitando, gignere videtur. Diagnosi potissimum ex anamnesticis et praesentia symptomatum luis instituitur. Epilepsiae nocturnae prae aliis de syphilide suspectae sunt. Cum et *mercurii* usus incautus epilepsiam excitari possit<sup>133</sup>),

absente medico suo ordinario commissus, cum observaverim epilepsiae sociam fuisse cephalaeam saevam noctu invalescentem (quo tempore et insultus epileptici ingruere solebant), num aeger nunquam morbos venereos perpassus fuerit, interrogabam. Fessus est se in juventute ab hoc malo non vixisse immunem; qua de causa periculum eum mercurio sublimato corrosivo institui, et tanto eum successu, ut aegram spatio sex hebdomadum ab utroque malo, epilepsia scilicet et cephalalgia, liberaverim. An. 1817 ancilla 20 ann. epileptica ad elinicum Vilnaense recepta est. Accusabat lapsum in flumen et terrorem inde secutum pro morbi causis. Examinato capite cariem ossis parietalis dextri deteximus, ejus centrum per exfoliationem ad circumferentiam pollicis et ultra ita consumptum erat, ut pulsatio cerebri per duram matrem deundatam apparuerit. Integumenta ulcere, notas syphiliticas exhibenta, depascabantur. Tophus orbitam sinistram occupabat. Glandularum submaxillarium una ad ovi columbini magnitudinem increverat. Paroxysmi epileptici plerumque horis nocturnis, magisque in corporis latera sinistro, saeviebant. Cura antisiphilitica adhibita, aegra sanitati restituta est, num sine reditu, ignoro.

131) Vide observationem R. MACLEODII l. c.

132) LARREY l. c. (1822). obs. 2. p. 338.

sit <sup>133</sup>), cavendum, ne effectus illius syphilidi tribuantur.

30. Si tantum jam in epilepsia excitanda <sup>Ep. complicata.</sup> unius diatheseos sit imperium, quid ex confluvio plurimarum diathesium expectandum erit? Sane quidem historias epilepticorum ab ovo pervolvendo, hujusmodi malorum conflictatio haud raro invenitur. Est ea tam multiplex, ut in omnibus suis combinationibus exponi nequeat <sup>134</sup>).

### §. LVII.

#### *P r o g n o s i s.*

1. Epilepsia morbum difficillimae curationis <sup>Genera-</sup> sistit. Valet id maxime de epilepsia haereditaria, <sup>lim.</sup> congenita et nocturna <sup>1</sup>). „Juvenes epilepsia labo-

133) §. LV. N. 2 (134).

134) Sufficiet hinc, unicum exemplum adducere rhachitici, scilicet osaniam exhausti, potu liquorum fermentatorum non parcentis et tandem a syphilide contaminati. Hic luis contagium, praepremis systeme osseum, utpote jam ab rhachitide labefactatum aggreditur, unde vertebrarum nonnullarum dorsalium topi et caries oriuntur. Porro medulle spinalis, osanise culpa, morbose sensilis, irritationem, suis membranis a vertebrae lurgidis erosio illatam, aegre fert; fert tamen, donec eccedente vel ebrietate, vel alvi obstructione, vel aestu venereo, vel calore lecti, vel motu nimio, vel animi pathemate etc., sanguis majori impetu in columnam vertebralem irruat; quo facto, nervi spinales, in origiae stimulum percipientes, impressionem morbosam nervo sympathico magno, et cerebro communicant, unde insultus epilepticus omnibus numeris absolutus oritur.

1) Peroxysmorum reditus nocturno tempore inque somno, fatalis est, ut BRAU (l. c. p. 299) inter 273 epilepsia laboran-

borantes, mutatione praecipue aetatis, regionis ac victûs sanantur“<sup>2)</sup>). At certe non indiscriminatim! Sic exceptionibus non caret alter aphorismorum, quo contenditur: „quod quibus ante pubertatem contingat epilepsia, curationem recipere; quibus post vigesimum quintum annum, eos ferè comitari ad mortem usque“<sup>3)</sup>). Epilepsias enim inter trigesimum et quadragesimum annum ex abusu liquorum fermentatorum ac suppresso fluxu haemorrhoidali evolutas, sine maximis difficultatibus sanavimus. — Epilepsiae prognosis non a vi symptomatum desumenda. Constat enim morbum, aspectu leviolem, aliquando difficilius sanari, quam qui sub forma feroci saevit<sup>4)</sup>). Nec frequentia paroxysmorum majus semper indicat periculum; immo generatim maxime rebelles sunt epilepsiae, quarum insultus longis intervallis aejunguntur<sup>5)</sup>). E contrario regula generalis, quo recentior epilepsia, eo magis sanationis spes afulget, et vice versa. Hoc tamen non impedit, quominus dentur etiam exempla epilepsiarum sa-

nata-

tas observavit. DAWOSKY (in n. *Ztschr. für Geburtakunde*, 1859, B. 7, H. 3) autam epilepsiam nocturnam caneri videbat.

2) HIPPOCRATES. II. aph. 45.

3) Idem Lib. V. aph. 7.

4) „Epilepsia, quae absque signo praemonente ingruit, ferè incurabilis est.“ QUARIN l. c. T. II, p. 17. „... Fallauschungen, die sich nur durch die leichtesten Symptome ankündigen, ... können heftiger u. selbst tödlich werden.“ PORTAL l. c. p. 374.

5) BOERHAAVE in consult. epist. VI, p. 23.



natarum, quamvis morbus annos quadraginta<sup>6)</sup> et quinquaginta<sup>7)</sup> duraverit. Novimus virum summo loco natum, qui ad annum quadragesimum aetatis epilepsiâ vexabatur, quae dein sponte evanuit<sup>8)</sup>. Gravissimae sunt epilepsiae, quae pulmones et cor vehementer aggrediuntur<sup>9)</sup>, quarum insultus vertiginem, hebetudinem, torporem relinquere solent; quaeque a pharmacis diversae prorsus naturae nullam mutationem, vel in melius vel in pejus, subeunt. Saepius epilepsia per annum unum alterumve evanescit, ac dein redit<sup>10)</sup>, nunquam evanitura. Ex quo colligitur, historiis epilepsiarum sanatarum fidem non indiscriminatim tribuendam esse. Eo magis errori locus est, quum epilepticus tempore intervalli liberi, perfecta frui videatur sanitate. Etiam si morbus diu duraverit, facultates animi non semper evidens detrimentum

ca-

- 6) NICOLAUS FLORENTINUS opp. (ab infautia aegra epilepsia laboravit). Et nova astant exempla: JOHN EPPS in *Lond. m. and ph. j.* 1833. Jan. p. 63 (Sanatio epilepsiae quae 20 annos saevierat). LARREY (l. c.) apilapsiam traumaticam 33 annorum curabat.
- 7) TRINCARELLI Lib. I. consil. 29.
- 8) Cfr. DOEDERLIN diss. de epilepsia autocratia naturae curata. Alt. 1747. Exemplum medici inter Italos, Leonicensi, qui post 30 annos epilepsia sponte liberatus est, et tantum fere annos vixit, ex TISSOT *dé l'épilepsie*, p. 218 notum est. FISCHER *Selbstheilung ein. Epileps.* (28 annorum); in *med. Ver.-Ztg. in Preuss.* 1836. N. 29.
- 9) Unde PORTAL l. c. p. 375: „die Prognose ist günstig, sobald die Respiration während der Anfälle frei bleibt, wenn sich auch andere heftige Symptome zeigen.“
- 10) PORTAL l. c. p. 375.

capiunt. Generatim epileptici longaeuitate non gaudent. Praeterea plurimis casibus fortuitis p combustionem<sup>11)</sup>, submersionem<sup>12)</sup> subiiciunt. Gravidae epilepsia laborantes plerumque, at ne semper<sup>13)</sup>, abortum<sup>14)</sup> patiuntur<sup>15)</sup>. Eclamps

11) Vir quidem sub peroxysmo epileptico sibi antibrachia at menum dextri lateris ad ossa usque ita combussit, ad amputationem recurrere opus fuerit, quae die 2 Nov 1821 in clinico instituto chirurgico Vilmensi locum obtulit. — Similam casum describit Dr. LUDW. VALENT in *voyage méd. en Ital.* Nancy 1822, p. 96. BURGGRAE l. c. (combustio lethalis). Plus vice simplici combustio fortuite salutaris fuit: *Eine 39jähr. Epileps., geheilt durch zufüll. Verbrennung durch Kohlen;* in HUFELAND *Journ.* 1826, St. 8, p. 128. PORTAL l. c. p. 182 (epilepsia octen combustionem fortuita in genu dextro, in capite at in man sinistra fugata). *Zwei Beisp. v. durch Verbrenn. geheile Epileps.* in *Miscell. pr. Aerzte u. d. Sanitätsber.* v. HUFELAND *Journ.* 1832, St. 7 (quaeritur an eductione ipsa an suppuratione sequente ac durante sanetur?). *Zwei Hlung. d. Epileps. durch Verbrennung u. Amputation eines Gliedes,* *ex gaz. méd.* 1839, N. 43, in FROBIEP *Notiz.* 18 B. 12, N. 17, p. 272.

12) DORNBLÜTH *suffocativ apoplect.* *Tod ein. Epilept. durch Hineinfall. mit dem Gesichte in ein klein. Wasserloch;* HORN *Archiv.* 1826, H. 4, p. 95.

13) SCHENK in obs. THREBUSIUS *gravis epilepsia in gravidis et foetui et partui innoxia.* *Act. ac. nat. cur.* Vol. I. p. 216. GULBRAND *epilepsiae tum gravidarum tum lactantium innoxia atque paralytica eruptis catameniiis soluta* (*acta s. med. Havn.* Vol. I. p. 84). Similia observata sunt a I HAASSEN l. c.

14) ROGERY *mém. et obs. sur des convulsions épilept. survenues à la fin du sept. mois de la grossesse et suivies*

parturientium, nisi jam prius convulsionibus insontibus obnoxiarum, quidquid dicant <sup>16</sup>), morbus est plerumque lethalis. Illa praegnantium post partum aliquando cessat <sup>17</sup>). Epilepsia infantum, nisi ex encephalitide et hydrocephalo, vel ex rachialgitide et hydrorhachitide, vel ex dentitione veniat, prognosin epilepsiae gastricae agnoscit.

2. „Qui a capite epilepsiae initium sumunt, <sup>Progn. ex</sup> ex his gravissimae, deinde qui a latere: qui vero <sup>sele.</sup> a manibus ac pedibus, maxime sanari possunt“ <sup>18</sup>). Paroxysmum vel antecedentes vel consequentes oculorum splendores epileptici funesti esse solent <sup>19</sup>). Sane omnia signa epilepsiam encephalicam indicantia, caeteris paribus, difficillimae curationis praesagium sistunt. Verisimile autem est, et epilepsias, quarum caussae in aliis corporis partibus resident, tractu temporis veluti encephalicas fieri. Valet id potissimum de epilepsiis abdominalibus.

### 3. Epi-

*l'avortement, (Annales de la soc. de méd. de Montp. T. 9. p. 100).*

- 15) Multo saepius graviditate durante epilepsia ailet: FR. HAASE I. c. (epileptice, quae quotidie fere paroxysmos passus est, in graviditate incolumis fuit). Busch *Epileps. b. Schwang. u. Gebärend.; a. d. Berichts üb. geburtsh. Klinik z. Berlin, in neue Ztschr. f. Geburtsh. B. 5. H. 1.*
- 16) GUNTER diss. de eclampsia parturient. morbo gravi quidem neque adeo funesto. S. I. Pathol. resp. GUTSCH. Lips. 1776, Sect. 2. Therapeut. resp. GERISCHER. Lips. 1777.
- 17) RONALD miscel. acad. n. cur. Dec. I. an. 3. 1672. p. 531. Ipse vidi.
- 18) HIPP. Proorrh. diss. 16. CORNARI.
- 19) Misc. ac. n. c. Dec. III. an. 9. et 10. p. 280.

Progn. ex  
indole.

3. *Epilepsiae atonicae* seu *nerveae* primus ill aphorismus HIPPOCRATIS<sup>20)</sup> applicari potest. Prognosis hic saepe a conditione domestica aegrorum pendet. *Epilepsiis traumaticis* quandoque auxilii efficacissima chirurgica opponi licet<sup>21)</sup>. *Epilepsiae inflammatoriae*, *rheumaticae* et *arthriticae* priusquam in vitia localia, quae cum dialhesi, e quibus pullulant, jam amplius non cohaerent<sup>22)</sup> degenerent, medicinae imperio plerumque subiciuntur. *Epilepsiarum* sanatarum maxima pars *metastaticae* fuerunt; item *gastricae*, saltem quatenus meconio, acidis primarum viarum, et venis ortum debuerant. *Epilepsiae scrophulose* et *rhachiticae* ut plurimum altas adeo radices egerunt, ut artis imperium eludant. Excipi quodammodo merentur epilepsiae ex affectione glandularum meseraicarum. *Epilepsiae syphiliticae*, ni complicatae, ad sanabiles spectant<sup>23)</sup>.

Transitus  
epilepsiarum.

4. *Epilepsiae* transeunt in maniam<sup>24)</sup>, in primis fatuam<sup>25)</sup>, in coecitatem<sup>26)</sup>, strabismum<sup>27)</sup>

20) l. c. (11).

21) Cfr. §. LVIII. N. 4 (46)

22) P. II, ed. alt. Vol. I. Sect. 1. C. 1. §. V. 18.

23) K. SENDELIN *Bemerk. üb. d. Ursach. d. Nervenkrankh.* in HORN *Archiv*, 1830. II. 1 (auctor adnotat, tales sanctius repentine vite decedere).

24) In nosocomio SALPETRIERE inter 290 epilepticos 80 maniaci et 50 fatui fuere, ESQUIROL in *dict. d. sc. méd.* I. p. 516. REINHOLD *transitor. Geisteszerrüttg. nach epileptischem Anfall.* in *vermischte Abhandl. a. d. Geb. d. Heilv. ein. Gesellsch. pr. A. zu Petersburg.* ib. 1830. *Samml.* p. 88 (*epilepsia cerebri metastatica fuit; mania vero a fatua*). CARRERI l. c.

in apoplexiam<sup>28)</sup>, paralysin<sup>29)</sup>, in hydropem et tabem etc.<sup>30)</sup>; quae transitiones nullam plane sanationis relinquunt spem. Sunt qui sub ipso paroxysmo morte mulcentur<sup>31)</sup>. Alii ab encephalide,

25) Inter 339 epilepticos 145 fatui. *Requisiol apud PORTAL l. c. p. 368.* „Von den in die Anstalt aufgenommenen Epileptischen waren die wenigsten mit einfacher Fallsucht behaftet, indem die meisten an einer oder der andern Form von Verrücktheit litten“ JULIUS Uebersicht etc. in *ajusdem et GERSON Mag.* 1829. H. 2. p. 193. MÜLLER l. c. (ad hoc malum minuendum magnas opii doses commendat). H. HALFORD *Forles, üb. d. Einfluss einig. körperlich. Krankheit. auf den Geist*; in GRAEF u. W. *Journ.* 1833. B. 20. H. 1. p. 98.

26) SIECH de coecitate post epilepsiam in parturiente (misc. sc. nat. cur. Dec. I. en. 3. p. 293. Dec. III. an. 5. 6. app. p. 123). GEBERT de epilepsia mira metastasi in repentinam coecitet. et inspirat. viam recuperation (eph. sc. nat. cur. cent. I. II. p. 264).

27) SIECH de strabismo ex epilepsia (l. c.) p. 294.

28) RAYCH de epileps. apoplexie superven. lethali. Misc. sc. nat. cur. en. 6. 7. p. 311. DEROUAUX *epileps. apoplectiformis*, verursacht durch ein. Markschwamm des Gehirns; ex *ann. de méd. belge.* 1835. Mai, in SCHMIDT *Jahrb.* 1836. Sppltd. 1. p. 258.

29) RANON act. soc. Havn. Vol. 2. p. 154. HERMES in *HENKE Ztschr.* 1830. H. 3. p. 149 (paralysis lateris dextri). BRAU l. c. p. 300 (inter 273 epilepticos vicesies et quinquies Hemiplegia occurrebat).

30) In tetanum: OTTO tödlicher Starrkrampf nach ein. Anfälle v. habitueeller Epilepsie, in CASPER *Wochenschr.* 1835. N. 15. — In enchylosin genu et convulsivos motus brachiorum: TOTZ zwei Fälle v. merkwürd. Metaschematism. bei Epileptischen, in HUFELAND *Journ.* 1833. St. 3. p. 119.

31) DOBRZANSKI mors repentina ex morbo caduco (misc. Frank Prax. II. I. 2. 1.

litide, quam secundariam vocavimus<sup>32)</sup>, nec no-  
a hydrocephalo accessorio<sup>33)</sup> necantur. Hi mori  
plane a febribus, aliisque aegritudinibus, quando  
que *fortuito* epilepticos aggredientibus, ac anti-  
quam morbum profligantibus distinguì debent.  
Epilepsias nempe a febribus quartanis sanatas vi-  
derunt alii<sup>34)</sup>, a typho nos ipsi<sup>35)</sup>. Nec desun-  
t exempla epilepsiarum fugatarum a supervenienti  
bus tumore ad cubitum<sup>36)</sup>, cholera et dysente-  
ria<sup>37)</sup>

ac. n. eur. Dec. I. an. 2. p. 276). GÖCKEL de milite e  
improviso convulsionib. epilept. sine manifesta causa tes-  
tato, ac spatio aliquod horarum trucidato, (Ib. Dec. II  
an. 9. et 10. p. 141). Die 18. Aug. 1807 morte subitane  
perit servus meus Carol. Zimmermann, juvenis floride  
25 circiter annorum, a multis retro annis epilepticus. Hor  
7. nempe matutina cum socio adhuc locutus, hora 9. ma-  
tutina mortuus in lecto repertus est. Pars corporis di-  
midia, et quidam sinistra, livida fuit; ita ut apoplexi  
enectus videretur; nisi pollices manuum retracti convul-  
sionem adfuisse testati fuissent. Ex schedis J. P. FRANK. —  
Nihilominus Esquirol (in *dict. des sc. mèd.* T. 12. p. 530  
edixerat, aegrum nunquam inter convulsiones ipsas, se-  
tantum in periodo, quae sequitur, necari.

32) P. II. ad. alt. Vol. I. Sect. 1. C. III. §. XVII 9.

33) Ibid. C. IV. §. XXIII 3.

34) TENOT ergo epilepsiae febris superveniens curatio. Paris  
1578. *Auszüge aus d. Tageb. u. ausüb. Arznei.* p. 271  
PORTAL l. c. p. 372.

35) Cfr. opusculum meum: *Erläuterung d. Errungstheorie*  
2. Aufl. Heilbronn 1805. p. 386 (Antequam nempe epileptic  
a reliquis aegris in nosocomio Viennensi separarentur  
contigit, ut in typhum contagiosum inciderent, quo morbo  
feliciter superato, et epilepsiae nulla alia obveniebant ve-  
stigia).

ria<sup>37)</sup>, haemorrhagiis<sup>38)</sup>, imprimis haemorrhoidibus<sup>39)</sup> et morbis cutis<sup>40)</sup>, nec non a ruptura abscessus<sup>41)</sup> etc. <sup>42)</sup>). Phaenomena sub finem

Gg 2 cunus-

36) SCHULTZ singularis crisi epilepticae in puerpera abortu tribus in sinistro cubito glandulis tumefactis soluta (misc. ac. nat. cur. Dec. I. an. 3. p. 146).

37) PRAETORIUS in *Samml. d. Soc. in Budissin*, p. 61. Eph. n. cur. Dec. II. an. 7. app. p. 183. Dec. III. an. 1. obs. 72.

38) *Edinburger Versuche*, V. B. N. 47.

39) LANGLOIS: ergo epilepticis et melancholicis haemorrhoides salutaris. Paris. 1640. RONCALLI hist. morbor. obs. auctae, Brix. 1791. p. 21.

40) HAHNES in *gazette salubre*, 1790, N. 2. Ströhm in *Horn Archiv*, 1824. H. 4. p. 130 (epilepsia accessu variolarum sanata). KRIEGER *merkwürdig. Heil. ein. Epileptisch*, in *HUFELAND Journ.*, 1834. St. 9. p. 39 (scabie purulente). CONSTANT *Uebers. d. Klinik Guersent's* 1834. ex *gaz. méd. de Par.* 1834. N. 35. in *SCHMIDT Jahrb.* 1835. B. 6. p. 110 (morbillis accedentibus).

41) WERLOSCHNIGG de motu hyst. (in puella) ex uteri abscessu pro epilepsia habito, feliciter cur. (misc. n. cur. Dec. III. an. 9. 10. p. 290). RANKEN l. c. (pus per nares exiit). FRAENKEL in *CLARUS M. RADIUS Beiträge* 1835. B. 2. H. 1 (abscessus in brachio).

42) Ulceribus pedis rodentibus: MÜLLER l. c. — Abortu: KRATENNETHIN l. c. — Ossium fractura: SALVATOR DE RENZI *Beobacht. ein. seit 9 Jahr. bestehend. Epileps., welche durch eine zufällige Verletz. gehoben wurde; ex il. filiatre Sebazio. Giorn. della sc. med. Nap.* 1837. Setobr. in *HUFELAND Journ.* 1838. St. 1 (os frontis et famoris sinistri fracta erant. Cura durante mensas quinque, epilepsie siluit et physiognomie epileptica disparuit; et capitis vulnere clauso, malum recidivum fuit et setaceo tandem curatum est. Ex quo videtur est, et similibus in casibus suppurationi maximam cures partem attribuendam esse).

cujusvis insultus epileptici contingentia veluti *crisis* constituere, ac fontem pro indicationibus aperire, dictum est<sup>43</sup>); quam vero observationes non nisi inter arctissimos limites admittemus<sup>44</sup>. Quandoque epilepsiae (forte rectius convulsiones salutares fuerant<sup>45</sup>).

## §. LVIII.

## C u r a.

Genera-  
tim.

1. Curatio vel praesentem, vel futurum respicit paroxysmum; illum solvere, hunc prohibere conamur. Hoc in opere indicationes rationales eousque prosequimur, quousque ipsae a conjecturis circa morbi sedem et indolem suggeruntur. Enim

43) LENTIN *Beitr. z. ausüb. Arzneyw.* 3. B. p. 144—175.

44) Si e. c. quivis insultus epilepticus largo urinarum sedimento termineretur, varissimiliter esset naturam *crisis* per lotium moliri, cui nutui obtemperando, deficiente alia indicatione, ad diuretica confugiendum foret. At quam incerta et ambigua haec sint, clare demonstravit DUBYSSÉ l. c. p. 259.

45) GUTTERMANN de arthrid. vaga convulsionib. epilept. soluta. l. c. THURBERGIA epilepsia disturnae colicae sanguineo-spasmodicae superven. solutis (act. ac. n. cur. Vol. I. p. 217). PAULLINI ceducus dysenteriae everruncus (misc. ac. n. cur. Dec. II. an. 7. app. p. 133). GRASS da ischuri paroxysmo epilept. soluta (ib. Dec. I. an. 3. p. 387. Dec. II. an. 5. et 6. app. p. 129). MÜLLER de seue plusquam octo generario apoplexiae proximo, convulsionibus epilept. vehementissimis tacto, et insperato sanitati restituto (aph. cur. cent. 9. et 10. p. 368). PAULLINI quartana febris a epilepsia cureta, et contra (misc. ac. n. cur. Dec. II. an. 1. app. p. 50).



Enimvero solum exhaustis aut desideratis indicationibus rationalibus, ad auxilia empirica sic dicta *specifica antepileptica* confugere fas est <sup>1)</sup>). Donec vero de sanatione morbi certi sumus, epilepticos diu noctuque custodire juvat. Hinc nunquam sine amico aut famulo domum derelinquere, nunquam eam soli inhabitare, nunquam ecclesias, comitia et theatra, concurrente multo populo, frequentare iis permittendum est. Si epilepsia noctu invadere soleat, ne aeger aliter quam in lecto super solum strato, culcitris undique circumdato, dormiat,

- 1) Elenchos eorum sedulitati à BRAC catal. medicamentor. adversa, epileps. Arnh. 1693. PSCHLINI diss. de epileps. et contra eam remed. Kil. 1678. RIVINI diss. de remed. antepilept. fossil. Lips. 1706. TRUCHSERI diss. de remed. antepilept. terreis coll. diss. Lips. 1710. SANSONI diss. de epilepsia et praecipue ejusdem sic dictis specificis. Helmst. 1756. ORLOVII diss. sistens observationes circa nonnulla remedia antepileptica usitata. Regiom. 1759. BRUGERII diss. de remed. specif. in epilepsia usitatis. Francf. 1765. HARTMANNI diss. sist. ver. epilepsiae medendi methodos. Francf. 1787. MILLERI diss. de medicamentis antepilept. Argent. In coll. diss. med. Marb. 1787. Fess. III. p. 31. F. W. MAURERI comm. de medicament. antepilepticiis. Marb. 1792. BUXTORFII *Bemerk. üb. d. Anwend. einiger, geg. d. follende Suchts gerühmt. Mittel.* v. Mus. d. Heilk. schweizer. Aerzte u. Wundärzte. 1. B. p. 549. C. WESTPHALII *Heilm. geg. d. Falls. Quedlinb.* 1823. *Die gewissest. u. berühmtest. Heilmitt. geg. d. Falls. Lpz.* 1823. *Ueb. d. Volksmitt. geg. Epileps. in Russl. ex Moskauer Comman.* in *Bust. Repertor.* B. 12. H. 2. p. 281. et W. ANCHETI *d. besten Mittel geg. Epileps. u. Hämorrhoid.* Nordhaus. 1830 (ad usum pro laicis) dabemus.

mias, curandum. Postremo nosocomia unico epilepticorum curae dicata, construenda forent \*).

Cura paroxysmi.

2. Aeger in paroxysmo constitutus, docente jam Caelso<sup>2)</sup>, nulla indiget cura, nisi ut vestibis, collari aliisque fasciis, sanguinis circule obstantibus, illico spoliatur. Collocetur porro in loco lucido et aperto potius, quam clauso et tenebricoso. Removeantur superflui spectatores. Dentes confirmati, vel spathalio ligneo ex tilio commodissimo, vel cochleari hiateis obvoluto, vel nodulo in strophiole facto, diducantur et diducti servantur, tum ob faciliorem respirationem, tum ne aeger linguam mordeat. Violentam corporis concussionem levare quidem, sed in totum comprimere non expedit<sup>3)</sup>. Pollicem extorquere superfluum est labor. Nec juvat aegrotos odoramentis, praesertim acrioribus, sternutatoriis<sup>4)</sup>, vellicatione, clysteribus excruciare. Vidimus plus vice simplici clavem aut aliud ferri frustulum manibus aegri commissum, paroxysmo finem imposuisse, legimusque similem effectum per lenem corporis epileptici frictionem ope ejusdem metalli ab aliis obtentum fuisse<sup>5)</sup> etc.<sup>7)</sup>. Quae tamen experimēta

2) NERNANN *Handb. d. Staatsarzneyl. u. staatsärztl. Veterinärk. Leipz.* 1813. 1. Th. p. 205.

3) L. III. c. 23.

4) FORTAL l. c. p. 381 et 382 conatus est, sanguinis extractiones universales et locales instituire.

5) VALENTINUS puerum vidit, qui ob insufflatum a matre sternutatorium, convulsus obiit (*Prax. med. infallib.* p. 225).

menta alias incassum repetimus. Affusio aquae frigidae insultum epilepticum cohibuisse fertur<sup>6)</sup>: num cum reali profectu, dubitamus.

3. Si epilepsiae insultus ab aura ex determinato loco manante annunciari soleat, sique mali causa nequaquam in cerebro et medulla spinali (locata sit<sup>7)</sup>); paroxysmi evolutionem impedire aliquando licet<sup>10)</sup>, si pars, ex qua aura proficiscitur, *ligatura*<sup>11)</sup> circumdetur<sup>12)</sup>. Interim haec methodus saepissime expectationem, vel in totum<sup>13)</sup>,

C. immin-  
nentis pa-  
roxysmi.

6) PFAYF in MECKEL *deutsch. Arch. f. d. Physiolog.* 3. B. 2. H. Hal. 1817. p. 165—168.

7) Compressio abdominis pugni ope versus columnam vertebralem commendatur a R. RIND in *transact. of the assoc. of fellows, Dublin* 1824. Vol. 4. N. 33. — Netro muratico in os aegroti ingesto paroxysmum extemplo sedari et conscientiam redire plus vice simplici videbat F. HAWKINS l. c. p. 352.

8) BRENA *giornale di med. prat.* Vol. 3. C. 3. C. J. B. ALDIS lib. d. *Nutz. kalter Waschungen, ex Boston journ.* Vol. 20. p. 11. in SCHMIDT *Jahrb.* 1838. B. 20. p. 279. (Cfr. 3 (21).

9) BORRHAVE de morbis nervorum. p. 844.

10) ALYSON *Abhandlung vom Wechselfieber.*

11) *Ligaturas loco nuperrime in nosocomio Berolinensi mox inter auras fontem et aegroti caput pluries fausto cum eventu applicata est.* v. *Jahresber. üb. d. Charitékranken.* 3. Abtheil. für Gemüthskr. u. Epileptische, in *Burr Mag.* 1828. B. 28. H. 2. Et a PORTAL l. c. p. 406 additur.

12) MORRO in BAYFORD cent. VI. hist. 78. RACHMANN. diss. de artuum ligatur. ad nonnull. morb. intern. usitat. Duisb. 1773. RAHN *Briefwechsel.* 4. B. p. 516. PORTAL l. c. p. 236. J. D. M. CLARION *patholo-therap. ed. vollständ. Begriff d. prakt. Med. etc. Nach dem Französischen.* C. I. A. TERNUS, *classica* 1834. Kap. 1. Abschn. 3. §. 1. und

tum<sup>13</sup>), vel post aliquot felicia tentamina<sup>14</sup>), d  
ludit, aut angustias addit<sup>15</sup>), aut paroxysm  
frequentiores reddidit<sup>16</sup>). Aliàs insultus epilepti  
animum terrore vehementer commovendo<sup>17</sup>), fr  
stulum sulphuris manibus terendo<sup>18</sup>), ammonis  
naribus cautissime<sup>19</sup>) admovendo<sup>20</sup>), opium<sup>21</sup>  
subcarbonatem potassae<sup>22</sup>), emeticum<sup>23</sup>) etc.<sup>2</sup>  
exhibendo praepediti fuere.

4. *Ep*

13) SIEDLER I. c. cas. quartus.

14) MAURER comment. de medicam. entepilept. p. 39.

15) MAURER ib. DREYSSIG I. c. p. 265.

16) FRÜNDL in HUFELAND Journ. 2. B. p. 280.

17) Legatur celebratum exemplum puellarum orphenotrop  
Haarlemensis apud KAAS BOERNAAYS impetum faciens dicti  
HIPPOCRAT. Lugd. Bat. 1745. §. 406. et cfr. BERNERT  
KAUSCH Memorab. d. Heilk., Staatsarzneiw. u. Thierhei  
Züllichau 1810. 3. B. (Timor verberationis profligavit me  
lum). F. A. HÜBNER eine durch Zufall (terrore) gehei  
Epilepsie; in HORN Archiv. 1827. H. 3. p. 500.

18) CULLEN Anfanggr. d. pr. Arzneyk. nach d. viert. en  
Ausg. übersetzt, mit Anmerk. u. Zusätz. 2. Aufl. 178  
3. B. p. 391.

19) NYSTEN obs. sur un cas d'empoisonnement prod. p. l'i  
spirat. de l'ammoniaque pendant un accès d'épilepsie (bu  
de la fac. de méd. et de la soc. de Paris a. 1815. p. 351)

20) Aliquoties cum fructu tentavi. Cfr. (24).

21) JUNGER pr. REIL diss. cont. analecta ad doctrin. de ep  
lepsy. Hal. 1801. p. 35. Nullum ab opio hic obtinui affectus

22) D. GOLZ patri meo retulit, se in nobili Polono insultu  
epilepticum saepe imminutum aut omnino impeditum v  
disse, si aeger, aure epileptica percepta, salis alcalini si  
vegetabilis in duabus aquae partibus soluti guttas XXX.  
XL assumeret. Certior eret effectus, si stomacho jejuni  
assumendum esset hoc remedium. — „Anno 1799 p  
hoc aegro in consilium vocato, ejusdem uxor mihi confi

4. *Epilepsiae traumaticae* cura quandoque C. E. traumatica.  
obtinetur, causam, locum quemdam systematis  
nervosi irritantem, abigendo<sup>24</sup>), vel partem, ex  
qua malum originem trahit, resecando. Sic exempla  
epilepsiarum ex vulneribus capitis ortarum, ac  
terebratione calvariae (jam ab ANETAKO propo-  
sita<sup>25</sup>)), vel laesionibus fortuitis cranii<sup>27</sup>), sana-  
tarum, vel saltem pro tempore, quamdiu scilicet  
patebat vulnus, fugatarum<sup>28</sup>), leguntur apud  
RHODIUM<sup>29</sup>), SPIGELIUM<sup>30</sup>), THEINERIIUM<sup>31</sup>).

BER-

mavit, paroxysmos quidam breviores esse at interdum  
non redire, caeteroquin illius valetudinem non malius se  
habere." Ex schedis J. P. FRANK. Cfr. 2 (7).

23) DREYSSIG l. c. p. 265.

24) Aquae frigidae potu paroxysmorum evolutionem impe-  
ditam esse, fertur in HUFELAND Journ. B. 10. St. 2. p. 138.  
Epilepticus dimidium scyphum fluidi spirituosi exhaustando  
paroxysmos depulit; ast stupor et capitis gravitas remanse-  
rant per tres quatuorve horas, nec non proclivitas ad paro-  
xysmum recidivum (FERRIER Notiz. 1828. B. 19. N. 16). —  
L. MARTINET (üb. d. innern Gebr. des Ammoniake b. d. Be-  
handl. d. Epileps., ex bull. de thérap. T. 11. livr. 9. in  
SCHMIDT Jahrb. 1837. B. 15. p. 6) ad depellendum morbum  
praescripsit Ammon. fluidi gr. X—XII p. d.

25) Epilepsiarum, globulis aliisque corporibus duris malum  
excitantibus, extractis sanatarum exempla affert PORTAL  
l. c. p. 216 sq. Cfr. (39).

26) L. I. de curat. morb. chronic. C. IV. p. 121.

27) Cent. I. obs. 66. L. II. C. IV. p. 53. SCHENK L. I. p. 116.

28) LA MORTE traité compl. de chir. obs. 172. T. 2. p. 409.

Et: Mém. de l'ac. r. de chir. T. I. p. 230.

29) cent. I. obs. 66. 30) TISSOT l. c. p. 290. §. 130.

31) Diss. medico-chir. sistens cas. epilaps. per terebr. cranii  
feliciter sanatae. Berol. 1811.

BETTIUM<sup>32</sup>) aliosque<sup>33</sup>). *Nervorum irritatorum discissio epilepsiae finem imposuit, testantibus* TISSOT<sup>34</sup>), PORTAL<sup>35</sup>), VERING<sup>36</sup>), KÖHN<sup>37</sup>) aliis-

32) *Storia delle principali operazioni di chirurg. di C. SPÄHN-  
GEL trad. dal tedesco e corredata di note da BETTI. Fiorenze* 1815.

33) *The Edinburgh medical and surgical journal*, Vol. II. an. 1806. Octob. — Decemb. GERSON u. JUL. Mag. 1826. II. 3. p. 509. ROYERS *Epilepsie, durch Anwend. des Trepanns geheilt*, in *FRONIER Notiz*, 1827. N. 14. p. 221 (epilepsia, ex ossis frontalis fractura ad introrsum exorta, 14 annos saevierat) et HORN *Archiv*, 1827. H. 6. p. 1062. ib. 1828. St. 6. p. 1075 (quinque inter casus epilepsia trepanatione ter fugata est). MAUGURST DE LANOTTE apud PORTAL l. c. p. 159. J. GUILD ex *the Americ. j. of the med. sc. Philadelph.*, 1829. Mai. N. 7. in *HECKER lit. Ann.* 1829. H. 8. p. 497. DUDLEY in *the transylvan. j. of med. sc.* 1833. v. GERSON u. JUL. Mag. 1834. St. 5. p. 273. Cfr. BRUNNEN *allg. Repert.* 1833. N. 11. p. 97. T. F. PALMER *Beobacht. a. d. chirurg. Praxis; ex Lond. med. gaz.* Vol. 17. 1835. Novbr. 14. in *SCHNIDT Jahrb.* 1836. B. 12. p. 70. cas. III. LARRY *Fall v. traumat. Epileps.*, die seit 33 Jahr. bestand u. nach Ausziehung ein. Knochensplitters geheilt wurde; ex *lancette franç.* 1836. N. 81. in *SCHNIDT Jahrb.* 1837. B. 16. p. 195. HOLSCHER *Epileps. nach ein. Kopfwunde. Heilung durch Trepanation; in ejusd. Annal.* 1837. B. 2. H. 1.

34) l. c.

35) *Cours d'anatomie médicale. T. IV.* p. 252 et l. c. p. 169.

36) *Salzb. med. chir. Zeitung.* 1819. N. 66. p. 228. Femina 40 annorum, semper sana donec quinque abhinc annis, ad superficiem internam surae dextrae, sine nota causa, tumorem, durum valde, sensilem, magnitudinis nucis, simul cum insultibus epilepticis acquisivit. Exciso hoc tumore, dolores et epilepsia cessavit.

aliisque<sup>39</sup>). Extracto ex aure globulo epilepsia cessavit, referente HILDANO<sup>40</sup>). Idem evenit aperto per cauterium tumore in coxa et extracto inde osse carioso<sup>41</sup>); atque in alio aegrotto, extirpato tumore ad pollicem manus dextrae<sup>42</sup>). Epilepsiae in sinistra manu oriundae sanationem *fonticulus* ibi excitatus perfecit<sup>43</sup>). Altera e laesione digiti indicis cum aura epileptica proficiens, *setaceo* ad brachium applicato, fugata est<sup>44</sup>). Epilepsiam terribilem, quae ex affectione testiculorum originem trahebat, castratione<sup>45</sup>) sanavimus<sup>46</sup>) etc.<sup>47</sup>).

Mi-

37) *Phys. med. Journ.* 1802. p. 71.

38) *Medical essays. T. IV. N. 27.* p. 416 (Mulier 38 annorum per duodecim annos laboraverat epilepsia omnibus auxiliis rebeli. Paroxysmus semper incipiebat a crure circe partem inferiorem gastrocnemiorum. Medicus hio scalpellum adgit ad binorum circiter pollicum profunditatem, et in fundo vulneris invenit corpus durum, cartilagineum, pisum majus aequans sua mole, quod a musculis separatum, cum nervo insidere vidisset, discisso nervo, corpus illud heterogeneum forfice prehensum eduxit, subsequente perfecte sanitate). FABIAN apud PORTAL l. c. p. 169 (discissione nervi epilepsiam, quae semper dolore in apice digiti indicis dextri annunciebat, ex templo devicit).

39) *Cent. I.* obs. 4.

40) SCHENK obs. L. I. N. 196. VOLCKAMEN nervi lesio epilepsiae orientis causae per cauterium ablata (misc. ac. n. car. Dec. II. ca. 5. p. 321).

41) CARRON in SIBILLOT *recueil périodique de la soc. de méd. de Paris. T. 13.* p. 422.

42) BAXTER *act. acad. n. car.* Vol. 8. p. 54.

43) MAROT *nouv. mém. de Dijon.* 1784. *sémemstr.* I. p. 149.

44) Inter Sectos veteres epilepsia, mania et aliis morbis hae-

Mitiora atque momentanea auxilia forent ligatura  
par-

rediteriis adfecti castrati sunt: „ne genus foeda contagione ab iis, qui ex illis prognati forent, leederetur.“

J. A. PARIS and FONBLANQUE *med. jurisprudence*. Lond. 1823. P. 2.

- 45) *Augustus Wambutt* viginti tres annos natus, optima semper sanitate gavisus, famuli officium exercens, cum die 23. Junii 1809 somno pomeridiano breccis deligatis indulisset, a domino suo praetereunte joci gratis strophiole in nodos convoluto ad scrotum percussus est. Cum ejulatu inde evigilans illice lipothymia correptus humum concidit. Recuperatis mentis viribus rubor, tumor et dolor scroti comperuere, quibus post triduum urinae suppressio supervenit. Adhibitis nonnullis mihi ignotis pharmacis, urina postridie in conspectum venit, multa quidem sed atra. Fugata et scroti affectione, juvenis se senem dixisset, nisi quolibet nocte in pollutiones repetitas, quibus antea rarissime obnoxius erat, incidisset. Cui incommodo, consilio medico, coitum, potum liquorum fermentatorum, et balnea frigida opposuit. Verum sextum vix intraveret balneum, cum convulsionibus diris correptus fereque exanimis inde extrahi debuerit. Nihilominus convulsiones per quatuor adhuc horas protraherantur. Ex eo tempore pollutiones non amplius comperuere. Redierunt vero convulsiones quavis die ter quaterve, et ita quidem protractae, ut vix intervallum horulae inter unum et alterum accessum locum obtinuerit. Desaevierent tamen spatium duorum hebdomedum, et anno 1812 die 10. Februarii, cum seeger meum imploreret auxilium, jam quater tantum de mense, illis subiciebatur et vix aliter nisi commoto qualicunque demum ex cense animo. Suscipe me in clinicum tuum institutum, aiebat, sic enim non eolum hominum miserrimo succurres, sed simul discipulis tuis memorabilem exhibebis morbum, et securitati publicae providebis. Primam rationem admittens, me reliquas haud intelligere fastus sum. Morbus meus, inquit, memorabilis est, nam



plurimi, qui me viderunt medici, eum definire haud potuerunt, dubii enim haerebant, num pro *epilepsia*, num pro *mania*, num pro *rabie* declarandus foret. Conveniebant solum, me esse aegrum vigente paroxysmo periculosum, ac arcte custodiendum. Quia verbis istis multum fidei tribueram, juvenem observandi gratia postridie in clinicum suscepti. Ad diem 13. Februarii nil morborum comparueret; verum cum circa horam octavam fortuito concussio vase quodam vitreo terrefactus fuisset, illico anxius factus est. Appropinquante jam paroxysmo, monuit aeger, tanto perati custodes! Brevi post mucum et bilem vomuit. Emasia conspicua virium jactura sequabatur. Custodibus interea accedentibus, aegrotus, ut ipsum ligarent, rogavit, ad quod cum obiter sese accingerent, ut multis iisque arctis vinculis circumdaretur, exposcebat. Quibus verbis vix prolatis, obmutuit. Aphoniae sociae erant crebrae oscitationes. Dubitari amplius non potuerat, miserum jam mentis compotem non esse. Hora a vomitus apparitione elapsa erat, cum sequens scena ordiretur. Aegrotus statuæ instar decumbens, truces lacrymisque inunctantes oculos in adstantes, veluti minitabundus, defixit. Pupilla dilatata irisque fere immobilis erat. En vero violentos oculorum motus, quos violenti toties corporis a vinculis sese liberandi nixus, illicque rapetiti sequebantur. Qui visus certe non inanis fuisset, nisi furibundus, facie jam livens, a quatuor adhuc viris robustis, quos mordere conabatur, coaceretur. Impotens veluti rabiosus contremuit, et contremendo lectum ferreum conqussabat. Mugitus, quasi taurus mactabundus, expellens, vicissim ita dentibus stridebat, ut inde pollen ex vehementi attritu spumas loco coram ore prodiret. Horrenda ista scena septem circiter sexagesimas horae partes perdurabat, ac concessa, per aliquot momenta, protrácta quiete, septies renovabatur. Paroxysmus sic ad tres horae partes protrahabatur. Jam vero pulsus hucusque frequens, plenus, durus, regularis, vix perceptibilis fieri incipiebat, respi-

ratione

ratione ad aspectu fariata, manibusque lividis, algidis, sudorisque rore obductis. Agoniae haec imago, post hora dimidium, singultu et oscitatione fugabatur, quibus ali quoties repetitis et mens instaurari incipiebat, quia tamen aeger verbum proferre valeret. Loquela autem binis ciciter horis alapsis redeuota, aeger primum, potum accepcebat, quem sine difficultate deglutire poterat, ac interrogatus, num quid doloris esset, summam debilitatem cephalaeam, artuum dolores, maxime vero cruciatum in scroto ad lumbos ascendentem accumbat, ac pulverem ex attritis dentium in ore relictum anxiebat. Testiculi retracti inveniebantur. Malorum perpessorum aeger plane non recordabatur. Postridie aeger hominis sani ad aspectum refarebat; donec novo paroxysmo, circiter omni hebdomada, plarumque sine aidenti causa redeunte, excrucietur. Tales paroxysmos quatuordecim trium mensium curriculo observavi, quorum alii breviores, alii longiores quam descriptus ille fuerant. Longiores paroxysmi ad decem, duodecim, imo quindecim insultibus, quales decem in descripto accessu numeraveram, componi solabant. Scrotum flaccidum erat, ac testiculi normales; si excipias quod epididymis sinistra attactum respuebat. Varias stabilitas indicationes variaque exhibita pharmaca enumerari spatium non permittit. Sufficiat hinc meminisse, cum nullum auxilium, nec venesectionibus ad lipothymiam usque exceptis, levaminis quid afferre potuerit, cum morbus ab ictu super testiculos primam originem traxerit, cumque quavis paroxysmus retractione testicularum terminatur, me aegro castrationem proposuisse. Cui proposito cum ipse accesserit, chirurgus *Molz* operationem perfecit. Testiculi nil morborum exhibuerunt. Nihilominus, si evasis jam nullus amplius apparuit paroxysmus, ac aeger mense Januario 1820 optima adhuc fruebatur sanitate, si excipiat dolor quandoque ad funiculos umbilicales recurrens, narcoticorum topico usu facile sedandus.

46) Epilepsia, a calculo vesicae urinae excitata, lithotomi-

mi:

partis, ex qua aura proficiscitur<sup>47)</sup>, aut applicatio opii<sup>48)</sup> super eandem.

5. *Epilepsiae inflammatoriae* primum auxilium *venaesectio*<sup>49)</sup>. Sic ARETAeus<sup>50)</sup>, RHODIUS<sup>51)</sup>, <sup>C. Epil. inflammatoriae.</sup> RIVIERIUS<sup>52)</sup>, ZACUTUS LUSITANUS<sup>53)</sup>, THEOPH.

Bo-

mia facta cessavit. TUCKER in the lancet, Lond. 1826, Jul. Alia, quinque menses post lapsum in caput exorta, ferro candante curata est. Ex bull. des sc. méd. 1827. Mai. N. 8, in J. B. FRIEDERICH Magazin. 1830. H. 3. p. 162. BRETRUNDI Heil. d. Ep. durch Exstirpat. ein. kl. Geschwulst am Wirbel d. Unterkiefers ex rev. méd. 1839. Octbr. in FAORIER Notiz. 1840. B. 13. N. 10. p. 160.

47) Dr. LISOSCHITZ medicus paritus Vilnensis, epilepticum curavit, in quo paroxysmus ex halluca incipiebat. Eo ligatura circumdato, aeger perfecta videbatur gaudere valetudine, at vix ablata ligatura malum recrudescebat. Cfr. MANGON epilepsia pedis symptomata sola ligatura curata (act. Havn. Vol. 2. p. 452). PORTAL (l. c. p. 171) laudat ligaturam duca propria experientia.

48) Motus epileptici a crure inciplantur per topica ipsi cruri applicata perfecte sanati sunt (vid. eph. n. c. cent. 1. at 2. p. 150). KERN phys. med. Journ. 1802. p. 78. PORTAL observ. sur le traitement de l'épilepsie et l. c. p. 171 at 172 (infrictionibus partium aequalium Ol. anim. Dipp. et Tinct. op. gummos. duas curas feliciter obsolvit).

49) Sanguinem in epilepsia vanaesectioe emissum maculosum fuisse, refert HAGENDOORN in misc. ac. n. c. Dec. 1. an. 2. p. 345.

50) Curat. chron. L. I. C. 4.

51) Cent. 1. obs. 64 (Epilepticus octo annorum, per multis pharmacis incassum adhibitis, vanaesectionum pluries repetitarum ope sanatus est).

52) Cent. IV. N. 38 (Epileptica duodecim annorum cum a pleuritida correpta fuerit, phlebotomiis institutis a his istis morbis convaluit. Similam observationem TISSOT propria in praxi collegit. l. c. p. 279).

BONET<sup>54</sup>), PECHLINUS<sup>55</sup>), HORCHSTETTER<sup>56</sup>), W. TER<sup>57</sup>), VIEUSSIEUX<sup>58</sup>), SWEETING<sup>59</sup>), WZ MANN<sup>60</sup>), TISSOT<sup>61</sup>), aliique<sup>62</sup>) et propria do experientia<sup>63</sup>). Eo certior phlebotomiae effect quo recentior epilepsia. Persuasi denique sum

53) Praxis admirabilis. Lib. I. obs. 21.

54) Mercur. compil. da epilepsia. §. 5.

55) Obs. L. II. obs. 30. p. 288 (Inter sex apilepticos, una phlebotomia sanavit).

56) Dec. VIII. obs. 10.

57) Da epilepsia juvenis cachectici vanaesactione cu (misc. ac. n. c. Dec. 9. et 10. p. 299. 328).

58) *De la saignée*. Paris 1815.

59) *The London medical repository*. Vol. V. 1816.

60) Epilepsia inveteratae et erysipalatis chronici spadicis, sola vanae sectione certis anni diebus at corp partibus instituta, curatio (eph. ac. n. c. cent. 9 at p. 299).

61) l. c. art. 23. *De la saignée*. „J'ai vu si souvent mal, soulagé dès les premières saignées, se guérir en continuant, que je ne puis assez recommander aux médecins, d'être en garde contre cette opinion funeste, qui terdit la saignée dans presque toutes les épilepsies“ (p. 2).

62) *Journal der Geburtshülfe, Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten*. 1. B. 2. St. N. XV. CHIAPPA at MORRIT the Edinb. m. and a. j. 1822. Vol. 24 (epilepsiam, raro inflammatione alicujus organi excitatam, omnino paratu antiphlogistico sanandam esse, docant). FOR l. c. p. 206. 229. 236. 385. M. v. WOLFF l. c. COL in SCHNIDT Jahrb. 1836. B. 12 p. 272. RINKEN l. c. fra duas sanationes interveniente epistaxi affaremus, q utilitatem sanguinis extractionum testantur.

63) Epilepticum triginta sex annorum, 1816 in clinico nensi decumbantem, vanaesactione e pede sanavi. Eclampsium sic sanatarum plurimarum recordor.

hac operatione illico post vehementem terrorem, aut primis sub insultibus convulsivis inde ortis institutâ, fieri posse, ut perfectae epilepsiae evolutio praepediatur<sup>64</sup>). De selectu venarum secandiarum non immerito quondam disceptabatur. Quis enim in dubium vocaret, in epilepsia inflammatoria *encephalica* sanguinem potius e *jugularibus*<sup>65</sup>), in *spinali* et in aliis ex abdomine et pelvi originem trahentibus, potius e *saphena*<sup>66</sup>), in reliquis vero potius e *brachio*<sup>67</sup>) educendum esse? Quid quod ipsa *arteriotomia*, praesertim arteriae temporalis, tentata est<sup>68</sup>). *Ligaturam*  
*caro-*

64) Puella 15 annorum, de qua supra (§. LVI. 2 (16)), quae a latronibus terrefacta an. 1814 in epilepsiam incidit, moxque curam se illico commisit, venasectione sat cito sanata est.

65) RICHARD argo epilepsia venarum jugularium sectio. Paris. 1689. HAGENBORN med. septentr. de epilepsia. C. 19. T. I. p. 115. TRALLER de vena jugulari saepius secanda. p. 181. HOFFMANN de vera epilepsiae causa. §. 31. MONRO *epilepsy of a child cured by letting five ounces blood at the jugular vein (medical essays and observ. by a soc. in Edinb. Vol. 5. P. 2. p. 561)*. FORTAL l. c. p. 233 (Sectionem venae jugularis defendit).

66) GALENUS jam docuerat, in epilepticiis venasectionem a pede instituendam esse. Venae sectione e pede omni mense repetita ZACUTUS LUSITANUS (l. c.) virum viginti annorum, plethoricum, robustum, ab epilepsia liberavit.

67) THEOPH. BONET l. c. TISSOT l. c. p. 283.

68) ARETANUS l. c. C. 4. SEVERINUS de efficaci medicina. L. III. Francf. 1671. p. 42. FOTHERGILL *effects of arteriotomy in cases of epilepsy in mem. of the med. soc. of Lond. Vol. 5. N. 26. p. 221*.

Frank Franz. II. 1. 2. 4.

Hh

*carotidis communis*<sup>69)</sup> proponere haud audeamus. Potius ad *compressionem* recurrendum foret<sup>70)</sup>. Nisi evidens plethora adsit, ac signa inflammatoris potius *congestionibus* sanguineis ortum debeant<sup>71)</sup>, *hirudines* ad encephalum<sup>72)</sup>, spinam<sup>73)</sup>, vel ad loca quondam cruorem cum levamine largientia apponuntur<sup>74)</sup>. Centies sic eclampsiam  
oepha-

69) J. R. PRINSON *Unterbind. d. art. carot. comm., ex transact. of Calcutta Vol. 5. p. 345. in FROEYER Notis. B. 36. N. 5. p. 78. Idem ex ibid. 1831. Vol. 6. p. 392. in SCHMIDT Jahrb. 1835. B. 6. p. 244. GUNSON u. JUL. Mag. 1834. H. 2. p. 338.*

70) *Compressio abdominis ad peroxysmum suppressendum s. RASD commendatur, v. supra, N. 2 (T). Ueb. d. Compress. d. Carotiden b. manchen Gehirnaffect. ex journ. des connoiss. méd. 1837. Octbr. in SCHMIDT Jahrb. 1838. B. 20. p. 166. (TROUSSARD postquam carotidem compresserat, epilepsiae, ex magnis congestionibus ad cerebrum pullulans, siluit).*

71) *Ut in casu epilepsiae apud W. HENDERSON (ex Edinb. journ. 1836. N. 198, in SCHMIDT Jahrb. 1837. B. 15. p. 186) spontanea epistaxi senecta. Similem casum habet PORTAL l. c. p. 235 et 236. Epilepticus in faciem labens terribili epistaxi sequente morbo liberatus est.*

72) D'ALGARN in HORN *Archiv. 1829. H. 1 (epilepsiam cum sanguinis congestionibus ad caput hirudinibus curavit).*

73) COLSON in SCHMIDT *Jahrb. 1836. B. 12. p. 272.*

74) ZACUTUS LUSITANUS *med. Pr. Hist. L. I. p. 235. BARNBIOTUS SYLVATICUS in BORET mercur. compil. epileps. RHODIUS cent. I. obs. 65. LANGLOIS ergo epilepticis et melancholicis haemorrhoides salutares. Paris 1640. TULLIUS L. I. C. 56. TISSOT l. c. p. 283. SAUR in *Abh. d. K. Schwed. Akad. 35. B. p. 98. Gazette salutaire de BEUILLETON, 1775. p. 42. TESTU in annal. de la méd. physiolog. 1828, Mars (ad epigastrium).**

cephalicam infantum debellavimus. *Epilepsiae spinali*, sub iisdem rerum positionibus, *cucurbitulas scarificantes* ad latera columnae vertebralis opponuntur<sup>75)</sup>. Quae singula parum praestare queunt, nisi congruo regimine pulcherrime a GALENO<sup>76)</sup>, CHRYNE<sup>77)</sup> et TISSOTO<sup>78)</sup> indicato, sustineantur. Spectant huc *sobrietas*<sup>79)</sup>, *fames*<sup>80)</sup>, *dieta lactea*<sup>81)</sup>, *lac asininum*<sup>82)</sup> vel aliud, *carnes* sic dictae *albae* juniorum animalium, *cibi farinacei*<sup>83)</sup>, *fructus heraei*, potus aquae, fuga vini<sup>84)</sup>, co-feeae, theae etc. Evitentur quoque calor atmosphaerae, odores fortes, motus nimius, vigiliae, animi<sup>85)</sup> pathemata ingrata<sup>86)</sup>. Praeterea sanguis *eccopreticorum* ope a capite revellendus. *Super-tartras et nitras potassae*, saporis gratia, *saccharo nupti*, *tamarindi*, *oxymel*, *oxycratum* ac similia optime conducunt<sup>87)</sup>. *Digitalem purpuream* in epilepsia ab aliis laudatam<sup>88)</sup>, ab aliis vituperata

Hh 2

tam<sup>89)</sup>,

75) TISSOT l. c.

76) Consil. pro puero epilept. Ed. CHART. T. X. p. 487.

77) *An essay on the gout*. Lond. 1794. p. 103.

78) l. c. art. 22.

79) BERNHAYN, TISSOT l. c.

80) CHRYNE v. CULLEN mat. med. Vol. I. p. 246. MÜLLER in HUFELAND Journ. 26. B. 1. St. p. 173.

81) CHRYNE l. c.

82) CARLUS AURELIAND. p. 314. BURSERIUS institut. med. pract. Vol. III. p. 2581.

83) *Zeyn Mais* ut nutrimentum quotidianum, epilepsiam prohibere, factus in HUCKER *Nit. Annal.* 1827. Jahrg. 3. H. 1. p. 66.

84) VAN HANES obs. 24. TRALLUS de opio. T. III. p. 22.

85) Contentio: SWINSEN aphor. 1075.

86) *Passantium iram, et terrorem.*

87) Cfr. N. 12.

tam<sup>88)</sup>, hic non usurpavimus; cum vero pluries hoc remedium cum successu in *spasmis cordis* adhibuerimus<sup>89)</sup>, illud et in epilepsia cardiaca, aut alia, actione nimia arteriarum stipata, tentandum esse putamus. *Digitalis purpurea* quoque in epilepsiis ex liquore, a praevio processu inflammatorio in cavitatibus encephali columnae vertebralis extravasato, locum inveniet. Si causa morbi in venis potius quaereretur, *acetati plumbi* locus foret<sup>90)</sup>. Nec indicatio sanguinem ex variis

88) WITHERING vom rothen Fingerhut, p. 50. 58. *Diet. des ac. méd. T. 9. p. 454.* VOGT *Pharmakodynamik. B. 2. p. 187.* R. W. SCOTT üb. d. *Anwend. des roth. Fingerh. geg. d. Epileps. ex Edinb. m. and c. j. 1827. p. 19. in n. Samml. auserl. Abh. f. pr. A. 1827. B. 10. St. 3. p. 410.* A. COURTNEY *Behandl. d. Epileps. durch Digitalis u. Polypodium; ex the lancet. 1831. Octbr. in BEHNEND allg. Repertor. 1832. März. p. 294* (autor remedii multo nimiam, minime imitandam, dosin exhibuit). Sic et SHARKEY *ex the lancet. 1832. Febr. 4. in HAENEL Summarium d. Neuec. u. Wissenswürd. a. d. in- u. ausländ. Med. 1832. B. 2. p. 215* (enormes doses hyperemesin provocabant). Cfr. BEHNEND *allg. Repertor. 1833. N. 6. p. 271.* NASSE *Cur d. Fallsucht u. Schreck durch Digitalis; in HORN Archiv. 1834. II. 1. p. 5.*

89) CURRIE in *memoirs of the med. soc. of Lond. Vol. IV. N. 2.*

90) Cap. XIV.

91) Actionem hujus remedii in systema vasosum in plurimis hujus operis locis confirmabo. In epilepsiis laudetur a RUSH *Philadelphia medical mucum. Vol. I. N. 1. p. 60. Abhandl. f. pr. Aerzte. 22. B. p. 254.* (Epilepticus loco sacchari cochleare acetatis plumbi sumpsit et convuluit. Convuluit et post decennis et alter). Dosis granum unum



riis systematis nervosi partibus, ope *cucurbitularum siccicarum* vel similium auxiliorum<sup>92)</sup> revelendi, negligenda est.

6. *Epilepsiae rheumaticae metastaticae* et ar-<sup>C. ep.</sup>  
*thriticae* recentes, utpote notis inflammatoriis in-<sup>rheumati-</sup>  
signitae, ut epilepsia inflammatoria curantur<sup>93)</sup>.<sup>caae, me-</sup>  
Exhausta methodo antiphlogistica, in profectioni<sup>tastaticae</sup>  
morbo vix amplius indicata, ad irritamenta loca-<sup>et arthri-</sup>  
lia<sup>94)</sup>, aut prope focum morbi<sup>95)</sup>, aut ad partem,  
ex qua aura manare solet, caute<sup>96)</sup> applicita, de-  
venitur. Spectant huc *vesicatoria*<sup>97)</sup>, *fonticuli*<sup>98)</sup>,

prae-

bis terre de die. Cfr. SAXTORPH act. r. soc. med. Havn.  
Vol. 3. p. 90.

92) HUFELAND Journ. 1819. Mai (Der bleyerne Stiefel).

93) RIKKEN l. c.

94) Sic RIKKEN (l. c.) epilepsiae, a scabie retropulsa exci-  
tae, unguento Anglico contra scabiem illinito medebatur.

95) PONTIER *épilepsie sympathique et périodique guérie par*  
*la cauterisation du nerf saphène de chaque jambe avec les*  
*reflexions de F. J. DOUBLE* (SHDILLOT rec. périod. de la  
soc. de méd. de Paris. T. XVI. p. 261. 268).

96) Quam tanta ustiones, praesertim ad caput, suscipiendae  
sint, ex PISONI (l. c.) et HAENIO (l. c.) intelliges.

97) PANAROLUS Pentecost. IV. obs. 30 (in sutura coronali).  
MORGAGNI observationem SERRAO referens Op. c. ep. X.  
art. 8 (circa extremum suturae sagittalis). AVICENNA l. c.  
C. 11 (in loco, ex quo aura). Eph. n. c. cent. I. II. obs. 90  
(parti, unde aura). PLEINDOUX *de l'emploi des vésicatoires*  
*appliqués sur toute l'étendue du cuir chevelu, dans*  
*l'épilepsie idiopathique* (ann. de la soc. de méd. de Mont-  
pellier. T. 3. P. I. p. 340). v. POMMER l. citando.

98) ZACUTUS LUSITANUS prax. admir. L. I. obs. 29 (Epilepsia  
ex ulcere nasi siccato per fontanellam in tibia sanata).  
MERCATUS cons. med. cons. 3 (ad brachium morbi vim

praesertim ustionis<sup>99</sup>) ope instituti, moxa<sup>101</sup>  
*setacea*<sup>101</sup>), *urticatio*<sup>102</sup>), illinitio *unguenti tu-*  
*tari emetici*<sup>103</sup>), ipsaque *psorae*<sup>104</sup>), *tineae*<sup>10</sup>

res!

fregit). WILLIS path. cerebri c. 27 (Quousque fonticu-  
 pus largiebatur, epilepsia nulle, contra ee illo exsiccatur  
 C. PISO de morbis a colluvie sarosa. Obs. 31. p. 178 (ver-  
 ticem capitis val ad nucham). MALVICINI collect. u-  
 les (in sutura coronali). Act. u. c. Vol. VIII. obs. 13 (ma-  
 nu exoriente, fonticulo ibi excitato, sanata). *Anecdo-*  
*ta medicæ* 85. p. 124. TISSOT l. c. p. 388. v. POMM  
 l. citando.

- 99) ARISTANUS cur. chron. L. I. c. 4 (capitis usque ad lamias  
 secundam). CELSUS L. III. C. 23 (capitis). RIVIERUS el  
 cent. II. N. 93 (suturae coronali). FORESTUS L. X. obs.  
 (nuchae). SCHENK obs. L. I. N. 238 (testimonia plurima aut  
 riorum variis in partibus applicitorum). TULPIUS L. I. C.  
 (nuchae). IV. C. 3 (pollicis pedis, à quo eura ascende-  
 ba). MECKEN obs. med. chir. C. 5 (ad suturam coronalem  
 BLANKARD collect. med. phys. cent. IV. N. 16 (genu, un-  
 eura epileptica). PORTAL l. a. p. 209 sq. (ad brachium)
- 100) C. F. v. POMM in *Heidelb. klin. Anal.* 1817. B.  
 H. 1. p. 119. LARREY in *dict. des sc. méd. artic. Mox*  
 MAYO in *Lond. m. and ph. j.* 1831. Jan. (retro euras et  
 nucham omni tertia die).
- 101) FABRICIUS HILDANUS cent. I. obs. 41 (ad nucham  
 SCHENK obs. L. I. N. 232. PARÉ *oeuvres de chirurgie*. L.  
 C. 4. CLARKE *Lond. med. journ.* 1781. v. *Abh. f. j*  
*Aerzte*. 2. B. p. 201 (in dorso). MARET in *nouv. mém.*  
*Dijon*. 1784. *Prem. semestre* p. 149 (ad brachium irritu-  
 tum). HEGEWISCH in *FRONIER Notiz*. 1823. B. 4. N. 2  
 p. 362 (ad nucham). V. supra, observet. de RENZI l.  
 PORTAL l. c. p. 395.
- 102) SHALZ diss. de urticatione. v. BRUGNATELLI *bibliot.*  
*fisica*. T. XI. N. 6.
- 103) J. CRIGHTON in *the Lond. med. and phys. j.* 182

restitutio. Nee balnea tepida<sup>106</sup>), et in arthriticis sulphurata<sup>107</sup>), negligenda. Veste lanca univsum idque nudum corpus involvere ac repetitas ejus frictiones instituere solemus<sup>108</sup>). Praeterea pharmacis transpirationi studendum<sup>109</sup>) e. c. guajaco officinali<sup>110</sup>), sambuco<sup>111</sup>), liquore acetatis ammo-

Oeder. (Illustriena diu continuata varia ad loca paroxysmos rariore reddi, expertus est) et in *transact. of the associat. fell. and licent. Dublin 1825. Vol. IV* (ad spinam). Lond. med. reposit. 1826. Apr.

104) *Gazette salulaire de Bouillon*, 1775. LOEFLER *Beyträge z. Wundarzneyk*, I. B. ACHAMBAULT obs. d'*Epilepsie guérie p. l'inoculat. de la gale* (SEDILLOT *recueil périod. de la soc. de méd. de Paris*, T. 57, p. 90). Heil. ein. nach unterdrückt. Krätze entstand. *Epilepsie*; in *Rust Mag.* 1827, B. 23, H. 3, p. 577.

105) LABONARDIÈRE in *journ. général de méd. de chir. et de pharm.* T. 50. 1814. Juillet (par l'ositionam). P. L. MÜLLER in *HUFELAND Journ.* 1825, Septb.

106) TISSOT l. c. p. 381. MARCARD *üb. d. Gebrauch d. Bäder*, p. 410. Neque vtiq pauca balnea sufficient, de centenis enim quaestio hic est. Praeterea cavendum, ne impetus sanguinis accephalum versus augeatur. HORN *Archiv.* 1832, H. 4, p. 625 (simul psychrolusias frigidissimas adhibuit).

107) In epilepsia saturnina commendata a BROCKMANN l. c. H. 4.

108) MANGOR in *act. n. soc. Haënsiens.* Vol. II, N. 35.

109) De diaphoreticorum in epilepsia usu lege praecipua LENTINIUM in *Beytr. z. ausüb. Arzneyw.* 3. B. p. 171 et in *HUFELAND Journ.* 14. B. 3. St. p. 15.

110) ZACUTUS LUSITANUS *Fr. hist. L. I. C. 6. II, C. 1. MERCURIALIS respons. et consult. L. II. C. 3. HORSTIUS opp.* III, p. 32, FERNETUS L. X. obs. 58, 62.

*ammoniae* <sup>111)</sup> et *agarico muscario* <sup>112)</sup>. Quodsi prima quidem epilepsiae origo rheumatica fuerit, jam vero magis de reliquiis praegressae forte inflammationis rheumaticae, arthriticae, metastaticae, quam de ipso rheumate debellando agatur, praeter digitalem, in *mercurium*, utpote in remedium, ad absorptionem humorum extravasatorum promovendam maxime idoneum, spes locanda est. Fama, quam *cinnabaris* in curanda epilepsia sibi non immerito vindicavit <sup>114)</sup>, maxime hydrargyro tri-

111) DUFOUR in *gazette de Bouillon*, 1775. p. 46 (laccas).

112) Ad uncias tres quatuorve de die, sic ut aeger per hebdomadam et ultra sudori innatet. L. MARTINET *üb. d. innern Gebr. des Ammoniaks b. d. Behandl. d. Epileps.* l. c.

113) Etsi propria de hoc pharmaco experientia destitutus sum, ex observationibus BRENNHARDTI *chym. Versuche u. Erfahr. Leipz.* 1755. p. 323. et WHISTLINGII (diss. de virtutibus agarici muscarii. Jan. 1778. p. 13) illud in epilepsia ex tinea aliisque impetiginibus incaute fugatis commendandum esse, putarem. Alvum movet et sudorem ad partem prius affectam elicere dicitur. Dosis pulveris a scrupulo dimidio ad scrupulum. Paratur et tinctura, a vulgo Lithuanine in diarrhoeis usitatissima. Commandatum etiam ut specificum in epilepsiis a terrore (*allgem. liter. Zeitung*, 1793, N. 245). *Med. Conversat. - Bl.* 1832, N. 32. SCHNEIDER in CLARUS u. RAD. *wöchentl. Beitr.* 1833, B. 1. N. 22 (mitigabatur morbus).

114) Cinnabarim epilepsiae magnetem appellavit J. CRATO, teste RIVERIO. (BURSERI institut. Vol. III. §. 286). FRID. HOFFMANNUS non modo in epilepsia a causa interna, sed etiam externa, a gravi nempe capitis percussione producta, incomparabilem cinnabarinerum facultatem expertus est (*med. rat. syst.* Vol. III. Sect. 2. C. 2. p. m. 450). His in epilepsia cinnabarim cum successu ipse adhibui et

tribuenda videtur. Cujus pharmaci virtus antiepileptica respectu ad *calomel* <sup>114)</sup> et ad *frictiones* ope *unguenti mercurialis* <sup>115)</sup>, saepe ad salivationem usque <sup>116)</sup>, a multis confirmata est. Arthriticam

quidem ad scrupulum semis bis de die. Lege de usu et dosi hujus pharmaci SCHULZ scrutinium cinnabarinum. Hal. 1680. SCHLICHTING traumatologia novantiqua. Amstelodami 1748. p. 27. VOGEL hist. mat. med. Lugd. Batav. 1758. p. 391. WALLERIUS resp. SKRACCH diss. de cinnabari in corp. human. effectu. Upsal. 1762. OTTINGER cinnabaris exul, redux in pharmacopol. Tub. 1760. DALAY on the virtues of cinnober and musk against the bite of mad dog. Birmingh. 1764. DEMETRIUS de medicis cinnabaris viribus. Lips. 1778. Interea saepius cinnabarim incassum tentavi, quod et alii fassi sunt, uti videre est apud GÄCKER de epilepsia (misc. ac. n. c. Dec. II. an. 6. p. 105. an. 7. p. 140). TISSOT l. c. p. 345. §. 176. PITTSCHAFT in HUYLAND Journ. 1833. St. 9. COHEN in CASPER Wochenachr. 1835. N. 13.

115) SÖNNER üb. d. Wirk. d. Quecksilbers in d. Fallsucht. v. Museum d. Heilk. Schweiz. Aerzte u. Wundärzte, I. B. p. 275. N. 35 (tres epilepsiae ex suppressione tinea capitis, psorae et miliarium ortae, per *calomel*, ad lenem salivationem usque porrectum, sanatae sunt). BURKRIUS inst. med. §. 276. p. 253.

116) SILVATICUS consil. et resp. med. cant. 4. Patav. 1656. consult. 47. WILLIS l. c. C. 3. ETTEBLLER opp. T. II. art. 8. p. 864. ROLPINK medic. consult. p. 193. KARNPF act. Hass. I. Vol. N. 23. p. 152. HOUSSET diss. sur les parties sensibles du corps humain. 1769. p. 72. BANG ect. soc. Havn. Vol. 3. N. 10. p. 112 etc.

117) ACOLUTH salivatio mercurielis epilepsiae habitualis averruncata (misc. ac. n. c. Dec. II. an. 9. p. 312). WALTHER de epilepsia salivatione mercuriali curata (oph. ac. n. c. cent. 3. et 4. p. 231). BUDAKUS de epilepsia per salivatio-

ticam seu rheumaticam habuisse indelem et illa epilepsia videtur, quae ope extracti aconiti nappelli sanata est <sup>119</sup>).

C. Ep. sy-  
philiticae.

7. Maxima vero mercurii virtus in *epilepsia venerea* est <sup>120</sup>). Administrationi autem illius saepe magna epilepticorum sensibilitas obstat. Nihilominus plurimi mercurium *sublimatum corrosivum* <sup>120</sup>), inprimis si in *aethere sulphurico* solutus exhibeatur <sup>121</sup>), perferunt. Radicalis tamen morbi cura vix aliter, nisi parvis diuque continuatis *frictionibus hydrargyri* <sup>122</sup>), interpositis balneis tepidis et decocto saturato radicis *smilacis sarsaparillae* <sup>123</sup>) cum lacte, obtinetur.

#### 8. Mer-

nam mercurialem curata (misc. ac. n. c. Dec. III. an. 7. et 8. p. 288). MAURIT. HOFFMANN ptialismus salutaris in epilepsia (aph. ac. n. c. cent. 1. et 2. p. 272).

118) DURAND in GARDANE *gazette de santé*, p. 143.

119) §. LVI. N. 29 (130).

120) Legatur stupenda epilepsiae venereae cura a LOCHNER passets l. c. p. 41. Cfr. CIRILLO *traité des maladies vénér.* P. III. obs. 32. RAHM *Briefwechsel mit sein. ehemal. Schülern*, 1. B. p. 427.

121) R. Mercurii sublimati corrosivi grana duo. Aetheris sulphurici drachmas duas D. S. Cap. quater de die guttas sex: vix augendo dosin, nam ultimas hujus pharmaci portiones aliunde, ob aetheris evaporationem, solutionem magis saturatam exhibant, quas circumstantia efficit, ut solutio mercurialis aetheris mihi in genere parum ardeat.

122) CULLERIN obs. sur deux maladies épilept. dépendantes de l'affection vénérienne, et guéries l'une p. les frictions mercurielles, l'autre p. le sirop sudorifique et p. la liqueur de VAN SWIETEN (SEUILLOT rec. périod. de la soc. de méd. de Paris. T. XIV. p. 271. 263).

8. *Mercurius* et in *epilepsiis gastricis*, quarum C. Ep. gastricas, scrophulosas, rha-  
 causa vel in obstructione hepatis et pancreatis, vel in vermibus intestinalibus locata est, indicatur. chiticas et  
 Generatim in pueris curam epilepsiae a pulvere carcinom-  
 anthelminthico, ex *calomel*, radice vel *convolvuli* maticae.  
*jalapae* vel *rhei palmati*, additis seminibus *ar-*  
*temisiae* contra scopo vermes et saburras, etiamsi  
 fortuito tantum praesentes, eliminandi, inchoa-  
 mus<sup>123</sup>). *Oleum ricini communis* reliquis<sup>124</sup>) an-  
 thelmithicis antepo-  
 nimus. Enim vero cum epi-  
 lepsiae originis abdominalis saepe ex affectione  
 scrophulosa glandularum mesenterii pullulent, nil  
 magis quam irritationem fortio-  
 rem intestin-  
 is illa-  
 tam timemus. Timor vero iste nequaquam im-  
 pedit, quominus in cura epilepsiae ad *indicata*  
 quoque confugiamus *emetica* et *drastica*<sup>125</sup>). In-  
 dica-

123) Una cum Potassae hydriod. gr. iij. ter de die: R. MACLEOD l. c. p. 101.

124) LATHAM some observat. respecting the med. usually given in worm-cases with remarks upon the collateral advantages sometimes derived from them in cases of epilepsy (med. transact. Vol. 5. p. 52).

125) Cortice radice *punicae granatorum* tanniam et epilepsiam simul sanavit GOUFIL in SCHMIDT Jahrb. 1835. B. 6. p. 250. — Oleo santon. anthar., at interne, at externa adhibito, epilepsiam verminosam fugavit DAWOSKY epilept. Anfall v. Würmern; in n. Ztschr. f. Geburtsh. B. 7. H. 3.

126) DREMAN. Epilepsia paucos inter dies sola primarum viarum evacuatione curata (nova acta ac. n. c. Vol. 7. p. 147). W. GUN in the Edinb. m. and s. j. 1827. Apr. ALKERM (Gaz. mèd. de Par. 1832. T. 3. N. 59. Journ. épér. du choléra-morbus, Juill. 17) ait: paroxysmi epileptici accedente cholera mitiores et rariores reddebantur, praeci-

dicatur autem *emeticum* in epilepsia ex ventriculo originem trahente (absente statu hujus visceris inflammatorio vel nimia illius sensibilitate), si vomitus insultui epileptico superveniens eum breviorē reddit <sup>127</sup>), si paroxysmus a nausea (nequaquam a consensu cum cerebro pendente) annuntiatur <sup>128</sup>), sique aeger de pondere ad ventriculum, aut de fame canina continuo conqueritur <sup>129</sup>). In epilepsia plenilunio addicta, emetico, triduum antea, locus est <sup>130</sup>). De usu emeticorum in epilepsiis inter alios legendi sunt: ALEXANDER TRALLIANUS <sup>131</sup>), ZACUTUS LUSITANUS <sup>132</sup>), RONCALLI <sup>133</sup>), MEIBOM <sup>134</sup>), RICHTER <sup>135</sup>), I. CLARKE <sup>136</sup>), J. M. SMITH <sup>137</sup>) et PORTAL <sup>138</sup>). Nostra experientia nullum epilepsiae solis emeticis sanatae exemplum exhibet; verum pluries vomitoria aliis auxi-

pue si diarrhoea valde serosa et rebellis fuerit. Quo ex facto autor concludit, *evacuantia epilepticis maxime conducere.*

127) SWIETEN l. c. aph. 1080.

128) HAHN rat. med. P. 5, C. 4. §. 1.

129) TISSOT l. c. p. 236.

130) SWIETEN l. c.

131) L. I. C. 21.

132) Prax. admirab. L. I. obs. 24.

133) Histor. morb. p. 19.

134) Diss. cit.

135) Med. u. chir. Beobachtungen. p. 132.

136) Commentar. on some of the most important diseases of children. Lond. 1825 (vomitus saepius repetitum excitet ope sulphatis zinci).

137) Ueb. d. Wirk. d. Brechmitt. in krampfhaft. Krankheit.; ex med. and phys. journ. N. 21. p. 53, in Samml. auserles. Abh. f. pr. A. B. 35. p. 329.

138) l. c. p. 357.



auxiliis viam parasse videbantur, unde et hic TISSOTO ea commendanti<sup>139</sup>) omnino assentimur. Nec reticendum, posse emetica praeterquam quod vomitum cient, opem afferre<sup>140</sup>). Epilepsia ex intestinis proficiscente, purgantia fortia suadentur, ut *aloe*<sup>141</sup>); *helleborus niger*<sup>142</sup>); nobis *rhum*<sup>143</sup>) satisfecit, et, si bilis praedominari videatur, *super-tartras potassae*, aliaque salia neutra, — verum diu continuata<sup>144</sup>); interposita nunc quiete, nunc si vires deficiant *amaris*, e. c. *bile*<sup>145</sup>). Nec aquae

*mine-*

139) l. c. p. 236. . . . „Je suis même persuadé, qu'en les (émétiques) négligeant trop, que des grands médecins échouent.“

140) MAYER epilepsia contumax usu radice*s* ipecacuanhae vindicata (eph. ac. n. e. cent. 5. 6. p. 315). F. FERRARA et GASTANO ALLGHERTI testantur radice*s* virtutem antiepilepticam, et gr. 4—5 p. d. praescripserunt (*osservatore med. di Napoli* 1830. *Ostbr.* OMODRI ann. univ. 1831. *Gennajo*. p. 151. Cfr. *BENNER* *allg. Repert.* 1831. *Aug.* p. 178. *Sptbr.* p. 364. *FRONIER Notiz.* 1831. *B.* 29. *N.* 19. p. 303).

141) GALENAUS de locis affect. L. V. C. 7. PITTSCHAVT in formula sua contra epilepsiam cerebralem, in *HUFELAND Journ.* 1833. *St.* 9.

142) CARL. AUREL. p. 307. GREDING *sämmtl. Schriften.* I. B. p. 186. *Journ. de méd.* 1776. p. 544. 1777. p. 63. *Mbh. f. pr. Aerzte.* 4. B. 2. *St.* p. 313. RAYMOND-POUTIER *id.* h. *Journ. de méd., chir. et pharm. par ADLON, BECLARD etc.* 1821. *Debr.* (in epilepsia verminosa).

143) MANDOLF. PR. de epilepsiae novis speciebus. KINKEIR *essay on the nerves.* p. 179. SIEVERS in *PALLAS n. nord. Beyträgen.* T. B. p. 264. Tincturam thei aquosam cum aqua manthae exhibere soleo.

144) Sic omni jure monet THON, *Erfahrungen u. Bemerk.* p. 35.

145) Variorum animalium commendatur, ut utri (in *Mbh.*

*minerales, saponaceas et salinas* <sup>146)</sup> effectu hinc destituuntur <sup>147)</sup>, dummodo alvus non nimis inde ruat. Quae vero cuncta nil efficere possent, si regimen negligeretur *diacteticum*, nulla in epilepsia, quod spectat alimenta, majoris momenti, quam in gastrica aliaque ex imo ventre profecta. Praecepta generalia hic statuere haud licet, nec quod unum juberat regimen, ideo et alium juvabit <sup>148)</sup>. Maxima aegrorum nostrorum para sub *dieta lactea* optime se habebat. Ac revera lac inprimis *asininum* ab omni tempore epilepticis

com-

d. K. Schwed. Ak. 27. B. p. 314), bovis (ib. p. 326), canis (BARTHOLINUS act. Hafn. Vol. III. obs. 20), hirci (*gaz. de santé.* 1774. p. 134), castelli nigri (UNGER de epilepsia. L. II. C. 14), tauri (QUARIN animadv. p. 24), qua et ego exclusive utor. HOFFMANN *üb. d. Nutzen d. Ochsen- u. Hirschgalle gegen d. fallende Sucht* (Schw. Ac. Abh. 1765. p. 325). Serpentum: G. v. MARIKOWSKY *Anwend. d. Schlangengalle gegen d. Epileps. durch Erfahr. bestätigt*; in HERRMANN *Journ.* 1831. St. 10. p. 56 (fel coronallae austriacae aut colubri heri in vino adusto jejuna sumitur), C. L. KLOPP *üb. d. Anwend. d. Schlangengalle in der Fallsucht*; in HORNBAUM *med. Conversat.-Blatt.* 1832. N. 48. p. 377 (incassum adhibitum).

146) P. I. ed. alt. Vol. I. Sect. 2. Cap. VI. 27.

147) e. c. *Balaruc* (TISSEOT). *Brückman* (ALIX obs. chir. Fss. III). *Nerndorf* (SCHRÖTER in BALD. u. MAGAZ. II. B. p. 211). *Freienwalde* (HEYDENECKER *Bechrstb. d. Gesundbrunnens zu Freienwalde.* 2. Abschn.). *Ems* (BRÜCKMANN *anarratio choreae Sti Viti et epilepsiae, quae per fontes medicatos et thermas Renssenses curatae sunt.* Francf. 1786).

148) Hanc ob causam haud arduum, ut omnes dietam, in op. cit. *Diactophilus* indicatam, sequantur.

commendabatur<sup>149</sup>), de quo argumento CNEYER<sup>150</sup>) legendus. Interea et *vegetabilia*<sup>151</sup>), non flatulenta, et *fructus* maturi, et *carnes* juniorum animalium, dummodo quantitate non peccent, concedi possunt. Sobrietas enim omnibus epilepticis commendanda. Potus optimus *aqua*; nam si pauca exempla excipias, alcohol, vinum, coffea, thea, cioccolata epilepticis constanter nocent. Idem de acidis vegetabilibus valet, nisi forte aegri iis a prima juventute adsueta sint, uti inter populos septentrionales accidit. Sed et hinc acida iis prohibeantur epilepticis, quorum morbus ex acidis primarum viarum pullulare videtur, qui casus in infantibus haud rarus est. Nil hinc miri, si *absorbentia* ad potiora, nisi genuinae epilepsiae, saltem convulsionum pharmaca spectent<sup>152</sup>). Loquimur de *lapidibus cancrorum, conchis praeparatis, cineribus variis*<sup>153</sup>), *carbonate potassae*<sup>154</sup>), *magnesia*,

149) CARLIS AVRELIANUS op. c.

150) *An essay on the Gout*. Lond. 1724, p. 106. *English malady*. Lond. 1730. De naturae fibrae ejusdemque laxae morbis. Lond. 1725.

151) Excipiunt nonnulli *Apium petroselinum*. v. HOFMANN de apio epilepticis noxio (et quare?) (in misc. sc. n. c. Dec. III. an. 3. (1096) p. 78).

152) RIVINUS diss. de remed. antiepilept. terrae. Lips. 1710.

153) c. c. testae limacum sine igne calcinatae (GONNUS in med.-chir. Ztg. 1812. N. 81), corvorum combustorum (REUSCHER obs. cent. I. N. 13). BLAW artemisiae carbonum usus in epilepsia (misc. sc. n. c. Dec. III. an. 9. et 10. p. 244).

154) Cfr. supra. N. 3 (22). HUYELAND Journ. B. 12. St. 4. p. 5. RICHTER spec. Therap. B. 7. p. 691.

sia; sapone<sup>155</sup>), aqua calcis<sup>156</sup>). Pulverē Frankii sic dicto contra physconiam<sup>157</sup>), pueri epilepsiam radicitus sanavimus<sup>158</sup>). Verisimiliter istiusmodi pharmaca<sup>159</sup>) praeter acidorum absorptionem, et vitium scrophulosum aggrediuntur; in quo debellando; si epileptici notas scrophulosas prae se ferant, toti esse solemus. Maxime tunc juvant fonticuli, pro re nata ad basin cranii et ad latera spinae<sup>160</sup>). Vesicatorium umbilico in epilepsia

155) Cum lacte v. CONAUSSEN epilepsia usu saponis veneti (in lacte soluti et per aliquot septimanas administrati) curate (nov. act. a. n. c. T. 2. p. 31). BUNSENIUS inst. Vol. III. p. 247.

156) TISSOT v. d. Nerven. 4. B. p. 489.

157) Ex baccis lauri, rasura cornu cervi et nuca moschate, partibus aequalibus, pasta panis obductis et in furno calcinatiq. Dosis ter de die ad cuspidem cultri.

158) Puer triennis ab undecimo aetatis mense epilepsiae subjectus erat, cujus accessus prius omni secundo, tertio mense, dein omni tertia hebdomade redibant. Abdomen erat tumidum, ac pruritus narium continuus aegrotum molestabat. Anthelminthica plurimo sine successu adhibita fuer. Morbum ex affectione glandularum mesaricarum derivans, pulverem contra physconiam edhibui, sub cuius usu omnino convaleuit.

159) Inter quae et jodum locari fortasse meretur: FRANKLIN ein Fall v. Epileps., geheilt durch die Jodine, ex the lancet in BRUNNEN allgem. Repertor. 1832. N. 3. p. 307 (vix, ne vix quidem credimus, morbum spasmodicum verem fuisse epilepsiam, et multo minus tam enormes doses jodi praescribere euderemus). MAGENDIE formulaire; 8. edit. Par. 1834 (eiusdem formula: Rj. Jodurati potass. ʒj. Jodi gr. ij. Aq. Menthae, Aq. flor. Aurant. ana ʒiij. Cap. ter de die cochlear majus).

infantium cum successu adhibuit M. HOFFMANN<sup>161)</sup>. *Ulcera artificialia* et adversus epilepsiam ex *vitis rhachitico* indicata esse, sponte elucet. Hic et *extractum pampinorum vitis viniferae* locum obtinebit. Rhachiticae indolis saltem epilepsiam fuisse, quae ope succi uvarum necdum maturitatem adeptarum sanata est, suspicamur<sup>162)</sup>. Quodsi principium *carcinomaticum* ut caussa epilepsiae latere videretur, methodus adversus scirrhum et cancerum commendanda, adhibenda foret. De virtute antepileptica *conii maculati*<sup>163)</sup>, et ipsius *arsenici*<sup>164)</sup> nonnulli testantur.

## 9. Jam

160) Viduam Professoris Vilnensis coram oculis habemus, quae sex et ultra fonticulis lateribus spinas edmotis, a rebelli epilepsia liberata est.

161) Eph. acad. n. c. cent. 9. et 10. p. 465.

162) Graecus, narrante Dr. LUDOVICO FRANK, epilepsia laborans, somniavit se per succum expressum uvarum necdum maturarum sanitatem recuperaturum esse; ac reversa succo hoc largitus epoto e tanto morbo liberatus fuit. *SIMURGUNDI bestätigt. Nutz. des Saftes d. unreif. Trauben*; in *HUPELAND Journ.* 1822. St. 10. p. 130 (praecipua contra epilepsiam, ex plithora abdominali et reproductione nimia pullulantem, commendat). KLOSS *Weinrankenextract gegen Epileps.* in *med. Ver.-Ztg. in Preuss.* 1832. Jahrg. 1. N. 16 (3ß. omni bihorio).

163) STORRE libellus, quo continentur experimenta. *PHAGVAL pract. essays. Vol. I.* p. 44.

164) L. ALEXANDER in *DUCAN med. comment. for the year 1791. Dec. II. Vol. 5. N. 11.* v. *Samml. auserl. Abh. f. pr. A. B.* 14. p. 427. PHARSON n. *auserl. Abh. f. pr. Aerzte.* 13. B. p. 572. v. *Med. Comm. von Edinb. II. Dec. 3. B. p. 233* (potassa arsenicata, ad  $\frac{1}{10}$  —  $\frac{1}{12}$  grani). BAGG-NATTELLI in *bibl. fisica. T. 14.* MASJUS *Beob. üb. d. Wirk.* Frank *Prax.* II. 1. 2. 1.

C. Ep. atonicæ et nervæ.

9. Jam vero ad *epilepsiam atonicam* et *nervæam* curandam nos accingimus. Cum epilepsiarum maximus numerus huc certe immerito revocatus fuerit, nil mirum, si pharmaca decantata semel juvent et centies effectui destituantur.

Pharmaca ex regno animalis.

10. *Moschus*. Etiam si hoc pharmacum bonæ indolis et dosibus conspicuis diuque continuatis sæpe sæpius in epilepsiis adhibuerimus, tamen nec unum inde sanavimus. Immo plurimi aegrorum, quamvis non plethoricorum, potius detrimentum accipiebant. Cum vero feliciores fuerint HANNES<sup>164</sup>), KUEFNER<sup>165</sup>), SCHENK<sup>167</sup>), MASSA<sup>166</sup>), HOFFMANN<sup>169</sup>), SWIETEN<sup>170</sup>), WALL<sup>171</sup>), CULLEN<sup>172</sup>),

*samk. d. Faleriana u. d. Arseniks in d. Epilepsie.* v. HUFELAND *Journ.* 1813. März. p. 43. S. G. v. VOGEL *med. Betracht. u. Memorabil. Stendal* 1834 (contra epilepsiam cum febra intermittente). J. PRACOCK *pract. hints on the treatm. of several diseases. Lond.* 1834. p. 56 (Solutione Fowlari epilepsiam sanavit). Namini usum hujus veneni, omni morbo pajoris, suadeo.

165) De moschi virtute antapilaptica in proprio filiole observata (nove ecte ec. n. c. Vol. 5. p. 244).

166) Pharmacoliterion s. medicamenta secund. ordinem effectuum elphabat. Ingolst. 1522 (cum vino albo).

167) *Dis. de moscho.* Jen. 1667.

168) *Journ. étranger Juillet.* 1760. p. 233 (Ry. Moschi orientalis grana decem, nitretis entimonii scrupulum unum, extracti chamomillæ q. s. ut fiat bolus. Csp. Sic virginam octodecim annorum gravissima apilapsia febrem intermittentem inasquante detantam, binis remadii dosibus anta paroxysmum exhibitis auctor sanavit).

169) *Med. rat. syst.* T. IV. p. 23. 25. 531.

170) *Commentar. in BOERHAAVE aphor.* T. III.

LEN<sup>172</sup>), TROUVENEL<sup>173</sup>) aliique<sup>174</sup>), procul a nobis sit, moschum ex serie antepilepticorum fugare velle. *Castoreum*, quod RIVINUS<sup>174</sup>), JUNKER<sup>176</sup>), NEUMANN<sup>177</sup>), ALEXANDER<sup>178</sup>) aliique vituperarunt, si optimae, uti in Rossia, haberi queat indolis, in *epilepsia nervæa* ad potiora pertinet auxilia. Pulvis illius extractis resolventibus junctus<sup>179</sup>) et narcoticis plus vice simplici nobis in *epilepsia* praesertim uterina satisfecit. Conveniunt cum nostris et aliorum observationes<sup>180</sup>). *Oleum animale Dippelii*. Binis propriis exemplis, aliisque nonnullis Patris mei laudem adversus epilepsias praesertim uterinas huic pharmaco a DIFFER-  
 I i 2 LIO<sup>181</sup>),

171) *Medical tracts. Oxf.* 1780.

172) *Anfangsgr. d. pr. Arzneyk.* p. 376.

173) *Mém. sur les principes et les vertus des substances animales médicamenteuses.* Bourdeaux 1779. p. 357. et *Abh. f. pr. Aerzte.* 10. B. 2. St. p. 352.

174) *Nove acta n. c.* Vol. V. obs. 63. MORBIUS diss. de epilepsia. Jen. 1659. FRUHRSTEIN diss. de epilepsia. Goett. 1792. MAURER diss. de med. antepilept. p. 25. REINCKE de moscho naturali et artefacto. Jen. 1781.

175) *Censur. medic. offic.* C. 2. §. 8.

176) *Conspect. med. theor. pract.* Tab. 37. cent. 35. et Tab. 35. cent. 5.

177) *The chem. works of CASPAR NEUMANN.* p. 566.

178) *Experimental essays.* p. 87.

179) *Ry. Pulveris castorei drachm. semis. Extracti fumeriae, gremis, 44 drechmes tres. Extracti rhei equosi drechmam unem. M. f. pil. pond. gr. trium. Cons. pulvere florum chemomillae. S. Bis, terre, de dio No. octo cepist.*

180) TROUVENEL l. c. v. *Abh. f. pr. Aerzte.* 10. B. 2. St. p. 357.

LIO<sup>181</sup>), ALBERTO<sup>182</sup>), HOFFMANNO<sup>183</sup>), JUCHIO<sup>184</sup>),  
 LUDOLFIO<sup>185</sup>), MAUCHARTO<sup>186</sup>), VATERO<sup>187</sup>),  
 MODELIO<sup>188</sup>), MORANDO<sup>189</sup>), WERLHOFIO<sup>190</sup>),  
 THOUVENELIO<sup>191</sup>), DREYSIGIO<sup>192</sup>), LEFREUX<sup>193</sup>)  
 aliisque<sup>194</sup>) impertitam, confirmare possumus. At  
 vero centies illud incassum adhibuimus! Idem  
 THILENIUS faletur<sup>195</sup>). Praeterea olei animalis  
*Dippelii* foetor intolerabilis, quominus in praxi  
 pri-

181) *Disquisitio de vitæ animalis morbo et medicina*. L.  
 Bat. 1711. p. 89.

182) *Diss. de med. quadam efficaci in motib. nat. exacerbata*. Halae 1718.

183) *Obs. phys. chem. select.* L. I. obs. 14.

184) *Diss. sist. facillimam ac certiss. method. epilepsiam curandi*. Erf. 1741.

185) *Resp. TRESSELT de olei animalis praeparatione et modo agendi*. Erf. 1748.

186) *Diss. de oleo animali Dippelii*. Tub. 1745.

187) *Diss. de specificorum antepilepticorum, sigillat. olei animal. virtutib.* Viteb. 1725.

188) *Recréations physiques etc.* Paris 1773.

189) *Journ. de méd.* T. 35. p. 565.

190) *Op. med. colleg.* WICHMANN. P. I. p. 88 (*Bis da die a guttis XXX—XL*).

191) *l. c. Samml.* 16. B. 1. St. p. 137. 192) *l. c.* p. 322.

193) *Huile animale de Dippel comme remède contre la teigne et contre l'épilepsie* (ann. de la soc. de Montpell. T. 18. p. 316).

194) KORTUM *diss. de epilepsia*. Duisb. 1765. *Breslauer Samml.* 1721. p. 661. BAUMER *de oleo anim. Dippelii, morboque comitiali observationes quaedam in ect.* Mogunt. Vol. 1. p. 297. W. A. HAASE *üb. d. Erkenn. u. Cur d. chron. Krankheit.* Lpz. 1817. B. 2. p. 204.

195) *Bemerkungen etc.* p. 112.



privata saepius in usum deduci possit, impedit <sup>196</sup>). Connubium cum *aethere sulphurico* <sup>197</sup>), aut forma *chysterum* <sup>198</sup>) aptissima est. *Phosphorus*. A multis in epilepsia commendatus <sup>199</sup>), a nobis nec usurpatus, nec aliis utpote periculosissimus commendandus. Quod fere et de *cantharidibus* valet <sup>200</sup>). Interea non reticendum, *partes animales* phosphorum largientes ab omni aeo in epilepsia sananda

196) Javenis adhuc, cum olei anim. Dippelii saltatori cuidam Italico epilepsia detento praescripserim, parum abfuit, quin me cum pharmaco per fenestras dejiceret.

197) Ry. Olei animalis Dippelii, aetheris sulphurici 84 drachmam unam. D. 8. ter quaterve de die a guttis quindacim ad triginta. Quo connubio, tinctura opii crocata addita, duos epilepticos sanavit STEGMANN in HORN Archiv. 1828. II. 2.

198) Auswahl d. wirksamst. einfachen und zusammengesetzten Arzneimitt. 2. Aufl. 1. B. p. 269.

199) KAMMER in commerc. literar. Nazimb. 1723, p. 137. 1732. p. 180. P. I. HARTMANN resp. FIETZ. diss. usum phosphori uzinari internum medicum a nuperis opprobriis vindicans. Francf. ad Viadr. 1786. J. J. HARTMANN. resp. ELYONNENS. diss. de noxio phosphori urinae in medicina usu. Aboae 1773. FEUERSTEIN diss. de epilepsia. Goett. 1792. QPAIN, animadv. pract. p. 23. Cfr. HUFELAND Journ. T. B. 3. St. p. 110; et med. National-Zeitung. Jul. 1799. p. 639. DR LERS in dict. des sc. méd. T. 41. artic. Phosphore. VOIGTEL vollst. Syst. d. Arzneimittell. B. 2. Abth. 2. p. 51.

200) STOCKER diss. de usu cantharidum interno. Goett. 1781. p. 34. CLARA sur l'efficacité des cantharides dans le traitement, de l'épilepsie. SÉDILLOT r. pér. de la soc. de méd. de Paris. T. 53. p. 455. PORTAL l. c. p. 443 (tristissima exempla ex usu Cantharidum vidit).

sananda sibi laudem promeruisse. Hujusmodi sunt: *sanguis* non solum variorum animalium<sup>201)</sup> sed ipsius adeo hominis<sup>202)</sup>, *secundina* humana<sup>203)</sup> et vitulina<sup>204)</sup>, *testiculī*<sup>205)</sup>, *hepata*<sup>206)</sup>, *cor*<sup>207)</sup>  
et

201) a. c. leonis (WIRTING nova medicina spirituum, p. 151), felis nigrae (BIRLING medicus, p. 944), asinae gravidae (FORMET Versuch e. med. Topographie von Berlin, p. 193), aquilae (ALDROVANDUS ornithologia. L. I. N. 1), corvi (ibid. L. XII. N. 13), talpae (REUSNER obs. N. 12), testudinis (PLINIUS hist. nat. L. XXVII. C. 4), vituli marini (CABLIUS AURELIANUS, p. 314).

202) e. c. gladiatoris jugulati (CELSUS L. III. C. 23), hominis recens occisi (BIRLING l. c. p. 435), patris (PORR Handbüchl. p. 116), ex pollice pedis aegri epileptici (ANTIUS tetrab. II. Serm. 2. C. 15. CAMERARIUS sylloge memorab. cent. XVI. N. 34. 43), menstruus (ETTMÜLLER opp. T. I. p. 780. SCHRÖDER pharmacop. p. 826), cruor humanus generatim (BARTHOLINUS obs. cent. II. hist. 78. LANGIUS epist. I. N. 14. SCHAPER diss. med. curiosae specimen I. de odio 2. de pota sanguinis calentis e corpore humano contra epilepsiam. Rostock, 1705). Quanto cum damno horrenda ista medendi ratio in usum deducta sit, ex observationibus apparet TULPII (L. IV. C. 4), VERZASCHAE (obs. med. cent. N. 7) aliorumque (Breslauer Samml. 1720. 2. B. p. 447. — 1721 p. 654. 1723. p. 559).

203) ZACUTUS LUSITANUS med. pr. hist. L. II. N. 62. SCHUMIG embryolog. p. 879. FINKIUS enchirid. dogmat. hermet. C. 5. LENTILIUS misc. Vol. I. p. 37. LANGIUS opp. Vol. II. 137. BERNHARDUS ALEINUS, professor in academia ad Viadrum, ut efficax epilepsiae remedium secundinam foetus humani in umbra siccata et pulverisatam a scrupulis duobus ad drachmam unam in aqua spirituosae tanaceti exhibendam commendavit, referente DIETALCO in diss. de epilepsia. L. Bat. 1684. §. 31.

204) Populare Lithuanorum remedium.

et cerebræ<sup>208</sup>), cranium humanum<sup>209</sup>), carbo talpæ nigrae<sup>210</sup>), urina<sup>211</sup>), stercus<sup>212</sup>), ossa<sup>213</sup>), sericum ustum<sup>214</sup>) et maxime ungula alcis<sup>215</sup>) etc.<sup>216</sup>).

## 11. Ra-

205) a. c. asini (GESNER hist. mirab. L. I. p. 9), vulpis (LENTILIUS misc. Vol. III. p. 136), verris (ib.), galli (ALEXAND. TRALLIAN. L. I. C. 31).

206) Hominis (AMETAEUS cur. chron. L. I. C. 4), lupi (BORELLUS obs. cent. II. N. 95).

207) Lupi (PAULLINI cent. obs. 65).

208) Hominis (HIRSCHL *Gedank. v. d. fallenden Sucht.* §. 4. — *Mém. de Paris. an. 1765, hist.* 51. *homme épileptique âgé de 28 ans, guéri par la cervelle humaine qu'on lui fait manger pendant 10 jours, sans qu'il le sût*), cameli (PLINIIUS hist. nat. L. XXVIII. C. 8), coturnicis (CAMERARIUS memorab. cent. XVI. N. 42), remæ (BLANKARD collect. med. phys. cent. IV. N. 89).

209) PLINIUS hist. nat. L. XXVIII. C. 1. HENNAULT ergo epilepsiae cranium humanum. Paris. 1611. QUINCRETANUS tetras gravissimorum capitis affectuum. p. 325.

210) Jem a HIRSCHL (l. c. 1770. p. 5) laudatum, contra omnes fere epilepsiae formas salutarem esse, fertur: *Verhandl. d. vereinig. ärztlichen Gesellsch. d. Schweiz. Jahrg. 1829. 2. Hälfte, Zür. 1829. p. 300. Bull. des sc. méd. 1830. Mai. p. 349. Juin. p. 438. PREVOST in troisième rapport du dispensaire de Genève 1830.*

211) CARL. AUREL. p. 320.

212) Humanum (STYMÖLLER opp. Vol. I. p. 215), caninum (AL. TRALL. L. I. C. 21), pavonis (BORELLI obs. cent. III. N. 15).

213) Ex vertice carpionis (BARICELLUS hortulus genialis. p. 312), truttæ Ruviatilis (VELSCH hecatoet. Vol. II. obs. 90).

214) *Breslauer Samml.* 1718, p. 698. HEIMREICH da holoserico remedio antepileptico, aetiologie considareto (act. a. n. c. Vol. 4. p. 76). Die 7. Apr. 1815. Centurio mili-

Pharm. ex  
regno va-  
getabili  
petita.

11. *Radix valerianae officinalis*. Quamvis  
decem epilepsiis huic pharmaco rebellibus, unam  
tan-

tum, Polonus, epilepsiâ (cujus causa in onanie, timore et laesione tendinis Achillis quaeri posset) a viginti annis laborans, meum exposcebat consilium, ajens, se quidem nunc a morbo liberum esse, a quo scilicet tempore serico nigro usto (*gebranntes schwarzer Sammt*) a cive quodam illi commendato utitur, quamvis jam pluries prodrome adventantis paroxysmi, aliis certissima, perceperit. Quid dein cum hocegro contigerit, ignoro.

215) Cum viderim *ungulam alcis* ingrediens celebratissimum omnium specificorum antepilepticorum constituere, eamque adhuc suffragia vulgi Lithuaniâ colligere, ac magis illam novis experimentis subicere statui, cum pharmaca hujus generis vel ab ipso Fr. HOFFMANNO ad tumultus nervosos compescendos commendantur (cfr. P. II. ed. ult. Vol. I. Sect. I. C. I. §. VI. 26). Equidem fabulam de epilepsia alcis (sylvarum Lithuaniâ iaculâ), non bestiae ferocis, ut SWINENIUS narrat (l. c. §. 1085. p. 454), haud ignoro; sed in ea versor opinione, quod si fabulae nos a pharmacorum usu abstergere deberent, vix unum illorum edhiberi jam amplius posset. Quid enim aliud sunt, nisi fabulae, hypotheses de actione pharmacorum jectatae? Sed ad rem revertor. Exhibite plurimis epilepticis ungula alcis, praeter unum, nullum sanavi, sed iste unus, cujus historiam alibi narravi (P. II. ed. ult. Vol. I. Sect. I. C. IX. §. XLII. 1 (5)), epilepsia laborabat cunctis aliis auxiliis rebellis. Tenta erat hujus aegri in hoc pharmaco fiducia, quod, cum in Germaniam profectus esset, ac ibi in pharmacopoliis ungulam alcis reperire non potuerit, eam ex myropoliis Vilnensibus desumeret (cfr. C. X. §. LI. N. 5 (30) ubi de pulvere etiam ungulam alcis continente questio est, cujus ope chorea epidemica sanabatur). J. J. VIERZ Notiz üb. d. ehemals als antiepileptisches Mittel gebrauchten Elensklaueu; ex *Journal de pharmac.* 1833. Mai,

tantum eo sanatam opponere valemus, et quamvis encomia a TISSOTO illi impertita <sup>217</sup>) haud parum restringere debemus; nihilominus fateamur oportet, in epilepsia *nervea*, omni complicatione experte <sup>218</sup>), radicem valerianae officinalis, non ex locis paludosis, sed ex montibus desumptam, debitis cautelis exsiccata, recenter in polinem subtilissimum redactam, hac sub forma <sup>219</sup>) bis terve de die adultis a scrupulo ad drachmam semis, per nonnullorum mensium spatium porrectam, primum inter vegetabilia antepileptica locum occupare. Compara hanc nostram sententiam cum observationibus FABII COLUMNAE <sup>220</sup>), DOMINICI PANAROLI <sup>221</sup>), SCHUCHMANNI <sup>222</sup>), CRUGERII <sup>223</sup>),

in BREKEND *allg. Repertor.* 1839. N. 9. p. 263. et GRUBER *Annal. d. Pharmacie.* 1833. H. 2.

216) *Crustam genu equini* jam anno 1762 contra epilepsiam adhibitam esse, fertur: J. S. METTAUER *Beobacht. üb. d. gut. Wirkung. der Rossniekruste bei d. Fallerucht; ex Americ. journ.* 1835. Aug. in SCHMIDT *Jahrb.* 1836. B. 11. p. 287 (aut pulveris grana II—XX, aut Tinctura).

217) l. c. p. 303. „*Cette plante est celle qui mérite la première place sur le catalogue des meilleurs anti-épileptiques.*“

218) Vide infra. N. 18.

219) Si aeger pharmaca volatilia perferre queat, tinctura aetherea valerianae c. drachma una radicis in uncia aetheris sulphurici infusa, quandoque pulveri palmam eripit.

220) *Phytobasmos.* Neapol. 1692. p. 97. Ed. II; Mediol. 1740 (Vir alta stirpe natus, epilepsia ipse mulctatus, botanices studio, scopo auxilium adversus proprium morbum inveniendi, additus, feliciterque valerianae ope sanatus).

221) *Istrologismorum seu medic. histor. pentecostae quinquae.* Romae 1643. Pent. I. obs. 33. p. 25.

GERII<sup>223</sup>), ROSINI LENTILII<sup>224</sup>), MORCHANDII<sup>225</sup>), CHOMELII<sup>226</sup>), HALLERI<sup>227</sup>), SCOPOLII<sup>228</sup>), HIL-  
LII<sup>229</sup>), QUARINI<sup>230</sup>), THILENII<sup>231</sup>) aliorumque<sup>232</sup>)  
atque eam experientiae consonam invenies. *Ra-  
dix paeoniae*. Antiquissimum hoc pharmacum  
antepilepticum<sup>233</sup>), ut plurimi recentiorum aucto-  
rum monent<sup>234</sup>), immerito obsoletum, binis a  
nobis

222) Valeriane epilepsiae euporiston (misc. s. n. c. Dec. III.  
an. 4. p. 116).

223) Eph. n. cur. Dec. III. an. 7.      224) Ibid. Dec. III.

225) *Hist. de l'ac. des sc.* an. 1700. p. 355. et an. 1706.

226) *Abrégé de l'hist. des plantes usuelles*. T. I. p. 71.

227) *Hist. stirpium indigenarum*. Helvet. T. I. p. 92.

228) *Flora carniolica*, p. 347.

229) *Von d. Tugenden des Baldrians*. Nüremb. 1765.

230) *Animadv.* p. 23. *Nova acta n. c.* Vol. V. obs. 63.

231) *Med. u. chir. Bemerk. nach dem Tode d. Verf. her-  
ausgeg. v. d. Sohne H. C. THILENIUS*. 2. Th. Frankf.  
a. M. 1714. p. 111 (adhibebat et oleum essentialia valeriana-  
e guttis duabus ad sex).

232) *Samml. auserl. Abb. f. pr. Ärzte*. 4. B. p. 311. HU-  
FELAND *Journ.* 2. B. p. 256. CHAUFFARD in *journ. gén.  
de méd. de Par.* T. 94. 1825. Decbr. 1826. Mars. LAPLANE  
in *revue méd. fr. et étrang. Par.* 1827. Juill. J. GAIRDNER  
in *annal. de la méd. physiol.* 1828. Mars (epilepsiam 12  
annorum fugavit). SIEDLER l. c. 1832 et 1833. cas. VII.

233) BERGER *Bericht v. wunderbarl. Kraft d. Paeonienwurzel  
wider das Vergicht*. Frankf. 1599. FRIDERICI *diss. de  
paeonia*. Jen. 1670. HERNERWOLF *anatomia paeoniae*.  
Amst. 1680.

234) HUFELAND *Bemerk. üb. d. natürl. u. inoculirten Blat-  
tern, verschiedene Kinderkrankh. u. s. w.* 3. Aufl. Berl.  
1798. p. 316. THOM *Erfahr. aus d. Arzney-, Wundarzney-  
u. Entbindungswiss.* Frankf. 1799. CULLEN *Anfangsgr.*

nobis vicibus tentatum, minime satisfecit. Mereretur nihilominus ulterioribus subjici periculis. Propriam desideramus experientiam de virtute antiepileptica radicum *pyrethri* <sup>235</sup>), *artemisiae vulgaris* <sup>236</sup>), *selini palustris* <sup>237</sup>), *doronici pardalianches* <sup>238</sup>),

*d. prakt. Arzneyk. nach d. viert. engl. Ausg. übersetzt mit Anmerk. u. Zusätzen. 2. Ausg. 3. B. Zusätze. p. 389. 390. Verhandl. d. med.-chir. Gesellsch. des Kanton Zür. Herbst-sitzung 1827. SIEDLER I. c. cas. IV et VII.*

235) ALEXAND. TRALLIAN. L. I. C. 21. CH. FR. HARLESS opera minora academ. Lips. 1815. T. 1. p. 321. LINDT diss. cit.

236) Vix unquam remedium, nostris saltem temporibus, in epilepsia frequentius, quam radix artemisiae, tentatum est. Ecce elanchum: BUEBACH in HUFELAND Journ. 1824. St. 12. p. 20. 1825. St. 10. 1826. St. 4. 1830. St. 9. p. 92 (primus hanc radicem ut antiepilepticum commendat laudatque. Duce ejusdem experientia feminis melius conducit; si prior dosis gr. XXX—XL, vespere sumenda, aut alterior lavamen afferat, sanabitur certissime aegar; si andorem non provocaverit, altera dosis auganda est). Cfr. ib. 1824. St. 4. WAGNER ib. St. 12. p. 26 et STOLL ib. p. 30 (antiquum assa antiepilepticum). E. GRAEFE in GRAEFE u. W. Journ. 1824. B. 6. St. 2. p. 358. et 1826. B. 9. St. 3. BONORDEN in RUST Mag. 1824. B. 17. St. 2. et in HUFELAND Journ. 1825. St. 1. SCHÖNBECK in Aars berättelse om svenska Läkars sällskap. Arbet. Stöckh. 1825. BROCK in Vaterl. Letteroefening. Amst. 1825. Decbr. HUFELAND Journ. 1825. St. 8. p. 115. St. 10. p. 97. J. R. v. MAAREN ib. St. 11. p. 64. et in pract. Tydschr. voor Geneesk., Verlos. en Scheidkund. Wetenschap. 1826. St. 4. p. 289. BRUNER in HUFELAND Journ. 1825. Spptb. p. 125. RUST Mag. B. 21. H. 1. p. 140. VAN DE PANT spec. med. de artemisia vulgari. Ultr. 1826. DE VRIES RUGLINGH diss. de

artemisia vulg. laudato in epilepsia remedio, Götting. 1826.  
 SCHLITZER, FRANK et HEUN in *Rust Mag.* 1826. B. 22.  
 H. 3. p. 510. GITTERMANN in *Hufeland Journ.* 1826.  
 St. 1. p. 61. St. 4. p. 54. P. J. TOSETTI diss. de rad.  
 artemis. vulg. remed. antiepileptico. Berol. 1827 (condu-  
 cere praesepimus in epilepsia uterina, hysterica et meta-  
 statica). FR. BIRD, E. LÖWENHARD et GRIS in *Hufeland*  
*Journ.* 1827. St. 9. p. 63—117. HIMMELSHNER in *Badensche*  
*Annal. f. d. gesammte Heilk. Karler.* 1827. Jahrg. 3. H. 1.  
 p. 120. USTERI Ber. üb. d. Krankh. im Zür. Kr.-Hause  
 v. J. 1825. in *Verhandl. d. med.-chir. Gesellsch. des Cant.*  
*Zür. ib.* 1827. MÜLLER *Erfahr. üb. d. Wirkg. d. rad.*  
*artem. vulg. in d. Epileps. in Baden. Annal.* 1828. Jahrg. 3.  
 H. 2. p. 62. 1831. Jahrg. 4. H. 1. p. 69 (20 epileptici, ad  
 remedii usum apti, nil lucri, plus damni ex eo traxerunt).  
 STEGMANN *med. Beobacht. in Horn Archiv.* 1828. H. 2.  
 p. 306 (solum infantibus conducens). *Abhandl. u. Beobacht.*  
*d. ärztl. Gesellsch. zu Münster.* 1829. B. 1. Abschn. 17. 2.  
 D'ALGUEN in *Horn Archiv.* 1829. H. 1. F. A. W. HOF-  
 MEISTER in *n. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. Dresd.* 1829. B. 1.  
 H. 1. p. 209. SUFFERT in *Hufeland Journ.* 1830. St. 2.  
 p. 124. A. S. LÖWENSTEIN in *Horn Archiv.* 1831. St. 4.  
 p. 716. J. PICK diss. de rad. artem. vulg. Vien. 1831.  
 PETERS in *Rust Mag.* 1832. B. 37. H. 1. p. 182. L. RAU  
 diss. nonnulla de artem. vulg. Pev. 1832. *Pract. Miscell.*  
*a. aml. Ber. in Rust Mag.* 1832. B. 37. H. 1. *Brandenb.*  
*Sanitätsber. v. 2. Halbj.* 1830. *Berl.* 1833 (solum in epi-  
 lepsia recenti). FRANK *ib.* (incertum esse remedium).  
 KARLST bestätt. *Wirk. d. Balfusswurx. geg. d. Epileps.*  
*in CLARUS u. RADIUS Beitr.* 1834. B. 3. N. 22. SIEDLER  
 l. c. c. 88. VIII. WAGNER *Wirkg. d. rad. artem. vulg. b. d.*  
*Epileps. in Hufeland Journ.* 1835. St. 8. FRIEDLÄNDER  
 üb. d. rad. artem. vulg. in *Oester. med. Jahrb.* 1838. B. 25.  
 St. 4. p. 626. — Plurimi horum virorum radicem, de qua  
 loquimur, in majus quidem extollunt, at quae hujus operis  
 autor celeberrimus observavit in aegrotis, qui radice ar-  
 temisiae



*ches*<sup>230</sup>), *dictamni albi*<sup>230</sup>), *heraclei spondylii*<sup>230</sup>),  
*tussilaginis petasitis*<sup>231</sup>), *scillae*<sup>232</sup>), *colchici*<sup>233</sup>),  
*cepa*<sup>234</sup>), et herbarum *anagallidis amarac*<sup>235</sup>),  
*cardamines pratensis*<sup>236</sup>), *sedi acris*<sup>237</sup>), *galii*  
*lutei*<sup>238</sup>),

temisiae usi sunt, nos timere faciunt, ne elogia illa ex  
 errore proficiantur.

237) SCHMUTZIGER *Erfahr. üb. d. Wirk. d. rad. selini palustr.*  
*gegen Epilepsie*, in *Verhandl. d. med.-chir. Gesellsch. des*  
*Cantons Zür.* ib. 1827 et 1828 (pleres epileptici hoc reme-  
 dio sanati sunt. Dosis est gr. 15—20, ter de die). USTUMI  
 ibid. PESCHIER *Analyse d. Wurzeln des Selin. palustr. u.*  
*sylvestr.* ib. AMMON, ib. RABEN I. c.

238) GRENZ. *epist.* p. 18. 66. 74.

239) STÖRK lib. de *Stammule Jovis C.* 2. p. 38 (*Essentia e*  
*guttis viginti ad sexaginta ter de die*). Radix dictamni  
 elbi ingredienti est pulveris antepileptici ad Guttatem v.  
 Pharm. Würtemb. p. 151. — Orvietanum p. 133 aliorum-  
 que. V. infra. N. 19.

240) ORNE in *medical papers, communicat. to the Massa-*  
*chusetts med. soc. Vol. I.* (Quinquies contre epilepsiam  
 tentata, ter profuit. Dosis pulveris a drachmis duabus  
 ad drachmas tres).

241) CRANE *met. med.* P. II. p. 102 (uncia una radicis ad  
 hydromellis libram unam, ejus aliquot unciae mane je-  
 juuno ventriculo per longum tempus potantur subjuncta his  
 vel ter de mense medicina laxante).

242) RIVIERUS *obs. commun.* p. 672. *Gardans gazette de*  
*santé.* p. 223.

243) RABEN in *the Lond. med. and surg. journ.* 1817.

244) *Journ. de méd.* 1787. v. HUFELAND *neuëste Annal. d.*  
*französ. Arzneyk.* 2. B. p. 38 (succus expressus ad uncias  
 tres quotidie).

245) DIOSCORIDES *mat. med.* L. II. C. 209. CASSIUS *obser-*  
*vat.* N. 57.

246) BERGER *de remed. specif. sp. epilepsia.* Freuch. 1796.

*lutei*<sup>248</sup>) et *molluginis*<sup>249</sup>), *indigo feræ tincto-  
riæ*<sup>250</sup>), *campanulae graminifoliae*<sup>251</sup>), *lunariae  
redi-*

p. 11. DUPRESNOI in FOURCROY *médecine éclairée*, T. IV.  
NAGEL diss. sistens *cardamines pratensis* characterem bo-  
tan. et usum medic. Francf. 1793. p. 13. Nil praestitisse  
BAKER (*med. trans.* T. I, p. 445) refert.

- 247) ZACHORN in HUFELAND *Journ.* 13. B. 2. St. p. 167.  
GAULAY *emploi du sedum acre* (joubarbe) et du nitrat d'ar-  
gent dans l'épilepsie (*ann. d. l. soc. de m. de Montpel.*  
T. 17. p. 182). PETRUS ib. 1815. Mai. p. 19 (Pulvis her-  
bae siccae a granis decem ad scrupulum unum bis de die  
propinatur). C. SOMMER *Behandlungsart d. idiopath. Falls,*  
u. vorzügl. üb. d. Anwend. ein. die jetzt sehr wenig ver-  
sucht. Mittels, d. *Sedum acre* gegen diese Krankh. Qued-  
linb. u. Lpz. 1819. GODIER üb. d. Nutzen des *Sedum acre*  
in der Behandl. d. Falleucht; ex *journal. gén. de méd.* 1829.  
Août. in BEHNREND *Journ.* 1830. H. 1. p. 210. PASQUIER  
üb. d. Anwend. des *Sedum acre* in d. Epileps.; ex *journal.*  
*clin. des hôp. de Lyon.* 1830. T. 1. Marc. in BEHNREND  
l. c. 1832. Apr. p. 102 (quinque casus feliciter senati).  
MAIER u. DORFF in HUFELAND *Journ.* 1834. St. 7. p. 118.  
248) CHOMEL *plant. usuelles*, T. II. p. 24. BONAFOS in  
HAUTHIERRE *recueil*. Vol. II. p. 443. v. *Abh. f. pr. Aerate.*  
1. B. 3. St. p. 101. GARDANH *gazette de santé*, 1773. p. 19. —  
1776. p. 73. — 1777. p. 9. MÜLLER diss. de clematitide  
vitalba. Erl. 1786. WENDT *klin. Annal.* p. 146 (Succus  
expressus ad uncias duas, vel quatuor mane sumendus).  
249) Extract. v. GÖPPNER in HUFELAND *Journ.* 1817. Jul. p. 93.  
250) G. v. STAHLY diss. cit. p. 62 (3ß — 5j sexies, octies  
de die). v. LENNHOSEK *Indigo als Heilmitt.* in d. Epileps.,  
in ENNH. v. ENNHARTSTEIN *med.-chir. Ztg.* 1832. B. 4.  
N. 87. p. 79 (sanationis historiam narrat). GROSSHEIM in  
*med. Ver.-Ztg. in Preuss.* 1833. N. 51. ROTH diss. de in-  
digo, medicamine. Berol. 1834. et Beobacht. üb. d. Indigo,  
als Heilm. d. Epileps. etc. in HACKER *Annal.* 1835. B. 1.

*redivivae*<sup>252</sup>), *androsaces lacteae*<sup>253</sup>), *taxi*<sup>254</sup>),  
*rutae*<sup>255</sup>),

H. 1. p. 17. IDLER üb. d. Gebr. des Indigo, als Heilm. gegen Epileps. in med. Ver.-Ztg. in Pr. 1833 et in RUST Mag. 1835. B. 43. H. 3. STRAHL einige Bemerkg. üb. d. Wirksamk. des Indigo in Krampfkrankh. in GRAUFE u. W. Journ. 1835. B. 22. H. 1 (in epilepsia inveterata nil efficit, quod at me, editorem, affirmare oportet). DORFF Indigo, als epilept. Heilm. in HUFELAND Journ. 1835. St. 6 (gr.  $\frac{1}{2}$  ter de die infantem trium mensium; gr. XV. bis de die puellam 20 annorum sanavit). KOCH üuss. therapeut. Anwend. des Indigos; in med. Ver.-Ztg. in Pr. 1836. N. 20 (epilepsia 12 annorum mox sanabatur eo, quod eger, paroxysmo appropinquante, in vas, indicis solutione calidissima impletum, quod in officina insectoris est, minus inseruit). M. HUS Indigo geg. Krämpfe; in DIERFENBACH Ztschr. 1836. H. 3. p. 124. NOBLE, RECH u. BLANCHE üb. d. Gebr. des Indig. b. d. Behandl. d. Epileps. ex bull. de therap. T. 11. in SCHMIDT Jahrb. 1837. B. 15. p. 157. MANKIEWICZ Indigo geg. Epileps. in med. Ver.-Ztg. in Pr. 1837. N. 22. HONNHORST Epileps. durch Indigo geheilt. ib. HILKENBURG Indigo geg. Epileps. ib. WIENER in Provinz.-Ber. des Colleg. zu Königsb. 1837. SICK in med. Ver.-Ztg. in Preuss. 1839. N. 20. p. 105 (duse epilepsiae feliciter curatae).

251) SALVATORIS ex BENNA nuovi comment. di med. e di chirurg. 1820. N. 2. in GERSON u. JUL. Mag. 1821. B. 1. p. 172 (Herb. at fol.  $\frac{3}{8}$ , ad infus. libr. j. Cap. ter de vasculum coctum).

252) Russische Samml. f. Naturwiss. u. Heilk. 2. B. 2. H. 1816. p. 248 (Remedium popolare in Rossie).

253) Ibid. P. 251.

254) Extrect. aquosum foliorum taxi a grano uno ad duodecim, spatio diei. Commendatur praecipue in epilepsia defectu catameniorum instructa. Luge HARNARD journ. de méd. 1700. Vol. 73. p. 214. HUFELAND Annal. d. français.

*rutae*<sup>215</sup>), *nicotianae*<sup>216</sup>), *daturae stramonii*<sup>217</sup>), *hellebori*<sup>218</sup>) et *atropae belladonnae*<sup>219</sup>). *Hyo-*  
*scya-*

*Arzneyk.* 1. B. p. 147. LODER diss. de taxo baccata. Jan. 1794. p. 17. 18.

255) ALEXANDER TRALLIANUS L. II. C. 32. PLINIUS op. c. L. XX. C. 13 (Dacocelum ante accessiones). RINDLIN Lin. med. 1698. p. 877. SCHENK obs. L. I. N. 228. VALLHRIOLA obs. L. VI. N. 7. STENZEL diss. de ruta medicamento et veneno. Vitsb. 1735.

256) ZACUT. LUSITANUS prax. admirab. L. I. obs. 26 (succo nicotianae sanata). SHENNET Paralip. ad L. I. med. pr. N. 13 (Syrupus). HANNEHMAHN de epilepsiae cura (in infante mediante clysters, ex dacoceto foliorum nicotianae constante) misc. a. n. c. Dec. II. an. 3. p. 159. Cfr. PITTSCHAF in HUFELAND Journ. 1829. St. 3. et 1833. St. 9. COHEN in CASPER Wochenschr. 1835. N. 13. A. FR. FISCHER Beitr. z. Bekräftig. d. hohen Wirksamk. des Tabacksblattes in wichtig. Krankheit, in CASPER Wochenschr. 1838. N. 10 —12 (in epilepsia ex onania conducent).

257) STORCK libellus, quo demonstratur Stramonium, hyoscyamum etc. esse remedia in multis morbis maxime salutifera. Viennae 1762. SIBBÉN diss. de usu Stramonii in convulsionibus. Upsal. 1772. et ODHIELIUS (Tinctura, ex onania et seminis jactura epileptica valde conducent. v. WENDT lib. d. Gebr. d. Dat. Stram. in Ruat Mag. 1827. B. 24. H. 2. p. 322). COOPER diss. on the proprieties and effects of the datura stramonium. Philadelph. 1797. HUFELAND Journ. 9. B. 13. St. N. 4. DREYER l. c. p. 300. MOST l. c. 1825. F. ARRLUNG in HUFELAND Journ. 1828. St. 11. CUNNINGHAM ex n. Amer. m. and s. j. 1828. in GERSON u. JUL. Magaz. 1828. H. 4. p. 148 (dosis multo nimias commendat).

258) CILSUS L. III. C. 23. SCHULSIUS de helleborismo veterum. Hal. 1717. Tinctura Hellebori nigri in morbis convulsivis ex retentione menstruum commendatur a MACLEAN in Edinb. med. and surg. Journ. 1818. Jul.

*scyamum* <sup>260</sup>) incassum hucusque in epilepsiis adhibuimus. Idem post multa pericula de *foliis aurantiorum* <sup>261</sup>), jactato antepileptico <sup>262</sup>), cum aliis <sup>263</sup>)

259) MÜNCH *Beob. der angewendeten Belladonna bei d. Menschen. Stendal*, 2. St. p. 66. MÜNCH (filius) diss. continens obs. pract. circa usum belladonnae in melancholia, mania et epilepsia. Goett. 1785. THEDEN *neue Bemerk. u. Erfuhr.* etc. 2. Th. p. 209. STOLL rat. medendi. P. III. p. 407. EHRH *Hannöv. Magaz.* 1783. p. 99. HUFELAND l. c. 9. B. 3. St. p. 100. Oppositas observationes collegerunt GARDINO *sämmtliche Schriften*, 1. Th. N. 4. THILENIUS l. c. 2. Th. p. 112. ALLEMAND obs. sur l'usage de la belladonne dans quelques affections nerveuses et épilept, et notamment sur ses heureux effets dans une maladie convulsive singulière (ann. de la soc. de méd. de Montpellier. T. 19, p. 47). LÖNNSTEIN-LÖNNEL l. c. p. 278. VOK l. c. (Bellad. c. Zinc. oxydat.). WAGNER in HUFELAND *Journ.* 1835. St. 8 (Bell. c. zinc.). JULES PICARD lib. d. *Anwend. d. Belladonna gegen Epileps.* in *gaz. méd. de Par.* 1838. N. 12. p. 179. Cfr. HUFELAND *Journ.* 1838. St. 3. p. 128 (pericula in 22 epilepticis instituta, infauustos eventus praeberunt). SÉCUIY in *revue méd. franç. étrang.* 1839. Avr.

260) STÖRK op. c. COLLIN obs. med. T. 2. p. 148. STOCKAR DE NEUFORN diss. de hyoscyami viriute med. Erl. 1797. p. 68. 69. BALDINGER *Magazin*. 3. B. p. 340. HUFELAND *Bemerk. üb. d. natürl. u. inocul. Blattern.* p. 334. — Et haec GRÜNIGIT observationibus felicioribus oppositas sunt. Op. c. 1. B. N. 1. et LUDWIG *adversaria*. P. I. N. 2. PORTAL l. c. p. 425. et SIEDLER l. c. (cum zinco oxydato conjunctum) extract. Hyosc. nigr. cum fructu adhibuerunt.

261) Dosis pulveris a drachma semis ad drachm. un. bis ter de die. Infusum ex uncia una foliorum ad colaturam libras paratum.

262) HARN rat. med. P. VI C. 7. §. 4. LOCHER obs. pract. circa luum venereum, spillapsiam et maniam. C. 2. p. 56.

Frank *Prax.* II. 1. 2. 1.

K k

aliis <sup>263</sup>) fateri adigimur. Nec aliter de visco betulino, corylino, querno seu quercino <sup>264</sup>) judicare possumus, si agatur de genuina epilepsia, et non solum de convulsionibus puerorum, quo in casu quandoque profuisse <sup>265</sup>) et propria docet praxis <sup>266</sup>). *Muscum terrestrem clavatum* <sup>267</sup>) non adhibui-

CEANZ mat. med. P. I. p. 31. HANNES epist. de puero epileptico, foliis aurantior. recent. servato. Lips. 1776. at varia diar. HUFELANDII loca. 2. B. p. 256. 9. B. 3. St. p. 103. 12. B. 1. St. p. 169.

263) QUARIN animedv. p. 23. Nove ect. n. c. Vol. V. obs. 63. TISSOT L. c. „J'ai vu, que dans l'épilepsie elles (les feuilles d'orangers) faisoient quelquefois du bien (!); je n'ai pas vu qu'elles guérissent.“ PORTAL L. c. p. 412.

264) PLINIUS hist. mundi. L. XVI. C. 95. T. II. p. 42. BACHWALD diss. analysis visci ejusque in diversis morb. usu. Hafn. 1753. LEHNSWALD de visci querni admiranda (in epilepsia) virtute. Misc. ac. n. c. Dec. II. an. 2. p. 203. COHNATZ Abh. v. d. Mistel u. dess. Kraft geg. d. Epileps. A. d. Engl. Alt. 1776. BOYLE de utilitate natur. philosoph. P. II. Sect. 5. C. 7. CARTHEUSER fund. mat. med. Sect. 15. C. 27. T. II. p. 528. 2. edit. HANNES L. c. p. 39. HARN op. c. p. 5. C. 4. §. 2. HENNING L. c. FRAZER on epilepsy and the use of viscus quercinus in the cure of that disease. Lond. 1806. Efficacité de guy contre l'épilepsie (ann. de la soc. de m. de Montp. T. 11. p. 249). ESQUIROL in diet. des sc. méd. T. 12. p. 585. SCHINZ in Verhandl. d. vereinigt. ärztl. Gesellsch. d. Schweiz. Jahrg. 1828. 2. Hälfte, Zür. 1829. HILDEBRAND ein Mittel geg. Epileps. in CASPER Wochenschr. 1834. N. 30.

265) Eadem est BORRHAAVII observatio (de morbis nervorum p. 841). PFÜNDEL de spasmis tonicis visco persanatis. Jen. 1783.

266) Pulverem bis terve de die e scrupulo uno ad drech-

hibuimus. *Cortex cinchonae* praeter virtutem in febre *intermittente larvata epileptica*, a plurimis observationibus confirmatam<sup>266)</sup>, et illam exerit epilepticos a venere et nimis evacuationibus exhaustos recreandi<sup>267)</sup>. Exhibetur sub forma aut *infusi frigidi cum lacte*, aut *sulphatis chinini*<sup>270)</sup>. Generatim tamen cinchona neutiquam remediis antepilepticis adscribi potest. Adscribunt vero illis flores *anchusae officinalis*<sup>271)</sup>, *convallariae*<sup>272)</sup>

Kk 2 et

mam semis exhibere soleo, superbibendo decoct. saturatum ejusdem visci e. e. ex uncia una ad cocturam librae unius.

261) W. WEDDL de musco terrestri clavato ejusque usu epilept. et drestico (misc. ac. n. c. Dec. III. en. 5 et 6. opp. p. 98).

268) WERLHOFF de febrib. Sect. 1. §. 4. Sect. 4. §. 4. GRAINGER febris anomala Batava. p. 112. L. FRANK in *Salab. med. chir. Zeitung*. 1792. 1. B. p. 427. HIRSCHL l. c. §. 26. TODD *med. chir. Bibl.* 2. B. 1. St. p. 160. TISSOT l. c. art. 27. p. 336. BANG oct. r. soc. med. Havn. Vol. I. p. 106. DUMAS observation sur une espèce d'épilepsie ramenée à la forme périodique par une méthode nouvelle, et guérie sous cette forme par l'administration du Quinquina, lus à l'Institut, le 5. Nov. 1810 (SHIBLOT rec. pér. de la soc. de méd. de Paris. T. 39. p. 351). J. PRACOCK *pract. hinte on the treatm. of several disease. Lond.* 1834.

269) RUER diss. de cort. peruv. vi antisepesmod. Argent. 1787. *Neue Samml. med. Wahrnehm.* 3. B. p. 217. LÖBUNSTEIN-LÖBEL l. c. p. 309 (praecipue potatoribus epilepticis, debilitatis conducere).

270) LEMONTAGNE in *bull. gén. de thérap. méd. et chir. Par.* 1835. T. 9. CLASSEN *Anwend. des Chinin b. d. Epilepsie.* in *PFÄFF Mittheil.* 1837. H. 9 u. 10. p. 117.

271) BRAUN *prakt. Beob. üb. d. Heilkräfte d. Blumen d. Och.*

et pollen *coryli*<sup>271</sup>). Inter semina, nucleos et fructus virtutem antiepilepticam patefecerunt<sup>274</sup>) *sabadilla*<sup>272</sup>), *cocos nucifera*<sup>273</sup>), *faba Sti Ignatii*<sup>277</sup>), *strychnos nux vomica*<sup>278</sup>), et *amygdalae*

*ama-*

*senzunge in d. Epilepsie.* v. BALDINGER *Maga. f. Aerzte.* 7. St. p. 604.

272) LENKENBERG diss. de lili convallii ejusque inprimis baccae viribus. Goett. 1737. p. 29 (Baccarum pulvis. Et pollen florum lili candidi cum saccharo et magnesia pro antiepileptico declaratur. v. VOIGTEL *Arzneymittellehre.* 2. B. p. 410).

273) ETTMÜLLER valatndinarium infantila etc. Eph. n. c. Dec. III. an. 1. obs. 97. HÜNERWOLFF de antiepilepticorum praesartim pulveris farinacei ex corylo effectu diverso (misc. ac. n. c. Dec. III. an. 1. p. 195).

274) GRANA piperis: HOLER *Epileps. durch rohe Pfefferkörner geheilt*; in *Salzb. med.-chir. Ztg.* 1835. N. 96 (cum epilepsia typum quartanum observasset et nunquam non hora septima pomeridiana redisset; suspicemur, febram intermittentem fuisse; ad cujus curam testandam L. FRANK grana piperis commendaverat).

275) SCHNUCKER *verm. Schriften.* p. 1. LOEFLER *Beitr. z. Wundarzneyk.* 2. B. (cum melle). Veratrino (gr. iiij. Aq. destill. ʒj. S. bis in die gutt. X) SCHAEBLER epilepsiam JOHANNEM SANSSO fertur in *Heidelb. med. Annal.* 1839. B. 5. II. 3. p. 469.

276) THUNBERG *Reise durch Europa, Asia und Africa.* 2. B. p. 203 (nuclei in pulvere).

277) STEIN diss. de faba Sti Ignatii. Erlang. 1793. Aet. med. Barol. Dec. II. Vol. 16. p. 12. Arcanū antiepilepticū Weitzii ingredientiū primum est faba St. Ign. W. A. HASEN pr. 1 et 2 de faba St. Ign. Lips. 1822. J. S. ROSENTHAL *Bemerk. üb. d. Salubrität v. Güstrow.* Frühling 1830. in *HORN Archiv.* 1831. II. 4.

278) LANGEUTH progr. de nucis vomicae virtute medica, non



*amaræ*<sup>272</sup>). *Aqua laurocerasi*<sup>280</sup>), nobis ab experto medico<sup>281</sup>) adversus epilepsias commendata, hoc quidem in morbo in permultis tentaminibus non satisfecit, attamen conduxit in plurimis convul-

ita fallaci. Witteb. 1771. SIDRÉN diss. de nucis vomica. Upsal. 1780. Act. med. Snec. Vol. I. Upsal. 1783. p. 397. *Abh. f. pr. Aerzte*. 8. B. p. 552. HARTMANN diss. continens episcopia ad nucis vomicae usum medicum pertinentia. Traj. ad Viadr. 1786. CARPÉL diss. de nucis vomicae viribus et usu. Jen. 1784. RESH diss. de nucis vomica. Jan. 1788. p. 20. — HUFELAND *Journ.* 1. B. p. 109 (Dosis quarta pars grani, ter quater de die, ascendendo). LICHTENSTEIN l. c. (grana duo bis de die), et in HUFELAND *Journ.* 1819. St. 8. KUKK l. citando. J. PHACOCK l. c. (gr. IV—V; horrenda dosis!). A. M. SHENKHA in il *filialro Sebesio giorn. delle sc. med. Nap.* 1835. Marzo. LEGRAND in FRONIER *Notiz*. 1838. N. 133 (nucem vomicam totam, naturam venenatam, salva virtute sua medicatrix, perdidisse at epilepsiam maderi, testatur). — Hodie frequentius *Strychninum* (gr.  $\frac{1}{4}$ —1) adhibitum est: a BROSENTO in *bibl. méd. nat. et étrang. Bruxelles* 1825. Juil. (nimia dosi et infansto successu). W. HENNEMANN in *Bisir. Mehlenb. Aerzte u. Med. u. Chir.* 1830. B. 1. H. 1. p. 123 (epileps. diurna inveterata sanabatur).

279) LUDIAN *einige Beobachtungen über die Anwendung der Blausäure in Nervenkrankh.* (aqua amygd. amararum a guttis octo ad quindacim pro dosi).

280) P. L. MÜLLER in HUFELAND *Journ.* 1825. *Supplemth.* (sub usu Aq. laurocer. tinea retrôpulsâ reparuit et epilepsia siluit), et in HARLESS n. *Jahrb.* 1827. B. 12. St. 3. p. 9 (apilepsiam septennem, quotidia bis recidivam, uncis quatuor, in dosi gtt. 20—30 quater de die porrecta, sanavit). SINDLER l. c. cas. III (in dosi augenda). BORIS l. c.

281) GOLZ quondam medicus Seren. Principis Czartoryski.

vulsionum speciebus, quorum causa in affectione morbose nervorum cardiacorum locata videbatur. — Quid vero de virtute antepileptica *opii*, *camphorae*, *asae foetidae*, *camphorae* et *olei terebinthinae* dicendum? — *Opii* usus, antiquitus adversus epilepsias commendatus<sup>222</sup>), nunc, omnium consensu<sup>223</sup>), ac jure meritoque, ad sequentes solum restringitur casus: videlicet, dum epilepsiae paroxysmi (absentibus indiciis congestionis sanguinis ad cerebrum, aut ad alia viscera) ab animi pathematibus, aut a dolore<sup>224</sup>) provocantur, dumque cum somno aut vigiliis cohaerent<sup>225</sup>). Exhibetur *laudanum liquidum Sydenhami* ante paroxysmum. *Camphora*, suffragiis plurimis suffulta<sup>226</sup>), in epilepsia ex onania, inprimis perstantibus pollutionibus nocturnis indicatur; hocque in casu, adjuvantibus et aliis pharmacis, cum magno successu adhi-

222) \*ARTIUS tetrab. IV. Sem. I. C. 96. SENNERIUS med. praet. L. I. Par. 2. C. 31. T. p. 730. RIVIERUS, QUERCETANUS, TURPIN L. c. REHFELD progr. sist. hist. morbi catalept. epilept. opio potissimum sanati. Gryphae 1788.

223) TRALLERUS usus *opii* Sect. 3. p. 16. TISSOT L. c. art. 26. MÜLLER in *Badensche Annal.* L. c. (fatuitatem prohibendo). C. G. NEUMANN v. d. *Krankh. des Gehirns des Mensch.* Coblenz 1833. Kap. 17 (in epilepsia inveterata).

224) Cfr. N. 4.

225) HAEN ratio medendi. P. V. C. 4. §. 3. PORTAL L. c. p. 207.

226) HANNEB L. c. p. 47. LOCHER L. c. p. 42. COLLIN v. d. *Wirkung. d. Camphers.* N. 8. TISSOT L. c. p. 338. §. 172. PINEL philosoph. *Krankheitslehre.* A. d. Fr. Kopenh. 2. Th. 1800. p. 102. SCHNEIDER in *MURREND Journ.* 1837: St. 3.

adhibuimus. Item in epilepsia puerperii sequela. Dosin majorem, quam unum alterumve granulum de die, non porrigimus, utque aeger vasculum emulsionis amygdalinae vel limonadae superbibat, snademus. Tali pacto vel ipsa hora somni camphora sumi potest <sup>287</sup>). *Asam foetidam*, encomiis non carentem <sup>288</sup>), in epilepsiis de complicatione verminosa suspectis, vel alterius abdominalis originis, cum aliis pharmacis, saepe saepius adhibuimus. Pluries aegroti inde irritabantur, quod BURGRAVE et TISSOT <sup>289</sup>) jam animadverterant. Bonum illud experti sumus, quod symptomata nervea, quae in nonnullis epilepsiis unum alterumve inter paroxysmum epilepticum molesta fiebant, ab asa foetida mitigabantur; sed epilepsiae legitimae, hujus tantum remedii ope sanatae, nullum novimus exemplum. *Oleum terebinthinae* in epilepsiis non solum a vermibus <sup>290</sup>), sed et in aliis nerveis, et potissimum maniacorum <sup>291</sup>), ad doses incomprehensibiles <sup>292</sup>), Angli <sup>293</sup>) — utinam jure!

287) TISSOTUS usum vesperitium reprobat. l. c.

288) Commentar. Lips. Vol. IV. p. 72. BERGER l. c. p. 13.

LANGHE tentamen de remed. Brunsvicens. domesticis. Brunsvigae 1765. p. 83. HOVEN *Versuch üb. d. Nervenkrankh.* Nürnberg. 1813, §. 188. C. L. KLOS *Beitr. z. Klin. u. Staatsarzneiw.* Lpz. 1823 (Duae epilepsias tinctura a. f. debellavit). SIEDLER l. c. cas. III.

289) l. c.

290) LATHAM in *med. transact. published by the college of physicians in Lond.* 1815. Vol. V.

291) *The Dublin hospital reports, and communications in medicine and surgery.* Vol. I.

jure! commendant. Alia olea essentialia e. c. *foeniculi*<sup>294</sup>), *anisi*<sup>295</sup>), *majoranae*<sup>296</sup>), *cajeput*<sup>297</sup>), jam dudum ut antepileptica in usu erant. Ita *benzoe*<sup>298</sup>).

Ph. ex  
ragno mi-  
nerali pe-  
tita.

12. *Acidis vegetabilibus*, prius in epilepsia usitatis<sup>299</sup>), PARACELsus *acida mineralia* substituit.

Inter

292) R. Olei terebinthinae, sacchari hñ unciam unam. Miste-  
terando, affunde aquae menthae piperitidis libras duas (!)  
S. Bis terro de die cochlear majus (!!). Cfr. PLENDER-  
LEATH (293) cit.

293) YOUNG *remarks on palpitation of the heart, complicated  
with dropsy of the chest and on use of the oil of turpen-  
tine in the cure of epilepsy* (méð. tr. V. 5. p. 257). E. PAR-  
CIVAL in the *Edinb. m. and s. j.* 1813. Vol. 20. p. 271. in  
n. *Samml. auserles. Abh. f. pr. A. B.* 1. p. 243. DAY.  
PLENDERLEATH in epilepsia ex febre recens nata ordinavit  
Ol. Terebinth. ʒij, Aq. fontan. ʒi., omni quarta hora  
ʒij. sumend. Paroxysmi mitiores raddebantur. Tandem  
remedii doei duplicata, siluerunt (the *Lond. m., s. and  
pharmac. reposit.* 1814. Vol. I. v. *Salzb. med.-chir. Ztg.*  
1815. B. 4. N. 79. p. 7); ast HORN in ejusd. *Archiv.* 1819  
H. 1 incassum tentavit. GRAVES in the *Lond. m. and s. j.*  
1833. Jan.

294) *Med. experimentalis* Digbyan. Vol. 2. p. 315.

295) *Ibid.* p. 316.

296) LEDDL de usu olei majoranae insigni in epilepsia (misc.  
ac. n. c. Dec. III. an. 9. 16. obs. 32. p. 47).

297) WERLHOF opp. T. III. p. 711. *Commerc. litter. No-  
rimb.* 1731. p. 5.

298) HARTMANN *diss. sistens varias epilepsiae medendi me-  
thodos.* Francf. 1787. p. 11.

299) GALIENUS *consil. pro puero epileptico.* C. 4. Chart. T. X.  
p. 42 (oxymel). RIVIERUS *obs. cent. IV. obs. 10* (oxycratum).

Inter hæc ut antepilepticum *acidum sulphuricum* <sup>300</sup>) laudem promeruit. Nobis praesertim *elixir acidum Halleri* in usu fuerat, quo quidem cum pharmaco epilepticis, tumultum vasorum sanguiferorum ex nimia systematis nervosi sentiendi facultate extra paroxysmos obnoxiiis, levamen attulimus, ac plurimos eorum ad remedia antepileptica calefacientia perferenda, idoneos reddidimus: sed nullum eo solo sanavimus. Tristissima exempla de usu *acidi hydrocyanici* in epilepsiis exstant <sup>301</sup>). *Sulphatem zinci* in epilepsiis nunquam tentavimus, tentaverunt cum successu alii <sup>302</sup>).

Ab

300) AGRICOLA comment. in POPPIUM de vitriolo. p. 386.

Ab HEERS obs. med. N. 18. QUERCETANUS tetras graviss. morbor. p. 360. RULAND curat. emp. cent. IV. obs. 96.

DESAULT nouvelles découvertes concernant la santé et les maladies. Paris 1727. p. 287. FEUERSTEIN diss. de epilepsia. p. 80. HILDENBRAND in HUFELAND Journ. & B. 4. St. p. 34. 35. TISSOT l. c. art. 30 (*acidum sulphuricum seu spiritum sulphuris* adhibet).

301) GERSON u. JUL. Magaz. 1828. II. 4. p. 144 (septam epilaptici nimia dosi necati sunt). Caeterum fateri adigimur, nonnullis epilapticis remedium salutare fuisse; H. KOLLMANN diss. de acidi Boruss. usu in spasms ex perversa syst. sexualis ratione ortis. Barol. 1826 (designat accuratissime casus, in quibus *acidum hydrocyanicum* proderit). SCOTT l. c.

302) JOHNSON Bemerk. üb. d. innerl. Gebrauch d. weiss. Vitriols in d. Epilepsie u. d. Durchfalle. v. Med. Comm. v. Edinb. 6. B. 1. St. p. 334. WIEL diss. de usu interno laucis vomicae et vitrioli albi in pertinaci morbo curando conspicuo. Witeb. 1775. LETTSON in mem. of the med. soc. of Lond. Vol. 3. N. 18. STOLLE diss. de vitriolo albo

Ab oxydo zinci, saepe saepius in usum deducto, in epilepsia originis, uti videbatur, abdominalis, ac singultui nupta<sup>303</sup>), et inprimis in illa puellarum ante pubertatem<sup>304</sup>), opes accepimus. Alii plus<sup>305</sup>), alii minus<sup>306</sup>) obtinuerunt<sup>307</sup>). *Oxy-*  
*dum*

ejusque usu medico-chir. Goett. 1792 (Dosis a grano uno ad quinque, duodecim bis de die). IDELER in HUFELAND *Journ.* B. 4. p. 114.

303) In virgine Vindobonsensi.

304) Novocomii plures ita sanitati restitui.

305) GAUJUS advers. var. argument. p. 113, NEUMANN. Praelect. chem. p. 1876. MYZGER advers. med. P. II. p. 98. PERCIVAL *med. Comm.* v. *Edinb.* 2. B. p. 316. DE LA ROCHE  *Journ. de méd.* T. 42. p. 518. RUSH *med. Comm.* v. *Edinb.* 3. B. p. 105. CHELL diss. de zinco med. Helms. 1780. in WEIZ *neue Anzeig.* 16. B. p. 35. RANON act. soc. med. Hefa. Vol. I. p. 451. 457. STARK *Einricht. d. klin. Instituts zu Jena.* p. 89. 178. OSIANDER *Denkwürdigkeiten.* 2. B. 1. St. p. 188. AASHEIM act. r. soc. med. Havn. 3. Vol. p. 268. HART diss. de Zinco. L. B. 1772. RICHTER *med. chir. Bemerk.* 1. B. p. 137. HIRSCHEL *med. chir. Nebenstund.* p. 161. 190. HUMANN diss. quaestiones super flor. zinci usu interno continens. Traj. ad Viadr. 1778. KUKSIG diss. sistens observationes et experimenta circa usum med. calcis, zinci et bismuthi. Hal. 1792. p. 22 (Dosis a grano semis, ad grana quinque, octo, bis terve de die). BELL in *med. and philos. comment. by a soc. in Edinb.* Vol. I. p. 103. et 204. HAYGARTH *ibid.* Vol. 3. p. 212. WHITE *ibid.* Vol. 4. p. 396. VOK l. c. (c. Belladonna, conjunct.). SIEDLER l. c. (gr. 6—12, c. Extr. Hyosc. n. gr. 2—3). J. G. LORSCHNER diss. sistens, conspect. morbor. in clin. med. pragensi . . . tractator. Prag. 1834. WAGNER l. c. (zinc. c. belladonna). GÜNTHER in HUFELAND *Journ.* 1837. St. 8 (c. pulver. cochear. limacum).

*dum bismuthi*, in epilepsiis nerveis originis abdominalis ulterioribus experimentis commendamus<sup>302</sup>). *Oxydum magnesi*<sup>303</sup>) sine omni fructu pluries tentavimus. *Ferrum*<sup>304</sup>) iisdem rerum positionibus, sub quibus corticem cinchonae proposuimus, quadrat. Immo illud scopo roborandi, et emmenagogo cortici anteponi potest. Dubitamus caeterum, num unquam mars epilepsiam genuinam per se debellaverit. *Aquae minerales martiales* ut *Spaa*, et *Pyrmont*, in epilepsiis ex imbecillitate functionum viscerum abdominalium

et  
306) CULLEN mat. med. J. A. HOFFMANN in HUFELAND Journ. 1833. St. 2. p. 33. Bussé *langsame Vergiftg. durch Zinkblumen, bei der Cur ein. inveterirten Epilepsie*, in CASPER Wochenschr. 1837. N. 18 (aeger suo arbitrio, cum SIEDLERII observationes legisset, intra quinque menses grana 3246 zinci oxydetti consumserat. Indo intoxicatio gravis).

307) *Zincum hydrocyanicum* a HENNIG in HUFELAND Journ. 1823. St. 6. a BROCKMANN L. c. (in epilepsia saturnina); *zincum chloratum* a HANKE in GRAEFE u. W. Journ. 1831. B. 16. H. 2. p. 347 (gr. j. sol. in aether. muriat. 3ij. Cape omni quodrihorio gtt. V.) et a CANQUOIN in Journ. de chimie méd. Par. 1835. Févr.

308) Cfr. C. XIV. In epilepsia tentatum est a PITTSCHAFF in HUFELAND Journ. 1833. St. 9. COHEN in CASPER Wochenschr. 1835. N. 13.

309) JACQUES in Journ. gén. de méd., chir., et pharm. 1811. Déc. (a grovis decem, duodecim cum saccharo, bis de die).

310) Epilepsiae ex onagria medebatur tinctura ferri SCHEUN-  
DER in HUFELAND Journ. 1837. St. 3. *Furni carbonici* 3j—ij  
p. d. praescripsit STRAUCH in General-Sanitätsber. v. Schlesien f. d. J. 1830. Bresl. 1832. KALMUS L. c.

et pelvis, caute, nunquam vero in epilepsiis encephalicis adhiberi queunt<sup>311</sup>). *Ferrum hydriodatum*<sup>312</sup>) et *hydrocyanicum*<sup>313</sup>) non adhibuimus. Principio addicti, aegrotis nequaquam ea pharmaca praescribendi, quae ipsi loco eorum sumere non auderemus<sup>314</sup>); *nitratem argenti fusum* (*lapidem infernalem*<sup>315</sup>)), utpote pharmacum rodens ac periculosum, quamvis a summo viro<sup>316</sup>) commendatum, in usum internum necdum deduximus<sup>317</sup>). Veluti miracula ab eo narrant MURDIE<sup>318</sup>), BOSTOCK<sup>319</sup>), CAFFE<sup>320</sup>), CURVIE<sup>321</sup>), SIMS<sup>322</sup>), POWEL<sup>323</sup>), BADELY<sup>324</sup>), FAUCHIER<sup>325</sup>),

VALEN-

311) TISSOT l. c. art. 27.

312) *Revue méd.* 1828. Decbr. p. 525.

313) J. R. L. v. KIRKHOFF in GIBSON u. JUL. Mag. 1827. St. 3. p. 533 (gr. β. ad iij—Vj. usque tandem quotidie, in epilepsia anorganica). STEGMANN in HORN Archiv. 1828. H. 2 (cum artemisia lavamen attulit). BROCKMANN l. c. (in epilepsia saturnina).

314) P. I. adit. alter. Vol. I. Sect. 1. Introd. ad stud. clin. §. XVIII. 6 (14).

315) Lagatur de hoc medicamine: KRAHMER *Bemerk. üb. d. innere Anwend. des salpêtreaur. Silbers*, in *allg. med. Ztg.* 1837. N. 57—60.

316) BOERHAAVE *elementa chem.* P. II. p. 456.

317) Postea tentamen frustratum institui.

318) KÜHN *physisch-medicinische Journal.* 1800. p. 456 (grenum semis (!) bis da die).

319) KÜHN *ibid.* p. 169 (Duo grana in quadraginta pilulis. Bis da die pil. duae).

320) DUNCAN *annale of medicine for 1798.* p. 456 (quarto pers grani ter da die).

321) *Auserl. Abh. f. pr. Aerzte.* 22. B. p. 361.

322) *Mem. of the med. soc. of London.* 4. B. N. 29.



VALENTIN<sup>226</sup>), GOULAY<sup>227</sup>); HEIM<sup>228</sup>), SCHÄTTER<sup>229</sup>) aliique<sup>230</sup>) attamen non sine omni contr-

323) *Medical trans.* 1813. N. 8. Cfr. *allgemeine Hallische Literaturzeitung*. 1815. N. 9.

324) *Medico-surg. trans. publ. by the med. surg. soc. of Lond.* 1818. Vol. 9. P. 1 (a gr. uno ad granum unum et semis, ter de die!!).

325) *Obs. sur l'usage du nitrate d'argent dans l'épilepsie* (ann. de la soc. de m. de Montp. T. 7. P. 1. p. 360).

326) *Obs. sur l'usage du nitrate d'argent et le sucre de saturne dans l'épilepsie* (ib. T. 8. P. II. p. 301).

327) *Emploi du cedum acre et du nitrate d'argent dans l'épilepsie* (ann. de la soc. de m. de Montp. T. 17. p. 182).

328) Egregius medicus Berolinensis sequenti utitur formula. Lapidis infernalis grana decem. Opii puri grana sex. Extracti conii maculati drachmas duas. Succu liquiritiae drachmam unam. M. f. pil. ponderis granor. duor. Consp. pulv. liqu. S. Mane et vespere 3—5. pil. capiat.

329) HURLAND *Journ.* 1819. St. 5. p. 43. Cfr. 1820. St. 7. p. 70.

330) KAUSCH op. c. N. 14. LANDSKROON in *Salzb. med.-chir. Ztg.* 1819. N. 62. p. 166. 167 (Formula ejusdem: R. Nitr. argent. gr. jß. Solve in Aq. destill. ℥Vj. Adde Mucilag. G. arab. ℥iij. Quater de die cochlear maj. aumend. Dosis arg. nitr. sensim sensimq. ad gr. jV. augenda). KRÜGER in *Horn Archiv.* 1823. II. 5. TONZ in *ibid.* 1824. II. 6. BALARDINI in *OMOIDI ann. univers.* 1828. Apr. MÖLLER in *Badensche Annal. f. d. ges. Heilk. Karler.* 1828. Jahrg. 3. II. 2. p. 70. et 1831. Jahrg. 4. II. 1. p. 69. *Bull. des et. méd.* 1828. Jan. p. 141. KÄHLER in *HURLAND Journ.* 1829. St. 3. p. 63 (valde laudat hanc formulam: R. Rad. Artemisia, vulg. ℥ij. Fac Decoct. ℥Vj. in Colatur. solve: Lap. infern. gr. X. Col. praecipitatum, siccatur in umbra et admisc. Sacch. D. S. Capitur mane et vasper. pars 60.). FÉVOST in *troisième rapport du dispensaire de*

tradictione<sup>331</sup>). Mirum, sub *nitratibus argenti* protracto usu plerumque cutis colorem in coeruleum commutari<sup>332</sup>), et in plexu choroideo et pancreate argentum inveniri<sup>333</sup>). Jam vero ad pharmacum, omni alio a nobis hucusque adhibito supe-

*Génève*, 1830. II, C. LOMBARD *üb. d. innere Anwend. des calp.s. Silbers in d. Epileps.* ex *gaz. méd.* 1832. T. 3. N. 7. Août, in *RUST Mag.* 1833. B. 40. H. 1. p. 145. DOM, LAMMARINI *neue Belege für den Nutzen des krystall. salpetersauren Silbers in d. Epileps.* ex *Observat. med. di Nap.* 1834. Marx, 1. in *SCHMIDT Jahrb.* 1834. B. 3. p. 137. A. M. SEHNENZA in *il filiatro Sebezio. Giorn. delle sc. med. Napoli* 1835. Marzo (cum nova vomica). C. J. KUNK *Jahresber. üb. d. Charité-Krankenhaus z. Berl.* v. 1832. in *SCHMIDT Jahrb.* 1836. B. 12. p. 84. SCHNEIDER *Bemerk. üb. d. Witterungs- u. Krankheitsconstitut.* in *d. Stadt Fulda*, in *HEFELAND Journ.* 1838. St. 9.

331) MACHENNIS in KÜHN op. c. 1802. p. 168. KINGLAKE ib. p. 772. HÜGNER apud STREINTZ *üb. d. ärztl. Anwend. d. salpetersauren Silbers.* Prag 1817. p. 32. WEDENMEYER in *RUST krit. Repert.* 1828. B. 19. H. 3 (epilepsia in hydropem lethalem transiit). STEGMANN in *HORN Archiv.* 1828. H. 2. GODIER l. c. FARBER *Warnung vor heroisch. Arzneimitt.* in *Würtemb. med. Corresp.-Blatt*, 1834. N. 13.

332) FOURCROY *médecine éclairée p. les sciences phys.* T. 1. p. 342. ALBERS in *med. chir. trans. published by the medico-surg. soc. of Lond. Vol. 7. P. 1.* p. 143. BUTTINI *dis. de usu interno praeparat. argenti.* Genf, 1815. *Med. and chir. transact. Vol. 9. P. 1.* p. 234. Cfr. *Salzb. med. chir. Zeitung.* 1817. N. 18. HEFELAND in *ejusd. Journ.* 1824. St. 7. p. 111. MÜLLER, WEDENMEYER II. ec. ELLIPTON l. c. p. 27.

333) FROBIEF *Notiz.* B. 28. N. 5. p. 72. WEDENMEYER in *RUST krit. Repert.* B. 19. H. 3.

superius, pervenimus; — ad cuprum scilicet ammoniacale. Quoties enim in epilepsiis curandis aliae indicationes quam illa genus nervosum specificè aggrediendi, deficiunt, toties nos ad medicamentum istud non sine successus spe convertere solemus. Rationem inde aegrorum sanatorum ad non sanatos, ut alii fecerant<sup>334)</sup>, exacte statuere arduum nimis est, satis quod plurimos, inter multos, et magis adultos quam pueros juvit. Oportet vero ut pharmacum rite paratum sit<sup>335)</sup>. Dosis illius quarta pars grani cum saccharo bis terve de die. Jejunus ventriculus rarius illud fert, caeterum vel ex diu continuato usu nullum observavimus detrimentum. Observationes virtutem antepilepticam cupri ammoniacalis confirmantes inveniuntur apud WEISMANN<sup>336)</sup>, DUNCAN<sup>337)</sup>, CULLEN<sup>338)</sup>, STORER<sup>339)</sup>, WALKER<sup>340)</sup>, BALLY<sup>341)</sup>, GRADING<sup>342)</sup>, THILENIUS<sup>343)</sup>, THOMASSEN A THUES-SINK<sup>344)</sup>,

334) MICHAELIS *medicinisch pr. Bibl.* 1. B. 3. St. (Inter 7 aegrotos, 4 sanantur).

335) Modus cuprum ammoniacala secundum pharmacopoeam Rossicam parandi, plene erroneus, nam paratur per evaporationem ad siccitatem (l. c. p. 199); — hinc vale ammonia!

336) Nov. ect. n. cur. Vol. I. p. 276 (Auctor novus ramadii in epilepsia. An. 1756).

337) *Krankheitsgeschichten, a. d. Engl. Leipz.* 1774.

338) *Mat. med. var. cit.* p. 31.

339) *Med. Commentar. v. Edinb.* 7. B. p. 31. 91.

340) *Ibid.* 10. B. 2. St. p. 33.

341) In DUNCAN *annals of medicine for* 1781.

342) *Fermischte Schriften.* 1. B. p. 109.

SINK<sup>343</sup>), WEGZENBREYER<sup>344</sup>), BATT<sup>345</sup>) aliosque<sup>347</sup>) bene multos<sup>346</sup>). Et acetas plumbi suum habuit laudatorem<sup>349</sup>), nec non murias stanni<sup>350</sup>) et platinæ<sup>351</sup>).

Balnea.

13. *Balnea frigida* tum fluviatilia tum marina; aestate, cum debitis cautelis et immergendo<sup>342</sup>) potius,

343) *Med. chir. Bemerkungen*. 1. *Ausg.* p. 103.

344) *Verhandelingen van d. Genootschap te Flissing*. 14. *Deel*. v. *Abh. f. pr. Aerzte*. 17. *B.* p. 380.

345) *Diss. de cupro medicato*. Erf. 1783.

346) l. c.

347) HAASE l. c. *B.* 2. p. 206. J. URBAN in HUFELAND *Journ.* 1827. *St.* 10. p. 78 (quinque narrat sanationis historias). RUST *Mag.* 1829. *B.* 30. *St.* 2. p. 381. PREVOST l. c. HARTMANN in HUFELAND *Journ.* 1831. *St.* 3. p. 135. MÜLLER l. c. ALBERTZ in HUFELAND *Journ.* 1832. *St.* 5. EISENER ib. *St.* 11 (*Liquor cupri ammon. Koechlini*). CRAMER in *med. Ver.-Ztg.* 1834. *N.* 18. GREHARDT in FRICKH u. OPFENH. *Ztschr.* 1839. *B.* 12. *H.* 4. p. 514.

348) *Liquorem cupri ammoniacalis cum mercurio*, nequid expertus eum (v. KÖCHLIN in *Salzb. med. chir. Zeitung*. 1819. *N.* 33).

349) EEBELH in LEROUX *journ. de méd., chir. et pharm.* T. 38 (*Forma solida*, ad grana tria bis de die, bauriendo dein cochlear olei).

350) W. SHEARMAN in *Lond. med. repository*. 1822. *Septbr.* J. SCHLESINGER *üb. d. verb. Anwend. des Stann. mur. oxydat.* (Stann. gr. j. solut. in Spirit. mur. aether. 3j. Ter, quater de die gtt. V. sumendum, et alternis diebus dosis nonnullis guttulis augendo. Contra epilepsiam ex transpiratione suppressa) in HUFELAND *Journ.* 1837. *St.* 9. p. 94.

351) PREVOST in *troisième rapport du dispensaire de Genève*. ib. 1830.

352) Ipse in equem frigidam lapsus epilepsiam sanavit in eph. nat. c. Dec. II. en. 9. obs. 190.

potius, quam per diuturnam moram in aqua adhibita, in adulatorum epilepsia nervea omni plethora experite vel ob id commendari merentur, quod aegros sensiles admodum ad usum internum pharmacorum calefacientium e. c. valerianae, sustinendorum, idoneos reddunt; quae singula observationibus CAELII AURELIANI<sup>353</sup>), FLOYERI<sup>354</sup>), TURPINI<sup>355</sup>), TEMPLEI<sup>356</sup>), LENTINII<sup>357</sup>), DE BEUNIE<sup>358</sup>), TISSOTI<sup>359</sup>) et S. G. VOGELII<sup>360</sup>) confirmantur. *Balneis tepidis* alibi commendatis<sup>361</sup>) vix in epilepsia, nisi uterina<sup>362</sup>), locus est.

14. Quoties *electricitatem* in epilepsiis adhibuimus, toties id cum evidenti detrimento factum est. Propria hinc infausta tentamina vix cum aliorum felici experientia<sup>363</sup>) conciliare possumus;

Electr.  
galvanis-  
mus, ma-  
gnatis-  
mus.

qua

353) Chronicor. Lib. I. C. 4. p. 312.

354) *Psychrolusia or the histor. of cold bathing both ancient and modern.* Lond. 1773. p. 160.

355) l. c. p. 274.

356) *Praktische Arzneykunst, a. d. Engl. übers. mit Anmerk. von MICHAELIS.* Leipz. 1794.

357) HUFELAND Journ. 7. B. 2. St. p. 160.

358) *Samml. auserl. Abh. f. pr. Ärzte.* 8. B. p. 577.

359) Op. c. art. 32.

360) HUFELAND Journ. 1820. St. 9. p. 21. 361) N. 6 (106).

362) JORDINET *mém. et obs. sur des convulsions épilept. survenues au travail de l'enfantement, et sur les bons effets du bain tiède et de l'eau à la glace, dans ces cas morbides diversément modifiés* (ann. de la soc. de méd. de Montpell. T. 7. p. 81). Cfr. EMBRY *reflex. crit. sur l'obser. de Jordinet* (ib. T. 15. p. 371) et JORDINET *réponse aux refl. crit. d'Embry* (ib. T. 16. p. 11). PORTAL habet observationem. l. c. p. 397.

363) *Rapport de Mr. CORNIER, MELORET etc. sur les avan-* Frank Prax. II. 1. 2. 1.

L I

qua de re non soli conquerimur<sup>364</sup>). Interea electricitatem forte iis in epilepsiis adhuc tentare liceret, quae paralysin sociam habent<sup>365</sup>), quaeque amenorrhoeae<sup>366</sup>), vel causis traumaticis originem debent. Quibus in casibus galvanismus forte electricitati consuetae anteposendus foret. Nonnulla saltem pro eo loquuntur facta<sup>367</sup>). De modo

*tages de l'électricité dans l'épilepsie et catalepsie* p. COMUS, Paris 1783. ALBANUS u. BOMAN in *den Material. f. Elektriker*, Halle 1790, p. 174. DRIMAN v. d. *gut. Wirkung. d. Elektrizität in verschied. Krankh.* 2. B. p. 187; 2. B. p. 160. FRUHRSTEIN diss. de epileps. p. 81. HODGSON in HURF-LAND, SCHREGER u. HARLESS *Journ. d. ausl. med. Liter.* 1802, p. 81. POMU et ARNAUD in *neuesten Ann. d. franz. Arzneyk.* 2. B. p. 327. ADDISON in *Guy's hospital reports*, Lond. 1837.

364) LINNAEUS resp. ZETTEL diss. cont. electrico-medica. Ups. 1754. KÜHN *Geseh. d. med. u. phys. Electric. Leipz.* 2. B. p. 240. Electricitatem vel nil boni, vel detrimentum attulisse observarunt quoque QUARTN animad. pract. Vind. 1786, p. 30. MAUDETT in *mém. de la soc. r. de méd.* an. 1771. et FOURCROY *méd. éclairée*. T. 3. MAISONNEUVE l. c. p. 81.

365) DESHAIS diss. de hemiplegia per electricitatem curata. Montp. 1794. p. 19.

366) SPENGLER *Briefe u. Erfahr. üb. d. Wirk. d. Electricität in Krankh.* 4. B. p. 39. HERBSTARDT in *actes de la soc. de méd. à Bruxelles*, T. I, P. I, p. 159.

367) BURDACH *Handbuch d. neuest. Entdeck. in d. Heilmittelchre.* Leipz. 1806. p. 233, 234. WHITTAM *medical phys. journ.* Vol. 14. p. 527. *Abh. f. pr. Ärzte*. 23. B. p. 630. MARCUS *Magazin f. Therapie u. Klinik*. 1. B. p. 349, 353, 355. J. G. MANSFORD l. c. F. G. MOST d. *Heil. d. Epileps. durch ein neues, gr., kräftig. u. wohlfeil. Heilm.*,

modo applicationis, a quo multum pendere videtur, legatur egregius WALTHER<sup>368</sup>). Unicum, quod in epilepsia uterina cum *magnetismo animali* instituiamus, frustratum periculum, observationes WIEKHOLDII<sup>369</sup>), FRICKE<sup>370</sup>) aliorumque<sup>371</sup>) non confirmavit. *Magnetem*<sup>372</sup>) et *Perkinismum*<sup>373</sup>)

## L 12

non

mit zahlr. Beispiel. bestätigt, Hannov. 1822. Ejusd. üb. d. gr. Heilkr. des Galvanismus, nebst einige nähern Bestimmung. üb. ein neues Heilm. d. Epileps. Lüneb. 1823. et L. e. UHNER PARSON ex n. Engl. j. of med. and surg. 1827. in GIBSON u. JUL. Mag. 1827. St. 4. v. FLANDER Galvanism. mit Erfolg bei ein. Epileps. angewend., in Würtemb. med. Correspond.-Bl. 1833. Jahrg. 2. N. 9. C. KIRCHHOFFER hemipleg. et convulsion. epilepticae Voltaismi ope sanatae. Kiel. 1836.

368) Ueb. d. therapeut. Indicationen des Galvanismus. C. VI. ALLÉ epilepsie; in Oesterr. med. Jahrb. 1837. B. 23. St. 2. p. 225 (electro-galvanismus).

369) Heilkr. d. thier. Magnetismus. Cas. I. et sq.

370) Geschichte einer durch den Lebensmagnetismus geheilten Epilepsie. Halle 1812.

371) WOLKERS et HENDRIKX. K. BARDENHELT en otteaa-ring epilepsie helbredet allene ved animaliske magnetisk Behandling 1821. Kopenh. 1821 (se profligasse Mesmerismo epilepsiam, persuasum sibi habet). PENÄLER hist. epileps. .... magnetismo animali feliciter curatae, in comment. soc. phys.-med. Mosquens. 1827. LÖWENHARD Gesch. ein. durch den (animal.) Magnetism. geheilten mehrjähr. Epileps. in HUFELAND Journ. 1835. St. 6. p. 81. SCHNEIDER in HUFELAND Journ. 1837. St. 3. histor. II.

372) Gazette de salut. Bouillon. 1761. HENSIUS Beytr. Mém. de la soc. r. de méd. 1779. p. 636. ANDRY u. THOURRY Beobacht. v. Gebr. des Magnete in d. Arztk. A. d. Frans. Lpz. 1785. p. 192. BORIS I. citando (ut brechie magnetice armillis ornent (bracelet aimanté), suadet).

non tentavimus. Parum saltem ab eo expectandum<sup>374</sup>).

*Amulata.*

15. De *amuletis* nostram jam alibi exposuimus opinionem<sup>375</sup>). Mirum certe non foret, si metalla e. c. aurum<sup>376</sup>), utpote electricitatis conductores, sique radices paeoniae<sup>377</sup>) et aliae<sup>378</sup>), quatenus aromaticae, corpori appensae, in sensile nervosum epilepticorum systema, imperium aliquod exercerent<sup>379</sup>)! Quod imperium metallorum alia-

373) *Recherches sur le perciniisme ou de l'infl. des tracteurs métalliques, inventés p. le Dr. PRAKINS sur certaines maladies telles que les douleurs . . . et l'épilepsie* (ann. de la soc. de méd. de Montp. T. 29. p. 274).

374) UNZER *Beschreibung eines mit d. künstlichen Magnet angeordneten Versuchs. Alt.* 1775.

375) P. II. ad. alt. Vol. I. Sect. 1. C. 1. §. VI. 54.

376) ALEXAND. TRALLIANUS. L. I. C. 21.

377) GALENUS de simpl. medicam. facult. L. VI. ZACUTUS LUSITANUS med. pr. hist. Lib. I. hist. 22. GAÜBEL epilepsia per annulum appansum curata (misc. ac. n. c. Dec. II. an. 10. p. 80).

378) SCHULTZ de amuleto epilepsiae (radice Ostrutii, seu Imperatoriae recens dissecta et pollicibus manuum et pedum alligata) cum addendis LENTILII (misc. ac. n. c. Dec. I. an. 4. et 5. p. 38. Dec. III. an. 8. app. p. 86).

379) Quod imperium fortasse canibus attribuendam est! E. c. Puer 13 annorum, duos annos et quod excurrit ab epilepsia nocturna rebeli exoruciatus, bene valens evadit, postquam omni nocte canis cum eo in lecto fuerat, v. DAWOSKY epilepsia nocturna; in n. *Ztschr. f. Geburtshunde. B. 7. II. 3.* Monet autor: „*Mag die Natur zur Zeit der Entwicklung einen Weg zur Heilung eingeechlagen haben; so bleibt es doch merkwürdig, dass der Hund*



aliarumque rerum externarum in corpus epilepticorum cum et nocivum evadere posset, sequitur ut medici ad domicilium, cubiculum, lectum, vestes, ornatum, subfumigia etc. hujusmodi aegrotorum, respiciant.

16. Quid lapidis cujusdam viridis, sic dicti *nephritici*, sub cute introductio ad epilepsiam debellandam valeat <sup>180</sup>), experientia docebit <sup>181</sup>). Introductio lapidis viridis sub cute.

17. *Victus* in epilepsia gastrica commentatus <sup>182</sup>) omnino et *nervae* quadrat. Si ista ex Regimen dieteticum. affectione nervorum partium genitalium, a spermate aut vehemente coeundi desiderio irritatorum, pullulet, — *matrimonium* <sup>183</sup>), aliàs epilepti-

cis,

*von Zittern u. Schwäche befallen wurde, die ihn nie wieder verliessen.*<sup>184</sup>

390) HAUTERIVR obs. sur une pierre verte dont se servent les sauvages de la riv. d'Orenague contre l'épilepsie, in mém. de l'oc. r. de Paris, an. 1724. p. 18. — Rimedio nuovo decantato contro l'épilepsia (una pietra verde che si trova alle sponde dell' Orenuco la quale si introduce con una picciola incisione sotto la cute, ove si porta per qualche tempo). Giornale della soc. med. chir. di Parma. Vol. 6. p. 59.

381) Dux militum Polonus epilepsie multatus ejusmodi lapidem in usum deduxit; videbatur ab initio conducere, sed paululum serius malum eadem ratione ut prius perstebat. Scio nuper in clinico instituto, quod Lendshuti aëret, lapidem nephriticum adhibitum fuisse, et ut ferunt, cum successu; num perpetuo? G. R. v. GRÄFN *Einheilung nephritisch. Steine geg. Epilepsie*, in GRÄFN u. W. Journ. 1835. B. 22. H. 1 (semenibus adhuc percis, profusius profluere incipientibus, epilepsia siluit. Autor sensationis partem illius auxilii eppulsi psychico attribuit).

382) N. 8.

cis, nisi forte menischesi laborantibus<sup>334</sup>), vix concedendum. Maxime vero mutatio coeli epilepticis conducit<sup>335</sup>). *Machina rotatoria*<sup>336</sup>) et hic commendata est<sup>337</sup>). Ita mora in *stabulis vaccinis*<sup>338</sup>). Quoad *regimen mentis* generatim quies

- 333) KÜNITZ de matrimonio multorum morborum remedio. Francf. 1749, DOLANUS de febre et epilepsia amatoria matrimonio curata (misc. ac. n. c. Dec. III. an. 2. p. 91). STEGMANN de epilepsia diuturna virginis post congressum cum viro sublata, sed eo denegato postea in furorem uterinum mutata (misc. ac. n. c. Dec. III. an. 1. p. 29). STAHL diss. de dispositione haereditaria ad nonnullos morbos. Hal, 1786, p. 48. MORREAU in *mém. de la soc. méd. d'émulation*. 2. B. p. 189.
- 334) Cum epilepsia ex retentis menstruis venere at puerperio sanata (misc. ac. n. c. Dec. I. an. 1. p. 204).
- 335) HIPPOCRATES aphor. Sect. 2. N. 47. HOFFMANN diss. de peragrinationibus sanitatis causa instituendis. Hal, 1701. p. 22. SWIFTEN l. c. GUYON *leçons diverses*. T. II. p. 78. RONCALLUS hist. morbor. observationibus auct. Brixiae 1741. p. 21. LENTIN *Beitr. z. ausüb. Arzneywiss.*. 3. B. p. 175. at HUFELAND *Journ.* 14. B. 3. St. p. 17.
- 336) P. II. ed. alt. Vol. I. Sect. 1. C. XXVI. §. CXI. 2 (51).
- 337) COX op. c. vers. germ. p. 203. Quantum concussionem corporis aliquando adversus epilepsiam valere possint, exemplum epilepsiae a lapsu curatae docet, quod WINKLER (in misc. aa. n. c. Dec. I. an. 6. et 7. p. 115) narrat; aliudque teste ROUCHERO (*observation sur une épilepsie guérie par une chute in mém. de Paris an. 1767. hist.* p. 28), et virgae adversus epilepsiam in usum deductae sunt (GERBER de epilepsia duorum annorum virgis curata, in misc. ac. n. c. Dec. III. an. 7. et 8. p. 306).
- 338) PINEL *rapport sur le traitemens de l'épilepsie par un séjour prolongé dans une étable à vaches*. *Bulletin de l'Ecole de méd. et de la soc. de Paris*, an. 6. a. 1815. p. 26.

quies animi, fuga irae et terroris conveniunt, etiamsi speciales extent casus epileptiarum, a vehementi animi motu, e. c. a terrore<sup>389</sup>) sanatarum.

18. Exposito praeceptorum multifarias *epi-* C. Ep.  
*leptiarum complicationes* curandi, limites hujus<sup>complica-</sup>  
capitis excedent. Lex generalis esto: curandi  
rationem semper conditioni singulari aegrotantis  
adaptare, et non praecipitanter ad pharmaca ant-  
epileptica pervenire, sed antea obstacula, quae  
effectum illorum pharmacorum eludere possent,  
removere; aut, aliis verbis, antea morbum ab  
omnibus complicationibus liberare et ad suam  
perducere simplicitatem<sup>390</sup>).

## 19. Quodsi

389) PAULLINI epilepsia ex terrore aquae (a lapsu in aquam frigidam) curata. Misc. ac. n. c. Dec. II. an. 9. p. 353.  
SHERR epilepsia ignis (seu lapsu in ignem) curata (misc. a. n. c. Dec. I. an. 2. p. 28).

390) Ait TISSOT (op. c. art. 21) *je dirai seulement . . . 2. que souvent cependant, s'ils ne réussissent pas (les remèdes antépileptiques) c'est par ce qu'on néglige, avant de les employer, de mettre le corps dans l'état dans lequel il serait à souhaiter qu'il fut avant d'en faire usage; on les regarde comme spécifiques absolus, on veut par là même, qu'ils guérissent toutes les épilepsies, on les ordonne indistinctement dans toutes, sans faire attention, que toutes les causes ne sont pas de nature à être vaincues par leur effet, et que comme ils sont tous de la classe de fortifiants, si on les emploie dans le tems, qu'il y a pléthore, tension, sécheresse, disposition à l'inflammation, embarras dans les premières voyes, putridité, obstruction, constipation, loin de faire du bien, il font un mal réel et certain; on les essaye tous successivement, tous nuisent, et tous auroient été utiles, si on avait donné au corps la disposi-*

Secreta  
antepilep-  
tica.

19. Quodsi indicationes rationales frustra ex-  
antlatæ fuerint; ex variis *secretis antepilepticis*  
(quæ caeterum a nemine medicorum ignorari de-  
bent) unum alterumve eligi posset. Hujuscemodi  
sunt: *remedium Ragolinum*<sup>391</sup>), *pulvis de Gut-  
teda*<sup>392</sup>), *pulvis Marchionis*<sup>393</sup>), *pilulae balsami-  
cae*

*tion, qu'il devait avoir.* — De necessitate curæ  
præparatoriæ vide: ELLIOTSON in *monthly gaz. of health*,  
1830. Mai. p. 934. — Cura, duci BORTH (*lanette franç.*  
N. 86. FROBER Notiz, 1830. B. 16. N. 18. p. 281) nimis  
complicata est et agrysm radolet.

391) A medico Hispaniæ MANDOLA propositum et ab alio  
RAGOLO confirmatum. Variæ sunt opiniones circa partes  
illud constituentes. Constat nemp̃ illud, teste KNORF,  
ex Radicum Valerianæ drachma una, Foliorum Auran-  
tiorum scrupulo uno. Salis ammoniaci granis duobus.  
Olei Cajeput guttis quatuor. M. f. pulvis (BALDINGER  
*Magazin f. Ärzte*, II. B. p. 232); teste GMELIN ex  
Rad. Valerianæ minoris drachma semis, magnesiæ albae,  
salis ammoniaci depurati aa granis tribus, olei cajeput  
guttis duabus. M. D. (CRELLS *chem. Annal.* 1793. 12. St.  
FAURSTERN diss. de epilepsia. p. 33) et, teste alio, ex  
agarico muscario, rad. valerianæ at oleo essentiali (*allg.*  
*Liter. Zeitung.* 1793. N. 245). Lega *Abh. v. d. berühm. u.*  
*wirksam. Ragoloischen Mittel z. Heilung. d. Epilepsie v.*  
*deutsch. Ärzten z. Druck befördert: Leipz.* 1788. DREYS-  
STE L. c. p. 370. *Ragolo's Mitt. geg. d. fallende Sucht.*  
*Hamb.* 1815.

392) Ry. Rad. Cassamunise, dictamni albi, paeoniæ, viaci  
quercini, vel corylini, seminum paeoniæ, aa semiunciam.  
Cranii humani, ungulae alci aa drachmas tres. Castorei  
Rossici, corallii rubri aa drachmas duas. Rad. valerianæ  
sylvestris unciam unam. M. f. pulvis, cui addæ olei dest.  
rutæ, saccharo excepti, guttas triginta.

cae *Stahlii*<sup>394</sup>), *essentia dulcis*<sup>395</sup>) et *electuarium di Brera*<sup>396</sup>) aliaque<sup>397</sup>).

## CAPUT

393) Radicum paeonae unciae tres. Visci querni, resurae eboris, ungulae elcis, cornu cervi, spodii, coralliorum rubrorum, alborum, margaritarum praeparatarum ad drachmas duas. Foliorum auri puri N. XX. F. pulvis subtilissimus (dosis a granis decem ad drachmam aemiam).

394) ZUCH diss. sistens facillimam ac certissimam methodum curandi epilepsiam. Erf. 1741 (Formula non reperitur in L. VOGELII *Formul. od. Recept-Lexicon. Frf.* 1804—1806).

395) GOHL de admiranda essentiae dulcis Hallensium efficacia in epilepsia infant. mesenterica periodica (act. sc. n. c. Vol. I. p. 267). WOBLLNER diss. de epilepsia ejusque curatione medicamento specifico, essentia dulci nominato. Leid. 1706. v. VOGEL I. c. Vol. I. p. 377.

396) Ad secreta spectat formula; hoc tamen non ignoretur, corticem peruvianum et valerianem ad partes illius constitutivas pertinere.

397) Multa restant adhuc enumeranda secreta antiepileptica, quo labore autem nos liberavit PORTAL I. c. p. 468—477; addamus solummodo haec: R̄. Acidi hydrocyan. gtt. XXX. Sulphat. Chin. ʒj. Sulphur. praecip. ʒjβ. Confection. aromat. gr. XV. Aq. destill. ʒiij. S. Cochlear coffean. ter de die (J. EPP I. c.). — Contra epilepsiam cerebralem: R̄. Cinabar. fact., Magist. Bismuth. ana gr. XX. Extr. Aloës eq. gr. V. M. f. pulv. div. in part. XX aeq. S. Hora post prandium et vespere pulv. unus sumendus. Pueris ½—1 p. d. (PITTCHAFT in HUFELAND *Journ.* 1838. St. 9). — R̄. Aq. Melissa. c. Castor. ʒj. Aq. Valerian. min. ʒj. Ozym. squillit. ʒj. Extr. Cent. min. ʒij. Spirit. Minder. ʒj. Cap. cochlear maj. ter de die et omni vespere Ol. Rutee gtt. V. (*allg. Anzeig. d. Deutsch.* 1834. Jul. 14). — R̄. Cort. rad. Dictamnii s. Fraxinellae Libr. j. Pulv. Zedoariae ʒjβ. Cap. ʒij. semel-quater quotidie (C. J. B. ALDIS iib. *Sloet's Heilm. d. Epileps. ex Lond. m. gas.* 1836.

## CAPUT XII.

*D e p a r a l y s i .*

## §. LIX.

*Definitio. Literatura. Divisio.*

**Definitio.** 1. *Paralysis* <sup>1)</sup> dicitur fibrarum muscularium immobilitas, nixu voluntatis aut stimulorum consuetorum vix aut ne vix quidem superanda, haud raro cum abolitione sensus in parte, nulla laesione externa visibili detenta. *Paresis* <sup>2)</sup> ejusdem morbi minor est gradus.

**Literatura.** 2. Molesti hujuscemodi morbi literatura, comparate ad illam tumultuariæ epilepsiae, egena est. Enim vero si excipiamus principes medicorum <sup>3)</sup>,

*Fel.* 19. p. 142, in *Schmidt Jahrb.* 1837. *B.* 16. p. 103). — *Ry.* Cupri ammon. gr. ¼—1. *Flor.* Zine. gr. j—jij. *Rad.* Valer. *Flor.* Aurant. ana ʒʒ—j. *Visc.* alb. ʒʒ—3j. *Cort.* peruv. ʒj—3j. *Elseosacch.* foenic. ʒj. *M. f.* *Pulv.* Cap. mane et vespere talem pulv. sensim sensimq. augend. (GÜNTHER contra epileps. nervos. typicam; in *Buchner Repert.* 1838. *B.* 14. *H.* 2).

1) А Гр. Παρά, vitiosæ, et Αύσις, debilitas seu resolutio. *Синонима.* Apoplexia (apud ipsum HIPPOCRATEM in Coac. præv. C. 3. vox apoplexiæ pro paralysis significanda occurrit). Resolutio nervorum, ЧЛЫ. Sideratio aliorum. Гнѣм. Lähmung. GALL. Paralysis. ANGEL. Palsy. RUSS. Параличъ. POL. Parali.

2) Латина remissio. Lenatio.

rum<sup>1)</sup>, utpote qui passim et paralyseos doctrinam dilucidaverant; — si excipiamus, qui idem praestiterunt, compendiorum medicorum auctores potissimum SWIETENIUM<sup>2)</sup>; BURSERIUM<sup>3)</sup> et CULLENIUM<sup>4)</sup>; — si excipiamus dissertationum de paralyssi scriptores<sup>5)</sup>; — si excipiamus collectores

observ-

- 3) HIPPOCRATEM loc. cit. GALENUM L. IV. C. 5. de locis affectis. De tumoribus praeternaturalibus, C. 11. CASSIUM AURELIANUM morb. chron. L. II. C. 1. CELSEUM L. III. C. 27. ARISTAEUM chron. L. I. C. 7. AETIUM Lib. VI. C. 28. p. 109. ANGINETAM Lib. III. C. 18. p. 31. AVICENNAM canon. Lib. III. Ten. 2. Tract. 2. C. 2. ZACUTUM LUSITANUM Lib. I. prax. med. QUERCETANUM art. med. pract. T. III. de paralyssi. p. 188. Tetras gravissimorum totius capitis adfectuum morb. 1696. v. HALLER bibl. med. praet. Vol. II. p. 202. WILLISIUM de anima brutorum, Patholog. C. 9.

- 4) Comment. T. III. Paralysis §. 1057—1070.

- 5) Institut.

- 6) First Lines.

- 7) Inter eos excelluerunt: SENNERUS diss. de paralyssi. Witteb. 1600. RADII diss. de paralyssi. Basil. 1616. SCHENK diss. de paralyssi. Jen. 1668. S. GRASS diss. de paral. Jen. 1677. WENDL diss. de paralyssi. Jen. 1677. Diss. egri paralyssi laborantis. Jen. 1682. Pr. de paralyssi torquente. Jen. 1690. Pr. de paralyssi. Jen. 1691. Pr. de paralyssi particulari. Jen. 1695. Pr. de paralyssi universali et particulari. 1696. Diss. de paralyssi ex epitome prax. clin. Jen. 1707. Diss. de paralyssi. Jen. 1719. C. F. ZIMMERMANN diss. de paralyssi scorbut. Lips. 1694. VATER diss. de hemiplegia. Witteb. 1700. DANCOWARTS diss. ratio paralyseos anatom. Helms. 1735. BURCHARD diss. de affect. paralyss. earumque ab aliis impotentiarum generib. differentis. Rost. 1736. ALBERTI diss. de hemiplegia. Hal. 1744. CARUSOVS diss. obs. circa varias affectionum paralyt. species. Hafn. 1748. ESCHER diss. de paralyssi artuum

observationum, ut FORESTUM<sup>8)</sup>, RIVERIUM<sup>9)</sup>,  
WEFFERUM<sup>10)</sup> aliosque citandos; — si excipiamus,  
qui speciatim de morbis cerebri<sup>11)</sup> et medullae  
spinalis<sup>12)</sup> egerunt, si, inquam, hos singulos ex-  
cipiamus, non nisi paucos de paralyti indicare  
valemus scriptores, quorum inter opera nullum,  
quod omnibus numeris absolutum dici possit, in-  
venitur. Nemo saltem libros VERZASCHAE<sup>13)</sup>,  
JEBBI<sup>14)</sup>, CHANDLER<sup>15)</sup>, KIRKLANDI<sup>16)</sup>, BETHKE<sup>17)</sup>,

OTTEN-

infer. Bas. 1753. FABRICIUS diss. de paralyti musculor. ca-  
pitis extensor. Lips. 1754. HALLER col. diss. §. 1. N. 8.  
AURIVILLIUS diss. de paralyti, Upsal. 1765. v. BALDINGER  
syllog. Vol. I. BÜCHNER diss. de paralyti sine nerv. et  
arter. laes. Hal. 1766. GARIOCH diss. de paralyti. Lugd.  
Bat. 1771. PRERBOON diss. de paralyti inprimis nerven.  
Hoornae 1773. v. SCHLEGEL thes. pathol. Vol. I. VAN  
ROSSUM diss. de paralyti. Lovan. 1784. v. DOERING Vol. I.  
p. 156. C. F. SCHURICH diss. de paralyti, Viteb. 1807.  
S. LOWE diss. de paralyti. Berol. 1824. J. HUTTA diss.  
de paralyti. Pestini 1831. O. CARUS diss. de paralyti non-  
nulla. Berol. 1835. P. BILLIEN diss. de paralyti. Past.  
1835. J. ALBRECHT diss. quaed. de paralyti. Berol. 1835.

8) Lib. X. obs. 84 sq. 90. 91. 121.

9) Cent. I. obs. 74. Cent. II. obs. 98. Cent. IV. obs. 4. 29.

10) Observ. p. 686.

11) P. II. ed. alt. Vol. I. Sect. I. C. I. §. I. 2.

12) C. I. §. I. 3.

13) Exercit. de apoplex. et paralyti. Bas. 1662.

14) *Select cases of the disorders commonly termed of para-  
lysis of the lower extremities.* Lond. 1782.

15) *Unters. üb. d. verschied. Theor. u. Heilmeth. d. Schlagfl.  
u. Lähm. A. d. Engl. Lps. et Stendal 1787.*

16) *Comment. of apoplectic and paralyt. affect.* Lond. 1792.  
Vers. germ. Lips. 1794.



OTTENSEE <sup>17)</sup>, COPELANDI <sup>18)</sup>, COOKE <sup>19)</sup> et BOCHARDT <sup>21)</sup> absolutis monographiis adscribet. — Attamen paralyxis, testantibus vel ipsis sacris paginis <sup>22)</sup>, hominum omnis aevi ad se traxit attentionem <sup>23)</sup>. Ac re quidem vera! inter corporis nostri infirmitates, vix aequae lamentabilem et ad aspectu miserandam invenies, quam paralyxin. Unde pulchre ait WEDEL <sup>24)</sup>: „miserum est tortores experiri dolores, horumque facibus accensis noctu diuque ingemiscere . . . . ast nec sentire nec ad imperium moveri posse non punctam sectamve retrahere manum, omni tristi sensatione est miserius.“ Qua de caussa et medico nil gratius, quam ad spectus aegri prius paralytici nunc proprio motu libere obviam euntis! Faxit hinc benignum numen, ut ista, quam tradituri sumus, doctrinae pars e voto succedat.

### 3. Ut vero in symptomatibus paralyseos tra-

Divisio.  
den-

17) Ueb. Schlagfl. u. Lähm. Lpz. 1797.

18) V. d. Erkenntnis u. Heil. d. Schlagfl. u. d. Lähm. Berl. 1805.

19) Op. c. (v. C. 1. §. I. N. 3 (42)).

20) Hist. and meth. of cure of palsy. Lond. 1821.

21) Ueb. d. Aetiolog. u. Therap. d. Lähm. Stuttg. 1826.

22) Paralytici novi testamenti medico et philos. commentario illustr. Hafn. 1653. Richtera progr. paralyxis alio sensu prisicis, alio recentioribus sumta, ad paralyticos novi testamenti accomod. Goett. 1789.

23) Et Chinensibus non exceptis: A. PHARSON Bemerkg. üb. d. Ansicht, u. Behandlungsweis. d. chinesisch. Ärzte bei Lähmungen, in GERSON u. Jul. Mag. 1828, St. 4. p. 151.

24) Diss. an. 1677. Prooemium.

dendis debito incedamus ordine; paralyin in *internam* et *externam*, nec non in *universalem* et *partialem*, dividemus. Dari enim *paralyin internam* pro re nata linguam, laryngem, oesophagum, pulmones, cor, diaphragma, ventriculum, intestina, vesicam urinariam, illorumque sphincteres, renes et uterum aggredientem, jam ANXTAEUS jure docuit<sup>25)</sup>; ac plus vice simplici de illa in doctrinis aphonias, dysphagias, asthmatis, anginae pectoris, asphyxias, bulimias<sup>26)</sup>, lienterias, hydropis, ischuriae, enuresis et morborum puerperarum, quaestionem instituemus. Quid quod praeter systema musculorum, et *alia corporis humani systemata* paralyi affici posse, verisimile est<sup>27)</sup>. *Paralysis universalis externa*, *paraplexia*, seu *paraplegia* salutatur. *Paralysis externa partialis* detinet aut *unum* idemque *corporis latus*, tunc *hemiplegia*; aut *brachium unius* et *pedem alterius lateris* *paralysis* seu *hemiplegia transversa*; — vel speciatim *musculus faciei*, *colli*, *thoracis*, *abdominis*, *brachii* et *cruvis*. Tandem ad paralyin peculiaris Indiae morbus vulgo *Beriberi* seu *Barbieres* revocari solet.

## §. LX.

*Symptomata. Necroscopia.*

S. prodroma.

1. Paralysis vel fulminis instar ingruit, vel lente

25) l. c.

26) De fene canina et lienteris ex pyloro ita relaxato, ut omnes manus digitos junctim compositos admitteret, lege RUYSCHIIUM (obs. med. chir. cent. obs. 74. p. 68).

27) HAASE lib. d. *Erkenntniss u. Cur d. chronischen Krankheiten*. Leipz. 1817. 1. B. p. 85.

lente insidias struit. Ibi praecedat aut sequitur apoplexia encephalica<sup>1)</sup>, rhachialgica<sup>2)</sup>, neuralgica<sup>3)</sup>. — Hic malum annuntiatur a dolore<sup>4)</sup>, fornicatione<sup>5)</sup>, torpore<sup>6)</sup>, stupore, tremore, concussionibus involuntariis, anaesthesia, aphonia<sup>7)</sup>, palpitatione cordis<sup>8)</sup>, atrophia et a difficultate movendi partium ad paralyin dispositarum.

2. Praesente jam paralyi, eaque perfecta, <sup>S. generalis.</sup> omnis motus abest, parsque affecta neque extendi, neque contrahi, neque in motu tonico manere, neque proprio motu transferri in alium locum potest. Feriantur haec motus organa, musculi flaccidi, laxi ac veluti elumbes ac enervati subsident, aliàs e contrario rigent<sup>9)</sup>. *Sensus saepe simul*

1) P. II. ed. ult. Vol. I. Sect. 1. C. V. §. XXV. 2.

2) Sect. 2. C. III. §. XIV. 5. 6.

3) C. V. §. XXII.

4) OLLIVIER l. c. T. 2. p. 836. obs. 122 (neuralgia ischiadica).

GREGORY et CASTELLO l. citando (cephalgia cum strabismo et amaurosi). CONSTANT in SCHMIDT *Jahrb.* 1834. B. 2. p. 227. *Collectanea med. chirurg. acad. Vilmens.* Vilm. 1836. p. 243 (cephalgia cum amaurosi).

5) GIERL in RUPPELAND *Journ.* 1827. St. 1. p. 95. histor. III.

6) „*Taubheit in Zehen u. Fusssohlen*“ MARY l. citando.

7) J. ABERCROMBIE lib. d. *Krankh. des Gehirns u. R. M.* Bonn 1821. p. 118 (vir robustus sine cepitis dolore praecedente linguae usu plane privatus, postridie in dextro latere paralyticus fuit. Tria exempla alie linguae perditae et hemiplegiae mox recutae, v. p. 120—122).

8) MORNAV *Beobacht. u. Betracht. lib. d. Hemiplegie*, ex n. *böhm. méd.* 1829. Novbr. in BEHNEND *Journ.* 1830. H. 4. p. 21 (palpitationem cordis, longis intervallis repetitam, sequebatur tandem hemiplegia lateris dextri).

9) HALL *diss. de hemiplegia.* p. 31. Sequitur inde momento

simul cum motu desideratur <sup>10</sup>), aliàs perstat sed imminutus, vel et normalis, vel, ut cum aliis <sup>11</sup>) vidimus, adeo acutus, ut pars paralytica non solum frictiones, sed levissimum quoque attactum respueret. Aliquando stimuli mechanici plus quam chemici, et vice versa, percipiuntur. Calor animalis in loco affecto saepe minor sano, quandoque major, cum motu arteriarum aucto, et venarum turgore. Interea et arteriarum pulsatio in parte paralytica defecisse est visa <sup>12</sup>). Nutritio saepe

WARDROP (de paralyti in WEBSTER syst. prax. T. II. p. 186) *laxam musculorum immobilitatem* in definitione paralyticos a BOERHAAVIO stabilitam (aph. 1057) nequaquam admittendam esse. Observationem, quam BARTHELI (RUST Mag. B. 49. II. 1) foras dedit, ignorare non debemus. Virginis nempe floridae 18 annor. et paralyti afflictae brachium sinistrum in *rigiditate cerea* mansit, dextrum *plane relaxatum* at resolutum fuit. Simili modo extrimitates inferiores sa habebant.

10) AL. REID *Fall v. Gefühl- u. Bewegungslösigk.*, ex Edinb. m. and s. j. Vol. 31. p. 292. in GERSON u. JUL. Magaz. 1829. St. 5. Aut desideratur motu perstante: LE SAUVAGE *Fall v. Lähm. des Gefühls bei ungehindert. Bewegung*, ex bull. des sc. méd. T. 19. p. 198. in GERSON u. JUL. Mag. 1830. St. 2. FROBIEF Notiz. B. 24. N. 14. Cfr. f. LXII. 4 (38).

11) SENAC *de la struct. du coeur. T. 2. p. 291* (brachium unum erat paralyticum cum sensu acutissimo, alterum vero brachium omni carebat sensu, sed motu naturali gaudebat). J. TANQUERRELLI DESPLANCHES (SCHMIDT Jahrb. 1837. B. 14. p. 188) hoc symptoma, in aegroto aucto observatum, mirum est et, saepenumero occurrere, eum fugisse videtur.

saepe perstat<sup>12)</sup>, saltem pro tempore; enim vero in longum deducto morbo atrophia vix evitari potest. Absconditur interdum ab oedemate.

3. *Paraplegia*<sup>13)</sup> exhibet resolutionem omnium <sup>Paraple-</sup>partium infra caput positarum (hinc trunci et ex-<sup>61a.</sup>tremitatum<sup>14)</sup>) perstantibus functionibus cordis et pulmonum. Quin immo in gravissimo hujus morbi exemplo<sup>15)</sup> et linguam partemque muscu-  
lorum

12) STOVER in *transact. of a soc. for the improvement of med. and chir. knowledge. Vol. III. N. 32.*

13) „*Abmagerung ist unbedeutend*“ MANX l. citendo.

14) A GR. Παρὰπλήσσω percussio: ΗΙΠΠΟΚΡΑΤΙ audit paralysis membri cujusdam corporis ex praegressu apoplexie aut epilepsiae oritur; ΑΡΕΤΑΒΟ: sensus et motus in parte jactura. GALENUS solius linguae paralysis dicit paraplegiam (de loc. aff. L. IV. C. 2).

15) ΒΟΗΡΗΛΑΑΝ de morb. nervor. T. I. p. 559.

16) Mense Mejo 1818 festinenter ad virum 27 annorum vocatus fui, morbo, ut aiebant, baud definiendo extemplo correptum, sub quo, perstantibus singulis animi et sensuum viribus, eger extremitates tum superiores tum inferiores umplius movere haud poterat (remanente in iis, minori tamen in gradu, sentiendi facultate), loquela balbutiente, deglutitione impossibili, respiratione sublimi anhelante redditae, urina sponte secedente. Pulsus ad centum non sine vi micabat. Ex anamnesticis comperit habui, aegrotum rhechiticum et scoliosi laborentem, syphilidem sub formu cephalaeae perpassum et hyeme praecedente febre rheumatica, gravi cepitis dolore insignita, detentum fuisse; relicto iude cruciata occipitis et cervicis ad hoc usque tempus durante. Morbo pro paraplegia ex affectione cerebelli et medullae oblongatae, nec non cervicalis declarato, prognosique vix non absolute lethali instituta, venesectionibus, hirudinibus, cepiti et

Frank Peen. II. 1. 2. 1.

Mm

lorum faciei a paralysi correptos invenimus, aegro a capite usque ad calcem resoluti; perstantibus cunctis animi facultatibus <sup>17)</sup>. In secundo paraplegiae casu <sup>18)</sup> extremitates inferiores, sphincte-

res

ano admotis, foeticulis ad basin granii, aegrum non solum inter vivos, adjuvante Deo, servavi, sed spatio aax mansium ita restitui, ut tandem expedite loqui, facile deglutire, brachia omnino movere, libere respirare, urinam ratiasse posset. Immo at grassus sat libere instituere jam potuerat, quam vero facultatem itarum (praavia lumbegine, hirudinibus, cauteriis at sataceo rebellis) amisit. Deambulat oampe con nisi baculi auxilio, et crura post se trahens. Quo primum deglutire poterat, solutio tartari ematici, lenis evacuantia, salina, digitalis, pro usu interno inserviebant.

17) Casum non absimilam refert GIERL l. c. hist. IV.

18) Rusticus 38 annorum, quatuor abhioc anois super dorsum vehementer verberatus fuit, ita ut par nonnullas dias dacumbere deberet. Convaluit, relicto tamco sensu doloris ad spinam, sub gravibus laboribus inprimis manifestum. Die 18. Aprilis 1819 abrius iter quatuor miliarium super carro instituit, vento frigido tergum allidente. Recordatur sa horrorem tunc percepiisse et toto corpore resolutum a rusticis traoseuntibus super solo invantum fuisse. Domum deportatus tantatisque nonnullis auxiliis domesticis die 23. Aprilis ad clinicum nostrum delatus est. Invenimus facultatas animi et sensus omnico in statu normali, brachia pectori admota torpentia, et dextrum paresi teotatum, inspirationem profundam impeditam, plagam gangraenosam ad aates dextras, abdomen tensus, iscburiam, alvum clausam, pulsum regularem ad 84 at extremitates inferiores omni motu et sensu destitutas. Declarato morbo pro paraplegia, apoplexiae spinalis traumatico-rheumaticae effectu, ad vennasectiones, hirudines, cucurbitulas scarificantes lateribus spinae admotas, ad foeticulos igois ope

res vesicae urinae<sup>19)</sup> et ani paralyticos illosque omni sensu destitutos<sup>20)</sup>, brachium dextrum paresi laborans, alterum sanum, invenimus, perstantibus et hinc cerebri sensuumque functionibus. In tertio aegro<sup>21)</sup> universi corporis paresi laborante, mente integra, quaevis syllaba speciatim articulari debuerat. Alia celebrata paraplegiae exempla apud GALENUM<sup>22)</sup>, BOERHAAVE<sup>23)</sup>, DU VERNAY<sup>24)</sup>, BURDEL<sup>25)</sup>, BAILLIE<sup>26)</sup>, EARLE<sup>27)</sup>,

Mm 2

HEID-

ibi excitatos, ad mercurium, arnicam, chenopodium ambrosioidem et nucem vomicam confugimus. Quo ultimo auxilio extramittes superiores et respiratio ab omnibus liberabatur incommotis, urina saepe sine catheteris auxilio secadebat, alvus sat regulariter deponabatur, extramittes multis involuntariis motibus agitantur, et nisu voluntatis attrahi poterant. Hac sub rerum positione aeger die 30. Junii, ob ingruens vacationis tempus, domum portatus; ibi, nulla amplius usus medela, obiit.

19) De vesicae urinae affectionibus in paraplegia sat bava disseruit THOM. BLIZARD CURLING in *Lond. med. gaz.* 1833. Vol. 1. Octbr. 19. Cfr. SCHMIDT *Jahrb.* 1834. B. 1. p. 323. et J. BURKH ex *ibid.* Decbr. 7. in *ibid.* B. 2. p. 310.

20) CRAMER in *Rust Mag.* 1828. B. 25. II. 3. p. 551.

21) Juvénis Vilnensis 18 annos natus, post febrem, ut fertur, typhodem, in paralytin universi corporis incidit, deficientia simul loquela, ita ut aeger, quamvis mentis compos, per sex menses farae instar ejulare deberet. Restituta tandem loquela, verba tamen aliter pronuntiare haud poterat, quam syllabas se junctim articulando. De dolore inter scapulas conquerebatur.

22) l. c.

23) l. c.

24) l. c.

25) *Med. and phys. journ.* 1827. June.

26) *Transact. of the med. college of Lond.* Vol. 6.

27) *Ex med.-chir. transact. of Lond.* 1827. Vol. 11. P. 1.

HEIDLER <sup>22</sup>), ELLIOTSON <sup>23</sup>), MONTESANTO <sup>24</sup>),  
KIND <sup>25</sup>), MAISONNEUVE <sup>26</sup>) aliosque <sup>27</sup>) leguntur.

Legat-

p. 516. in *Samml. auserlesen. Abh. f. pr. A.* 1828. B. 12.  
St. 3. p. 553. St. 4. p. 672.

28) HUFELAND *Journ.* 1828, B. 67. St. 3. p. 94.

29) *Ex the lancet*, 1831. in BEHREND *allg. Repert.* 1832.  
N. 3. p. 297.

30) *Storia ragionata di paraplegia antica con fenomeni straordinari in persona vivente etc.* Milano 1831. — *Seconda append. alla stor. di parapleg. ant. etc.* Letta all' acad. di Padova li 9 Luglio 1833. — *Riassunto, continuazione e fine della stor. ragionata di paraplegia etc.* Padova 1835. *Ex n. saggi dell' J. R. acad. di sc., lett. ed arti di Padova, Vol. 4.* — *Epitomen hujus morbi historiae, qui, quum urinae et elvi retentione septemdecim annorum conjunctus esset, oculos omnium medicorum ad se convertit, donarunt: F. W. LIPPICH in med. Jahrb. des Oesterr. Staat. 1833. B. 14. p. 166. 1834. B. 15. p. 323. 1836. B. 20. p. 33. et OLLIVIER D'ANCERS in acad. de méd. de Par. 1833. Fêv.* quorum ulterior de altero paraplegia affecto, quem 72 annos (!) urinam alvumque retinuisse dicitur, avertit; dum LIPPICH (ultime loco cit. p. 334—336) probabiliter exponit, negotium Patevium urinae et alvi excrationem dolose dissimulasse.

31) *Merkwürd. allgem. Lähm.* in HUFELAND *Journ.* 1832. St. 9.

32) *Revue méd.* 1833. Juill. p. 44. Cfr. GIBSON u. JOL. 1833.  
St. 6. p. 444.

33) GREGORY u. COSTELLO *Fälle v. Parapl. ex Lond. m. and s. j.* 1834. N. 110. in SCHMIDT *Jahrb.* 1834. B. 3. p. 170. GALLI *rheumat. Parapl. etc.* ex OMORI ann. 1834. Octbr. in FROBIEP *Notiz.* B. 44. N. 20. V. D JONOD *Parapl. mit günstigem Verluste der Sensibilität, ex revue méd.* 1834. Septbr. in SCHMIDT *Jahrb.* 1835. B. 6. p. 130. J. H. MILLER *Ber. üb. Fälle, die in dem Baltimore Almsen-Krank-Hause behandelt wurden, ex Americ. Journ.* 1834. N. 28.



Legatur et ZIMMERMANN de paralyisi brachiorum et crurum post dysenterias<sup>34</sup>).

4. *Hemiplegia*<sup>35</sup>) est paralyisis unius lateris, *Hemiplegia* plerumque sinistri<sup>36</sup>). Malum plurimos aegrotos<sup>37</sup>.

in SCHMIDT *Jahrb.* 1836. *Suppl.*<sup>h</sup> 1. p. 292. WADDEL *üb. einige Krankh. des Nerv. sympath. ex Americ. Journ.* 1835. N. 30. in SCHMIDT *Jahrb.* 1836. II. 12. p. 297 (paraplegiae casum memoratu non indignum enarrat; quem ex affectione nervi sympathici pullulasse fertur. Medulla spinalis cum membranis at spina ipsa incolumes visae sunt). R. LAW *Paraplegia mit vollk. Verluste d. Beweg. u. fast gänzlichem der Empfind.*, geheilt durch Quecksilber, ex Dublin *Journ.* 1836. N. 26. in SCHMIDT *Jahrb.* 1837. B. 13. p. 288. VOGEL *Paraplegie mit Blasenlähm.* in *Würtemb. med. Corr.-Bl.* 1837. N. 13. PREISS *eine glüchl. geheilte, durch Metastase entstand. Paraplegia completa d. untern Extremit.* in CASPER *Wochenchr.* 1837. N. 22. HOFER *glüchl. Ausg. ein. Paraplegie* in *Würtemb. med. Correspond.-Bl.* B. 9. N. 13.

34) Von d. Ruhr unter d. Volke. p. 143 (Duo exempla).

35) A Gr. *Ἡμισυ*, medietas, *Πλησσω*, percutere.

36) Inter decem hemiplegias vix duae lateris dextri mihi obvenire solant. Convenit cum isto et CALDANI calculus, asserentis, hemiplegias lateris sinistri ad eus lateris dextri se habere ut 11 ad 3 (Animedvers. in CALDANI experimenta et obs. ad illam cerebri partem attinentes, in qua fibrae medullosae ejusdem praecipue decussantur). In nosocomio Parisiensi St. Ludovici inter 63 hemiplegias 36 latus sinistram, 27 latus dextrum occupabant (BOURDON *essai sur l'infl. de la pesanteur sur quelques phénomènes de la vie.* v. *Journ. général de méd.* T. 68. de la seconde série. N. 273. Août. 1819. p. 155). Ex diss. inaug. Dr. CABARD (Paris. 1815) elucet inter 45 paralyces, 24 hemiplegias lateris sinistri obvenisse.

a capite<sup>37)</sup> ad calcem detinet. Tunc visus, auditus<sup>38)</sup> in latere affecto laedi solent<sup>39)</sup>, immo adest diastrophe<sup>40)</sup>, seu oris et linguae in partem sanam distorsio, cum loquela impedita<sup>41)</sup>. Praeterea magna mentis irritabilitas, et infantilis quasi mobilitas observatur, quo fit, ut vel minima oblata opportunitate aeger, aetate quamvis proventus, modo in fletum<sup>42)</sup>, modo in risum prorumpat. Si vero caput immune sit, tunc resolvitur residui tantum corporis pars dextra vel sinistra, ita tamen, ut plerumque brachium gravius afficiatur, quam artus inferior<sup>43)</sup>. Sicuti in aliis paralyseos formis,

37) Immo mentis alienatione conjunctum: J. J. MEYER *Fall ein, mit eigenthümlicher Geisteserrüttung verbunden, halbseitig. Lähmung*, ex *the Maryland med. record. Vol. 1. p. 452.* in GERSON u. JUL. *Mag.* 1830. *St. 6* (in opinione fuit aegrotus, latus corporis sui sanum esse dominum, paralyticum vero servum, inter se rixentes. Similem casum habet GALL).

38) SCHMIDT *Jahrb.* 1834. *B. 2. p. 191.* ex *Lond. m. and s. j.* 1833. *P. 23. Vol. 4. N. 97.* BLONDIOT *ib.* 198. ex *gaz. méd. de Par.* 1834. *N. 3. p. 44.*

39) MIRER, Cl. YBOLLY sensus in hemiplegia parum affici contendere. v. *Med. chir. Abh. d. med. chir. Gesellsch. in Lond. A. d. E. v. OSANN. Berl.* 1811.

40) STROMMEYER (in CASPER *Wochenschr.* 1837. *N. 7*) vere adnotat, in hemiplegia rheumatica repentine provocata latus oppositum contrahi.

41) TAVENNIER *merkwürd. Fall v. Halbblähmung*, in GERSON u. JUL. *Mag.* 1827. *St. 4.* ex JOHNSON *med.-chir. rev. N. Ser. Vol. 7. p. 130.*

42) HONNBAUM in *med. Corresp.-Bl.* 1831. *N. 46. p. 367.*

43) Sic in casu a GRISOLEM (*Fall v. rein nervöser Hemiplegic*,

mis, ita et in hemiplegia, tactus nunc deletur, nunc perstat, nunc acutior evadit, nunc pruritu molestatur. Quandoque brachium aut crus nequaquam in toto ambitu aequo pacto paralyticum est, quod tum accidit, pars affecta sub movendi conatu pro re nata plus minus introrsum, extrorsum, antrorsum, postrorsum flectitur. Aegrotus, ut nisum partem resolutam movendi faciat, excitatus, plerumque ad id efficiendum, latus sanum movet. Fertur, quod per visum aeger adjuvamentum obtinuerat <sup>44</sup>). Hinc inde latus hemiplegicum motibus involuntariis <sup>45</sup>), convulsivis, rigiditate <sup>46</sup>), tentatur. Aliàs convulsiones latus hemi-

*ex presse méd.* 1837. N. 29. in SCHNIDT *Jahrb.* 1838. B. 18. p. 189) enserate.

44) HALDAT in *bulletin de la faculté de méd. de Paris.* 1809. p. 146.

45) HENNEBAUM *unwillkührliche Muskelbewegung in sonst gelähmten Theilen;* in *med. Correspond.-Bl.* 1831. N. 46. p. 361. — Hi motus et nervorum respirationi dicetorum munere effici possunt. E. c. quotiescunque vir, cujus latus sinistrum plexa resolutum fuit, oscitabat, brachium paralyticum tollebatur (ANERCHONIS l. c.). Alter hemiplegia affectus humerum resolutum elevare non potuit; at profunda inspirando una cum narium dilatatione attollebatur, ut humerus sonus. BELL, cujus haec observatio est, ex his concludit, nervos respiratorios in hemiplegia semper fere incolumes esse et in partibus ipsis voluntati subtractis motus conciliare (l. c.). Caeteroquin da hoc argumento MARSHALL HALL (*üb. d. Zustand d. Irritabilität in den Muskeln gelähmt, Glieder in MÜLLER Archiv f. Anat.* 1839. H. 3. p. 200 sq.) legisse jovebit.

46) Aegrum hemiplegia laborantem coram oculis habui,

hemiplegico oppositum agitant. Sphincteres vesicae urinariae et ani nunc mali participes fiunt, nunc immunes manent. Crines et ungues lateris resoluti lentius, aut nequaquam<sup>47)</sup> crescunt. Pulsus ibi plerumque, at certe non semper, debilior; quandoque irregularis. Porro latus hemiplegicum saepe ephidrosi, decubitus, atrophiae et oedemati obnoxium.

*Paralysis  
transver-  
sa.*

5. *Paralysis seu hemiplegia transversa* resolutionem brachii unius et pedis alterius lateris exhibet. Rara haec paralyseos forma doloribus veluti arthriticis stipata, a CONRADO FABRICIO descripta<sup>48)</sup>, post dysenterias malignas epidemicas, adstringentibus et opiatibus praemature suppressas, observata est. Vidimus illam ut apoplexiae effectum<sup>49)</sup>.

#### 6. Para-

cujus crus paralyticum ita rigeat, ut ligneum videretur. Pedis digiti sursum tracti et erecti cernebantur. Manus paralytica nec vi adhibita explicari poterat. ROMBERG (l. c. hist. III) pueri mentionem facit, hemiplegia faciei laborantis, qui latere faciei dextro fiebat, dum sinistrum larvae instar erat.

47) Act. nat. cur. Vol. IV, obs. 111.

48) Diss. de paralyti brachii unius et pedis alterius lateris, dysentericis familiari. Helms. 1750. v. HALLER *Samml. ac. Streitschr.* CRILL *Auszug.* 1. B. Helms. 1779. p. 117. Cfr. praeterea: HUFELAND *Journ.* 1826. St. 2. p. 103. MATTHIAS in HORN *Archiv.* 1830. H. 5. p. 755. ans. I (brachium sinistrum et pes dexter).

49) Die 25. Aprilis an. 1817 pro viro 30 annorum herculeae constitutionis in consilium deductus fui, qui a stirpe pilicosa descendens, haemorrhoidibus et spasmo vexatus, ante tres hebdomades, sine ulla nota causa in apople-

6. Paralysis musculorum faciei, cuius exem-<sup>Paralysis faciei.</sup>  
pla FRIEDERICH <sup>(\*)</sup>, VERSCHUIR <sup>(\*)</sup>, POWELL <sup>(\*)</sup>,  
SCHÖNKEMANN <sup>(\*)</sup>, LABONNARDIERE <sup>(\*)</sup> et praecipue  
J. SHAW <sup>(\*)</sup>, CH. BELL <sup>(\*)</sup> aliique <sup>(\*)</sup> collegerunt,

nos-

xiam iacideret, relicta paralyti seu hemiplegia transversa.  
Paralyti enim laborebat brachium sinistrum et crus dex-  
trum. Et linguae tota resoluta erat, aegroto balbutiente.

50) Da paralyti musc. faciei rheumat. Würtab. 1797.

51) Diss. de paralyti musculor. faciei sic dictae rheumat.  
Gröniag. 1804.

52) In *medical transactions publ. by the coll. of physic. in*  
*London 1815. Vol. 5.*

53) In *HUFSLAND Journ. 21. B. 2. St. p. 149.*

54) *Journ. général de médecine. T. 27. p. 22.*

55) *V. d. Wirkg. d. Lähm. d. verschied. Art. v. Gesichtsnerv.*  
*auf d. Mensch. ex journ. of sc., litt. and arts. N. 25. in*  
*GERSON u. JUL. Mag. 1822. B. 4. p. 70. — Ueb. theilweise*  
*Lähm. ex med. chir. transact. Vol. 12. p. 105. in GERSON*  
*l. c. p. 313 (hemiplegiam facialem raro ex cerebro, sed*  
*potius ex portione durae parietis 7. aut parietis 5. affectione*  
*pullulare). — Some observ. on a case of partial paralyt. of*  
*the face. Lond. s. a.*

56) *Append. to the pap. on the nerv. . . contain. consult.*  
*and cas. illustr. of the facts arrang. in those papers. Lond.*  
*1827. Cfr. GERSON u. JUL. Mag. 1828. St. 1. p. 49 (de-*  
*cem paralyseos faciei historias majoris momenti enarret).*

57) *HORN Archiv. 1824. H. 2. p. 281 (paralysis faciei lateris*  
*sinistri, post dentis extractionem difficilem molaris ma-*  
*xillae superioris lateris ejusdem). OMIOIDEI annal. univ.*  
*1827. Febr. e Marzo. p. 253. Bullet. des sc. méd. 1829.*  
*Mai. p. 182. ex la cliniq. des hôp. T. 4. N. 13 (ab ex-*  
*ostosi syphilitica). Revue méd. 1830. Janv. p. 63. CHOMEL*  
*Lähm. d. N. facia. ex gaz. méd. de Par. T. 3. N. 3. in*  
*HAHNEL Summar. des Neuerr. n. d. in- u. ausländ. Med.*  
*Lpz. 1832. B. 1. p. 228. Paralyse d. rechten N. facialis;*

nosque plurima vidimus<sup>44</sup>), plerumque unum lat-  
tus

ex gaz. méd. de Par. T. 3. N. 111. in HAHNEL l. c. B. 4. p. 88. PROEVS rheumat. Lähm. d. Gesichtsmusk., in med. Ver. Ztg. 1832. N. 13. W. FRIEDRICH zwei Fälle v. rheumat. Lähm. d. einen Gesichtshälfte, in CLARUS u. RADIUS wöchentl. Beitrüge. B. 2. N. 1. GERDESSEN paral. muscular. faciei hemiplegica u. glückliche Heil. derselb. in mehr. Fäll. in HUFELAND Journ. 1833. St. 5. DÜRR in Württemb. med. Corr.-Bl. 1833. N. 4. E. HUMBERT diss. de paral. n. fac. Berol. 1834. W. TURNBULL in SCHMIDT Jahrb. 1834. B. 2. p. 351. ex Edinb. m. and s. journ. 1834. Jan. OTTO Fall ein. rheumat. Lähm. in d. einen Gesichtshälfte, in CASPER Wochenschr. 1835. N. 13. J. B. THOMSON partielle Gesichtslähm. ex Lond. med. gaz. 1834. Vol. 14. Jul. 12. in SCHMIDT Jahrb. 1835. B. 7. p. 59. ROMBERG Lähm. d. Antlitznerv. durch Krankh. des Felsenbeins, in CASPER Wochenschr. 1835. N. 38. CHRISTISON Fälle v. Paralyse einzelner Nerven des Gesichts, ex Edinb. journ. 1835. in SCHMIDT Jahrb. 1836. Spptb. 1. p. 108—110. L. TANQUEREL-DESPLANCHES Beob. ein. Paralyse d. Empfind. u. Beweg. d. linken Seite des Gesichts, mit Lähm. des Musc. rect. extern. des gleichseit. Aug. in Folge d. Stör. eines der Nerv. v. 5., 6. u. 7. Hirnnervenp. ex revus méd. 1836. T. 11. Avril. in SCHMIDT Jahrb. 1837. B. 14. p. 183. L. STROMMEYER in CASPER Wochenschr. 1837. N. 3. 4. 7. 8. C. J. HEIDLER Gesichtslähm. in RUST Mag. B. 49. II. 2. STÖBER zwei Fälle v. Hemipl. facial. ex gaz. méd. de Par. 1838. N. 17. in FRICKZ Ztschr. 1838. B. 9. II. 2. p. 243. ULRICH paral. n. facial. in CASPER Wochenschr. 1838. N. 9. STANSKI Fall v. Paral. des 3. u. 5. Gehirnnervenpaar. ex archiv. de méd. de Par. 1839. Jan. p. 62. in SCHMIDT Jahrb. 1839. B. 23. p. 165. L. FIGARD Lähm. des 3. u. 5. Nervenp. ex archiv. gén. 1839. Jan. in FROBIEP Notiz. 1839. B. 10. N. 1. p. 13. LANDOUZY v. d. halbseitig. Lähmung des Antlitzes bei Neugeboren. in FROBIEP l. c. B. 12. N. 19.

tus (hemiplegia facialis<sup>49</sup>), saepissime dextrum occupat. Morbus extemplo oriri solet<sup>50</sup>) quando-  
que

p. 297. KLOKOW *halbseit. Lähm. d. Gesichtsmuskeln* in *Provinz.-Sanit.-Ber. des K. Med.-Collég. z. Königsb. f. d. erste Semester 1838. Königsb. 1839. p. 23.*

58) Morbus iste in regionibus septentrionalibus tam communis est, ut spatio quindecim annorum viginti duo mihi obveniant exempla.

59) Prout causa excitans unius aut alterius lateris nervum facialem tetigerit. Juvenis 18 annos natus, hemiplegia dextra affectus, impos fuit, palpebras oculi dextri claudendi, sibilandi et inflandi atque non nisi latere sinistro risum adidit et frontem contraxit. BULL, qui hanc historiam enarrat (l. c.), cognovit tumorem durum retro ad aurem juvenis dextram, inter ramum mandibulae at processum mastoideum ossis temporum, qui nervum facialem, foramine stylo-mastoideo exeuntem compressit. Similia refert autor de glandulis inflammatis et tumidis. — Et ABERCHOMIE (l. c. p. 416) infra aurem sinistram, inter angulum mandibulae et processum mastoideum tumorem durissimum magnitudinis fabae, truncum portionis durae nervi faciei comprimentem reperiēbat in uxore defuncta, cujus os distortum et musculus orbicularis resolutus fuerant. *Folgen ein. Schläges auf die linke Infraorbitalgegend* (hemiplegia ejusdem lateris faciei), in *FRORIKER Notiz. 1834. B. 40. N. 20. BLONDET l. c.*

60) Septem aegrorum meorum optima sanitate fruebantur, cum matutinis horis lectum deserentes, ex fenestris, vel parte illarum (vulgo *Was ist das*) prospectabant; retracto vero mox, ob aurem frigidam faciem allidentem, capite, faciei paralyzin adstantibus in cubiculo jam patefaciebant. Juvenis dolore dentium lateris sinistri detentus, partem affectam per totam diem strophilo coopertam tenuit. Vespere theatrum adivit, epoto ibi *Punsch*, excalearctus foras petiit, ac tantum per horae momentum partem

que illum veluti rheumatismus acutus faciei seu potius neuralgia facialis rheumatica <sup>61)</sup> praece-  
dit <sup>62)</sup>. Facies in latus sanum trahitur; ac saepe  
risum sardonium exprimit <sup>63)</sup>. Praeterea impoten-  
tes sunt alii vel frontem et supercilia corrugandi <sup>64)</sup>,  
vel palpebras rite claudendi <sup>65)</sup>, aut aperiendi <sup>66)</sup>,  
vel labium superius et alam nasi attollendi <sup>67)</sup>,  
vel naricem dilatandi <sup>68)</sup>, vel angulum oris ele-  
vandi <sup>69)</sup>, vel os claudendi et effluxum salivae  
aut

denudavit, jam inde paralyticam redditam. Alter ex nun-  
cio mortis uxor in eandem incidit morbum. Ita vatale  
ex moerore et ira. Idem refert BALL (l. c.) de studiosa  
medicina, qui, corpore servafacto ad fenestram apartam  
considens, aodam memento hemiplegia faciali at capite  
obstipe afflictum se vidit. Cfr. J. CASTANA iib. d. *Hemi-  
plegia faciaL u. ihre Behandl. durch d. Galvanism.* ex  
*journ. des conn. mèd.-chir.* T. 3. p. 231, in SCHMIDT *Jahrb.*  
1837. B. 16. p. 32. DAHLING apud STROMAYER in *CASPER*  
*Wochenachr.* 1837. N. 7 (paral. n. fac. at abducentia).  
Collect. mèd.-chir. acad. Vilmens, Vilm. 1838. p. 243.

61) Cap. VI. §. XXX. N. 8.

62) Memorabilis casus habetur mulieris, in qua dolor di-  
versa capitis loca successiva occupabat at mutationem loci  
dolantis sequebatur paralytis diversarum partium corporis  
(*acad. des sc. Par.* 1742. p. 62).

63) Sic in casu a HANNAH S. THOMPSON ex *Lond. m. gaz.*  
*Vol.* 21. p. 335. in SCHMIDT *Jahrb.* 1839. B. 21. p. 196.

64) Ex paralyti musc. frontalis et corrugatoris supercilii.

65) Ex paralyti musc. orbicularis palpebrarum.

66) Ex paralyti musc. levatoris palpebrae superioris.

67) Ex paralyti musc. levatoris labii superioris et alae nasi.

68) Ex paralyti musc. compressoris nasi.

69) Ex paralyti musc. levatoris abguli oris et musc. zygo-  
maticorum.



aut regressum ciborum impediendi<sup>70)</sup>, vel buccas aëre, aut aqua implendi<sup>71)</sup>. Facies lunae phases sequi est visa<sup>72)</sup>. Generatim fere<sup>73)</sup> omnes, qui paralyti faciei laborant, de anaesthesia praecipue ad labium superius conqueruntur. Raro mastica-

tio

70) Ex par. musculi orbicularis seu sphincteris oris.

71) Ex par. musc. buccinatoris. — Hujusmodi paralytes ex affectione nervi communicantis faciei proveniunt, cujus functione nasi alae dilatantur et contrahuntur, labia, musculi orbiculares palpebrarum moventur, etc. ut BALL (l. c.) docet. E. c. dum autor tumorem retro ad auram extirpavit et ramum percidit nervi facialis, angulo oris pervariantem, eger facultate sibilandi extemplo spoliatus est. Cfr. PROUSS l. c.

72) *Traité médico-philos. sur le rire*, p. DENIS-PRUDENT-ROY. Paris 1814 (KREKINGIUS feminam vidit solo planilunio physiognomiam admodum regularem et compositam exhibentem. Mutabatur varo vultus decrescente luna; tunc enim oculi, nasus, os, ad unum convertabantur latus, ac ita quidem, ut egre, vigenta haec rarum conditione, conspectum hominum fageret).

73) Sedulitate CH. BALL et SHAW edocti sumus, nervum quintum sensui, facialem vero motui dicatos esse et, iis perscissis, illic sensus, hio autem motus deleri; quare fieri potest, ut, prout solummodo alteruter nervus effectus erit, et paralytis sine anaesthesia occurrat, et revera observationes extent. BILLARD (*archiv. gén. de méd. T. 4*) de uxore, hemiplegia faciali sine sensu deleta necata, refert: truncus nervi facialis transversum digitum daletus fuit. Cfr. PICHONNIÈRE *de la paralysie partielle de la face*. Par. 1830. J. CORRIGAN ex the *Edinb. m. and phys. journ.* 1830. Septbr. p. 91. in *BERNARD Journ.* 1830. II. 8. p. 231. Casum eximium paralytis nervorum motui dicatorum faciei unius lateris habet KINSM, *klinische Beitr.* Lpz. 1834. Th. I.

tio impedita. Nec lingua, nisi quid apoplectici lateat<sup>74)</sup>, laedi solet<sup>75)</sup>. Contra autem verisimile est, musculos maxillam inferiorem adducen-tes<sup>76)</sup> in senibus paresi laborare; saltem continuus maxillae motus masticatorius, cui indulgere so- lent, aliter vix explicari potest, quam per repeti- tos nisus labentem per proprium pondus maxillam attollendi<sup>77)</sup>.

Paralysis  
colli.

7. *Musculorum colli, caput sustentantium*<sup>78)</sup> paralysis, pulchre a QUELMALZ<sup>79)</sup>, RUST<sup>80)</sup> aliis- que<sup>81)</sup> nomine *capitis obstipi* descripta est. Hic

caput

74) Ut in casa a KŁOKOW l. c. p. 24 relato.

75) Uvulae obliquitatem editor huj. op. in hemiplegia faciali semel observavit. A. SHAW de hoc phaenomeno disserens, affectionem rami digastrici portiones dextrae accusat (*Lond. med. gaz.* Vol. 21. p. 164. Cfr. SCHMIDT *Jahrb.* 1839. B. 21. p. 195 et 196).

76) M. temporalis, massetar, pterygoideus internus. Nervis, quos a Quinto accipiunt, prope ganglion Gasseri irritatis, muscoli moventur incitanturque; nervis percissis mandibula paralytica labitur. ROMBERG *neuropathol. Stud.* in RUST *Mag.* 1830. B. 30. H. 2. p. 281.

77) BRÜCKMANN *Untersuch. d. Ursachen, woher d. beständige Beweg. der untern Kinnlade bey alten Leuten rühre.* Braunschw. 1752.

78) Musc. biventer cervicis et complexus, m. splenius capi- tis, m. trachelomastoideus.

79) Progr. de musc. capitis extensorum paralyti. Lips. 1754. v. HALLER *Samml. acad. Streitschr.* CARLL *Auszüg.* 1. B. Helmsl. 1779. p. 124.

80) l. c. p. 78 sq.

81) MAUCHART diss. sist. caput obstipum. Tüb. 1737. in HERRN disput. chir. salut. T. II. RUTTIG diss. sist. caput obstipum. Bud. 1783. G. GREYER diss. de capite obstipo.

caput antrorsum veluti sub somno profundo super sedile capto, pendulum observatur. Legitur puer post lapsum habuisse manus et brachia et quosdam musculos capitis paralyticos, ita, ut caput nunc antrorsum, nunc retrorsum dilaberetur, simul ac truncum corporis huc illucve inflecteret<sup>82)</sup>. Aliis aegroti, sanitate fruentes, solum capiti debitum situm aliter conciliare nequeunt, quam propriis vel alienis manibus, seu artificio quodam<sup>83)</sup>. Sunt inter eos, qui loquantur, alii non nisi ejulatus edere queunt. Sensus in musculis affectis perstare solet.

## 8. De

Traj. ad Rhen. 1786. GILBY ex Lond. m. journ. 1790. T. IV. N. 12. in Samml. auserles. Abh. f. pr. A. B. 14. p. 355. ABRAHAMSON in MECKEL n. Archiv. B. 1. Abth. 3. N. 25. A. G. RICHTER Anfangsgr. d. Wundarzneik. B. 4. p. 256. SYMR Durchschneid. d. M. sternomast. wegen unheilb. schiefen Halses; ex the Edinb. m. and s. j. 1833. Apr. in BECKERND allg. Repert. 1833. N. 4. p. 24. AMUSAT Heil. ein. schief. Hals, durch Durchschneid. des Sternocleidomast. ex gaz. méd. 1834. N. 52. p. 829. in GERSON u. JUL. Mag. 1835. St. 2. De paralyti colli, strychnini medio sanata, PELLETAN in SCHMIDT Jahrb. 1835. B. 5. p. 230 verba facit. DIEFFENBACH Durchschneid. des Musc. sternocleidomast. u. Heil. des schief. Hals. in med. Ver.-Ztg. 1838. N. 27 (de 37 casibus rationem reddit). LEHMANN Durchschneid. des rech. Musc. sternocleidomast. unter d. Haut beim schiefen Hals, in med. Ver.-Ztg. 1839. N. 2.

82) Acad. des sciences l'an. 1741. hist. p. 104.

83) Duo hujusmodi exempla, unum Madiolani in cantore, aliud in femina Novocomensi, Domina Scalini vidi. Haec caput obstipum acquisivit, quum aestivo tempore, leviter vestita, inter januam et fenestras apertas, sederet.

Paralysis  
musculo-  
rum tho-  
racis et  
abdomi-  
nis.

Paralysis  
extremi-  
tatum su-  
periorum.

8. De *paralysi musculorum thoracis et abdominis*<sup>84)</sup> mentionem jam injecimus<sup>85)</sup>.

9. *Paralysis extremitatum superiorum*, prout musculi huc spectantes vel omnes vel partim resoluti sunt, varia exhibet phaenomena. Nequit enim saepe *humerus* modo extendi et ad thoracem adduci<sup>86)</sup>, modo retrorsum trahi<sup>87)</sup>, modo elevari<sup>88)</sup>, modo intus<sup>89)</sup> aut extus<sup>90)</sup> converti; — interdum nequit *antibrachium* flecti<sup>91)</sup>, extendi<sup>92)</sup>, supinari<sup>93)</sup>, pronari<sup>94)</sup>. Eadem impotentia respectu motus *carpi*<sup>95)</sup> locum invenit<sup>96)</sup>. *Digiti* neque-

84) COPLAND l. c. p. 12. 13.

85) C. I. §. II. 4. 5. Cfr. HUVELAND merkwürd. Krankheitsfall ein, eigenthüml., jetzt häufiger werdend, Art d. Lähmung; in ejusd. Journ. 1826. St. 2. p. 103. CRAMER Paraplegie, in RUST Mag. 1828. B. 25. H. 3. p. 551. ZANGEL üb. eine eigene v. R. M. ausgehende Lähmung, in HUVELAND Journ. 1830. St. 12. p. 54. L. STROMAYER üb. Paralyse d. Inspiratione-Musk. Hannov. 1836. et in CASPER Wochenschr. 1837. N. 3. 4. LEINWEBER Lähm. ., des link. gross. Brustmusk. in med. Ver.-Ztg. 1837. N. 29.

86) Ex paralysi m. pectoralis majoris.

87) Ex paralysi m. latissimi dorsi.

88) Ex par. m. deltoidei et coracobrachialis.

89) Ex par. m. subscapularis.

90) Ex par. musc. supraspinati, infrespinati, et teretis minoris.

91) Ex par. musc. bicipitis brachii seu coraco-radialis et brachialis interni.

92) Ex par. musc. tricipitis s. m. anconaei magni et anconaei parvi.

93) Ex par. m. supinatoris longi et brevis.

94) Ex par. m. pronatoris rotundi et quadrati.

95) C. R. PEMBERTON die Lähm. d. Hände, in ejusd. pract. Abh. üb. verschied. Krankh. des Unterleib. A. d. Engl. v.

nequeant nunc extendi<sup>97)</sup>, nunc flecti<sup>98)</sup>, nunc ad latus moveri<sup>99)</sup>. Sic et *pollex*<sup>100)</sup>, *digitus index*<sup>101)</sup>, *medius*<sup>102)</sup>, *auricularis*<sup>103)</sup> et *minimus*<sup>104)</sup>. Quandoque *ligamenta* cum musculis resolutis commercium prope alentia *relaxantur*, unde *luxationibus spontaneis* ansa porrigitur<sup>105)</sup>.

## 10. Para-

G. v. D. BUSCH. *Brem.* 1817. p. 159. HENZOG üb. Lähm. d. Hände u. Füße in med. Ver-Ztg. 1837. N. 25. hist. I., III et VI.

96) Ex par. musc. flexorum carpi, radialis et ulnaris extensorum carpi radialis longi et brevis, nec non ulnaris.

97) Ex par. m. extensoris quatuor digitorum communis.

98) Ex par. m. flexoris quatuor digitorum sublimis et profundus, nec non lumbricalium.

99) Ex par. musc. interosseorum internorum et externorum.

100) Ex par. m. extensoris pollicis longi et brevis, — ex par. m. flexoris pollicis longi et brevis, — ex par. m. abductoris longi et brevis, ex par. m. adductoris et opponens pollicis.

101) Ex par. m. extensoris indicis proprii; ex par. m. abductoris indicis.

102) Ut tremore (v. cap. IX. §. XLIII. 1 (5)), sic et paralyti hi tres digiti impotentes fiunt scribendi, de quo plures observationes exstant: ALBERS üb. ein. eigenthüml. Krampf d. Finger beim Schreiben, in med. Ver.-Ztg. 1835. N. 9. A. TH. BRÜCK in HUFELAND Journ. 1835. St. 4. p. 89 (duos similes casus affert). TROCHSEL paralytic extensionum digitor. man. dextree, in med. Ver.-Ztg. 1836. N. 44.

103) Ex par. m. flexoris brevis, abductoris, adductoris.

104) Ex par. m. adductoris. WHITE *Hysterie mit beständiger Abduction des kl. Fingers u. Aphonie*, ex Lond. m. and s. Journ. 1835. Aug. in FROBIEF Notiz. B. 45. N. 18. p. 296.

105) C. II. §. VIII.

Frank Prax. II, I. 2. 1.

N n

Paralysis  
extremi-  
tatum in-  
feriorum.

10. *Paralysis extremitatum inferiorum* nisi perfecta sit, impedimenta motus partiatim prodit. Sic desideratur aliquando potestas *femur* elevandi<sup>106</sup>), aut femur elevatum retrorsum extendendi<sup>107</sup>), extrorsum vertendi<sup>108</sup>), aut femora invicem adducendi<sup>109</sup>), divergendi<sup>110</sup>), aut femur unum alteri imponendi<sup>111</sup>), aut *crus* extendendi<sup>112</sup>), flectendi<sup>113</sup>), aut *pedem* flectendi<sup>114</sup>), extendendi<sup>115</sup>), intus<sup>116</sup>), extus<sup>117</sup>) vertendi, aut *digitos pedum* flectendi<sup>118</sup>), extendendi<sup>119</sup>), a se invicem removendi et appropinquandi<sup>120</sup>), aut *hallucem* extendendi<sup>121</sup>), flectendi<sup>122</sup>), a reliquis

106) Ex par. m. psoae et iliaci interni.

107) Ex par. m. glutaeorum.

108) Ex par. m. glutaeorum, pyriformis, gemellorum, obturatorii interni et externi, quadrati femoris.

109) Ex par. m. bicipitis femoris, pectinaei.

110) Ex par. musc. glutaeorum, praesentim maximi at medii.

111) Ex par. m. gracilis et sartorii.

112) Ex par. musc. recti femoris, vasti externi et interni, cruralis.

113) Ex par. musc. bicipitis femoris, semi-tandinosi, semi-mambranosi, poplitei.

114) Ex par. tibialis antici, peronaei secundi at tertii.

115) Ex par. gastrocnemiorum, solai, plantaris. HANCOCK l. c. cas. II., IV et V.

116) Ex par. m. tibialis postici.

117) Ex par. m. peronaei longi.

118) Ex par. m. flexoris quatuor digitorum longi et brevis, lumbricalis.

119) Ex par. m. extensoris digitorum longi, brevis.

120) Ex par. musc. interosaeorum internorum et externorum.

121) Ex par. m. extensoris hallucis longi, brevis.

122) Ex par. m. flexoris hallucis longi et brevis.

liquis digitis abducendi<sup>123</sup>), adducendi<sup>124</sup>). Paralysis interdum contractionem musculorum morbosam sociam agnoscit<sup>125</sup>).

11. Aegri Beriberi<sup>126</sup>) laborantes genubus Sympto-  
N n 2 retri-mata Ra-  
riberii.

123) Ex par. m. abductoris hallucis.

124) Ex par. m. adductoris hallucis.

125) Die 20. Maji 1829 vir aetatis mediae consilium meum propter paralyisin cruris dextri post lapsum in dorsum ortam, exposcebat. Patella dicti cruris adeo firmiter partibus subjectis adhaerebat, ut plane immobilis fuerit. Ex schedis autoris.

126) De hoc morbo legi merentur: JAC. BONTIUS medie. Indiae orient. Lib. II. C. 1. MANGETI biblioth. pract. (asseritur, hunc morbum jam Erasistrato fuisse notum). TULPIUS obs. Lib. IV. C. 5. SAUVAGESIUS nosolog. method. Classis IV. Gen. 22. THOMAS the modern practice of phys. New-York 1817. W. HAMILTON Bemerk. üb. d. Nat., Ursach. u. Behandl. des Beriberi; ex transact. of the med. chir. soc. of Edinb. 1826. Vol. 2. in GERSON u. JUL. Mag. 1827. St. 4. p. 153 (malum endemicum in Cailano, litoribus Malabaricae et in parte septentrionali praefecturae Madras, raro longius 60—70 milliariis citra mare in terram mediterraneam pertinens, praecipue tempore Etesiarum occurrit. Causa ejus excitans transpiratio suppressa, et proxima, congestiones ad organa interna esse videntur). J. WHITENHAD MACHEN üb. d. Krankh. Beriberi, ex the lancet. 1832. Septbr. 15. in HANNEL Summar. des Neuesst. a. d. in- u. ausländ. Med. Lpz. 1832. B. 3. p. 420. P. W. WRIGHT üb. d. Beriberi, ex Edinb. journ. 1834. Apr. in SCHMIDT Jahrb. 1834. B. 4. p. 301 (parcet infantibus, foeminasque raro ingreditur. Cum hydropse complicari non desinit). A. SEGOND essai sur la neuralg. du grand sympath., maladie connue sous les noms de coliq. végétale, de Poitou, . . . de Beriberi etc. Par. 1837. Cfr. FRICKS u. OPPENH. Ztschr. 1838. B. 8. H. 3. p. 332—344.

retractis elevando crura tanquam oves progrediuntur. Praeter debilitatem universalem sensus et motus extremitatum est imminutus, cum vocis exilitate, raucedine; immo accedit non raro pectoris musculorum crampus, qui anhelitum et vocem intercludit.

Necropsopia.

12. *Paralyticorum cadavera* obtulerunt in *encephalo*, atque hîc, si pauca excipias exemplâ<sup>127)</sup>, in *latere resolutioni opposito*<sup>128)</sup>: crassitiem<sup>129)</sup> et cariem<sup>130)</sup> cranii, meningis sanguine ple-

127) SCHLICHTINGO *traumatologia*. BIANCHI *storia medica d'un apostema nel lobo destro del cerebello che produsse la paralizia della parte destra in una giovinetta*. Rimini 1772. REIL *mem. clin.* Fasc. IV. N. 4. A. L. J. BAYLE *mém. sur l'existence de la paralysie du même côté que la lésion cérébr.*, qui la détermine, in *indicateur méd.* 1824. Avril. Cfr. GERSON u. JUL. *Mag.* 1824. St. 4. p. 143. *Paralysie du même côté que la lésion cérébr.* in *revue méd.* 1828. Nouvbr. p. 299. R. LAW *ex the Dublin hosp. reports*, 1830. Vol. 5. in n. *Samml. auserles. Abh. f. pr. A.* 1832. B. 15. St. 2. p. 356. HILSENBERG l. citando.

128) DU PUI *diagn. de homine dextro et sinistro*. CALDANI in *saggi scientif. e letterar. dell' acad. di Padova*, T. I. 1786. MONTAGNA Fasc. *patbol.* BICHAT *anatomic générale*, T. I. p. 121. MEHLIS *commentat. de morb. hom. dextri et sinistri*, Goett. 1818. H. THIAUDIERRE *ex la cliniq.* T. 3. p. 68. in FROBIEP *Notiz.* 1829. B. 23. N. 15. DELORME *üb. Krankheit. des klein. Gehirns*, ex la *cliniq.* 1829. Févr. FROBIEP l. c. N. 22.

129) HORN *Uebers.* etc. in ejusd. *Archiv.* 1833. H. 1. W. DAVIDSON l. citando. J. JOHNSON *Lähm. d. Zunge u. d. Schlingmuskeln ohne Apoplexie od. Feränder. d. Sinnesverrichtungen*, ex *med.-chir. rev.* 1836. N. 49. in SCHMIDT *Jahrb.* 1837. B. 16. p. 195.



plenas<sup>131</sup>), crassiores<sup>132</sup>) et decolores<sup>133</sup>), cum tuberculis<sup>134</sup>) et ossificationibus<sup>135</sup>), lympham inter eas et cerebrum<sup>136</sup>); festucas cerebrum comprimentes<sup>137</sup>), portionis cerebri impressionem<sup>138</sup>), indurationem<sup>139</sup>), emollietiem<sup>140</sup>), atrophiam<sup>141</sup>),

130) Eph. n. e. cent. IX. obs. 14. RHODIUS cent. I. obs. 34. ABENCRONBIN on the disease of the brain and spin. cord. edit. 2. p. 443. R. LAW Hemiplegie ohne sichtbare Veränderung d. Gehirneubstanz, in n. Samml. auserles. Abh. f. pr. A. 1832. B. 15. St. 2. ROMBERG l. c. CHRISTISON l. c. p. 109. cas. I. p. 110. cas. II. HILSENBERG in Rust Mag. 1837. B. 5. H. 3. Abth. 8.

131) TAVERNIER l. c. (arachnoidea cerebri). STÜVN halbseit. Lähm. etc. in GHAFFR u. W. Journ. 1827. H. 10. H. 1. p. 142. W. SERRIG in SCHNIDT Jahrb. 1834. B. 1. p. 94 (dura mater). J. JOHNSON l. c.

132) TAVERNIER l. c. BREHEND allg. Repert. 1830. H. 2. p. 151. ex n. biblioth. méd. 1829. Octbr. GREGORY et COSTELLO l. c. hist. I.

133) TAVERNIER l. c. (arachnoidea cerebelli lacteo-elba). BREHEND l. c. (arachnoidea cerebri fusca).

134) EARLE l. c. (in dura matre). ROMBERG l. c. hist. III.

135) BELL in GERSON u. Jul. Mag. 1831. St. 6 (in dura matre). L. Zungenlähm. v. organ. Hirnleid. in med. Ver.-Ztg. 1835. N. 5.

136) STÜVN l. c. 137) HENSTER Wahrnehmungen. 2. B.

138) ABENCRONBIN l. c. p. 119 (viri, hemiplegie dextra mortui, cerebrum in latera sinistro plane impressum). CHRISTISON l. c. p. 110. cas. I.

139) Aesculap v. WERNER u. RULAND. 1. B. p. 283. SCHNIDT Jahrb. 1834. B. 2. p. 191. J. JOHNSON l. c.

140) DENONVILLIÈRE rothe Erweichung des Gehirns mit Lähmung, in KALISCH med. Ztg. des Ausl. 1833. N. 11. ROSSAN in SCHNIDT Jahrb. 1835. B. 5. p. 189. CRAIGIE ib. B. 6. p. 114. L... l. c.

phiam<sup>141</sup>), degeneraciones<sup>142</sup>), cruorem<sup>143</sup>) et serum<sup>144</sup>) in ventriculis, corpus striatum degeneratum<sup>145</sup>), omnino a cerebro separatum<sup>146</sup>), item thalamos nervi optici<sup>147</sup>) et medullam oblongatam<sup>148</sup>)

141) BELL *Beobacht. v. Atrophie d. einen Gehirnhälfte mit ein. complett. Paralyse d. entgegengesetzt. Körperhälfte*, ex bull. méd. 1831. Mai. in GERSON u. JUL. *Mag.* 1831. II. 6 (atroph. lobuli dextri cerebri et cerebelli).

142) ARNCRONSK I. c. (substantia dissoluta). STÜVE I. c. (degeneratio hemisphaer. sinistri in hemipleg. dextra). AMMAN in *Verhandl. d. vereinigt. ärztl. Gesellsch. d. Schweiz. Jahrg.* 1830. 2. Hälfte. Zür. 1831 (hemisphaer. sinistrum quasi dissolutum in hemiplegia dextra).

143) TAVERNIER I. c. (coagulum cruentum in lobulo medio sinistri hemisphaerii). *Patholog. Anatom. üb. Lähm.* ex n. bibl. méd. 1829. Septbr. in BEHREND *allg. Repert.* 1830. N. 1. p. 67 (cruor in ventriculis). OEHLEK in *PARST allg. med. Ztg.* 1835. II. 2 (cruor extravasat. in ventriculo laterali dextro et hemiplegia sinistra).

144) PRUOLD obs. med. chir. N. 60. A. VULPEAU I. citando. hist. III. STÜVE I. c. (in ventriculo sinistro hemiplegia dextra defuncti). EARLE I. c. GREGORY et COSTELLO I. c. hist. I. SCHMIDT *Jahrb.* 1834. B. 2. p. 191. CRAIGIE in SCHMIDT *Jahrb.* 1835. B. 6. p. 114. HILSENBERG I. c. (saepius vidi).

145) WENZEL op. c. (in capite praecedente). FOVILLE et PINEL-GRANDCHAMP *recherch. sur le siège spécial de différent. fonctions du syst. nerv. Par.* 1823 (degeneratio cancrosa). BEHREND *pathol.-Anatom.* I. c. p. 66 (in hemiplegia sinistra corp. str. in latere dextro kystam apoplecticam includebat), p. 67 (emollitum et cruore infiltratum). Idem I. c. N. 2. p. 151 (inflammatum). HACKER *lit. Annal.* 1830. H. 6. p. 217. ex *journ. des progr. Vol.* 11 (emollitum, griseum). R. LAW I. c. p. 356 (mollitum).

146) MORGAGNI de sedibus et caus. morb. epist. XI. 2.

tam <sup>148</sup>) alienatos, pus in sacco inclusum <sup>149</sup>),  
 steatoma pugni magnitudinis inter cerebrum et ce-  
 rebellum <sup>150</sup>), hydatides <sup>151</sup>) et tumores <sup>152</sup>) in  
 ence-

147) BREHEND *pathol.-Anat.* l. c. p. 67 (thelam. dexter kystam apoplecticam includens et altero in casu destructus).  
 HUCKER *lit. Ann.* l. c. p. 217 (emollitus et flavus). R. LAW  
 l. c. p. 356 (uterque emollitus). GREGORY et COSTELLO  
 l. c. hist. I.

148) BREHEND *pathol.-Anat.* l. c. p. 67. L... l. c. (durissime).  
 J. JOHNSON l. c. (emollita).

149) PROCHASKA *annotetiones oecademicæ.* Prag. 1784. Fasc. 2.  
 Sect. 2. C. 2. W. STOCKES ex *Dublin journ.* 1834. Vol. 15.  
 in SCHMIDT *Jahrb.* 1835. B. 8. p. 81 (abscessus in hemi-  
 sphærio dextro). HILSENBERG l. c. (pus in hemisphærio  
 cerebelli dextro).

150) DARLINECOURT in BONNETI *sepulchr. anat.* Lib. I. Sect. 1.  
 p. 123.

151) *La cliniq.* T. 4. N. 28.

152) TAVERNIER l. c. (in lobulo sinistro cerebelli tumor cy-  
 sticus, serum continens). ESQUIROL apud ANDRAL *Anleit.*  
*d. speciell. Pathol. u. Therap.* v. BRESSLER u. JACOBSON.  
 B. 1. H. 6. p. 815 (duo tumores cancrosi in hemisphæriis,  
 totidemque tumores medullares, de quibus *la cliniq.* T. 4.  
 N. 47. EARLE l. c. (in substantia cerebri tres tuberculi  
 serophulosi). BELL l. mox citando (tuberculi). GREGORY  
 et COSTELLO l. c. hist. I. SHERRIE l. c. (fungus medullaris  
 in hemisphærio sinistro in hemiplegia dextra). J. BISHOP  
 in SCHMIDT *Jahrb.* 1834. B. 2. p. 136. ex *Lond. m. gaz.*  
 1833. P. III. Vol. 1. Decbr. 21 (tumor scirrhusus). SCHMIDT  
*Jahrb.* l. c. p. 191 (t. fungosus). W. DAVIDSON *theilweises*  
*Lähm. mit Scirrhus des Gehirns,* ex *monthly archiv.* 1834.  
 March. in SCHMIDT l. c. 1835. B. 5. p. 167. STANNIUS  
*unvollkomm. Hemiplegie ... veranlaßt durch eine Balg-*  
*geschwulst im Gehirne,* in *med. Ver.-Ztg.* 1835. N. 19.  
 CHRISTISON l. c. p. 110. cas. I. et II. J. JOHNSON l. c. (er-

encephalo et ad pontem Varolii<sup>153</sup>), in *columna vertebrali*, atque hic concessis paucis exceptionibus<sup>154</sup>), in *latere paralyti respondente*<sup>155</sup>): gibbositates varias infra accuratius describendas, tumores<sup>156</sup>) sese inter processus spinosos ad ipsum spe-

taria valde amplificata corpus olivare et pyramidale comprimens). HILSENBERG l. c. (tuberculus in substantie corticali). MARTINY in DIEFFENBACH *Ztschr.* 1837. B. 5. St. 4 (stomatoma in hemisphaerio cerebelli *dextro*; hemiplegia *sinistra*).

153) YELLOLY in *medico-chir. transact.* Vol. I. N. 16. BELL ex arch. gén. 1831. Mars. in SCHMIDT *Jahrb.* 1834. B. 3. p. 312 (tuberculus magnitud. nucis avellanae).

154) Sic ex SOMMERINGII verbis concludimus: „laesa vero spinae medullae latere, plerumque idem corporis latus afficitur“ (de corp. hum. fabrica T. 4. §. 85. p. 87). A. VULPRAU *Lähmungsfälle mit u. ohne Verletz.* ex *revue méd.* 1826. T. 2. p. 247 in GERSON u. *Jul. Mag.* 1827. H. 2 (in hemiplegia *sinistra* defuncto pars medullae cervicalis *dextra* abcessum continebat).

155) SALICETO chirurg. libri V. p. 330. RUELAND p. 349. MORGAGNI epist. anatom. XIII. Art. 20. 21. DUPUI l. c. Sect. 2. cap. 1. §. 5. ANDERSON *medical journ.* Vol. II. HALLER physiol. T. IV. p. 134 nians: „in medulla spinali . . . . id latus corporis resolvitur, in quo ea medulla vulnus passa est, aut pressionem.“ RACCHATTI l. c. p. 270.

156) Agnum posterioribus ertubus claudicare, cui *callus* erat circa spinalem medullam, jam in *Talmudo* habetur. HALLER bibl. med. pr. T. I. §. 119. p. 333. Cfr. PALLETTA exercit. pathol. p. 62 (histor. tumoris cervicalis cum paralyti ac morte, ex carie vertebrae cervicalium secuta). *Ueb. eine faserigte Geschwulst, die sich auf dem Knochenbogen der vordern Wurzeln des 9. Rückenpaar. d.*

specum issinuantem <sup>157</sup>), spinam bifidam <sup>158</sup>),  
vertebrarum mollitiem <sup>159</sup>), cariem <sup>160</sup>), destru-  
ctionem <sup>161</sup>), consumptionem <sup>162</sup>), luxationem <sup>163</sup>),  
fra-

Rückenmarksnerven gebildet hatte, ex n. bibl. méd. 1827.  
Mai. in *FRONIER Notiz*, 1827. B. 18. N. 2. p. 25. Para-  
plegia, beruhend auf einer, das R. M. zusammendrückenden  
Krebbsgeschwulst; in *BEUKEND allg. Repert.* 1833. N. 10.  
p. 76. ex soc. de Par. (SESTIERS et CREVIERIER).

- 157) COPLAND op. c. p. 7. 158) C. IV. §. XVII. N. 3.  
159) FRANK orat. eod. de vertebr. columnae in morbis  
dignitate. LUDWIG de distorta spine dorsi v. adversar.  
med. pract. Vol. 2. RACCHETTI l. c. p. 292. BOSTOCK in  
*medico-chir. trans. published by the med. and chir. soc. of  
Lond.* Vol. 4. 1813 (Ex analysi chemicae vertebrarum dor-  
salium emollitarum apparet: ossa huc in morbo dimidium  
minus materiae terreae possidere). A. VELPEAU l. c.  
hist. II. (vertebrae cervicales fere cartilagineae). CRAIGIE  
in SCHMIDT *Jahrb.* 1835. B. 6. p. 114. L. M. RAY l. citando.  
obs. 13.

- 160) COWPER *anatom. of human body.* v. HALLER bibl.  
chir. Vol. 1. p. 519 (innumerebilia exempla paralyseos ex  
carie vertebrarum mea suppeditet praxis). Cfr. HELM l.  
mox citando. PALLETTA l. c. KUNKE l. citando. OMORDI  
*annal.* 1832. Luglio. p. 207 (caries vertebr. cervical.).  
CRAIGIE l. c. CLASS in *Würtemb. med. Corr.-Bl.* 1834.  
N. 38.

- 161) LUDW. FRANK *storia d'una paralizia.* v. *Nuovo giorn.  
medico-chir. di Milano.* T. 4. KILIAN apud COPLAND  
l. c. p. 63. CRAIGIE l. c.

- 162) „Die 11. m. Januar. 1800 D. Dr. HELM, discipulus  
meus, columnam vertebralem pueri 12. fere annorum,  
magno ingenio quondam praediti, sed cyphosi laborantis  
aeque prurum exhino paralyti, pro quo et egomet ipse  
duce apte annos in consilium vocatus fueram, — ed me  
tulit. Duodecim vertebrae ex dorsalibus et lumbalibus

fracturam<sup>163</sup>), cartilaginum intervertebrali-  
um ossificationem<sup>164</sup>), intumescuntiam corporum ver-  
tebrali-um<sup>165</sup>), depositionem materiei osseae ad  
illa<sup>166</sup>), serum<sup>167</sup>), ichorem<sup>168</sup>), sanguinem in  
specu

carie erant affectae, sed duae ex his ultimis protinus fue-  
runt consumptae.<sup>169</sup> Ex schedis J. P. FRANK. Cfr. E. HARRI-  
son in the Lond. med. and phys. journ. 1823. Vol. 49 (ex  
abscessibus musculorum psoas inter se per consumptionem  
primae at secundae vertebrarum lumbalium communica-  
tionem, paraplegia). L. M. RAY l. citando. obs. 13.

163) CHLUS L. VIII. C. 4. COLLOMB med. chir. Werke.  
obs. 49. Cfr. C. 1. §. 1.

164) Act. met. cur. Vol. II. obs. 51. GREEN in the lancet.  
Vol. 5. p. 382 (fractura arcus vertebrae 6. cervicalis). J. BE-  
DINGFIELD comp. of med. pr. p. 264 (fractura processus  
spinosi et arcus vertebrae 5. cervicalis). SMITH ex n.  
Amer. s. and m. j. in FROBIE Notiz. 1829. B. 26. N. 5.  
p. 78 (paralysis ex fractura processus spinos. trium ver-  
tebrarum. Sanatio duobus annis praeterlapsis fragmentis,  
medullam spinalem comprimentibus, manu chirurgica  
ablati).

165) COPELAND l. c. LAWRENCE Fall v. Verknöcher. des  
Hinterhaupt. u. d. 3 erst. Halswirb. ex the lancet. T. 11.  
p. 31. in GIBSON u. JUL. Magaz. 1826. St. 6. p. 437. —  
Eorum protuberantiam: A. KEY ex Guy's hosp. rep. 1838.  
in FROBIE Notiz. 1838. N. 162. p. 122. 1840. B. 13. N. 6.  
p. 94. et in FRICKE u. OPPENH. Ztschr. 1839. B. 2. H. 2.  
p. 226.

166) POTT op. c. (in cap. nostro l. §. 1 (32)). Eorumque  
ligamentorum: A. KEY l. c.

167) Rarius id contingere esset COPELAND l. c. p. 5; idem  
asseruit GÖTZE de morb. ligamentorum. Berol. 1799.

168) COPELAND l. c. p. 7. J. J. BÖMER de hydrorhachia  
s. hydrope medullae spin. Hal. 1795. In BRENA sylloge  
opusc. Vol. IV. p. 99. In eagro ex paraplegia in clinico

specu extravasatum <sup>170</sup>), hydatides ibi nidulantes <sup>171</sup>), ulcus intra canalem <sup>172</sup>), meninges spinales incrassatas <sup>173</sup>), vasculosas <sup>174</sup>), arachnoideam granis cartilagineis obsessam <sup>175</sup>) et degeneratam <sup>176</sup>);

instituto Vilnensi mortuo, a quinta vertebra ad os sacrum usque extravasatum serosum unciae unius reperimus. HORN *Uebersicht* etc. in ejusd. *Archiv.* 1833. H. 1 (in parte lumbali uncia equae). GREGORY et COSTELLO l. c. hist. II. D. CRAIGIE in SCHMIDT *Jahrb.* 1835. B. 6. p. 113 et 114. GRISOLLE ex *journal. hebdom.* 1836. N. 10. in SCHMIDT *Jahrb.* 1836. B. 11. p. 30.

169) HORN *clinische Versuche.* p. 267.

170) DU VERNET v. DUNAMEL reg. scient. acad. hist. en. 1663. Sect. 5. C. 2. p. 264. RAHN *Museum d. Heilk.* 4. B. p. 397. COPPLAND l. c. p. 5 (Maltae propriae observationes idem docent. E. c. in aegrotto, nunc ipso memorato, a vertebra 4. colli ad quintam dorsi sanguinis coagulum valde copiosum ad meninges adhaerebat). Cfr. MONOD et CRUVEILHIER in KALISCH *med. Ztg.* 1833. N. 16. GREGORY et COSTELLO l. c. hist. II.

171) CHAUSSIER in *journal. de méd. continué.* Vol. 14. p. 231. (cysticercus cellulose). M. MÄLIER ex *journal. gén. de méd.* 1825. Juill. in FROBIEF *Notiz.* 1825. Decbr. p. 317 (acrophalocystes).

172) COWPER l. c.

173) COPPLAND l. c. p. 4 (\*\*). p. 55. HORN l. c.

174) COPPLAND l. c. p. 26. In aegrotto nostro meninges nonnullis in locis colore rubro notatae et in tota earum superficie vasa sanguinea turgida erant. HORN l. c. GREGORY et COSTELLO l. c. hist. II. ULRICH *chron. Fentz. d. R. M.* (c. paralyti extremis) in CASPER *Wochenschr.* 1836. N. 9.

175) A. VESPRAN in *archiv. gén. de méd.* 1825. Janvier (in homine, paraplegie complete necato). J. K. MÜLLER in *bibl. for Läger.* B. 4. p. 249 (extravasatum cruentum inter musculos et spinem, nec non in illius cavitate inter ver-

ratam<sup>176</sup>); medullam spinalem induratum<sup>177</sup>), hypertrophicam<sup>178</sup>), emollitam<sup>179</sup>), consumtam<sup>180</sup>), quasi divisam<sup>181</sup>), exsiccata<sup>182</sup>), illius fungum<sup>183</sup>), excrescentias<sup>184</sup>), degenerationem<sup>185</sup>),

incras-

taeum cervicis 6. et dorsi 9. J. HEDINGFIELD l. c. MONTESANTO l. c.

176) COOKE ex Hunter, *soc. of Lond.* 1832. in BERKEND *allg. Repert.* 1833. N. 6. p. 212.

177) MARY in *medical obs. and inquiries.* 3. Vol. p. 95. MARX l. citando (portuunculae duriores et excavatae, materiam mellem, griseo-rubeolam includentes; en kystas apoplecticas?).

178) MARX l. citando („bedeutend vergrößert u. blutreich; beide Substanzen nicht mehr zu unterscheiden“).

179) MAISONNEUVE l. c. GIERL l. c. hist. IV („auffallend kleiner, weisser u. weicher“). ROSTAN l. c. (fero fluida). D. CHAIGIE l. c. p. 113 et 114. L. M. RHY l. citando. obs. 12. 13. L. . . l. c. GRISOLLE l. c. J. JOHNSON l. c. (pars superior una cum medulla oblongata et ponte Var.).

180) COPLAND l. c. p. 26. HERN l. c. (tota medulla, in primis cauda equina). MAISONNEUVE l. c. (substantia grisea).

181) FLOUQUEY hist. morbi singularis paralytici. Tubing. 1806.

182) SALEMANN act. nat. cur. T. II. obs. 102.

183) PHILIPS in *the new Lond. med. journ.* 1792. Vol. I. Par. 2. Cfr. RICHTER *chir. Bibl.* 15. B. p. 77. VELPHEU l. c. (fungus medullaris a 6. vertebra cervicis usque ad 3. dorsi).

184) Paralysis ab insolita medullae spinalis excrescentia describit J. SALTSMANN in act. phys. med. nat. cur. Vol. II. obs. 102.

185) HARTLESS u. RITTER *Journ. d. ausländ. med. chir. Liter.* 8. B. 1. St. p. 59. In aegro, de quo supra: medullae spinalis ad regionem vertebrae 7. colli ipsa nerva substantia flaccida, dissoluta quasi, sanguine suffusa. OLLIVIER



incrassationem vaginae nervi duri<sup>186</sup>), — cor abnorme<sup>187</sup>), aortam vinctam<sup>188</sup>), musculos membrorum paralyticorum incompletos<sup>189</sup>), albi coloris<sup>190</sup>), in substantiam infirmam similem illi, quae in steatomatibus deprehendi solet, degeneratos<sup>191</sup>).

## §. LXL

## C a u s s a e.

1. *Disponunt* ad paralytin: vitium haereditarium<sup>1</sup>), aetas infantilis<sup>2</sup>) et senilis, sexus masculinus<sup>3</sup>), temperamentum sanguineum et cholericum<sup>4</sup>), quies

l. c. p. 334 (radices nervorum spinalium anteriores abnormi consistentia. Autor de viro, qui septem annos paralyti membrorum inferiorum laboraverat, refert). MAISONNEUVE in KALISCH *med. Ztg. des Ausl. Jahrg. 2. N. 25* (pars medullae superior). CRAIGIE l. c. p. 113 et 114.

186) FRIEDERICH l. c.

187) SCHMIDT *Jahrb. 1834. B. 2. p. 191*. CHRISTIAN l. c. p. 110. cas. III.

188) VIRSSENS *neurographia universa*.

189) SALZMANN *diss. de plurium pedis musculorum defectu*. 1734.

190) MORGAGNI *op. c. epist. LXIX. 2*.

191) SALZMANN l. c. *Journ. des sçavans*. 1736.

1) ALBERTI *diss. de morb. haereditar.* 1701. LAMBIN *Beiträge*. p. 103. FLRISCHMANN *de vit. congenit. circa thorac. et abdom.* Erl. 1840. SARTORIUS *rachit. congen. obs.* Lips. 1826. et propriae observationes.

2) Loco aliorum lege J. BADHAM *Fälle v. Lähm. b. Kindern*, ex *Lond. m. gaz.* 1835. B. 17. Noubr. 14. in SCHMIDT *Jahrb. 1836. B. 12. p. 189*.

3) CALMEIL (inter mares ut 1:15; inter feminas ut 1:50), MARX II. citand.

4) CALMEIL et RODRIGUES II. citand.

quies musculorum nimis protracta<sup>1)</sup>, obesitas<sup>2)</sup>, opificia varia<sup>3)</sup>, systematis nervosi labefactatio, constitutio scrophulosa<sup>4)</sup>, rhachitica, plicosa et tandem rerum positiones encephalitidi, apoplexiae, rhachialgitidi, hydrorhachitidi et neuralgiis faventes.

C. exci-  
tantes.

2. *Excitant paralyisin violentiae externae*<sup>5)</sup>, ut lapsus<sup>10)</sup>, praesertim super caput<sup>11)</sup> et columnam

5) „Videmus hoc evidenter in mulieribus, quae pessimo more loricis, ex balaenarum ossibus factis, corpus stringunt, diu saepe noctuque: in illis totus truncus corporis sustinetur hac lorica, hinc muscoli dorsi validissimi, qui truncum corporis erectum firmant, otiantur. Unde miserae mulieres, quae a prime juventute his loricis usae fuerunt, illes postea deponere nequeunt, quin antrosum collabatur totus truncus corporis“ SWIETEN I. c. §. 1060.

6) „In nimis obesis saepe languent muscoli compressi ab abundante pinguedine, non tantum incumbant musculis, sed et interposita ubique inter musculorum fibras“ SWIETEN I. c. §. 1059. CALMHIL I. citando.

7) RODRIGUES I. citando.

8) Hanc veram POTTII observationem illustris PALLETTA vix admittit I. c. Attamen haec causae non neganda est: JAEGER in CASPER *krit. Repert.* 1830, B. 27, H. 3.

9) FLATER obs. L. I. p. 182. FORSTUS L. X. obs. 95. J. CONE. TRIUMPHUS in *act. phys. med. Vol. VI.* obs. 125. p. 419 (paralysis ex leesa spina dorsi). MAYER *Bericht etc. in Verhandl. d. med. chir. Gesellsch. des K. Zür. in d. Frühlings-Sitz.* 1827. Zür. 1828. p. 59 (ex contusione dorsi paralyseos extremitatum inferiorum casus tres).

1) KUNKE I. citando et quotidiana experientia.

10) Super abdomen: OLLIVIER op. cit. T. 2. obs. 121. p. 828 („chûte sur l'abdomen, suivie immédiatement de paralysie des 4 membres“).

lumnam vertebralem<sup>11)</sup>, harum partium concussiones<sup>12)</sup>, nismus<sup>13)</sup>; vulnus orbitae<sup>14)</sup>, perinaei<sup>15)</sup>

et

11) GÄHNLIUS diss. vizi ex lapsu lente deficientia casus. Lugd. Bat. 1662. HALLER coll. diss. pract. Vol. VIII. N. 247. GREEN l. c. (ex lapsu super caput compressio medullae spinalis et paraplegia lethalis). BEDINGFIELD l. c. (paraplegia ex lapsu). *Revue méd.* 1827, Juin. p. 499. BELL l. c. hist. VI.

12) POTT, PALLETIA, COPENLAND, RUST, et plurimae propriae observationes, imprimis in Italia ob foliorum mororum collactionem. Cfr. J. K. MÜLLER l. c. (ex lapsu cum contusione inter scapulas impotentia totum corpus, exceptis capite et collo, veluti mortuo, movendi. Postridie mors). GIRRL in HUFELAND *Journ.* 1827. St. 1. p. 95. histor. IV (ex lapsu ad os coccygis). FESTECCIANO in *osservatore med. di Napoli*. 1829. Apr. et FROMIER *Notiz.* 1829. B. 25. N. 9. C. OZLBERGER in *Oesterr. med. Jahrb.* 1832. B. 12. St. 3. p. 431. HEUSINGER in *SCHMIDT Jahrb.* 1836. B. 11. p. 97.

13) Quandoque sine omni in sensus cadente laesione. NYSTEN in *journ. de méd. continué*. Vol. XIX. p. 267. RUST *Mag.* B. 21. H. 3. p. 452. *Cas de paralysie, qui ne s'accordent pas avec les altérations rencontrées dans les cadavres.* *Bull. des sc. méd.* 1825. Août. p. 360. OLLIVIER D'ANGERS l. c. cas. I. BUSCH in HUFELAND *Journ.* 1832. St. 7. p. 52. hist. 4. G. RUSSEL MART pr. obs. on the nat. and treatm. of nervous diseases. Lond. 1835. p. 31 sq. PAVAN *Parapl. nach Commotion des R. M.* in *SCHMIDT Jahrb.* 1839. B. 24. p. 160. ROUX *parapl. a commot. medull. spin. ex gas. méd. de Par.* 1839. Mars. 30. p. 204. in HUFELAND *Journ.* 1839. St. 3. p. 121.

14) NEBEL a laboribus durioribus gibber et mors. v. *Acta acad. nat. cur.* Vol. 5. p. 387.

15) *Journal de médecine*. T. 37. p. 268.

16) KOCH vom Gesundbrunnen in *Lauchstädt*. p. 25.

et surae<sup>17)</sup> contusio, nervorum læsiones<sup>18)</sup> e. c. a venæsectione in brachio<sup>19)</sup>, a pressione<sup>20)</sup>, a morsu

17) LIE. MARON *seltene Paraplegie, ex observ. di Nap.* 1834.

*Settbr.* 1, in SCHMIDT *Jahrb.* 1835. B. 8. p. 42.

18) LEVESQUE-LASOURCE in *journal de méd. continué.* 1810.

*Juin.* p. 424. BELLINGHRI *üb. eine Læssion des 7. Nervenp.*

in FROBIEF *Notiz.* 1827. B. 18. N. 2 (paralysis omnium musculorum faciei lateris dextri ex tumore, nervum facialem ex foramine stylomastoideo exeuntem comprimente).

*Eine Paralyse d. Streckmusk. d. recht. Hand durch Verletz. des N. radialis,* in FROBIEF *Notiz.* 1828. N. 13. ALB. MAGGI *Ausrötung ein. Geschwulst in d. Ohrdrüsengegend,*

*welche eine Gesichtslähm. nach sich zog; ex OMIDDI ann. univ.* 1829. *Decbr.* in GIBSON u. JUL. *Mag.* 1831. St. 2. p. 336 (nervus facialis percussus). BLONDIOT in SCHMIDT *Jahrb.* 1834. B. 2. p. 199. ex *gaz. méd. de Par.* 1834. N. 3.

*Janu.* p. 44. PIGNAT in SCHMIDT *Jahrb.* 1834. B. 4. p. 91 (ex tumore nervi degeneratio). GRAVES in FROBIEF *Notiz.* 1837. B. 1. N. 6. EVOY KENNEDY ex *Dublin. journ.* 1837. *Jan.* in FROBIEF *Notiz.* 1837. B. 2. N. 3 (e. c. infantis in partu).

ROBOKES *paral. Nerven affect. des 3. Astes d. N. trigem. durch Ausziehen ein. Zahn. veranl. in Würtemb. med. Corr.-Bl.* 1838. B. 8. N. 18. p. 142.

19) Eph. nat. cur. Dec III. an. 9 et 10. obs. 247.

20) CRAFTMAN 1758. Dec. v. *Hamb. Mag.* 22. B. 2. St. N. 3.

Virum sub abrietate totam noctem capite brachio et manu dextra suffulto profundo somno transigentem, cum paralyai hujus extremitatis evigilatum conspexi. — „Die 2. mensis Novembris 1804 consilium meum petiit vir juvenis, qui, cum ante 5 dies super brachio sinistro obdormivisset, evigilans hoc sensit paresi, — manum vero paralyai affectam et nunc lividam, atque ab antibrachio pendentem.“ Ex schedis P. FRANK. Plane similem casum paralyseos antibrachii ex eadem causa vide opud GRAVES in FROBIEF *Notiz.* 1837. B. 1. N. 3.

morsu canis<sup>21</sup>), a scarificatione inter scapulas<sup>22</sup>), a steatmate<sup>23</sup>), aneurysmate<sup>24</sup>) tumore glandularum<sup>25</sup>), a vesica distenta<sup>26</sup>), a graviditate<sup>27</sup>),

21) Paer quetnordecim annorum mense Martio 1819 e cane non rebido ad partem inferiorem antibrachii dextri mordetur. Tria inde oriuntur vulnera cruorem largientia. Deligantur linteis. Ad sanitatem hisce ulceribus jam jam fere deductis, puer in partem affectam ex alto cadit. Aperiantur denuo ulcera, nuac pus fundentis, accedit dolor ex articulo cubiti sese ad digitos extendens; qui dolor, clausis post duos menses ulceribus, in torporem desinit, accedente puillo post impotentia brachium elevandi, supinandi et prenandi. Suscepto aegro mense Octobri ad clinicum, cicatrices ulcerum ad faciem posteriorem et inferiorem ulnae, brachii quodammodo extenuati, conspeximus. Cutis a cubito usque ad digitos erat frigida, livida, veluti macerata, ac sensu ite orbata, ut neque acus puncturam aeger perciperet. Musculi subjacentes flaccidi. Caeterum antibrachii motus non omnino denegatus fuit. Vera enim paralysis solum digitum auricularem et annularem prehenderat. Declarato morbo pro peresi antibrachii, ex laesione nervi ulnaris, ope balneorum sulphuricorum, ope telae ceratae, quae brachium continuo obtegebatur, ope frictionum varii generis, et praecipue ope *fonticuli* per lapidem causticum ad locum prius vulneratum facti, relicto solo quodam in parte affecte torpore, sanatus est.

32) FARRICIUS HILDANUS. Cent. V. obs. 71. \*

23) SALMUTH, Cent. II. obs. 76.

24) W. STOCKER *Aneurysma d. Aorta innom. mit Hemiplegie*,  
ex *Dublin journ.* 1834. Vol. 15, in SCHMIDT *Jahrb.* 1835.  
B. 8. p. 80. J. JOHNSON l. c. (aortae descendentes).

25) „Vidi sic tumentes et scirrhusas glandulas subaxillares  
parelysin brachii facisse.“ SWIETEN l. c. §. 1059. v. AN-  
CROMBII et BELLII exemple, §. LX. & alleta. J. F. HOFF-  
Frank Prax. II. I. 2. 1.

a partu<sup>11</sup>), plethora<sup>12</sup>), haemorrhagiis<sup>13</sup>), —  
ligatura carotidis communis<sup>14</sup>), suppressio hae-  
morrhoidum<sup>15</sup>), menstruum<sup>16</sup>), lactis<sup>17</sup>), dy-  
sen-

MANN *Angina tonsill.* etc. mit nachfolgender Lähm. einig.  
Sinnorgane; in RUST Mag. 1830. B. 33. H. 2. p. 341.

26) WICHMANN *Ideen u. Diagnostik.* 3. Th. p. 19 (paralysis  
extremitatum inferiorum).

27) PERCIVAL *essays.* Vol. II. p. 220. v. *Abh. f. pr. Ärzte.*  
2. B. 2. St. p. 90. De impotentia ambulandi ertusque mo-  
vendi aubitanea in gravida, castasquin sana, refert J. J.  
SCHLIEBACH in act. phys. med. n. c. Vol. VII. obs. 63.  
ROBERTA *Hemiplegie in d. letzten Schwangerschaftszeit, ex*  
*Liverpool journ.* 1834. Jun. in SCHMIDT Jahrb. 1835. B. 7.  
p. 296. G. P. HOLSCHER in SCHMIDT Jahrb. 1836. B. 11.  
p. 196.

28) ZACUTUS LUSITANUS *prax. admirab.* L. I. obs. 35. CAL-  
MIL I. citando. SCHUPMANN in HUFELAND Journ. 1830.  
St. 4. p. 115. *Lähm. des Fusses bei ein. Frau, in Folge*  
*ein. Contusion d. innern Beckennerven, ex lancette fr.* 1834.  
N. 90. in SCHMIDT Jahrb. 1835. B. 7. p. 79.

29) Nov. act. nat. cur. Vol. V. obs. 7. SWIETEN comment.  
§. 1060. AUTENRIETH *Physiologie.* §. 589.

30) REGNOLI *lettera sopra un' abbondante emorragia a cui*  
*sopraggiunsero singolari sconcerti.* Pesaro 1834. — CON-  
STANT *Gehirnblutung b. ein. 11jähr. Kinde; Hemiplegie d.*  
*linken Seite etc.* ex gaz. méd. de Par. 1834. Févr. N. 8. in  
SCHMIDT Jahrb. 1834. B. 2. p. 227. Similem casum refert  
PELLERAN in SCHMIDT l. o. 1835. B. 5. p. 237. A. BOYER  
ib. B. 7. p. 158. ex gaz. méd. de Par. 1834. N. 52. DIDAY  
*Fall v. isolirter Gesichtshemiplegie in Folge ein. Gehirn-*  
*blutung.* ex gaz. méd. de Par. 1836. N. 3. in SCHMIDT  
Jahrb. 1837. B. 14. p. 186.

31) DOHLHOFF *zwei Fülle v. Unterbindung d. Carot. comm.*  
*dextra mit darauf folgend. Lähm. d. linken Körper-*  
*hälfte,* in RUST Mag. B. 51. H. 3.

enterici fluxus<sup>25</sup>); labores duriores<sup>26</sup>), calor nimius<sup>27</sup>), frigus<sup>28</sup>), inprimis refrigerium aestu-

O o 2

ante

32) FABRICIUS HILDANUS. cent. II. obs. 11. HOFFMANN de nervorum resolutionibus obs. 7. opp. Vol. III. p. 205. FISCHER (HOFELAND Journ. 1834. St. 10. p. 42) da puero 10 annorum refert, e matre ad haemorrhoides haud dubio disposita, nato, et paralyti dorsali perfecta laborente. Melum disparuit, postquam intra plures dies cruor niger et coagulatus excretus fuit. Quanta haemorrhoidum in paralyti excitanda potestas sit, jam HIPPOCRATES cognoverat, cians: „Ex haemorrhoides parum apparente vertigines obortae parvam siderationem brevi futuram significant“ (Concar. Praenot. N. 346. CHARTER. T. VIII. p. 871). „Tunc enim ait SWITEN (l. c. §. 1060. p. 355) natura evacuationem superflui molitur quidem, sed non perficit, et sanguis, per inferiora haec vase exire non potens, superiora vasa urget et distendit.“ Sic vir, da quo alibi locutus sum (P. II. ad. alt. Vol. I. Sect. 1. C. V. §. XXV. N. 1 (12)) en. 1818 verneli tempora in diarrhoeam haemorrhoidalem cruentam incidit. Quamvis eam sollicitaverim, etiamen citius quam voluisssem, cessavit, subsequenta apoplexia insultu, cum linguae paralyti. Sanatus fuit aeger. Au. 1819 eodem anni tempora, an de novo diarrhoea haemorrhoidalis cruenta. Memor eem praeterito anno apoplexiae insultum annuntiasse, illico venem pedis tundi jussi. Hac vice nulla secuta est apoplexia.

33) Ex menstrualis circa cessationis periodum copiose fluentibus et incante cohibitis, nonnulla exempla paralyseos conspexi. Alii viderunt: *Moer paralyt. universal. u. Tod in 6 Tag. durch menstruation suppr. in allg. med. Zig.* 1834. N. 38. R. LAW l. c. p. 268.

34) FUSOS traité du dépôt lacteux, ou lait répandu. v. Abh. f. pr. Ärzte. 1. B. 1. St. p. 7.

35) §. LX. N. 5 (48).

36) NEBELII in act. phys. med. Vol. V. obs. 109. p. 387.

ante corpore susceptum <sup>37</sup>), humiditas tarrhus <sup>41</sup>), exanthemata praepostere fi

37) HIPPOCRATES monuit parasplasticos fieri homines put repente solis ardoribus expositum, aut si reptum fuerit (de aëre, locis et aqua text. 14. T. VI. p. 191). CALMEIL I. citando (insolati balneum calidissimum). BEHRND *allg. Repert.* p. 271. ex *Hunter, soc. of Lond.* 1832.

38) HIPPOCRATES de liquidorum usu C. II. CHAR p. 444 „cerebrum, quaeque ex eo oriuntur, frig offenduntur, calido vero delectantur.“ Sic GALENUS, qui et vesicae sphincteros resolutos lapidi frigido diu insederant homines vel inter has partes diu alluerant: idem malum et nonnulli frigida natantibus contigisse monet (de locis a C. 6). De paralyti ex lapsu in mare frigida MARTINI *ein Dutzend Beobacht.* N. 6. JOURDA *d. rechten Seite des Antlitzes*, ex *compte rendu de la soc. des sc. méd. du départm. de* in *FRONIEP Notiz. B.* 19. N. 7 (ex vento frigida KEYLER *Beob. u. Heil. ein. in Folge heftiger entstanden. Lähm. in Würtemb. med. Corr.-Bl.* . PRUSS I. c. GRAVES in *FRONIEP Notiz.* 1837.

39) Cfr. acriptores de morbis climatum calidiorum ed. alt. Vol. I. Sect. 1. §. IX. N. 4. §. X. N. 7. § citati. Et in climatibus frigidia permulta p suscepto refrigerio corpore, culpa balnearum vaporum fermentatorum, animi pathematum astante,

40) HIPPOCRATES notavit, post tempestatem aut pluviosam parasplagias endemico more grassari (apud I. CHARTER. T. IX. p. 63). J. A. KONE *miplegia*, in *HORN Archiv.* 1835, H. 5. GRAVE FRET (filius) in *bull. de therap.* 1839. T. 16. p.

41) Paralysis brachii ex suppresso catarrho nari BURGHAY *medicin. Fälle.* p. 72.



ut scarlatina<sup>42</sup>), morbilli<sup>43</sup>), variolae<sup>44</sup>), achor-  
res<sup>45</sup>), plica imprimis resecta<sup>47</sup>), metastasis lac-  
tea<sup>48</sup>) aliaque<sup>49</sup>), febres intermittentes suppres-  
sae<sup>50</sup>), typhus, otorrhoea<sup>51</sup>), errores diaetae<sup>52</sup>),

ver-

42) KORTEN in HUFELAND *Journ.* 20. B. 3. St. p. 52. P. K. MÜLLER *Heil. ein. 6jähr. Lähmung ... des linken Arms*; in HARTLUS *n. Jahrb.* 1827. B. 12. St. 3. p. 9. et *Lähm. ... durch zurückgetriebene Krätze veranlasst.* ib. 12. CLESS *erster Bericht etc.* in HOHN *Archiv.* 1830. H. 2. p. 284 (duas paralyses ex scabies retropulse). NICOLAI in RUST *Mag.* 1833. B. 39. H. 1 (hemiplegia dextre ex herpate retropulso).

43) DELIUS *dis. de paralysi utriusque brachii post scarlatinam orta.* Erl. 1753 (Plurima exempla propria exhibat praesio).

44) LUCAS in *Lond. medical journ.* 1790. 4. Vol. N. 1. Cfr. P. I. ed. alt. Vol. III. Sect. 1. C. II. §. XI. 3. EITNER *Lähm. nach Masern* in *med. Ver.-Ztg.* 1840. N. 8. p. 37 (casus duo).

45) Eph. nat. chr. Dec. I. an. 4 et 5. obs. 9. Dec. III. an. 4. obs. 1. ROBERTS ex *Lond. m. soc.* in BEHREND *allg. Repert.* 1831. Dezbr. p. 371. Cfr. op. c. C. IV. §. XXI. 3.

46) DR HAHN *ratio medendi.* Vol. I. p. 185.

47) DE LA FONTAINE *med. chir. Abh.* p. 55. op. c. 3. 2. C. XXII. §. LXXI. 1. p. 324. Sed et quia plica resecetur, plicosi, potissimum ex animi pathematibus et transpiratione suppressa, facile in paralysis incidunt.

48) GARN *Krankengeschichten.* N. 6.

49) Ulcerum at sudorum pedum: OSANN l. citando hist. I et II.

50) PERCIVAL l. c.

51) ROMBERG l. c. hist. I et II. CHRISTISON l. c. p. 109. cas. I. p. 110. cas. II.

52) CARL. AURELIANUS. p. 349. PERCIVAL *essays.* 2. Vol. p. 220. *Philos. trans.* N. 277. Cfr. TRAMPER *Beob.* 2. B. p. 139. et MARCARD *Beschreib. v. Pyrmont.* 2. B. p. 169.

vermes<sup>53</sup>), flatus<sup>54</sup>), vitia hepatis aliorumque viscerum abdominalium<sup>55</sup>), hypercatharsis<sup>56</sup>), podagra retropulsa<sup>57</sup>), syphilis<sup>58</sup>), metalla<sup>59</sup>), ut mercurius<sup>60</sup>), arsenicum<sup>61</sup>), maxime vero plumbum<sup>62</sup>),

53) SALMUTH cent. I. obs. 44. PAULLINI cent. IV. obs. 17. Eph. nat. cur. Dec. II. ca. 5. epp. 15. *Journ. de méd.* T. 30. p. 44. T. 80. p. 344. MÖNNICH in HUFELAND *Journ.* 1817. Sept. p. 114 (Brechtii perelysia horarum nonnullarum a vermibus ipse observavi). J. MOSING in *Oesterr. med. Jahrb.* 1837. B. 21. St. 1. p. 174 (peral. extremit. inferiorum quatuor annorum esceridibus excessis senescitur). MOLL merkwürd. "Fall ein. durch den Abgang des Bandwurms geheilt. Lähm. mittelst des Tart. emet. in *Oesterr. med. Jahrb.* 1839. B. 28. St. 2. p. 242.

54) HELWIG obs. 84 (Transitoriam a flatibus perelysia brachii sinistri conspexi).

55) PERCIVAL I. c.

56) HELWIG obs. 83.

57) DE MEZA in act. soc. med. Havn. Vol. I. Mense Julio 1819 vir nobilis 70 et ultra annorum, evolutionem insultus podagrae ad pedem sinistram exhibitis frictionibus spirituosus impedivit. Brevi post iter instituta, susceptoque aestuante corpore refrigerio sub ipso opere pulverem ex pyxide manu sinistra sumendi in hemiplegiam ejusdem lateris incidit.

58) WYFFER obs. p. 689. LANGE in SCHNUCKERS *vermischte Schrift.* 2. B. p. 232. HOUTET in *mémoires de l'acad. de chir.* T. 4. p. 141. *Samml. med. Wahrnehm.* 1. B. p. 84. BUSSE *Gesch. ein. inveterirt. u. larvart. Syphilie, welche ... halbseit. Lähm. z. Folge hatte*, in HUFELAND *Journ.* 1837. St. 4. p. 3.

59) TUCHLAN diss. de paralyai metallariorum. Ultr. 1693.

60) THOMANN ennel. ed 1800. p. 68. BEUL I. c. histor. I. E. M. A. HEIM *üb. d. Merkurialkrankh. Erlang.* 1835 (historiam paralyseos mercurialis enarrat).

bum<sup>61</sup>), alia venena<sup>62</sup>), animalium illis non exceptis<sup>63</sup>), animi pathemata<sup>64</sup>), potissime terror<sup>65</sup>), ira<sup>66</sup>)

61) FORESTUS. L. VIII. obs. 5. BRANDIS *üb. d. Wirkung d. Eisenmittel*, p. 155. 170.

62) BORRILLUS cent. IV. obs. 32. FABR. HILDANUS cent. V. obs. 71. STOLL rat. med. P. II. p. 416. PEARCEVAL *essays*. v. *Abh. f. pr. Ärzte*. 2. B. 2. St. p. 70. MAUER in *arzneyl. Abhandl. v. London*. 3. B. p. 309. PARIS and FONBLANQUE *med. jurisprucl. Lond.* 1823. v. HENKE *Ztschr. f. St.-Arzt.* 10. *Ergänzungsh.* 1829. p. 271. H. M. HUFELAND *Bemerk. üb. d. durch Blei herbeigeführte Lähm. ex Lond. med. gaz.* 1836. Vol. 15. Febr. 21 et 28. L. TANQUEREL DESPLANCHES *ex journ. hebdom.* 1836. N. 26. in SCHMIDT *Jahrb.* 1837. B. 14. BICKING *traurige Folgen ein. Behandl. d. Schwindelsucht durch Plumbum acet.* in HUFELAND *Journ.* 1839. St. 6. p. 110. Cfr. auctores de colica pictonum.

63) E. c. infusum baccarum laurocerasi in vino (commerce. liter. Norimb. 1733. p. 390); opium: *dictionn. de sc. méd. artic. opium*, et ORFILA, *Toxicolog.* (paralysis extremitatum inferiorum apud animalia et homines). Sulphur: OLMSTRDT *Fall von Lähm. durch Schwefel*, *ex Americ. journ. of sc.* Vol. 8. p. 394. in GIBSON u. JUL. *Mag.* 1827. H. 2. Lathyrus cicera: DESPLANCHES in BEHRND *Journ.* 1830. H. 1. p. 100 (farina hujus plantae, farinae secalinae admixta fuit). Strychninum: BURDACH in *med. Ver.-Ztg.* 1837. N. 23 (ex duobus granis paralysis pedum).

64) E. c. morsus viperae (FONTANA *üb. d. Viperngift*), camelorum aestuantium (LARRY *de l'expédition d'Egypte*. p. 413).

65) Auctores P. II. ed. alt. Vol. I. Sect. 1. C. 1. §. III. 9 citati.

66) DR HAHN rat. med. P. I. p. 106. HOFFMANN de nervorum resolutionibus obs. 5. opp. Vol. III. p. 204. Eph. nat. cur. Dec. I. an. 4 et 5, obs. 9. BARTHLY *ex bibl. méd.* in FROBIEF *Notiz.* 1828. B. 21. N. 13 (plures casus). Bellum Lithuaniae an. 1812 plurimas paralyses ex terrore reliquit.

ira<sup>67)</sup> et moror<sup>68)</sup>, dolor<sup>69)</sup>, fulmen<sup>70)</sup>, fumus carbonum<sup>71)</sup>).

C. proxi-  
ma.

3. *Causa proxima paralyseos* a BOERHAAVIO in impedito fluore liquidi nervosi a cerebro in musculum paralyticum, vel liquidi arteriosi in eundem, quaerebatur<sup>72)</sup>. Rebus certis stando, id solum compertum habemus, paralytin oriri a caussis aut cerebrum aut medullam spinalem aut pulpam nervorum singulorum vehementer comprimantibus, solventibus, lacescentibus, destruuntibus, aut principium vitae, quo partes hae instrui deberent, quocunque demum pacto vel non largientibus, vel exhaurientibus.

#### §. LXII.

- 67) WOLFF obs. med. chir. L. II. N. 5. BERLIN *Hemiplegie b. ein, Säuglinge als Folge heftiger Gemüthsbezeugung d. Mutter*, in HARLESS n. Jahrb. 1827. Spptb. 2. p. 66. *Entzünd. des rechtl. Corp. striatum u. Hemiplegie in Folge v. Zorn*; ex n. bibl. méd. 1829. Octbr. in BREHEND Journ. 1830. H. 2. p. 151. Cfr. P. II. ed. alter. Vol. I. C. XX. §. LXXXVII. 2 (13).
- 68) SCHENK obs. Lib. I. N. 176. VICAR delect. obs. pract. N. 34. BARTHOLINUS act. Havn. Vol. III. obs. 39. HECKER lit. Annal. 1830. H. 6. ex journ. des progr. Vol. 11. Cfr. op. c. §. LXXXII. 1 (5).
- 69) SWIFTEN l. c. §. 1060.
- 70) THRDEN neue Bemerk. 3. B. p. 177. GASTELLIER in mém. de la soc. méd. d'émulat. an. 5. p. 402. DRESSARDIN ex BROUSSAIS annal. de la méd. phys. 1826. Juin, in GERSON u. JUL. Mag. 1827. St. 4. p. 63. DRESSLER Verletz. durch Blitzaeschlag in med. Ver.-Ztg. 1839. N. 35. p. 174. Vidi quondam Viennae Polonum, hemiplegia lateris dextri laborantem ex ictu fulminis, quo percussus fuit.
- 71) STOLL rat. med. P. VII. p. 92.
- 72) SWIFTEN l. c. §. 1068.

## §. LXII.

## D i a g n o s i s.

1. Pulchre hinc dicit WEDELIUS<sup>1)</sup>: „Inter <sup>Genera-</sup> istos morbos, qui vivae mortis imaginem sistunt, <sup>tim.</sup> praecipue est paralysis, facile dignoscenda, et sensibus obvia. Cum enim vita consistat in sensu, consistat in motu, quid est mors viva, etiam hic, si haec non est.“

2. Paralysis originem trahit ex *encephalo*, ex <sup>Paralysis</sup> *spina*, ex *nervis*, et ex plurimis locis simul: — <sup>origo.</sup> natura illius est *traumatica*, *inflammatoria*, *rheumatica*, *metastatica*, *gastrica*, *arthritica*, *scorbutica*, *nervea* et *venerica*.

3. *Paralysis originis encephalicae*<sup>2)</sup> a morbis <sup>P. encephalica.</sup> *cerebri*, dolore videlicet *capitis*<sup>3)</sup>, *encephalite*<sup>4)</sup>, *hydrocephalo*<sup>5)</sup>, *apoplexia*<sup>6)</sup>, *vertigine*<sup>7)</sup> etc. annuntiatur, vel his stipatur. Offenduntur inde maxime *sensus*, *facultates animi*, *deglutitio*, *respiratio*, *circulus sanguinis* (ut plurimum *lentior redditus*), *musculi faciei*, *linguae* ac illi *lateris*   
 dimi-

1) Diss. cit. GÖLLERI.

2) J. ABRACROMBIE Abhandl. üb. d. Lähmung., in Folge von Affectionen des Gehirns; ex *extract of pathological and practic. researches of the brain and spinal cord*, p. 267, in BEHRND allg. Repert. 1832. N. 6. p. 314. De diagnosi paralyseos encephalicae lege: A. BOYER Abhandl. üb. Paral. auf Beobacht. ... gestützt, ex gaz. méd. de Par. 1834. N. 23. in SCHMIDT Jahrb. 1835. B. 5. p. 188 sq.

3) P. II. ed. alt. Vol. I. Sect. 1. C. II. §. XI. 2.

4) C. III. §. XVII. 3.

5) C. IV. §. XXI. 7, §. XXII. 4.

6) C. V. §. XXVIII. 3 (12). 6.

7) C. XVI. §. LXXI. 1.

dimidii corporis<sup>8)</sup>, affectioni encephali plerumque<sup>9)</sup> oppositi, quod mirabile phaenomenon doctis animadversionibus<sup>10)</sup> de *chiasmo nervorum*, aut potius de *chiasmo substantiae cerebri ad corpora striata*<sup>11)</sup>, *pyramidalia*<sup>12)</sup>, et de illo *cerebelli ad medul-*

8) LACRAMPE LOUSTAN (*recherch. fait. à l'hosp. de la Pitié sous les yeux de Mr. SERRES pour déterminer les rapports des lésions du cerveau avec les paralys. des membres supér. et infér.*, in *revue méd. franç. et étrang.* 1824, Mars) concludit: „que les radiations postérieures de la couche optique président aux mouvemens du bras; — que les radiations antérieures du corps strié somment à ceux de la jambe; — que les radiations antérieures du corps strié et postérieures de la couche optique tiennent sur leurs dépendances les mouvemens des deux membres.“

9) HIPPOCRATES docens (de morb. vulgar. L. XII. Foss. Sect. 7. p. 1218. N. 38) *latus paralyticum illi affectionis cerebri oppositum esse*, tamen rem non semper ita ac habere monet (de capitis vularibus. C. XXVI. T. 2. p. 705. Edit. Lind.). Vide §. LX. 12 (128).

10) Fundamenta hujus doctrinae ARETAEUS, LANCISIUS, SANTORINI jecerunt, ac MORCAONT, SCARPA, SOMMERING, GALL alique confirmarunt, ut doctus CL. RACCHETTI exposuit, op. c. p. 262, 274. Cfr. RISTELHUBER apud L. J. A. MARSHALL *essai sur la topographie méd. a l'hôp. civil de Strasbourg et de son annexe. Strasb.* 1829. SERRES in SCHMIDT *Jahrb.* 1834. R. 1. p. 94.

11) CALDANI (l. c.) corpus striatum lateris hemiplegiae oppositi plerumque multum pati asserit. Jam WILLISIIUS motus et sensus principium in corporibus striatis quaeisivit (de anima brutorum. P. II, C. 9). MARSHALL contenderat, omni in hemiplegia corpus striatum in latera sinistro alteratum esse; quod axioma NAUMANNI observationibus non sine discrimine comprobatur (HUFELAND *Journ.* 1824. St. 7.

*medullam oblongatam* <sup>13</sup>), nec non *ad pontem Varolii* <sup>14</sup>) (nervorum encephali et ipsius medullae spinalis communi origine) ansam praebuit. Causae paralyseos originis encephalicae tum ex necroscopia paralyticorum, tum ex consideratione morborum, qui paralysin antecedunt, vel eam comitantur, elucent. Violentiae cranio illatae, crassities meningum, plethora sinuum, liquores  
variae

p. 69). ASHCROMBIE l. vix cit. p. 317. 322. CHRISTISON l. c. p. 110. cas. III.

12) In opere posthumo SANTORINI, a GIRARDI edito, legitur (p. 29): „qua calami scriptorii apex est, ibi et foraminulum, quod si dirigente stylo diducatur, atque aperietur, iidem tractus medullares eversi conspiciuntur, quos pyramidalis corpora efficere dicimus; hi paulo infra calami scriptorii apicem, sive ad decussim feruntur, ut id negare paritacitas, aut non cernere caecitatis esse arbitrer.“

13) „La ragione poi per la quale, etante pur il picciol tratto, in cui si discerne questo incrociamiento dei fasci midollari nel luogo anzidetto (delle piramidi); pure le lesioni del cervello, anehe in altre sue parti quinci discoste, presentano i fenomeni della paralisia nel lato contrario, ei è questa, che nella midolla allungata e nel ponte del Varolio concorrono certamente la costanza del cervello e quella del cervelletto, le quali si uniscono in questo centro commune, che dà commune origine ed ai nervi del cervello, ed al gran cordone della midolla spinale; il che dimostra benissimo, come nel intreccio de' fasci nervosi entro la midolla allungata risieda la cagione organica del frequente eccitarsi le convulsioni e la paralisia nel lato opposto alla parte offesa nel cervello; benchè questa parte fosse pure discosta dal luogo delle piramidi.“ l. c. p. 267. ASHCROMBIE l. vix cit.

14) ASHCROMBIE l. c.

variae indolis in cavitates vel in substantiam cerebri et cerebelli extravasati<sup>15)</sup>, hæc, inquam, omnia in eo conveniunt, quod partibus in encephalo contentis comprimendo vel irritando vim inferunt. Ad paralyisin sic excitandam aliquando minorem quam ad apoplexiam gignendam vim requiri, ex eo, quod illa hanc interdum annuntiat<sup>16)</sup>, apparet. Apparet itidem paralyisin originis cerebri potius effectum aliorum morborum quam morbum per se constituere. Habetur interea pro primaria, dum alterius morbi praesentia minus evidens est. *Paralysis originis encephalicae* saepissime a congestionibus et plethora gignitur, — inflammatoria dicenda<sup>17)</sup>. Socia illi signa sunt encephalitidis<sup>18)</sup>, aut apoplexiae<sup>19)</sup>, atque instar huius morbi derepente adortur. Gravissime morbus urget, si rupturis vasorum et extravasatis cruentis stipatur. Praeter istam paralyseos cerebra-

15) Quibus ABERCROMBIE (l. c. p. 315) addit: cerebri substantiae emolliem et encephalitidem cum ejusdem sequelis. Cfr. ejusdem necroscopiae. p. 316 et sq.

16) ABERCROMBIE (l. c. p. 314) ait: „Häufig geht wohl die Krankheit, die mit einem Anfalle von Lähmung beginnt, nach einer gewissen Zeit in Apoplexie über, alsdann aber ist die Lähmung nur die erste Periode der Apoplexie.“

17) Paralyisin maniacorum nunquam non ex encephalite aut meningitide pullulare, necroscopiis CALMEIL aliique ostendunt. Cfr. §. LXIII. 2 (7).

18) ABERCROMBIE l. c. p. 321 et 322.

19) BOUILLAUD Fall v. Hemiplegie, die durch einfache Blutcongest. des Gehirns entstanden war, ex Journ. hebdom. 1835. N. 26. in SCHMIDT Jahrb. 1836, B. 10. p. 41. Cfr. §. LXI. 2 (30).



bralis speciem altera datur plerumque lentius<sup>20)</sup> praevis signis inflammationis chronicae meningum ingruens et a causis *rheumaticis*<sup>21)</sup>, *arthriticis* et *metastasi* originem nanciscens, indeque nomen desumens. A secretionem seri cerebrum comprimentis aliisque inflammationum reliquiis, e. c. a meningum incrassamentis, repetenda ea videtur. Nec tertiam paralyseos originis encephalicae speciem ex *inanitione* praeteribimus, effectum evacuationum nimiarum quandoque ipsarum venaesectionum, nec non inediae, narcoticorum, animi pathematum, *nervea* seu *spasmodica*<sup>22)</sup> nuncupanda. Quarta species, *paralysis* scilicet *encephalica traumatica*, sponte intelligitur.

4. Quae ex *spina* proficiscitur *paralysis*, im-<sup>P. spina-</sup>  
plicatissima omnium est<sup>23)</sup>. Praeter signa enim ge-<sup>lis.</sup>  
neralia, sensum scilicet constrictionis ad columnam  
vertebralem<sup>24)</sup> et resolutionem musculorum ab-  
dominalium<sup>25)</sup>, signa adhuc specialia observantur,  
prout pars cervicalis, dorsalis, lumbalis, sacralis  
spi-

20) „Dauert die Lähmung lange . . . , so liegt ihr eine tiefe Affection des Gehirns zum Grunde.“ BOYER l. c. p. 189.

21) CAVALLINI storia d'una reumatica paralisis curata con l'unzione mercuriale. Venezia 1769.

22) C. XIV. §. LXX. 3.

23) Ni fallimur MARSHALL HALL (in MÜLLER Archiv. l. c. p. 211. 212) primus fuit, qui medicorum animum ad symptoma criticum advertit, quod res occultas dubiasque explanare poterit. Docet enim autor, musculorum irritabilitatem in *paralysi cerebrale* augeri, in *spinale* vero diminui.

24) ARMSTRONG, YELLOLY, COPLAND l. c. p. 9.

25) COPLAND l. c. p. 13.

spinae separatim; vel tota columna vertebralis simul laeditur<sup>26)</sup>; quod ex tradita doctrina<sup>27)</sup> et ex observationibus B. HOME<sup>28)</sup> abunde elucet<sup>29)</sup>. Paralyzin ex affectione spinae, plerumque in latere, causae morbosae respondente, obvenire, jam monimus<sup>30)</sup>. Ratio in defectu *chiasmi* substantiae medullae spinalis quaeritur<sup>31)</sup>. Porro cum medullae hujusmodi ambitus, comparate ad illum cerebri, parvus sit; violentiae illi illatae raro ad *unum* modo latus restringi solent, sed plerumque *totam* medullae circumferentiam occupant: ex quo vir Cl.<sup>32)</sup> explicare satagit, cur ex affectione spinae frequentius paraplegia, quam hemiplegia oriatur. Quae opinio per *paralyzin ex cyphosi*, quatenus ut plurimum utrique cruri in-

fen-

26) Cfr. J. FR. W. KURKE *Lähmung der Extremitäten etc.* in *HUFELAND Journ.* 1829. *St.* 12. p. 54.

27) C. I. §. II.

28) Op. c. (v. P. II. ad. alt. Vol. I. S. 1. C. IV. §. XXII. 7 (144).) p. 270.

29) Docent praeterea istae: quod sanguis coagulatus superficiem externam durae matris, quae medullam spinalem a quarta vertebra cervicali ad secundam dorsalem investit, comprimit, paralyzin extremitatum tum superiorum tum inferiorum, laesa simul evacuatione urinae et faecum, producit; — quod sanguis in centro medullae spinalis, inter sextam et septimam vertebrae colli extravasatus, paralyzi extremitatum inferiorum, nequaquam varo superiorum, ansam praebet; quodque ex fractura septimae vertebrae colli, dilacerata medulla respondente, partes omnes sub loco affecto paralyticae redduntur, deglutitione valde dolorifica facta.

30) LX. 13. 31) RACCHETTI l. c. p. 274. 32) Idem l. c.

fensam, comprobatur. *Paralysis* ista, aliàs *cyphosis paralytica* <sup>33)</sup> dicta, graphice a POTT, PALLETTA, RACCHETTI, COPELAND <sup>34)</sup> aliisque <sup>35)</sup> descri-

33) *Cyphosis paralyticam* vocavit PALLETTA (l. c. p. 104), quod ea a reliquis gibbositatibus, ratione causarum et symptomatum, differat.

34) Op. citatis.

35) WEDDEL *parelysis pedetentim ingruens e gibbero* v. misc. ac. nat. c. Dec. I. an. 2. 1671. p. 333. CORR. HENR. A. ROY comment. de scoliosi. Lugd. Bat. 1774. v. *Wism neuen Auszug aus Diss. f. Wundärzte*. 15. B. p. 108. COOPMANS diss. de cyphosi. ibid. 1775. LUDWIG advers. med. pract. T. I. p. 712. T. II. p. 327. CHESLEDEN Osteographia. Tab. XLIV. SANDIFORT mus. anet. T. I. II. III. XXXVII. fig. 5. 6. Vol. I. Sect. 4. p. 127. N. I. p. 129. N. II. III. p. 167. N. CIV. tab. XXXVI. p. 168. N. CV. tab. XXXVIII. p. 181. N. CCIX. p. 182. N. CCX. tab. L. usque ad LIII. p. 183. N. CCXI. tab. LIV. LV. p. 184. N. CCXII. tab. LVI. usque ad LVIII. p. 188. N. CCXIII. tab. LIX. LX. LUDWIG Lib. I. tab. XII. fig. 2. p. 7. 25. §. XVIII. tab. XIV. fig. 1. p. 9. N. 26. §. XXI. WALTHER Anat. mus. 2. B. p. 59. N. 420, 430. VOIGTEL Handb. d. path. Anatomie. 1. B. p. 310. DOLBEARE case of curvature of the spine. v. Transact. of the college of physie. of Philadelphia. Vol. I. P. I. p. 45. CERILL. Puellae gibbosae sectio et causa hujus mali in eadem detecta v. ect. ac. nat. cur. Vol. 9. p. 229. PORTAL obs. anat. sur une bosse particulière v. mém. de Paris. a. 1776. hist. p. 42. mém. p. 242. NEBEL l. c. KOK obs. d'une paralysie des extrémités inférieures avec courbure de l'épine dorsale. v. Act. de la soc. de méd. des Bruxelles; aegrotantibus T. I. P. 2. p. 177. N. W. APPLSTON account of the successfull treatment of a parelysis of the lower limbs, occasioned by a curvature of the spine. v. Med. papers communicated to the Massachusetts med. soc. Nrb. I. p. 56. B. CUNASCO cifosi para-

descripta est. Maxime illa infantiae et pubertatis epochae familiaris cernitur: Vêrùm et adultis non parces<sup>36)</sup>. Annuntiatur languore, inertia, frigore pedum, doloribus crurum, cute flaccida circumdatorum, verbo consumptione. Aegrotuli pedibus instare recusant, et si jam gressus fecerint, deambulandi potestatem rursus amittunt. Quodsi aliorum ope suffulti ad motum adigantur, crura aut antrorsum projiciant, aut post se trahunt, aut eum iis semicirculum describunt. Sedentes crura decussatim Turcarum more collocant. Plurimi prominentiam sterni, respirationem laboriosam, thoracem emaciatum, abdomen inflatum, exhibent, ac de dolore regionis epigastricae conqueruntur. In nonnullis et brachiorum paralysis accedit. Crescente morbo extremitates inferiores omnino resolvuntur, quin tamen sentiendi facultatem plane amittant<sup>37)</sup>, et tandem paralysis ipsam attingit  
vesi-

*lítica curata. Giorn. della soc. med. chir. di Parma, Vol. 4. p. 155. J. JACOMI diss. de cyphosi paralytica, Heidelb. 1801. BERRA delect. opusc. acad. Vol. VIII. p. 81. DELPECH tr. des malad. chirurg. Par. 1816. KAHLEIS Pott's Lähm. d. untern Extremit. in HUFELAND Journ. 1829. St. 2. SIKKES lib. d. Wesen des sogenannt. Pott. Ueb. d. Rückenwirb. ex gaz. méd. 1830. Janv. in BEHRND Journ. 1830. H. 6. p. 326. B. CH. VOGEL. C. I. §. V. 3 (10) cit. L. M. REY sur la pathogén. de quelq. affect. de l'axe cérébro-spin. etc. Par. 1834. obs. 12 et 13. A. NULATON Tuberkeln d. Wirbelsäule (melum Pottii) ex archiv. gén. de méd. 1837. Fév. in FRONIER Notiz. 1837. B. 4. N. 13. GIUL. URSIOLLO mem. sulle cifosi paralitiche. Firenze 1838.*

36) MORGAGNI ep. X. 13. 14.

vesicam urinariam. Explorata in *provetiori morbo* \*) columna vertebrali, pars illius a recto tra-

37) Posse motum sine sensu, et vice versa deleri, mirum non amplius erit, si perpendatur, nervos spinales motui et sensui dicatos, diversas agnoscere radices, et quidem juxta BÉCLARD (*élem. d'anat. génér. Par.* 1823), MAGENDIE (*annal. de chimie.* 1823, *Avril*), BELL (l. c.) et juxta PANISSA (*ricerche speriment. sopra i nervi.* Pav. 1834) nervi motus a medullae spinalis parte anteriore, illi sensus a parte posteriore; juxta autem BELLINGERI (de medulla spin. variisq. ex ea prodeantib. Taur. 1824. Experimenta physiolog. in medull. spinalem. ib. Experimenta in nervorum antagonism. ib.) nervi motus ex substantia alba medullae spinalis, nervi sensus ex ipsius substantia cinerea, ita tamen, ut sensus omnino et unico pullulet ex radicibus posterioribus, quae simul motui extensionis praesunt, quam motus flexionis duntaxat anterioribus debeat. Argumento est historia, quam ex ANNECROMBIE (l. c.) de juvene 18 annorum extremitatum inferiorum motu quidem, minime vero sensu aaram orbatu audimus. Cadavere dissecto pars anterior medullae dorsalis mollita, in molem pulvis instar dissoluta, pars posterior autem fere in columnis videbatur. Similem observationem habet POWELL ex *Dublin Journ.* 1839. *Novbr.* in *FRONIER Notiz.* 1840. *B.* 13. *N.* 9. p. 144. Aliæ argumenta, BELLINGERI hypothesis confirmantia, ex tetani speciebus desumpta, vide apud FARO, MOSSETTI et PAOLINI, in C. XIII citandos.

38) COPRELAND jure monet, cyphosin solum *provetiori morbo* supervenire, immo, ipsam aliquando cariem jam vertebrae detinere, quin extus adhuc aliquod in conspectum veniat signum. l. c. p. 9-10. E. HARRISON, Pottii opinionem, ad extremitatum paralysin inferiorum cum cyphosi provocandam vertebrarum cariem absolute requiri, negans, statum vitiosum ligamentorum vertebrarum earumque cartilagineum ut causam spinæ curvaturæ accusat (*the Lond. Frank Prax.* II. I. 2. 1. Pp

tramite deflectere ac sub forma anguli prominere cernitur (*cyphosis*). Substantia vertebrarum affectarum nequaquam tumet, ut quondam docuerant, sed, teste PALLETTA<sup>39)</sup>, mollior, erosa, consumpta et in pulvem, instar illius, quae in steatomatibus inveniri solet<sup>40)</sup>, conversa, non sine suppurationis<sup>41)</sup> et anchyloseos<sup>42)</sup> vestigiis, detegitur<sup>43)</sup>. Mirum hinc non est, columnam vertebralem, ita labefactatam, capitis ponderi et actioni costarum vix resistere posse, ac super et infra locum affectum, antrorsum flecti debere. Sedes cyphoseos communissima, vertebrae dorsi et lumborum. Notari meretur, quod non solum partes *infra* cyphosin locatae, sed aliquando et illae, quae *supra* positae sunt, paralyticae fiant<sup>44)</sup>; quod-

*med. and phys. journ.* 1821. Vol. 41). W. TILL. WARD malum influxui musculorum vitioso adscribit. Vide ejusdem opus et aliorum sub *orthopaedia* citata.

<sup>39)</sup> L. c. p. 104. „Huc (ad tubercula ossivora spinæ) referri potest illud morbi genus, quod, sub steatomatis specie, corporibus vertebrarum insidet, et quod ossa dissolvendo cum cartilaginibus intervertebrallibus spinam inflectit, ut dorsum in gibbum attollatur.“

<sup>40)</sup> Et degeneratio, ait DELBECQ (l. c.), ossium tuberculosa, quam SERRIS (l. c.) necroscopia perspicuum fecit.

<sup>41)</sup> Cf. REY, NÉLATON l. cc.

<sup>42)</sup> VOIGT L. c. p. 312. GHIRLANDI in *giornale di medicina pratica di BERNA*, Vol. 4. 1813. Settemb. e Ottob. SERRIS l. c. p. 329. NÉLATON l. c.

<sup>43)</sup> VOIGT L. c.

<sup>44)</sup> RACCHETTI l. c. p. 196. *Sullo stato del midollo spinale nelle curve delle vertebre*, in *ONOI DEI ANNALI UNIVERS.* 1827. Fasc. 122, p. 371.

quodque magnitudo vitii vertebrarum non semper cum gradu paralyseos cohaereat <sup>44</sup>). Generatim tamen HIPPOCRATIS observatio, quod scilicet vitium spinæ *supra* regionem diaphragmatis, quam maxime pectus, *infra* vero, quam maxime abdomen, afficit <sup>45</sup>), confirmatur. De *caussa* cyphoseos paralyticae, vario modo sentiunt auctores, eam quaerendo nunc in vitio scrophuloso <sup>46</sup>), nunc in peculiari humorum acredine <sup>47</sup>), nuncque in morbo ipsius medullæ spinalis <sup>48</sup>) (cyphoseos simulque paralyseos fonte). Ad nos quod spectat, opiniones huiusmodi pro re nata, quot quot sunt, admittendo, generatim tamen originem cyphoseos paralyticae in causis traumaticis spinæ infensis et inflammationem chronicam, primum vertebrarum, dein meningum et tandem medullæ ipsius, cum exitibus inflammationi propriis, producentibus, quaerimus; quæ sane causæ dum in aegrotos labe quadam contaminatos agunt, effectus graviores, quam in caeterum sanis, producant. Resolutio variarum partium certe non indistincte a

Pp 2

com-

44) JESS v. RACCHETTI l. c. p. 305.

45) POTT l. c. RACCHETTI l. c. 46) RACCHETTI l. c. p. 305.

47) POTT l. c.

48) PALLETTA l. c.

49) LATOUR, *mémoire sur la paralysie des extrémités inférieures, qu'on supposait dépendante de la courbure de l'épine du dos; avec des observations, qui prouvent, que cette maladie, avec ou sans vice vertébral, dérive de la lésion de la moelle épinière et qu'elle se guérit p. les fontanelles*. Par. an. XIII—1805. v. *mém. de la soc. méd. d'émulat.* an. 6. p. 62. RACCHETTI l. c. p. 311.

*compressione*, quam nervi spinae illas adeuntes per cyphosin experiuntur, derivari potest, cum necroscopia, vertebrae in cyphosi non timere, sed potius erosas esse, doceat. At vero et vertebrae erosae, dum a recto tramite deflectant, aliena loca occupant, et luxationis spontaneae imaginem referunt <sup>50)</sup>, organis vicinis tenerrimis, ut nervis, vim inferre posse nemo inficias ibit. Praeterea cyphosin saepe anchylosin vertebrarum sociam agnoscere <sup>51)</sup> constat. Postremo cavendum, ne incommoda eorum, qui cyphosi laborant, *per nervos* tantum explicare satagamus. Notum enim est, quod, tum columna vertebralis in cyphosi valde laeditur, cavitates pectoris, abdominis et pelvis <sup>52)</sup> maxime angustantur, et vasa majora, imprimis aorta, a recto tramite deflectunt <sup>53)</sup>, unde plurima mala, certe non a nervis repetenda, expectanda sunt. Ne vero credamus, omnem, quae ex columna vertebrali aut osse sacro <sup>54)</sup> proficiscitur, paralysin absolute cyphosi vel

50) RUST l. c. p. 73. „Auch ist die sogenannte Pott'sche Lähmung weiter nichts als die Folge einer spontanen Verschiebung einiger Wirbelknochen von innen nach aussen.“

51) VOIGTHER l. c. A. W. OTTO aliique C. II. §. VIII. 11 (34) citati.

52) HARRISON *case of complete palsy of the lower extremities, with partial dislocation of the pelvis*; in RUSCH *the monthly gaz. of pr. med.* 1831. Jun. p. 210. Jul. p. 245.

53) VOIGTHER l. c. p. 314.

54) Exstant observationes comprobantes, extremitatum paralysin inferiorum non solummodo in forma cyphosaeos



vel alio externo vitio insignitam esse. Aliorum <sup>54)</sup> nempe et nostrae observationes, permultas *paralyses spinales* sine omni externo ad columnam vertebralem indicio obvenire, docent. Hujusmodi sunt: 1° *Paralyses*, quae ex *inflammatione chronica* <sup>55)</sup> indolis traumaticae, rheumaticae, arthriticae, haemorrhoidalis *meningum*, spinalem medullam ambientium, aut *systematis venosi specus vertebralis*, oriuntur (*rhachialgitis paralytica* dici posset). — Frequentissime ea sane, praesertim inter opifices, labores cum lumborum intensione per-

vertebrarum aut colli, aut dorsi aut lumborum conspici, ut POTT contendarat; sed nec minus cum *ossis sacri degeneratione* connexam esse posse. Hujus ossis superficies paralytica, cujus mentio fit in HORN *Archiv. B.* 9 et 10, degenerata et toto ambitu tumida apparuit. — Juvenis, 18 annos natus, de quo factum in *Salzb. med.-chir. Zig.* 1811. *B.* 2. p. 115, 116, post lapsum in *os sacrum* eadem paralyti affectus, idem os tumidum habebat. Exinde patet, nec minus *os sacrum* extremitatibus resolutis afflictorum, quam columnae vertebralis caeteras partes inspicere, necessarium esse.

55) „Subinde tum hujusce morbi (spinae bifidae) tum cyphosis asymptomata, sine ipso ad vertebralem columnam tumore, externo observari videntur.“ J. P. FRANK l. c. RACCHETTI l. c. p. 305. J. K. H. MARK z. *Lehre v. d. Lähm. d. untern Gliedmass.* Carlar. u. Bad. 1838.

56) BERNDT *Fälle glücklich geheilt, Lähm., welche v. einer Rhachialgis u. v. chron. Entzünd. in d. Substanz oder den Umgeb. des R. M. ihr. Urspr. genom. hatten*, in HUPF-LAND *Journ.* 1833. *St.* 11. p. 28. Lege duas paraplegias ex myelitide chronica apud CRAIGIE in SCHMIDT *Jahrb.* 1835. *B.* 6. p. 113.

perficiētes, et inter milites atque rusticos vicissitudinibus aëris expositos obvenit. Morbus, sub forma rhachialgiae incipiens<sup>57)</sup>, lente insidias struit<sup>58)</sup>, tum per meningum callositatem, tum per destructionem partis medullae spinalis, tum per adhaesiones morbosas, tum per extravasata serosa, purulenta, cruenta. 2° *Paralyses*, quae ex metastasi antro vertebrali infensa pullulant, quaeque plus minus processui inflammatorio tribui possunt. Sic plurima *febrium rheumaticarum et nervosarum*, peculiari medullae spinalis affectione stipatarum, imperfecta crisi solutarum, paralysi brachiorum pedumque terminatarum, vidimus exempla<sup>59)</sup>. *Scarlatina* in hydropem specus vertebralis desinens, nisi morte praecipiti, tandem paralysi terminatur. Idem, quamvis rarius, alia exanthemata efficiunt<sup>60)</sup>, 3° *Paralysis ex ossificatione cartilaginum intervertebraliū*<sup>61)</sup>, aut ex  
*tophis*

57) C. II. §. VIII. N. 7.

58) „*Characteristisch . . . ist das allmähliche Fortschreiten von der Peripherie zu den Centraltheilen u. der langsame Verlauf.*“ MARK l. c.

59) Inter haec luculentissimam nobilis Lithuani recorder, qui an. 1813 ex febra nervosa convalescens, ita manuum usum amisit, ut a famulis nutrirī debaret. Brachiorum motus liber remansit. Non ita crurum, sub deambulatione vacillantium, implicitorum. Universalis adarat macies. Fonticuli varē an. 1817 lateribus spinæ admodū quid levaminis attulerunt, sed autumno subsequente aeger sub itinere morbo acuto inopinante e medio ablatu est.

60) §. LXI. N. 2 (43—47).

61) ASS. KNT (l. c.) duorum paraplegia affectorum mentionem facit, in quibus cartilago intervertebralis ac *Lige-*

*trophis vertebrarum*, cui morbo, uti monuimus<sup>62)</sup>, ut plurimum arthritis et syphilis ansam porrigunt.

4° *Paralysis ex apoplexia specis vertebralis*. Morbus istiusmodi, jam alibi commemoratus<sup>63)</sup>, saepe est apoplexiae encephalicae aut socius<sup>64)</sup>, aut effectus<sup>65)</sup>; alias *per se* ingruit<sup>66)</sup>. Quo in casu apoplexia spinalis, ut supra docuimus<sup>67)</sup>, plerumque<sup>68)</sup> *paraplegiam* post se trahit: Nisi morbus a causa traumatica excitetur, plerumque a *rhachialgia*<sup>69)</sup> annuntiari solet. Huic ansam ut plurimum dederunt haemorrhoides<sup>70)</sup>; menstrua, lochia suppressa, praesertim in hominibus labor scorbatica mulctatis. Apoplexia more suo extemplo ingruit, relinquens variarum partium ex loco affecto nervos desumentium paralysin. Secto

cadavere una alterave pars medullae spinalis crure aut  
menta tumida duraque intra thecam ita prosiliebant, ut  
chorda spinalis vabementer comprimeretur.

62) C. II. §. VIII. N. 11. 15.

63) C. III. §. XIV. N. 5.

64) E. c. casus MORGAGNI op. c. epist. LX. 4. T. II. RICCHETTI l. c. p. 217. DE AGOSTINI in *giorn. di med. prat.* 2. Vol. FODERÀ de apoplexia disquisitio theor. pract. Avignon. 1808.

65) P. II. ad. alt. Vol. I. Sect. 1. C. V. §. XXIX. 2 (7).

66) G. H. RICHTER in HUFELAND *Journ.* 1826. St. 6 (nonnullos casus, plethora et enormi venarum medullae spinalis repletionis provocatos, affert).

67) §. LX. 3.

68) Possa enim paraplegiae causam etiam in cerebro latere, observationes EARLE (l. c.) docent.

69) ZANGEL l. c. BERNDT l. c.

70) Quare ZANGEL (l. c.) dicit: „diese Lähmung kommt nur im männlichen Alter von 30—50 J. vor.“

aut sero cruento inundata reperitur<sup>71)</sup>. Cerebrum incolume obvenit. Mirum hinc non est, exercitium facultatum animi vix aut ne vix quidem perturbari<sup>72)</sup>. Et 5° *Paralysis ex medullae spinalis atrophia seu inanitione*. Aegritudo huiusmodi, saepissime onaniae<sup>73)</sup>, in utroque sexu, effectus, cum *labe dorsali* connubium inire solet<sup>74)</sup>. Interdum et venenis originem debere videtur. — Quocunque in casu, ad diagnosin paralyisum spinalium, sine evidentibus vitiis externis ad columnam vertebralem obvenientium, instituendam, maxime ut methodi spinae internae conditionem explorandi<sup>75)</sup> memores simus, opus est. Interea certissimum diagnosticon ex anamnesi desumitur.

Paralysis  
nervae.

5. Inter *paralyses, ex vitiis singulorum nervorum* pullulantes, paralysis affectioni *plexuum nervorum abdominalium* inprimis *mesaraicorum* originem debens, primum occupat locum. „Nervi enim mesenterii non tantum cum intestinis, stomacho, jecore aliisque visceribus communicant, sed etiam cum lumborum aliarumque partium nervis et consequenter cum artuum<sup>76)</sup>. Ac profecto! Nervi intercostales et vagi, plexus abdominales formantes, cum nervis cervicalibus et dorsalibus, plexum brachialem constituentibus, in gangliis cervicalibus invicem confluent<sup>77)</sup>. Miror hinc SWIETENIUM

dixisse:

71) §. LX. 12 (170). 72) MARX l. c. 73) GIRRL l. c. hist. II.

74) HORN *Archiv*. 1833. II. 1. p. 65. 75) C. I. §. IV. N. 2.

76) WILLISIUS de anima brutorum, P. II. C. 15.

77) SCARPA de gangliis nervorum de qua origine et essentia nervi intercostalis, ad illustr. vir. H. WEBER anatom. Lips. epistola. 1831.

dixisse: „Laetus recordor, me aliquoties brachiorum resolutionem, colicae pictionum succedaneam, feliciter curasse, dum frictiones, emplastra aromatica etc. *soli abdomini applicarem*, licet ex anatomica nervorum historia fatear me non intelligere, quomodo nervi, per abdominalia viscera dispersi, molestissimo et diuturno dolore excruciat, paralyisin brachii inducant cum atrophia musculorum“<sup>78)</sup>. Ex nervorum abdominalium affectione sequentes paralyseos species ortum ducere solent: 1° *Paralysis saturnina seu metallurgorum* a STOCKHUSIO<sup>79)</sup>, LANGIO<sup>80)</sup>, SUCHLANDIO<sup>81)</sup>, L. TANQUERELIO DES PLANCHES<sup>82)</sup>, BROCKMANN<sup>83)</sup> aliisque tum citatis<sup>84)</sup>, tum citandis<sup>85)</sup>, bene descripta. Detinet morbus iste extremitates praecipue superiores, maxime manus; verum haud raro et crura saltem imbecillia sunt. Extremitates doloribus vagis exoruciantur, eorumque musculi atrophia, in pollice manuum maxime obvia, laborant. Nec paralyseos vestigia in partibus internis desiderantur e. c.<sup>86)</sup> ad oesophagum, teste dyspha-

78) L. c. §. 1070.

79) Tract. de lithargyrii fumo noxio morbifico. Gosl. 1656.

80) Epist. Lib. I. epist. 13. p. 189 sq.

81) Diss. de paralyisi metallariorum. Traj. ad Rhen. 1693.

82) *Essai sur la paralysie de plomb ou saturnine*. Par. 1834. at in *journ. hebdom.* 1836. N. 28. Cfr. SCHMIDT *Jahrb.* 1837. B. 14. p. 188.

83) *Pathol.-therap. Bemerkg. üb. d. Bleikrankh. d. Hüttenarbeiter*, in HOLSCHNER *Hannöv. Annal.* 1837. B. 2. H. 3 et 4.

84) C. IX. §. XLIII. N. 2 (43).

85) P. III. Vol. I. cap. de Colica pictionum.

dysphagia, ad intestina, teste pertinaci alvi obstructione, maxime hinc familiari. Origo *abdominalis* paralyseos metallurgorum vel ex eo comprobatur, quod morbus iste multis *signis arthriticis* stipatur, et ut plurimum ex *colica saturnina* <sup>87)</sup> ortum ducit. Morbum illum *signis arthriticis* stipari jam SCOTLAND <sup>88)</sup> ex eo comprobare satēgit; „quod tempore pluvioso dolor exacerbetur, quod topiis nodisque articuli perturbentur, ut et quod dolor in articulis, quam in reliqua membri parte maior sit“ <sup>89)</sup>. Arthritidis vero praecipuam officinam ventrem esse, ut res demonstrata <sup>90)</sup> admittitur. Quod spectat ad *colicam saturninam*, haec signa, nisi *neuritidis*, saltem *neuralgiae* plexuum nervorum abdominalium, praecipue *mesentericorum* exhibet <sup>91)</sup>. Mirumne hinc, si ex neuritide aut neuralgia paralysis oriatur? „Sufficiebat mihi novisse, ait SWITZER, in *nervis abdominalibus* morbum habuisse originem; et in aliis morbis jam didiceram, nervos multos habere mirum imperium in aliis corporis partes . . .“ <sup>92)</sup>. Cum vero non quaevis paralysis metallurgorum colicae saturninae succedanea sit <sup>93)</sup>, cumque actio plumbi

non

86) Ad organa vocis, testibus linguae haesitantia et aphonia, immo ad nervos opticos, teste amaurosi. Cfr. lib. d. *Paralyse saturnina u. ihre Behandl. mit Strych.* ex bull. *gén. de therap.* T. 6. livr. 4. in SCHMIDT *Jahrb.* 1834. B. 3. p. 35. et supra §. LX. 1 (4 et 7).

87) v. SCHMIDT *Jahrb.* l. c.

88) L. c. p. 6.

89) L. c.

90) v. cap. de arthritide.

91) v. cap. de colica.

92) §. 1070.

93) SCOTLAND l. c.

non solum ad speciales nervos circumscripta, sed in universum genus nervosum extensa sit<sup>94)</sup>; origo abdominalis paralyseos saturninae dubiis adhuc subjici videri posset. Difluentur vero haec dubia considerando: a) non omnem paralyzin, quae metallarios aggreditur, ideo ex plumbi actione repetendam esse, cum opifices istiusmodi et ex causis rheumaticis aliisque<sup>95)</sup> paralytici fieri possint; — b) plumbum varia sub forma corpori insidias struere, et verisimiliter potissimum ex usu suo interno, ntpote directe nervis abdominalibus infenso, colicam et inde paralyzin originis abdominalis expectandam esse (sic antequam adulteratio vini ope plumbi probe nota fuerat, ipsa ex vini qualitate derivari solebat colica saturnina et succedanea inde paralyzis<sup>96)</sup>) — et c) paralyzes non solum colicam saturninam, sed et alterius generis colicas, quidquod multos alios morbos abdominales sequi. Qua de causa stabilimus generatim 2° *Paralyzes ex colicis et dysenteriiis*. Exempli paralyzium post colicas, quamvis non saturninas, collegerunt alii<sup>97)</sup> ipsique vidimus<sup>98)</sup>.

De

94) P. II. ed. alt. Vol. I. Sect. 1. C. I. §. III. N. 75.

95) SUCHLAND I. c. p. 10.

96) WEPFER misc. ac. nat. cur. an. II. obs. 39.

97) EPIPHANUS hist. N. 35. CRAWER diss. de colico dolore et illius symptomate paresi. Basil. 1614. KLOPFINGER diss. de colica passione ejusque symptomate illustriori paresi. Basil. 1618. BURWOND Beobacht. u. Bemerk. üb. eine Colica nervosa mit darauf folgend. Paralyse d. oberh. u. unt. Extremit. ex journ. de Montp. T. 2. livrais. 11 et 12. in SCHWABER Jahrb. 1836. B. 10.

De *dysenteriae* in paralyisin transitu jam mus<sup>99</sup>). Cur paralyisis ista plerumque<sup>100</sup> versa sit, explicare non audemus. O etenim, hoc sub respectu allatae<sup>101</sup>), ne nobis satisfaciunt. 3° *Paralyisis ex ver flatibus intestinalibus*. Transitoria esse sc xime extremitatibus inferioribus infensa<sup>1</sup> *Paralyisis ex febribus intermittentibus*<sup>102</sup>).

98) Medicus Lithuanus S. perpassis plurimis colicibus, in manuum paralyisin crurumque imbecillidit. Nulla apud eum plumbi suspicio locum potuerat. Matrōna Viennensis R. et stirpe C. i tumores, quorum unus magnitudinem capitis adaequabat, verisimiliter in mesenterio gerens, obnoxia, tandem brachiorum paralyisin contraxi  
99) §. LX. N. 5.

100) ZIRNEMANN (von d. Ruhr unter d. Folle. p exempla paralyseos post dysenteriam affert, i et brachia simul resoluta erant.

101) FABRICIUS l. c.

102) M

103) Febrem intermittentem sub levia paralyseos tum inferiorum describit WINKLER in *Oesterr. in neueste Folge*. 1830. B. 1. St. 2. p. 174. Similia runt: MUSGRAVE in *phil. transact.* N. 212. REM PELAND *Journ. B.* 20. St. 3. p. 68. SEILER pr. d periodica. Viteb. 1805. PUCCINOTTI *stor. delle febb. di Roma. Urbin.* 1821. p. 129—136. J. DER Beobacht. ein. intermittir. Paraplegie in *Fa Amaurose*; ex *the lancet*. 1827. p. 393. in *Ile Annal.* 1828. B. 4. *Spptheft* 2. p. 284. ELLIOTT lysis intermitt. ex *the lancet*. 1831. January, in *allg. Repert.* 1831. Juli. p. 35 (casus memoratu bris interm. quartanae larvatae, chinini medi postquam tres fera annos aevierat). ROMBERG.



tur de ea RIVZARIUS<sup>104)</sup>, bilem accusans. A veritate minus alienum videtur, compressionem ple-xuum nervorum abdominalium a visceribus vicinis obstructis<sup>105)</sup>, vel a saburris pro causa tanti phaenomeni admittere. Interea cum et medulla spinalis in febribus intermittentibus scenam ludere videatur<sup>106)</sup>, fieri posset, paralysin illis febribus succedaneam quandoque et originis spinalis esse. Ad reliquos nervos quod spectat, ex eorum laesione paralysin oriri, innumeris observationibus confirmatum habetur. „Sic praeciso brachii nervo, qui ab illo actuatur, digitus riget. Sic praecisis digitorum nervis non semel vidimus hinc ad motus genera exercenda ineptos digitos, sive contracti maneant, sive rigidi et contractioni inepti“<sup>107)</sup>. Spectat huc exemplum paralyseos brachii a laesione nervi ulnaris, quod supra retulimus<sup>108)</sup>, aliudque SWIETENII paralyseos brachii a glandulis subaxillaribus scirrhis<sup>109)</sup>. Resolutiones ex neuralgiis et neuritide<sup>110)</sup>, ortum paralyseos ex affectione traumatica, rheumatica, arthritica etc. singulorum nervorum abunde confirmant. Indolis rheu-

*Wochenschr.* 1833. N. 8. FRANK *periodische Lähm. d. Unter-Extremit.* in CASPER *Wochenschr.* 1833. N. 26. DASSIT *Fall v. intermittir. Hemiplegie, welche mit ein. Tertianfieb. zusammentraf.* ex *bull. de therap.* T. 15. p. 376 in SCHMIDT *Jahrb.* 1839. B. 22. p. 288.

104) Prax. L. I. de paraly. p. 106. 105) PERCIVAL L. c.

106) C. I. §. II. 2. 107) WEDDEL diss. an. 1677. p. 13.

108) §. LXI. 2 (21). 109) Ibid. (25).

110) Cap. VII. §. XXXIII.

rheumaticae plurimas paralyses musculorum faciei, de quibus monuimus<sup>111)</sup>, fuisse.

Par. com-  
positas et  
simulatas.

6. Cum cerebrum, medulla spinalis et nervi unum idemque efficiant systema, paralyisin ex plurimarum illius partium *simultanea affectione* ortum ducere posse, intelligitur (*Paralyses originis compositas*). Nec satis. Ex tradita aetiologia constat, paralyses quoque causam interdum in vitiis systematis vasorum sanguiferorum<sup>112)</sup>, musculorumque ipsorum<sup>113)</sup> agnoscere, unde ille, qui in fonte morborum paralyticorum unice genus nervorum coram oculis haberet, a recta via valdepere aberrare posset. Aberraret quoque, si paralyisin, ut aliquando accidit<sup>114)</sup>, *incurvationi columnae vertebralis fortuito nuptam*, ex illa columnam praepostere derivaret. Postremo non ignorandum, *paralyisin* interdum *simulari*<sup>115)</sup>.

#### §. LXIII.

111) §. LX. 6 (60)

112) §. LX. 12 (188). Cfr. SWIFTEN l. c. §. 1059. Hoc valet praecipue de Beriberi. WRIGHT l. c. De differentiis paralyisium aut ex vasorum sanguiferorum aut ex cerebri affectione pullulantium, lege W. STRECKES *Verles. jeb. d. Heil. d. innern Krankheit.* etc., deutsch v. J. BERNARD. Lpz. 1835.

113) §. LX. 12 (189). MOTHE (*melang. de méd. et chir. . . paralysie* etc. T. 2. Lyon 1827) ne paralyisin ex cerebro, medulle oblongata, medulla spinali et e nervorum lessione pullulentem cum ea, e musculorum affectione morbosa prodizante confundamus, monet.

114) Legi de hoc argumento meretur EARLE l. c. et STROMMEYER l. c. in CASPER *Wochenschr.* (qui ulterior docte exponit, spinas curvaturas saepe ex paralyisi peripherica oriri).

## §. LXIII.

## P r o g n o s i s.

1. Periculum paralyseos bifario e fonte pendet, <sup>Pericu-  
lum.</sup> videlicet tum e loco systematis nervosi affecto, tum a musculo inde resoluto. Paralysis encephalica et spinalis, quo magis caussa circa medullam oblongatam et cervicalem urget, eo periculosior <sup>1</sup>). Istis enim locis affectis, muscoli nobilissimi, ut cor, aliique respirationi et sensibus dicati resolvuntur. Colligitur inde *paraplegiam* periculosissimam omnium esse. Accedit *hemiplegia*, inprimis si ea apoplexiam praecedat, quae enim apoplexiam sequitur hemiplegia, haec melioris spei est, „quia tunc novimus morbi causam minui et quassam encephali partes liberari“ <sup>2</sup>). Idem de paraple-

115) H. MARSHALL *hints, &c. on the examinat. of recruits etc.* in *Edinb. med. and surg. journ.* 1826. Octbr. *Cfr. Horn Archiv.* 1827. St. I. J. CHEYNE ex *Dublin hosp. reports and communicat.* 1827. Vol. 4. in GERSON u. JUL. *Mag.* 1828. II. 1. p. 160. *Cfr. FAURIE Notiz. B.* 18. N. 17. p. 267. *B.* 22. N. 9. p. 138. WAGNER *erster Jahrgang. üb. d. päd. Unterrichtsinst. f. d. Staatsarzneik.* . . z. Berlin. ib. 1834 (casum memoratu dignissimum relinquit).

1) ROLPINKIUS (method. cogn. et curend. effect. C. 1) inquit: „quo cerebrum sunt propiores spinae affectus, eo magis sunt periculosiores, quo vero remotiores, eo intiores.“  
2) SWISTEN §. 1062. Sic apoplectici duo, de quibus alibi locutus sum (P. II. ed. alt. Vol. I. Sect. I. C. V. §. XXV. 1 (18. 36)), hemiplegia, in quam inciderent, plane sanati fuerunt, ac longo tempore post optime adhuc fruebantur valetudine. Vidimus feminam hemiplegia laborantem, quae felicissime infantis seni partu absoluta est.

raplegia, apoplexiae spinalis effectu, valere videretur<sup>3)</sup>. Quae ex imo ventre ortum ducunt paralyses, caeteris paribus, facilius sanantur<sup>4)</sup>, dummodo atrophia non stipentur. Est illa aliquando *transitoria*<sup>5)</sup>. Haec cum praesertim paralysin saturninam comitari soleat, illius prognosis sponte elucet. *Paralysis musculorum faciei*, si ex affectione ipsius cerebri pullulet (quod ex aliis signis labem encephali indicantibus, potissimum ex sensuum, et ex animi facultatum laesione, cognoscitur), magna pericula et inter alia apoplexiae illud portendit; secus autem, si paralyseos caussa in ipsis nervis facialibus sedem figat. Optime hoc monuit HIPPOCRATES<sup>6)</sup> dicens: „distorsiones autem in facie, si nulli alteri parti corporis communicant, cito sedantur, vel sponte, vel per necessitatem; reliqui vero apoplectici fiunt.“ *Paralyses partiales* quae ex vitiis columnae vertebralis originem ducunt, illorum vitiorum agnoscunt prognosin. Ominosae sunt paralyses ex carie vertebrarum; praesertim morbo jam multum provento et aegroto labefactato.

## 2. Ma-

3) §. LX. 3 (18).

4) Ergo HEIDLER (l. c.) „je vollkommener die Functionen des Unterleibes von Statten gehen,“ eo periculoior est paralysis.

5) Anno 1834 ad propriam mensam dominus St. ..., vir quinquaginta annorum, potui vini haud parcens, brachium dextrum derepente movendi facultate orbatum exhibuit. Rediit tamen haec facultas, elapsa decima horae parte. — *Transitoriae paralyses* exemplum quoque invenitur in GERSON u. *Jul. Mag.* 1831. p. 327.

6) *Proorrh.* L. II. C. 17. *CHART.* T. VIII. p. 826.

2. *Malum*, si sphincterum officium franga-<sup>Signa ma-</sup>  
 tur, si paralysis cum aliis morbis herculeis com-<sup>la.</sup>  
 plicetur<sup>7)</sup>, si pars paralytica simul sensu desti-  
 tuatur, si frigida, oedematosa, flaccida, gravis sit,  
 si fiat gangraenosa<sup>8)</sup>, atrophica. Unde merito  
 monuit HIPPOCRATES<sup>9)</sup>: „quibus una cum hoc,  
 quod movere non possunt, morbosa pars corpo-  
 ris attenuatur, hi in sanitatem restitui non pos-  
 sunt: quibus autem colliquationes non accesserint,  
 hi sani evadent.“ — Et CELSUS<sup>10)</sup>: „Quacumque  
 vero corporis parte membrum aliquod resolutum  
 est, si neque movetur et emacrescit, in pristinum  
 habitum non revertitur; eoque minus, quo vetu-  
 stius id vitium est<sup>11)</sup> et quo magis in corpore  
 senili

7) Ut cum mania: *Samml. ausserles. Abh. f. pr. J. B. S.*  
 p. 485. L. J. C. CALMEIL de la paralysie considérée chez  
 les aliénés. Par. 1826. ESQUIROL rapport statistiq. sur la  
 maison r. de Charenton pendant les an. 1826—1828. Par.  
 1829. Cfr. G. H. BERGMANN maison r. de Charenton, in  
 J. B. FRIEDREICH *Magaz. f. philosoph., méd. u. gerichtl.*  
*Seelenheilk.* 1831. H. 7. p. 102 (CALMEIL et ESQUIROL hanc  
 paralytin insanabilem declarant). W. DAVIDSON *allg.*  
*Lähm. u. Blödsinn*, ex *monthly archiv.* 1834. March, in  
 SCHMIDT *Jahrb.* 1835. B. 5. p. 192. H. RODRIGUES *üb. d.*  
*allg. Paralyse bei Geisteskr.* ex *revue méd.* 1838. Avril et  
 Mai, in SCHMIDT *Jahrb.* 1840. Supplb. 2. p. 210.

8) RUMER in HUFELAND *Journ.* 1814. p. 40 (Sphacelus spon-  
 taneus digitorum manus).

9) L. c.

10) L. II. C. 8. p. 75.

11) „Haec est ratio, quare prudentes medici non multum  
 sperent de curanda paralyti, quae per plures jam annos  
 perstitit; quia jure metuunt, nervosam fabricam vel de-  
 structam esse, vel jam concretam adeo ut nil transmittere

Frank Prax. II. 1. 2. 1.

senili est;“ — aut, ut WEDÉLI verbis utamur <sup>12)</sup>, „si paralysis seni alterum pedem in cymbâ Charontis jam habenti accidat.“ Paralysis hyeme curatu difficilior, vere facilior.

Signa bona.

3. Bonum est, si febris, potissimum ea, quae horrore ingruit <sup>13)</sup>, recenti paralysisi superveniat; si pars paralytica tremore aut motibus convulsivis tentetur, si dolere incipiat, si sensus puncturae acus in ea percipiatur <sup>14)</sup>, si diarrhoea vires haud frangens in conspectum veniat <sup>15)</sup>, si paralysis descendat, et liberas partes superiores relinquat, si morbus aetati competat, sique prima medendi tentamina succedant.

Curae spontaneae et accidentales.

4. Paralysis evanuisse visa est, supervenientibus apoplexiae recidiva <sup>16)</sup>, abscessu sub aure <sup>17)</sup>, ad pelvim posteriorem <sup>18)</sup>, fistula ani <sup>19)</sup>, partu <sup>20)</sup>,

men-

possit. Hinc in tali casu membrorum paralyticorum motus emendatur quandoque utcumque, sed raro vel nunquam in integrum restituitur, ut quotidianae observationes practicae docent.“ SWIFTER l. c. §. 1065.

12) Diss. cit. p. 20.

13) Haec conditio requirere videtur, ut a febre, paralysisi superveniente, quid boni expectari liceat.

14) CLIFTON WITTINGHAM de morb. quibusdam commentarii. Lond. 1752. v. *Abh. f. pr. Ärzte. B. B. 2. St.* p. 228. N. 91.

15) ZANGEL l. c. („reichliche Stuhlausleerungen nach gelind abführenden Mitteln“).

16) RUSSEL in med. obs. and inquiries, Vol. I. N. 24.

17) *Journal de médecine*, T. 61, p. 354.

18) *Recueil périod. de la soc. de méd. à Paris*. N. 34.

19) GENCA anatomia chirurgica. v. HALLER bibl. chirurg. Vol. I. p. 405 (Paralysis saltem imminuta).

menstruorum eruptione<sup>21)</sup>, blenorrhoeae restitutione<sup>22)</sup>, apostemate ad lumbos<sup>23)</sup>, ad trochanterem<sup>24)</sup>, alvi profluvio<sup>25)</sup>, ira<sup>26)</sup>, terrore<sup>27)</sup>, gaudio<sup>28)</sup>, risu<sup>29)</sup>, imaginatione<sup>30)</sup>, febre<sup>31)</sup>, combustione<sup>32)</sup>, fulmine<sup>33)</sup>, ictu sclopeti mino-  
 Qq 2 ris<sup>34)</sup>

- 20) SCHNEIDER in *med. Corresp.-Bl.* 1831. N. 21.
- 21) GILBERT *advers. pract.* p. 271. GULBRAND in *act. soc. r. Havn.* Vol. I. p. 82.
- 22) GULBRAND *coll. soc. med. Havn.* Vol. II. p. 194. CAL-  
 LISEN in *act. r. soc. med. Havn.* Vol. II.
- 23) HUFELAND *Journ.* 1812. *Mai.* p. 34.
- 24) LIROSCITZ *Beiträge z. neuern Heilk.* 2. B. p. 133.
- 25) RANÖE in *act. reg. soc. med. Havn.* Vol. II. p. 30.
- 26) SCHENK obs. L. I. N. 182. PAULINUS obs. *med. phys.*  
 obs. 34. v. *Ephem. n. cur.* Dec. II. an. 5. app. p. 23.
- 27) SCHENK obs. L. I. N. 181. MARCELLUS DONATUS L. VI.  
 C. 4. p. 640. VALLERIOLE L. II. obs. *med.* 4. PSCHLINI  
 L. III. obs. *med.* 26. DIMMERROGER obs. et *curat. med.* C.  
 N. 10. LOEPFLER *Beiträge z. Wundarzneik.* 1. B. JÄGER  
*merkwürd. Heil. ein. Lähm.* in CASPER *krit. Repertor.* 1830.  
 B. 27. H. 3.
- 28) GASSENDIUS in *vita Peirescii.* L. IV. p. 26.
- 29) *Gazette de santé.* 1814. *Mai.*
- 30) PSCHLINI obs. 32. L. III. FROBER *Notiz.* B. 31. N. 9.  
 p. 148. ex PARIS *the life of Davy.*
- 31) LENTIN *Lib. I.* obs. 21. ELLER *med. u. chir. Anmerkun-*  
*gen.* p. 17. HERMAN app. ad MARQUEST *traité de l'hydro-*  
*pie.* p. 169. *Cfr. journ. de méd.* T. 6. p. 148. HORNUNG  
*Hemiparesis rheumat. Natur,* in *Oesterr. med. Jahrb.* 1835.  
 B. 17. p. 281.
- 32) A. GIBSON *Fall ein. Lähm. d. untern Extremit.* in GIBSON  
*u. JUL. Mag.* 1828. St. 4 (comb. fortuits).
- 33) *Gazette salulaire.* 1781. *Moût.* WILKINSON *the case of*  
*Ms. Winder.* Goett. 1765. *Obs. d'une paralysie guérie*  
*par un coup de tonnerre.* *Revue méd.* 1828. *Févr.* p. 300.

ris<sup>24</sup>) et sponte<sup>25</sup>). Quae singula medico naturae nutum sequenti haud raro viam medendi indicant<sup>26</sup>).

## §. LXIV.

## C u r a.

Generet-  
tim.

1. Ad hanc viam prosequendam, prudentiâ et patientiâ opus est, totaque medendi ratio sedi et indoli morbi adaptanda.

C. para-  
lyseos en-  
cephali-  
cae.

2. *Paralysis originis encephalicae*, praesertim recens, instar apoplexiae<sup>1</sup>) curatur. Hic (si morbus inflammatorius) *venaesectio* ab antiquis commendata<sup>2</sup>), tardius vero, ob varias hypotheses de paralyseos natura frigida<sup>3</sup>) vel asthenica, ple-  
rum-

Cfr. ALBERS in *Heidelb. klin. Annal.* 1826. B. 4. *Spptheft* 2. p. 284 (3). GIUS. BARRERA in *il filiatro Sebezio giorn. della sc. med. Nap.* 1836.

34) VELPRAU *Hemiplegie durch einen Pistolenschuss geheilt*, ex *bull. de therap.* T. 15. p. 68. in *SCHMIDT Jahrb.* 1839. B. 21. p. 323 (ut videtur sanatio vulnere et sanguinis jactura contigit).

35) MORISSET ergo paralyseos repentinae solutio a natura. Paris. 1644.

36) Tandem hemiplegiam saluterem fuisse fertur: ALLÉ *chron. Husten durch Schlagfl. mit Hemiplegie gehoben*, in *Oesterr. med. Jahrb.* 1837. B. 23. p. 234.

1) P. II. ed. alt. Vol. I. Sect. 1. C. V. §. XXIX.

2) CELSUS L. III. C. 27. ZACUTUS LUSITANUS *prax. admirab.* L. I. obs. 38. 39. VALLERIOLO L. IV. N. 4. DU PORT ergo paralyseos *venaesectio*. Paris. 1598.

3) WEDELIIUS in *diss.* BIRLENI an. 1719. p. 19 restricto *venaesectionis* usu ad solam paralyseos cum apoplexia, ait „Est enim morbus potius *frigidus* at e tempora sanguinis et defectu spirituum oriundus.“ Et SWISTENIUS methodum



rumque omissa, ut sacra anchora commendari meretur \*). Relate ad hemiplegias docte disceptatum est \*), utrum cruor ex parte resoluta vel opposita detrahendus sit, — sane ex ista, utpote cerebri vitio respondente \*). Interea, si febris; boni quid promittens, paralyti superveniret, priusquam ad phlebotomiam deveniatur, effectus illius observandi forent, ne scilicet salutare naturae conamen intempestive temperemus. Conducente venaesectioe ea, si verae plethorae urgeant symptomata, novum apoplexiae insultum minitantiā; post aliquod tempus reiteranda, iterumque reiteranda. Sic saltem misera procrastinatur existentia. Quodsi signa congestionis ad encephalon sine universali plethora adessent, ad *hirudines*, circa caput applicandas, confugiendum. Praesente statu hae-

fere exclusive irritantem adversus paralytin commendat.  
§. 1668.

- 4) Casus hemiplegiarum, ubi phlebotomia profuit, enumerare amplius non possum. Quod spectat ad paralyses partiales, matrona quinquaginta et ultra annorum mense Majo an. 1817 paralyti lateris sinistri faciei, torpore linguae et dira cephalaea laborans, incassum a nonnullis hebdomadibus ruri per vesicatorium, arnicam et similia tractata, Vilnam venit. Jubeo venaesectionem e parte dextro, et illico facies, tanquam pars laxata, quae reducitur, debitum in ordinem componitur. Sanam postea ducebat vitam.
- 5) DERNARDING diss. de paralyti et hemiplegia subjuncta quaestione: utrum venaesectio in parte sana val affecta instituenda. Rostochi, 1739. GRENZ diss. de sanguine ex parte siderata per venam educatione. Lips. 1778.
- 6) Cfr. quaezo P. II. ed. alt. Vol. I. Sect. 1. C. II. §. XII. 2 (2).

haemorrhoidali, illae prope ani venas locum inveniunt<sup>7)</sup>, at non sine urgente necessitate<sup>8)</sup>. Cum apoplexia effectus suos saepe ad specum vertebralem extendat<sup>9)</sup>, nilque sanguinem efficacius ab encephalo revellat quam *cucurbitulae scarificantes* lateribus spinæ admotæ, istud quoque auxilium non negligendum. Simul vero ad conditionem viscerum abdominalium, praesertim *hepatis*, raro plane in nostro morbo immunis, respiciendum, ne reali plethoræ eas adscribamus congestiones ad encephalum, quæ impedito cruoris per ventrem circulo adscribendæ sunt. Generatim regula esto, ut in paralysi originis encephalicae, alvus quotidie semel bisve aperta sit; et quidem, si fieri posset, evitando clysteres (quatenus haemorrhoides ani excitant et intestina tenuia haud evacuant). Nisi salia media, rheum aut electuarium lenitivum debita dosi vespere sumta, postridie evacuationem alvinam producant, ad *colocynthidem*<sup>10)</sup>, *jalappam* confugiendum, ita tamen ne secessus liquidi fiant<sup>11)</sup>, quod vix unquam sine virium

7) Vir quædreginta et ultre annorum en. 1818 apoplexia et hemiplegia mulctatus applicitis hirudinibus eno, jam postridie proprio merte gressus instituere potuerat. At vero tres menses serius, novus apoplexiæ cum paraplegia insultus vitæ finem imposuit.

8) Cfr. l. c. C. V. §. XXIX. 1 (4).

9) §. LXII. Cfr. P. II. ed. alt. Sect. 1. C. V. §. XXIX. 2 (7).

10) SCHNEUR in HUFELAND Journ. 1829. St. 5 (tinct. gtt. 15—80, ter te die). ZANGEL l. c. D. A. BARTHELS in RUST Mag. 1837. B. 49. H. 1 (gtt. 20 omni bihorio).

11) Hoc præcipue de oleo crotonis valet, quod adhibitum

virium detrimento contingere solet<sup>12</sup>). Morbo jam jam provento, systemati abdominali et alvinae evacuationi per *aquas medicatas saponaceas et salinas*<sup>13</sup>), dummodo aut ob calorem aut ob gaz acidum carbonicum, aut ob aliam ignotam causam, encephalo non infensas, prospiciendum. In recenti morbo, temperato impetu inflammatorio, *tartratis stibii et potassae* parvae saepeque repetitae doses, verisimiliter opus transpirationis sustinendo, ad potiora spectant auxilia. *Vomitum* ipsum ut suadeamus<sup>14</sup>) ciere, nisi crapula invasioni morbi prope antecesserit, nunquam ob metum congestionum ad caput, ausi sumus. *Balnea tepida et sulphurica*, in paralysi generatim commendata<sup>15</sup>), illi, quae ex encephalo ortum trahit,

non

est a LANDSBERG *therap. u. toxicolog. Würdig. der Grana Tiglii* etc. in *HORN Archiv*. 1831. H. 4. p. 565.

12) Legatur, rogo, SWIETEN. §. 1068. 3.

13) F. SCHUBB *üb. d. Wirksamk. d. Mineralquell-Bäder in Marienb., b. Lähm. überh. u. besonders bei jen. d. untern Gliedmass., wenn s. v. ein. krankhaft. Affect. des R. M. od. ein. Hüfte ihr. Ursprung nehmen*; in *Rust Mag. B.* 19. p. 529. et *Heilung ein. 3jähr. R. M.-Lähm. b. einem 18jähr. Mädchen durch die Mar.-Brunner- u. Badeskur*, in *HUFELAND Journ.* 1826. St. 4. p. 102. ORANN *Chronik d. Heilg.* etc. in *HUFELAND Journ.* 1834. St. 6. p. 95 sq.

14) CELSUS L. V. C. 27. p. 179. FALCONER *memoirs of the med. soc. of Lond. Vol. 2. N. 120.* SWIETEN l. c. §. 1068. C. J. HEIDLER (l. c.) sibi et uxori suae vicibus iteratis emeticum ordinavit et paralysibus facialibus medicatus est.

15) SUMNER *account of the success of warm bathing in paralytic disorders. Lond. 1751. — Narrative on the efficacy*

non nisi senescente morbo quadrant; si enim citius in usum deducantur, inevitabilis est novus apoplexiae insultus<sup>16</sup>). Contra vero *embrocatio*, praesertim antiquitatis medicorum suffragiis suffulta<sup>17</sup>), tutissime adhiberi potest. Idem de alio antiquorum consilio, de balneis scilicet frigidis, praesertim ope *natationis*<sup>18</sup>), non audemus contendere. Ne mature nimis ad *vesicatorium* nuchae apponendum confugas! Quousque nempe congestio sanguinis circa caput timenda est, aegros praecipitat. Non ita, deleta jam impetu morbi inflammatorio, inprimis si quid rheumatici aut arthritici lateat. Interea dum celer effectus haud requiritur, *fonticulos*, utrimque ad basin cranii cultri vel lapidis caustici ope institutos, vesicatoriis longe anteponimus. Immo fatemur, quodsi praeter methodum antiphlogisticam certum aliquod paralyseos originis encephalicae habeatur auxilium, id in fonticulis ad basin cranii consistere<sup>19</sup>).

Cavea-

*of Bathwaters in var. kinds of paralytic disorders. Lond. 1787. Fontes calidae prope Cervimontium aliaeque sulphuricae (HAUSLEUTNER in HUFELAND Journ. 1826. St. 4. E. OSANN Chronik d. Bädq. im K. Preuss. ib. 1829. Spplth. p. 285. et 1834. St. 6. p. 95).*

16) ZANGEL *Badechronik von Eilsen etc. in HUFELAND Journ. 1829. St. 3. p. 118.*

17) CARL. AUREL. p. 361. PAULUS AEGINETA L. IV. C. 56. BANG act. r. soc. med. Havn. Vol. I. p. 102. COPELAND l. c. PHORBUS l. c. OSANN l. c. 1834.

18) CARL. AURELIANUS morph. chron. L. II. C. f. p. 361 (mones: „partibus passione vitiatas adiungendas esse vesicas, quo natandi laborem minuunt“).

Caveatur autem a ligamenti scopo vel vesicatoria vel fonticulos firmandi, circa collum applicandis; venas enim jugulares comprimendo omnis bonus eorum effectus destruitur. *Setaceum* ad nucham<sup>20)</sup> nimias excitare solet molestias. Juvat praeterea salivae secretionem per *sialagoga* promoveri<sup>21)</sup>. Virtus auxiliorum hujusmodi externorum variis *pharmacis internis*, peculiaribus rerum positionibus adaptandis, sustinetur. Indicantur *flores arnicae montanae*<sup>22)</sup>, si verisimile sit, paralyisin extravasato, potissimum cruento, encephali ortum debere, si morbus proventus, recidivae apoplexiae effectus, si aeger exhaustus, sique pulsus mollis et facies pallida fuerint. Virtutem arnicae perbelle a seminibus *coriandri sativi*, a herba

19) J. C. FRITCHARD *üb. d. Behandl. d. Hemiplegie*; ex the *Lond. m. gaz.* 1831. January, in BEHREND *allg. Repert.* 1831. Jul. p. 96. et FROBIEP *Notiz.* 1832. B. 32. N. 21.

20) CRAMER *diac. de paralyti et setaceorum adversus eam eximio usu.* Goett. 1760. v. SANDIFORT *thesaurus*, Vol. I. N. 7. FRITCHARD l. c. p. 96. BERNET l. c. hist. I.

21) Ut HANNAM S. THOMPSON l. c.

22) De arnicae in paralyti usu lego: COLLIN obs. circa morb. acut. et chron. Vol. IV. p. 5. V. p. 108. PLENK in MORRISSEIN *Wiener Beyträge.* 2. B. AASKOW in collect. soc. med. Havn. Vol. 2. p. 162. DE MEZA *act. r. soc. med. Havn.* Vol. III. N. 20. v. *Abh. f. pr. Ärzte.* 13. B. p. 81. CONRADI in HUFELAND *Journ.* 6. B. p. 463. ANGELI *observat. medico-prat.* v. WEIGEL *ital. Bibl.* 3. B. 1. St. p. 117—122. MORRELLI *lettera in nuovo giorn. di Milano* 1792. v. KÜHN *ital. Bibl.* 2. B. 1. St. p. 21. JAEGER l. c. OSANN l. citando. hist. I. L. F. v. GRAEVE *Jahresber. üb. d. klin.-chir.-augenärztl. Instit. d. Universität z. Berlin* 1832. *Chr. GRAEVE u. W. Journ.* B. 18. H. 1.

herba *origani majoranae*<sup>23)</sup> sustineri, experti sumus. Sub eadem rerum positione, sub qua arnicam commendavimus, inprimis si ventriculi vires langueant, aegerque notas diatheseos scorbuticae exhibeat, semina *sinapis nigrae*<sup>24)</sup>, in sero lactis decocta, aut radix *pyrethri*<sup>25)</sup> usurpari merentur. Ipsa *sanguinis transfusio* cum successu tentata est<sup>26)</sup>. Deficiente in parte paralytica necessaria cruoris copia, et *venarum compressio* proposita fuit<sup>27)</sup>; aequae ac *carotidis ligatura*<sup>28)</sup>. Quodsi

extra-

23) Sic praescribo: Rj. Fl. Arnicae drachm. unam, seminum coriandri, aut herbae majoranae drachmas duas. Infunde cum s. q. aquae fervidae per quartam horae partem, colatura unciarum decem; cap. tribus vicibus curriculo nycthemeri. Plurimos sanes paralyticos hac formula restitui.

24) Uncia semis ad colaturam librae unius.

25) OXLEY in KÜHN *phys. med. Journ.* 1802. p. 244.

26) DENIS *lettre à M. Sorbiers touchant l'origine du la transfus. du sang avec le recit d'une cure faite sur une personne paralyt.* Paris 1688.

27) Venae compressorium (Tourniquet) praecipue in paralyti partiali, ita quidem admotum, ne arteria prematur, multum auxilium ferre dicant, credentes, membra paralyti affecta sanguinis sufficiente quantitate carrere. v. CALHOUN in *Philadelph. Journ. of med. and phys. sc. N. 1.* VALENTINE *lib. d. Wirk. des Tourniq. b. Paralyse, ex the med. quart. review.* 1834. Apr. p. 188. in GERSON u. JUL. *Mag.* 1835. St. 2.

28) MORHAU (*nouv. bibl. méd.* 1829. Nouv. p. 197. Cfr. BEHNHED *Journ. des Ausland.* 1830. H. 4. p. 25) carotidia ligaturam lateris sani in hemiplagia capitis et colli suavit, ut sanguinis effluxus ad caput hic impediatur et in latere opposito vitalitas eugeatur. FANSTON (*ex the med.-chir.*

extravasati potius serosi in encephalo, ut caussa paralyseos latentis, habetur suspicio, methodus adversus hydrocephalum chronicum indicata<sup>29)</sup> inserviret. Interea fatemur, *mercurium* nobis raro in paralyysi originis encephalicae quid praestitisse, hocque pharmacum cane pejus et angue in hemiplegia senum, utpote plerumque diatesi scorbutica plus minus mulctatorum, fugiendum esse. Nec *digitalis purpureae* hic canere valemus laudem. Potius stipites *solani dulcamarae*, radices *arctii lappae*, *smilacis chinae*, lignum *guajaci*<sup>30)</sup>, profuere, quorum vegetabilium decocta per nonnullarum hebdomadum spatium epota urinae secretionem promovent et paralyticorum arthriticorum constitutionem instaurant. Quae praeterea instauratio obtinetur, tempore vernali hujusmodi aegrotis succos expressos herbarum recentium, *hederae terrestris*, *veronicae beccabungae*, *urticae dioicae*, *nasturtii aquatici*, *scandicis chaerifolii* et *fumariae officinalis*, per se vel cum jusculis carneis, viperarum, ranarum, testudinum exhibendo, non neglecta rusticatione, itineribus, animique recreatione. *Corporis enim motus*, in nonnullis paralyseos

review. 1831. Jul. in BEHREND *allg. Repertor.* 1831. Noubr. ex *Calcutta transact.* 1831. Vol. 5. in BEHREND l. c. 1832. Mai. p. 153. et 1835. Vol. 7. Cfr. FROBIEF *Notiz.* B. 46. N. 9. p. 140) hac audace operatione cum successu perfunctus est.

29) P. II. ed. alt. Vol. I. Sect. 1. C. 1. . §. XXI. 8.

30) SWITHEN l. c. §. 1068. 4. Verum nisi tenuis admodum sit decoctum ligni guajaci, facile excalescit.

seos speciebus tam infensus, hic, dummodo modicus, juvat<sup>31)</sup>; e contrario *electricitas*, quibusdam paralyseos speciebus accommodata, in paralyti originis encephalicae valde periculosa evadit<sup>32)</sup>.

C. paral.  
spinalis.

3. *Paralyses, ex affectione medullae spinalis proficiscentes*, corporis summam quietem et positionem horizontalem<sup>33)</sup> exposcunt, quibus scilicet columnae vertebralis partes affectae minus concutuntur minusque a super impositis comprimuntur. Memorabile, de quo agitur, praeceptum BAYTONIO<sup>34)</sup> et COPELANDIO<sup>35)</sup> debemus. Interea non reticendum, *extensionem diuturnam corporis* jam prius, saltem in *cyphosi paralytica*, commendatam fuisse<sup>36)</sup>; ne loquamur de aliis *auxiliis mechanicis*<sup>37)</sup>, si vertebrae inflammatae aut carie<sup>38)</sup> detentae fuerint, potius damnosis quam utili-

31) SCHWENKE in *Harl. Abh.* 1. Th. N. 15. v. *Abh. f. pr. Ärzte.* 2. B. 2. St. p. 81.

32) QUARIN animadvers. STOLL. rat. med. P. VI. p. 401. FALCONER in *memoirs of the med. soc. of London Vol. 2. N. 20.* Sane! Nil rationi magis adversatur quam usus electricitatis in paralyti, apoplexiae cerebri effectui; et nihilominus quotidie, ut ita dicam, tales absurdae curationes obveniunt.

33) E. HARRISON l. c. 34) Op. cit. 35) Op. c. p. 22.

36) LE VACHER 1768, sub *Orthopaedia*, C. I. §. V. N. 3 (10), cit.

37) Vide ibid.

38) Huiusmodi casum, abstinens cibi sanatum, describit ROLFFS *das methodische Fasten, als Heilmittel vieler Krankheiten, betrachtet*, in *Pravv Mittheil.* 1833. H. 1. Eadem ratione paralyti cum extravasato medicatus est ELLIOTSON l. c.



utilibus. Positio corporis horizontalis optime obtinetur aegrum super *lectum pensile* ponendo. Lectum inter binos arbores appensum suadet COLLES<sup>39)</sup>. Dolendum corporis illam quietem, indicatamque decumbendi rationem, vix aut ne vix quidem ab infantibus impetrari posse! Eo majori cum sedulitate reliqua auxilia in usum deducenda sunt, et quidem 1° in *cyphosi paralytica*, antequam morbus omnino evolutus sit, inprimis si violentia externa columnam vertebralem attigerit, aut si pars illius dolere videatur, *hirudines* circa locum spinæ de morbo suspectae, eo copiosiores, quo robustior aegrotulus, applicamus. His praemissis lintea complicata et aqua frigidiuscula cum aceto imbuta, pluries de die per breve temporis spatium, e. c. per horulam, parti affectae admoveamus. Nisi aegrotulus tenellus sit, et anni tempus adversetur, eum in *flumen vel mare*<sup>40)</sup> immergere curamus. Tenellis, absentibus indicibus processus inflammatorii, tota columna vertebralis bis de die *spiritu* quodam *aromatico* perfricatur. Quibus singulis auxiliis *fonticuli*, ad utrumque latus spinæ curvatae, dinque, per annorum scilicet curriculum, aperti, palmam arripiunt<sup>41)</sup>. *Metho-*  
*du*

39) GORDON 1813, C. I. §. I. N. 3 (42), cit.

40) Vel balnea salina: KANLIS l. c.

41) LATOUR (l. c. p. 63), cyphosia non ut causam paralyseos extremitatum inferiorum agnoscens, ex necroscopie hac paralyti mortuorum demonstrat, fonticulos illos nunquam contra cyphosin, verumtamen semper fere et certissime contra omnes paralyseos extremitatum inferiorum sine vertebrarum vitio conducere. Nihilominus certum est, et

us ista POTTII dicta, quamvis POTTIO longe antiquior sit<sup>42)</sup>, saepius nobis satisfecit, unde eam praesenti aevo tot detractores invenisse miramur et dolemus. Caeterum non negamus, vertebrae carie magna ex parte corruptis, cruribus omnino paralyticis, aegroto tabe correpto, et POTTII methodum non solum nil amplius praestare, sed miseros incassum excruciare interitumque propere<sup>43)</sup>. *Fonticuli* ad latera spinae, in infantibus per *causticum*<sup>44)</sup>, in adultis per *ustionem*<sup>45)</sup> instituuntur. *Ustionem* jam HIPPOCRATES<sup>46)</sup> et ALBUCASIS<sup>47)</sup> commendarunt. Sunt qui et hic *setacea*<sup>48)</sup> et *vesicatoria*<sup>49)</sup> fonticulis antepo-  
 Quo-

curvaturas spinae cum paralyti extremitatum fonticulis sanantes esse. Cfr. HORN *Archiv. B. 9.* MEYER l. c.

42) JEFFRIS, CAMBERER, MERCURIUS, qui in libro de morbis puerorum capite de paralyti et torpore ait: „quoad chirurgiam remedia quaedam sunt quae accommodantur, ut sunt cauteria etc.“

43) Ait RACCHETTI: „Io posso attestare d'aver conosciuto per esperienza, che ne' fanciulli deboli, macilenti, estenuati di forze, il lungo insistere in questo rimedio, invece di recar giovamento, ha condotto più presto il malato ad una consumazione mortifera.“ L. c. p. 317.

44) CARL BELL *System d. operat. Chirurgie. A. d. E. Berlin* 1815. KEYLER l. c.

45) L. PACCINI di una paraplegia sanata col fuoco. *Lucea* 1824. CASTELLA *jährl. Ber. etc. in Verhandl. d. med.-chir. Gesellsch. des Cant. Zür. im J. 1826. Zür. 1827. p. 62 sq.* (quatuor cauteriis, ad spinae latera applicatis, duas gibbositates formandas cohibuit at extremitatum inferiorum paresin curavit).

46) Op. c. De articulis. Sect. 3.

47) Chir. P. I. C. 10.

Quocunque in casu ulcerum artificialium actio per dietam nutrientem, aërem purum, nec non per pharmaca congrua sustinenda est. Inter haec, si agatur de aegrotto scrophuloso, *urias calcis* praepriis indicatur <sup>40</sup>). Nisi alvus obstructa sit, potus, veluti cofea paratus, ex *glandulis quercus tostis* exhibetur. Vitio *rhachitico* extractum *pampinorum vitis viniferae*, aut decoctum *radicis rubiae tinctorum* — et simplici *atoniae*, infusum *corticis cinchonae* frigidum aut *carbonas ferri* <sup>41</sup>) opponuntur. Si *venerei* quid lateret, ad *aethiopem antimonialem*, parva dosi <sup>42</sup>) at diu continuato usu, quod generatim de omnibus pharmacis intelligendum est, confugiendum. 2° *Paralysi ex inflammatione chronica metastatica partium in specu vertebrali contentarum*, si recens, et signis vigentis phlogoseos <sup>43</sup>) stipata, *venaesectionem* <sup>44</sup>) exposcit e brachio, si morbus a cervice et dorso, e pede, si a lumbis et osse sacro proficisci videtur. Sequuntur *cucurbitulae scarificantes* <sup>45</sup>), et

*hiru-*

40) KRAKER l. c. KANLIS l. c. BRENDT l. c. hist. III. BURDACH in *med. Ver.-Ztg.* 1838. N. 19.

49) PLENCK in MOHRENNHEIM *Wiener Beiträge*. 2. B. DICKSON in *med. obs. and inquiries*. Vol. II, p. 27.

50) Rec. *Murietis calcis* drechmas duas. *Aquae destillatae* unciam unam. M. D. S. ter de die guttas decem-viginti (Pro infante quatuor annorum).

51) *Grana tria* bis terve de die infanti octo annorum.

52) E. c. *granum unum* de die. 53) C. III. §. XII, N. 1.

54) GOUZÉE in SCHMIDT *Jahrb.* 1834. B. 3. p. 339. ex observat. belge. 1834. Juin. ULRICH l. c. hist. I.

*hirudines*, illae prope spinae latera, hae praecipue ad vasa ani, non neglecto reliquo *regimine antiphlogistico*. Morbo jam provectiori, praepriis rheumatico aut arthritico, super ipsam columnam vertebralem<sup>55)</sup>, aut saltem ad latera illius utrinque striae *emplastri vesicatorii* latitudinis trium pollicum apponimus<sup>57)</sup>. Usui interno tunc *diapnoica* alternatim cum *diureticis* inserviunt. Si malum indicatis auxiliis rebelle, sique in aegro ab omni crasi scorbutica alieno, juvene et vegeto, extravasati serosi in cavitate specus vertebralis haberetur suspicio; *mercurius*, sub forma aut *unguenti* ad latera spinae illiniendi<sup>58)</sup> aut *calomel*<sup>59)</sup>, intus ad levem salivationem usque exhibendus est. Hydrargyri virtus florum *arnicae decocto* sustinetur. Quae si incassum adhiberentur, *moxae*<sup>60)</sup>

ad

55) GOUZÉN l. c. PREISS l. c. (paraplegia completa ex influenza metastatica).

56) SCHMIDT commentatio de nerv. lumbalibus. p. 94. PRITCHARD in the Lond. med. repository. Lond. 1824. Jan. (de utilitate admiranda vesicatoriorum ulcerumque artificia-  
lium ad spinam dorsi paralysi afflictorum refert). J. CONRIGAN l. c. cas. II.

57) Cfr. PERCIVAL essays. Vol. I. p. 183. v. Abh. f. pr. Ärzte. 2. B. 2. St. p. 120. PREISS l. c. (vesicator. ad os sacrum).

58) BRENDT l. c. hist. I. II. IV.

59) PREISS l. c.

60) Methodus Aegyptiaca: v. ALPINUS medic. Aegypt. L. III. C. 12. p. 211. De cyphosi et spinae inflexione disserens LENTINUS (Beitr. z. ausüb. A.W.) utilitatem fonticulorum et moxae commendat. Item J. BOYLE tr. on moxa, on the applicat. of ... spin. disorders. Lond. 1825 (ad moxas conficiendas BURNE [FRONIER Notiz. 1826. N. 254] fomi-

ad latera spinae locus est. Stupendos illius effectus, quandoque tantum temporarios<sup>61)</sup>, pluries admirati sumus. Similes magisque stabiles ab ustione ope *ferri candentis* obtinuimus<sup>62)</sup>. Respuente aegro ignem, *fonticulū* aut *setacea*<sup>63)</sup> supplere possent. A balneis hic nil expectandum<sup>64)</sup>.

tem lignarium; SALANDIERE [*mém. cur l'électropunct. . . et de moxa*, Par. 1825] lenam foliorum *artemisiae vulgaris* proponunt; PAILLARD [*n. bibl. méd. Par.*, 1828. Mai. et FRORIEP *Notiz*, 1828. N. 453] *moxae* loco phosphori fragmentum magnitudinis lentis comburi iussit et laudet effectum in organismum morbosum). GIERL *ein Krankheitsfälle, als Beitr. zu . . . ein. eigenthüml. , jetzt häufiger werdend, Art. der Lähm.*, in HUFELAND *Journ.* 1827. B. 64. St. 1. p. 95. hist. I et II. CASTELLA l. c. (moxis quatuor cariem vertebrarum lumbelium cum paralysi extremitatum inferiorum curavit). *Anwend. v. Kalium-Maxen* (in paralyti), in RUST *Mag.* 1829. B. 29. H. 3. p. 584 (vituperantur). LARREY apud RUST *theoret. pract. Handb. d. Chirurgie* etc. Berl. 1831. B. 4. BUESCH *Lähm. d. Extremit. durch d. Moxa geheilt*, in *Hamburg. Ztschr. f. d. ges. Med.* B. 3. H. 3. LABLACHE *Fall v. unvollkomm. Lähm. des Armes, welche durch eine mittelst Schiesspulv. bewirkte Moxa geheilt wurde*, ex *bull. de therap.* T. 12. p. 357, in SCHNIDT *Jahrb.* 1838. B. 17. p. 303. LARREY et BAUDENS in FRORIEP *Notiz*, 1837. B. 1. N. 9 (paral. traumat. moxis debellarunt).

61) *Acte mea instituti clin. Vilnens.* an. 11. p. 91.

62) Adhibitum est ad curam capitis obstipi. KRIMMER *echnelle Heil. ein. etäßen Halses durch das Glüheisen*, in GRAEF u. W. *Journ.* 1829. B. 13. H. 3. p. 523. VON KERN *v. d. Anwend. des Glüheisens*, Lpz. 1828. FEHR in *Verhandlg. d. vereinigt. ärztl. Gesellsch. d. Schweiz*, Zür. 1829. *Erste Hälfte* (in paralysi rheumatico).

63) PIRISS l. c.

Frank *Fraz.* II. 1. 2. 1.

Rr

dum<sup>64</sup>). Contra vero 3° in *paralysi ex ossificatione cartilaginum intervertebraliū*, quo scilicet in morbo, praeter *ulcera artificialia*, prope locum affectum *balnea calida*, potissimum *sulphurica*, *extractum aconiti napelli*<sup>65</sup>), *guajaci aquosum*, *tinctura guajaci volatilis*<sup>66</sup>) aliaque sic dicta remedia antarthritica indicata sunt, dummodo nil syphilitici lateat. Hoc videlicet in casu nec ulcera artificialia prodessent, nec a sulphure nisi damnum expectare liceret. 4° *Paralysis ex apoplexia specus vertebralis*; nisi in primo morbi limine, *methodo antiphlogistica* et inprimis evacuationibus sanguinis, tum universalibus, tum localibus, cum successu aggrediatur, omnia artis conamina eludere solet. Interea nil impedit, quominus et hic auxilia, absorptionem liquidi in specu vertebrali extravasati promoventia, tentamini subjiciantur. Posset et *rhus radicans*<sup>67</sup>) et *capsicum annuum*<sup>68</sup>)

ten-

64) Inamo nocuerunt: KUHKE I. c. histor. II.

65) J. LENZ in HUFELAND Journ. 1827. St. 10 (Extr. Aconiti c. Guaj.).

66) FOTHERGILL in med. obs. and inquiries, Vol. 5. p. 394.

67) ALDERSON essay on the *Rhus toxicodendron*. Hal. 1794. Vers. germ. a F. L. FROBER. Jena 1799. Medic. Comment. v. Edinb. 2. Dec. 10. B. p. 136. Abh. f. pr. Ärzte. 17. B. p. 194. VAN MONS actes de la soc. de méd. de Bruxelles. T. I. P. II. p. 136. Abh. f. pr. Ärzte. 20. B. p. 298. BRERA prospetto di risultamenti ottenuti nella clinica med. di Padova. 1812. 13 (usque ad gr. sedecim spatio nycthemeri). DE MATTHIAS ratio instituti clin. Romani. 1816. tab. XVII. Cfr. HUFELAND Journ. 1816. Octob. p. 127. HENNIG glücklich. Kur ein. Paralyse, d. untern u. obern Extremit. durch *Rhus rad.*, in HORN Archiv. 1823. H. 6. OLLIVIER I. c. T. 2

tentaminibus ulterioribus subjici. 5<sup>a</sup> *Paralysis ex medullae spinalis atrophia seu inanitione, regimen tonicum* exposcit, deductis simul in auxilium pharmacis adversus paralytin originis encephalicae cum notis atoniae commendatis. Adde iis *camphoram* et *herbam chenopodii ambrosioidis*<sup>68)</sup>. Et *nucis*<sup>70)</sup>

Rr 2

vo-

obs. 121. p. 828. C. OTTO in n. *Hygea*. Kopenh. 1825 (ex BRENNER clinica). BUCHNER *bestät. Nutz. des R. toxicod. bei Lähm. d. Glieder*, in *allg. med. Annal. des 19. Jahrh. auf d. J. 1825. II. 1. p. 138* CLESS l. c. (duo casus) et in *Mittheilung. des Würtemb. ärztl. Ver. 1833. p. 180*. NICOLAI in *Rust Mag. 1833. B. 39. H. 1*. HEYFELDER in *SCHMIDT Jahrb. 1835. B. 8. p. 127*. TROIS üb. d. Nutzen des Rh. v. bei Behandl. paralyt. Krankheit. *ex giorn. . . pathologia 1835. Gen. Febr.* in *SCHMIDT Jahrb. 1837. B. 13. p. 10*. GÜNTHER *Wirksamk. des Rh. toxicod. in nervös. Lähm.* in *BUCHNER Repertor. 1836. B. 8. H. 3. Collectan. med. chir. Vilnens. Viln. 1838. Vol. I. p. 214*.

68) HORN *Archiv. f. med. Erfahr. 1815. 2. Heft. p. 301*.

69) BALDINGER n. *Magazin 5. B. p. 496*. RUDOLPH ib. 8. B. p. 235. LENTIN *Beyträge. 2. B. p. 212*.

70) „Dans les expériences cliniques que Mr. FOUQUIER a faites sur l'emploi de la noix vomique dans la paralysie, il a constamment vu que l'extrait alcoolique de cette substance donné de 6 à 24 grains par jour, déterminait des légères contractions dans les parties paralysées et une amélioration remarquable dans l'exercice des mouvements volontaires“ (*Gazette de santé. 1814. Mai*). Cfz. FOUQUIER in  *Journ. de méd. chir. et pharmacie p. LEROUX. T. 38* (Contenditur, nucem vomicam prius masculos paralyticos, tetanicos reddere) et LESCURE obs. sur l'emploi thérapeutique de la noix vomique dans la paralysie. v. *Bibl. méd. Paris 1818. Octob. p. 81* (Monet ischuriam hoc e pharmaco saepe produci, quod et ego in segro paraplegia laborante,

*vomicae et strychnini* <sup>11)</sup> vis antiparalytica actioni  
hujus

de quo *supra* (§. LX, 3 (18)), expertus sum. Suspexabar inde actionem specificam nucis vomicae in vesicam urinariam ac hanc ob rationem in ischuria paralytica senili valdeque rebelli adhibui, stupendo cum successu, ut debito loco palam fiet (P. IV. Vol. II. de morbis vesicae urinae). Cfr. MAURICHT in *arch. gén. de méd.* 1826. Mars (Extr. N. v. contra paralyt. rheum.). *Précis de la soc. méd. de Tours.* 1827. WENNERIS *Lähm. d. ob. u. unt. Extremität.* in *Badische Annal.* 1827. Jahrg. 2. H. 2 (Extr. N. v. gr. β—iij bis de die; sanatio). CASTELLA l. c. (in paralyti extrem. itatum). *Beobacht. ein. rheumat. Paralyse, geheilt durch den Alcoholextract d. N. v. ex arch. gén. de méd.* T. 13. Mars. 1827. in *FRORIER Notiz.* 1827. B. 17. N. 6. *Précis de la soc. méd. de Tours.* 4. trim. 1827. RAHN in *Verhandl. d. med.-chir. Gesellsch. des Kant. Zürich* in d. *Herbstsitz.* 1827. Zür. 1828. p. 19 sq. KUNKE l. c. (paral. extrem. itat. infer.). M. SCHLESINGER in *HECKER liter. Annal.* 1829. Mai. p. 74 (par. extrem. infer.). CLESS l. c. E. D. A. BARTELS *erster Jahresber.* etc. in *Rust Mag.* 1830. B. 32. H. 2. CH. WISSBACH d. *bürgerl. Krankenhaus in Bergen*; in *GERSON u. JUL. Mag.* 1830. H. 3. HEDBERG *das Reichshospital* etc. *ibid.* LAFAYE *Harnverhalt. u. Lähm. d. Blase durch Extr. N. v. geheilt*; *ex journ. univers.* 1829. Août, in *BEHREND Journ.* 1830. H. 2. p. 210. et H. 4. p. 65. TRINIUS in *vermischte Abh. a. d. Geb. d. Heilk.* Petersburg 1830. Samml. 4. p. 146. OSANN *Anwend. d. N. v. geg. Lähmg.* in *HUFELAND Journ.* 1830. Spsth. SCHÖNBBECK in *HOHNBAUM med. Conversat.* — Bl. 1830. Jahrg. 1. N. 31 CHIAPPA *Paralyse d. untern Extremitäten, ex OMOIDEI annal.* 1831. Febr. in *FRORIER Notiz.* B. 31. N. 11. BURCKARD *Lähm. nach Apoplex. durch spirit. Krükenaug.-Extr. geheilt*, in *CASPER Wochenachr.* 1833. N. 52. GALLI i *OMOIDEI ann. univ.* 1834. Outbr. Cfr. *FRORIER Notiz.* B. 44. N. 20. FERRUSSEL *N. vom. geg. Lähm. d. unter*



hujus pharmaci in medullam spinalem tribuenda videtur<sup>71)</sup>).

*Extremitäten*, ex *gaz. méd. de Par.* 1834. N. 25. in SCHMIDT *Jahrb.* 1835. B. 5. p. 10. F. JAHN *Vers. f. d. pr. Heilk.* Eisenach 1835. II. 1 (Extr. spirit. incassum adhibet.). C. WLADIMIR RADZIBON diss. de N. v. Berol. 1837. PÉTRASQUIN *Éb. d. therap. Wirkg. d. N. v. u. ihre Präparate in d. paralyt. Affectionen*, ex *gaz. méd.* 1838. N. 43. 44. in SCHMIDT *Jahrb.* 1839. B. 224. p. 157. et FROHNE *Notiz.* 1839. B. 8. N. 22. p. 343. HORN *glückl. Ausg. ein. Paralyse*, in *Würtemb. med. Corr.-Bl.* 1839. B. 9. N. 13. p. 101.

- 71) Remedium efficacissimum, quod plurimis et quidem multo saepius in paretica quam in hemiplegia conduxisse traditur et jure meritoque commendatur. Ordinatur non nisi absente inflammatione organorum systematis nervosi centralium, lubentissime in paralyti nervorum motui dicatorem, et *endernice*, gr.  $\frac{1}{2}$  — gr.  $\frac{1}{3}$ , et interne gr.  $\frac{1}{4}$  bis terve de die, quae dosi sensim sensimque ad gr.  $\frac{1}{2}$  augenda est, immo, ut alii suadent, donec per paralyti effecta convellatur. Laque observationes apud: ANDRAL in MAGENDIE *Journal.* 1823. T. 3. Juill. et in *clin. méd. ou choix d'observat.* 4. part. Par. 1827. A. LEBERET *essai sur la méth. enderm.* Par. 1823 (plus vici simplici partes resolutae post duas horas mobiles reddidisse strychninum andernice applicatum). BALLY in FROHNE *Notiz.* 1828. B. 21. N. 6 (contra paralytin vesicae urinae). HUBER et HORT in *Eyr Christiania* 1829. B. 4. et l. c. A. F. LÜBBS in *HUYERLAND Journ.* 1829. St. 4 (R. Strych. ecet. gr. iij. Solve in Alcohol. 3j. et Aq. Cinnem. spirit. 3VII. Cap. bis de die gtt. X. Dosis augenda). *The n. Americ. m. and s. Journ.* 1829. Octbr. H. RICHTER diss. de method. enderm. experiment. illustr. Berol. 1829. J. L. BARDELEY *hosp. facts and observ. illustrativ. of the new remedi., strychn., brucia etc.* Lond. 1830. et in *transact. of the provincial. med. assoc. Liverpool* 1834. Vol. 2. Cfr. FROHNE *Notiz.* 1830. B. 27. N. 9. B. 43. N. 5. p. 73. et GIBSON u.

detur<sup>72</sup>). At caute tali cum pharmaco incedatur<sup>73</sup>)!

Nec

JUL. MAG. 1835, H. 2, p. 240 (In 12 paralyisibus nervosis, sanguinis extractionibus et eccoproticis praemissis opteto cum eventu edibuit. Gr.  $\frac{1}{2}$  dosis est maxime; gr.  $1\frac{1}{2}$  vitem edimunt). Von ein. durch örtl. angewend. Strychnin geheilte partielle Lähmung, ex Glasgow med. j. in FROBIEP Notiz, B. 25, N. 7. LEMBERT, LESIEUR et WOLFF in RUST Mag. 1830, B. 32, H. 3 (Strychn. purum). Ex the Lond. m. and phys. j. 1830, Febr. in BEHREND allg. Repert. 1830, H. 5, p. 193. SANDRAS ex gaz. méd. de Par. 1830, Juin, N. 24. in BEHREND l. c. H. 7, p. 4. Lähm. d. linken Vorderarms u. d. Hand, durch Strychn. geheilt, in FROBIEP Notiz, B. 27, N. 13. W. HENNEWMANN in Beitr. Mecklenb. Ä. z. Med. u. Chir. Rostock 1830, B. 1, H. 2, p. 123. STAVENSON in transact. of the med. and phys. soc. of Calcut. 1831, Vol. 5. Schwefels. Strychn. geg. Lähm. ex the Lond. m. gaz. 1832, Vol. 10. in HANDEL Summar. 1833, B. 4, p. 213. ROHBERG endermat. Heilveruche, in CASPER Wochenschr. 1833, N. 12 et 13. STRINHAUSEN üb. d. äuss. Anwend. des Strychn. in GRAEFE u. W. Journ. 1833, B. 19, H. 1, p. 81. NICOLAI in RUST Mag. 1833, H. 1. L. GEDDINGS üb. d. Anwend. des Strychn. b. d. Behandl. v. Lähm. ex Americ. journ. of med. sc. in KALISCH med. Ztg. des Ausl. 1833, N. 70. REDLICH Strychn. geg. Hemiplegie, in med. Ver.-Ztg. 1833, N. 26. GRÖBENSCHÜTZ diss. de strychnini in neurosib. vi atq. usu. Berol. 1833 (endermice). FISCHER in Schles. Gen. Sanit.-Ber. f. 1831. Bresl. 1833. S. OPPLER diss. de strychn. nitr. interne adhib. usu et efficacia. Berol. 1834. L. T. REINHARDT vorübergehende Heil. ein. 9½jähr. Hemipl. durch d. Strychn. in Würtemb. med. Corr.-Bl. 1834, N. 22. FOUQUIER in SCHMIDT Jahrb. 1834, B. 3, p. 98. OESTHELM Beobacht. üb. d. Wirkg. des essigs. Strychn. b. ein. Parapl. in Würtemb. med. Corr.-Bl. 1834, N. 11. et 1836, B. 6, N. 27. LANGELOU in bull. méd. de Bordeaux, 1834, T. 1. HEYFELDER in SCHMIDT

Nec electricitatem <sup>74)</sup> et galvanismum <sup>75)</sup> adversus  
para-

Jahrb. 1835. B. 8. p. 127. SCHÄUBLE Beobacht. üb. d. Wirkg. des Strychnins in med. Annal. Heidelb. 1835. B. 1. H. 1. p. 124. RACIBORSKI üb. d. Anwend. d. enderm. Methode b. einige. Affect. des Nervenyst. ex journ. hebdom. 1835. N. 26. in SCHMIDT Jahrb. 1836. B. 10. p. 15. G. R. MART pr. observat. on the nat. and treatm. of nervous diseases with remarks of the efficacy of Strychnin in the more obstinate cas. Lond. 1835. p. 10 sq. et p. 31 sq. F. CHR. FAYE glückl. Anwend. v. Strychn. in d. Paralyse, ex Eyr et med. Tydschr. 1835. Förste H. in SCHMIDT Jahrb. 1836. Spptb. 1. p. 286. WILKE in Prov.-Sanit.-Ber. v. Pommern. 1. Semest. 1835. Stett. 1836. HAUFF üb. d. Anwend. narkot. Alkaloide in Würtemb. med. Corr.-Bl. B. 6. N. 8. GÖBEL et LOHMEYER Beitr. z. d. Erfahr. üb. d. Wirkung des cal-petersaur. Strychn. geg. Lähm. in med. Ver.-Ztg. 1836. N. 31. KNYLER l. o. C. F. BÄRTELS in GRÄFFE u. W. Journ. 1836. B. 24. H. 2 (adversus paralyse. chron., rheumat. et arthrit.). A. ANDRESEN diss. de methodo enderm. Berol. 1836 (in paral. local. sine vitio organ.). L. NEURAUER in med. chir. Ztg. 1837. N. 100. p. 365. SCHWEIZER in Ber. des Gesundheits-R. des Cant. Zür. ib. 1837. VOGEL l. c. PRUSS l. c. ENNS Erleichterg. u. mögl. Heil. in Lähmg. in CASPER Wochenschr. 1837. N. 23. 24. M. JANSEKOWICH ein. Bemerkg. üb. d. endermat. Heilmethode, nebst Heilversuch. damit, in Oesterr. med. Jahrb. 1838. B. 14. St. 4. p. 537. STAUER günst. Wirk. des Strychn. b. nach Apoplex. entstand. Lähm. in Schweiz. Ztschr. 1838. B. 3. II. 1. A. DROST üb. d. antiparalyt. Wirksamk. des Strychn. in Annou Monatsechr. 1839. B. 2. II. 2. p. 169. ROSSI üb. Lähmung. u. d. Gebr. des Strychn. dageg. in HUFELAND Journ. 1839. St. 5. p. 110. CLOUGH ib. St. 8. p. 130. De effectibus strychnini in partes resolutas MARSHALL HALL (MÜLLER Archiv. l. c.) pericula instructive instituit. — Brucina, strychnino conveniens et in paralysi functionibus cerebri turbatis con-

paralysin ex atrophia aut inanitione medullae spinalis

juncta, adversus quam strychninum nil effecit, perutilis, sub iisdem conditionibus, et in dosi majori, gr.  $\beta$ —ij quater de die ordinata est a MAGENDIE, ANDRAL, BAROSLEY etc.

72) Cfr. C. XIII §. LXVI. N. 2.

73) De damno et periculo nucis vomicae lege *bibl. méd.* 1818. *Février*, p. 196.

74) SICAUD LA FOND de l'électricité médicale, p. 311. JALLABERT expériences sur l'électricité, Gendv. 1749. DUBAIS diss. de hemiplegia per electricitatem curanda, Montasp. 1749. TRESKEN Tagregister üb. d. Wirkung d. Electricität, welche sich an e. gelähmten gezeigt hat, Königsb. 1752. SANS guérison de la paralysie par l'électricité, Paris 1778. Germ. Augsb. 1780. NEREL de paralysi electricitatis ope sanata, Haidelb. 1778. VAN DER BELLEN diss. de usu electricitatis in curatione paralysie. vid. Coll. diss. Lovan. MAUDUYT in mém. de la soc. r. de méd. 1777 et 1778. p. 201. — 1782 et 1783. Vol. I. p. 66. MERTENS observ. med. Vol. 2. C. 1. Heilkr. d. electrisch. Aale. Ex journ. complém. du dict. des sc. méd. 1821. Octbr. in GIBSON u. JUL. Mag. 1822. B. 3. p. 365. BERMONO ein Fall v. halbseit. Lähm. durch Electricität geheilt; ex journ. de la soc. de méd. d. Bord. 1831. Mars, in FRORIER Notiz. B. 31. N. 9. p. 137. PHORBUS l. o. BUSCH in HUFELAND Journ. 1832. St. 7. p. 66. FRORIER Notiz. 1834. B. 39. N. 14. ex bull. méd. de Bord. N. 11. BOUSSIRON fast vollst. Heil. ein. Hemipl. durch Electr. ex ib. in ib. B. 43. N. 2. p. 30. RÉVOLAT Heil. ein. paralyt. Affect. durch d. Electricität ex journ. de méd. pr. de Bordeaux 1835. Septbr. in SCHMIDT Jahrb. 1836. B. 10 (balnea electrica). BENATTI Lähm. ein. obern Gliedm. durch Electricit. geheilt, in Oesterr. med. Jahrb. 1837. B. 21. p. 495. THIENEMANN in Provinz.-Sanit.-Ber. d. K. M. K. z. Königsb. f. d. 2. Semest. 1835. ib. 1837 (paral. manus dextrae electro-punct. sanata). ROUX Parapl. . . . durch Electricität behandelt, ex gaz. méd. de Par. 1839.

nalis plane excludendum esse censemus; quamvis pro-

- Mars 30. p. 204. in HUPFELD Journ. 1839. St. 3. p. 121.  
 MAGENDIE üb. Paralyse .. des Antlitzes in FROBIEP Notiz.  
 1839. B. 11. N. 4. p. 63 (Electropunctura).  
 75) TUALLETI stor. di una parapleg. curata e guarita del  
 galvanismo; in repert. di Torino. 1825. Genn. N. 61. p. 29.  
 H. EARLE in Journ. of sci., liter. and arts. Lond. 1827.  
 Vol. 13. p. 96. Cfr. neue Samml. auserles. Abh. f. pr. A.  
 1828. B. 12. St. 3. p. 553. St. 4. p. 26. MARIANINI in bibl.  
 univ. de Gênev. 1829. Decbr. G. F. MOST Anwend. des  
 Mannfordschen Apparats gegen Lähmungen, in GRAEFE  
 u. W. Journ. 1829. B. 12. St. 3. p. 452. FESTEGGIANO Heil.  
 ein. Lähm. d. Blase u. des Mastdarmes durch Galvanism.  
 ex observat. med. di Napoli. 1829. Apr. in FROBIEP Notiz.  
 1829. B. 25. N. 9. ROSAS Lähmung des obern Augenlid.  
 mit Schiefstaken des Augapfels verbund. u. durch d. Gal-  
 vanism. gehoben; in Oesterr. med. Jahrb. 1833. B. 12. St. 3.  
 p. 433. OMIDHI annali univers. 1833. Luglio. p. 174.  
 FABRE-PALAPRAT in archiv. gén. de méd. Par. 1835. Janu.  
 Cfr. GIBSON u. JUL. Mag. 1835. St. 2 (lingua paralysis  
 galvanismo sanata). J. HAMILTON Ber. üb. d. v. Dr. Stoeckes  
 mit galvan. Akupunkt. angest. Vers. ex Dublin Journ. 1834.  
 Vol. 16. in SCHMIDT Jahrb. 1835. B. 8. p. 279 (paralya.  
 port. dur. par. 7). J. H. MILLER l. c. in SCHMIDT Jahrb.  
 1836. Sptbr. 1. p. 292. 293 (parapleg. et paraly. univers.  
 feliciter curat.). CASTURA l. c. EBERS in CASPER Wo-  
 chenschr. 1837. N. 24 (galvano-acupunctura). L. HIRSCH-  
 FELD diss. de galvan. in paral. adhib. Königsb. 1837.  
 J. GRANTHAM ex Lond. m. gaz. Vol. 20. p. 70. in SCHMIDT  
 Jahrb. 1839. B. 21. p. 195. hist. II. PIET (filius) Paralyse  
 d. Bewegung d. ein. Gesichtseite; schnelle Heil. durch die  
 Galvanopunktur. ex bull. de therap. 1839. T. 16. p. 368.  
 in SCHMIDT Jahrb. 1839. B. 24. p. 183. De effectu galya-  
 nismi in organa paralyti affecta lege MARSHALL HALL in  
 MÖLLER Archiv. l. c.

propriae observationes huiusmodi auxilia, a multis ad sidera usque elata, in ea solum paralyssi quae ex affectione singulorum nervorum oritur, commendent.

C. paral.  
nervosae.

4. Incipiemus vero therapiam istiusmodi generis paralyssium, a paralyssi, quae ex affectione plexuum nervorum abdominalium pullulat; et quidem 1° a cura *paralyseos saturninae*. Vix therapia illius ab illa colicae saturninae separari potest. Praeter remedia hic indicata, paralyssis, colicae effectus, tria potissimum agnoscit auxilia; *electricitatem* et *galvanismum*, *mercurium* et *balnea sulphurica*. *Electricitas* praeter auctores supra alatos<sup>76)</sup>, specialim hic commendatur a BANGIO<sup>77)</sup> et VATERVLIET<sup>78)</sup>, *galvanismus* a STOCKES<sup>79)</sup>. Nunquam ea hac sub rerum positione usi sumus. *Mercurius* plurima suffragia sub forma tum *calomelanos*<sup>80)</sup>, tum *unguenti*<sup>81)</sup> collegit. Ad nos quod spectat, recenti neque ad extremum perducto malo, in *balneis sulphuricis*<sup>82)</sup>, non neglecto victu nutri-

76) 3.

77) Act. soc. r. Havn. Vol. III. N. 10.

78) Auserl. Abh. f. pr. Ärzte. 8. B. p. 634.

79) L. c.

80) BÜRGER in HORN Archiv f. med. Erfahr. 2. B. p. 346.  
WAGNER Nutz. des Quecksilb. geg. Lähm. u. Contractur.  
d. Glieder durch Bleivergiftg. in HORN Archiv. 1828. H. 4.  
p. 604.

81) Sic pater meus nonnullos egros paralyssi saturnina laborantes sanitati restituit.

82) Vienaese inter tot opifices plumbum pertractantes paralyssis saturnina saepe obvenit, unda pluries opportunitatem aquarum Badensium stupendum effectum observandi habui. Cfr. STOLL rat. med. P. II. p. 416. BROCKMANN

nutriente et aëre puro, potissimum auxilium invenimus. Et *nitras argenti*<sup>83)</sup> nec non *strychninum*<sup>84)</sup> in paralysi post colicam pictonum laudatur. 2° *Paralysis ex colica et dysenteria*, indiciiis inflammatoriis stipata, *venae sectionem*, ut suadent<sup>85)</sup>, simultaneam ex brachio et pede sano, exposcit. Quodsi suspicio saburrarum adhuc latentium vigeret, alvus *rheo* movenda foret. Contra vero si praevia dysenteria aegrum debilitasset, sique is exhaustus omnia signa inanitionis exhiberet, ad *spiritum cornu cervi*, *tincturam suocini* et *liquorem mineralem anodynum* HOFFMANNI, nec non ad *vinum* et *diaetam nutrientem*, confugiendum<sup>86)</sup>. Hic et *balnea martialia*, et potus *aquarum acidularum martialium* locum invenit<sup>87)</sup>. 3°

## Para-

(HOLSCHER Hannov. *Annal.* 1837. B. 2. H. 4) sulphur hio ut remedium specificum laudat.

- 83) ROBERTA in *Land. med. repository.* Vol. 5. 1816. January. H. C. LOMBARD in *troisième rapp. du dispens. de Génève* 1830. et in *gaz. méd. de Par.* 1832. Août. v. RUST *Mag.* 1833. B. 4. H. 1. p. 145. LIE. MARONNI l. c. (in paraplegia ex contusione). Cfr. KRAHMER *Bemerkg. üb. d. innere Anwend. d. salpeters. Silb. in allg. med. Zig.* 1837. N. 59.
- 84) ANDRAL in *MAGENDIE journ.* 1823. T. 3. Juill. Ueb. d. *Paral. saturn. u. ihre Behandl. mit Strychn.* ex *bull. de therap.* T. 6. livr. 4. in SCHNIDT *Jahrb.* 1834. B. 3. p. 35. RECAMIER in *lancette franç.* 1834. N. 29. BROCKMANN l. c.
- 85) CHEVALIER animadversiones criticae in tract. de usu diversar. *venesectionum specier.* in *nov. act. Erud.* an. 1732. p. 229. MORGAGNI *epist. anat.* §. 24. FABRICIUS l. c.
- 86) FABRICIUS l. c.
- 87) LENTIN *Beob. epidem. Krankh.* p. 65. 90. *Beiträge.* p. 67. MARCIRD vom *Pyrmonter Brunnen.* Vol. 2. p. 169. HUFN-

*Paralysi ex vermibus et flatibus consueta opponuntur anthelminthica et carminativa. Generationum paralyses originis abdominalis remedia exposcunt alvum sollicitantia, de quo argumento ABERNETHY* <sup>87)</sup> *legisse non poenitebit. Quae remedia 4<sup>o</sup> et paralysi febrium intermittentium succedaneae quadrare videntur, nisi atoniae et inanitionis adsint notae, nisique paralysis diatheseos periodicae adhuc vigentis sit effectus, quo in casu ad corticem cinchonae recurrendum foret. — Paralyses ex vitio topico singulorum nervorum passim in facie et extremitatibus decurrentium variam prorsus curam exposcunt* <sup>88)</sup>. Quo recentior morbus, quo-

LAND Journ. 27. B. 2. St. p. 22. F. TREUMANN Freyenwalde geg. Lähm. d. Extremität. nach Schlagfl. u. R. M. Leid. etc. in HUFELAND Journ. 1829. St. 3. FRITSCH Ber. üb. d. Mineral-Badeanst. z. Naumburg am Bober, in HUFELAND Journ. 1829. St. 6. p. 85. ZANGEL in HUFELAND Journ. 1830. St. 12 (thermas Stadthegae laudat). HENPRICH kurze Uebers. d. Wirkamk. d. eisenhalt. Quell. z. Cudowa, in HUFELAND Journ. 1835. St. 5.

88) *Surgical observations on the constitutional origin and treatment of local diseases, and on aneurismes. 3. ed. Lond. 1814.*

89) Nuperrime amanitam muscariam Comtechadulicam in paralysi extremitatum, linguae et organorum quae loquelae et voci servant, tentavit SCHNEIDER d. Fliegenschwamm, ein Mittel z. Heilung d. Lähmung. etc. in CLARUS u. RADIUS wöchentl. Beitr. 1833. N. 22. — Secale cornutum: DESGRANGES in A. DUFASQUIER compte rendu des trav. de la soc. de méd. de Lyon. ib. 1831 (gr. XII quinquies et sexies in nycthemero, praecipue cum vino et china paralysi spinali medicata sunt). DUCROS sen. apud PÉTANQUIN lib.



quoque evidentiora neuralgiae et neuritidis signa,  
eo certior methodi antiphlogisticae, praesertim

eva-

cine neue Gebrauchweise ... des Mutterhorns ex *bull. de thérap.* T. 13. p. 266, in SCHMIDT *Jahrb.* 1838. B. 20. p. 18. et apud DUPASQUIER l. c. 1837 (incipit dosi gr. ij—jjj augenda ad XLVIII). BARBIER apud J. J. LEVRAT-PERROTTON *recherch. et obs. sur l'emploi thérap. du sergle ergoté.* Par. 1837. PAYAN *üb. d. See. cornut.* in d. *Parapl.* ex *revue méd.* 1839. Mars. in SCHMIDT *Jahrb.* 1839. B. 21. p. 159. Cfr. SCHAIDLER in *Heidelb. klin. Ann.* 1839. B. 5. H. 3. p. 470 (paral. vesic. urin.). — *Oleum jecinoris asellii*: II. SPITTA d. *med. Klinik z. Rostock*, 1826. Ber. I. REDER diss. de ol. jecin. as. Rost. 1826 (paral. extrem. infer. ex diathesi rheum., arthrit.). SCHUPMANN *ausgezeichnet. Wirk-samk. des braun. Leberthr. b. Lähm.* in HUFELAND *Journ.* 1830. St. 4. p. 115. *Leberthr. geg. rheumat. Lähm.* in A. ANDREAS *med. Ber. des Med. Coll. d. Prov. Sachs. f. d. J.* 1830. Magdeb. 1831. MAX l. c. — *Jodum*: ELLIOTSON in *the lancet* 1830. Novbr. et Decbr. Cfr. BERNARD *allg. Repert.* 1831. B. 5. H. 1. p. 50. et II. 3. p. 332 (ut remedium absorbens seri in specu vertebrali extravasati; coerces autem non immerito usum tincturae). — *Nicotianum tabacum*: C. G. NAUMANN d. *Krankheit. des Gehirns d. Mensch.* Coblenz 1833. Kap. 18. A. F. FISCHER *Beitr. z. Bekräftig. d. hohen Wirk-samk. des Tabacksblatt.* in *wichtigen Krankheitsfäll.* in CASPER *Wochenschr.* 1838. N. 10—12 (3j ad infus.  $\S$ VIII, cum rad. Angelicae aut Calam. arom., omni  $1\frac{1}{2}$  hor. cochlear maj. sumand.). MAX l. c. (FISCHER laudem non sequitur). — *Corticem Cascarillae*: BINNEMANN *Cort. Cascar.*, ein neues, sehr wirk. Mittel b. *allgem. u. örtl. Lähm.* in *Summar. des Neuest. u. Wissenswörd. a. d. gesamt. Med.* Lpz. 1839. B. 11. p. 342 (Fumigationes ex Cort. Casc.  $\S$ IV. Olibani, Mastiches, Gl. Myrrh. ana  $\S$ 3, et frictiones ope panni lanei his vaporibus aromaticis imbuti).

evacuationum cruentarum localium, successus. Sic paralyzin musculorum faciei rheumaticam pluries *hirudinum* ad tempora et retro aures positarum et *diapnoicorum* ope debellavimus. Absente febre, et *sudoriferis* <sup>90)</sup>, e. c. *tincturae guajaci volatili* <sup>91)</sup>, locus est. Nisi haec auxilia sufficiant, *vesicatorium* prope partem affectam <sup>92)</sup> et, si agatur de brachio aut crure, super ipsum membrum paralyti detentum <sup>93)</sup> ponitur. Si actio diuturnior illâ vesicatorii optatur, *fonticuli*, *setacea*, *cortex mezeriei*, *moxa* <sup>94)</sup> aliaque irritantia localia praesto sunt. Enim vero jam CELSUS <sup>95)</sup> jubet „torpentis membri summam cutim exasperare vel urticis caesam <sup>96)</sup>, vel imposito sinapi, sic ut ubi rubere coeperit corpus, haec removeantur.“ Verum tamen haec non ita intelligenda sunt, ac si irritamenta par-

90) SIGNORONI in ORGIDEE ann. univ. 1837.

91) JOURNATON in med. comment. Vol. IX. p. 383. v. Abh. f. pr. Ärzte. 10. B. p. 418.

92) Sanguisugentibus, vesicatoriis ad nucham etc. paralyzin facialem rheumaticam debellavit JOURDAN in SCOUTTEN compt. rend. des trav. de la soc. des sc. du départem. de la Moselle, Metz 1830.

93) Hoc modo quatuor individua paralyti musculorum manus extensorum liberavit SYME in FROHNER Notiz. B. 27. N. 12.

94) CHOMEL l. c. (duabus moxas paralyti nervi facialis medicatus est). Cfr. supra N. 3 (60).

95) Lib. III. C. XXVII. p. 179.

96) De urticationis in paralyti virtute legatur: ARRTAKUS da curat. morb. acut. L. I. C. II. p. 80. Eph. nat. cur. Dec. III. an. I. obs. 34. Hist. de l'acad. des sciences. 1741. p. 103. HUFELAND Journ. 11. B. 3. St. p. 115 etc. ]

partibus paralyticis indiscriminatim admovere liceret, ab ista scilicet perversa curandi ratione pluries erysipelas, exulcerationes, oedema partium paralyticarum observavimus. Qua de caussa, quamvis ad paralysin, ex affectione topica nervorum externorum pullulantem, curandam nec supra indicata *ulcera artificialia*, nec frictiones ope *linimenti volatilis*<sup>97)</sup>, *camphorae oleo terebinthinae solutae*<sup>98)</sup>, *solutione phosphori*<sup>99)</sup>, *oleo cajeputi*<sup>100)</sup>,

un-

97) DESAULT *ausserl. chir. Wahrnehm.* 7. B. N. 231. HERZOG in *med. Ver.-Ztg.* 1837. N. 25, 26.

98) SCHUMACHER *med. chir. Bemerk.* 1. B. p. 63.

99) Formula KERNER: R. Phosphori grana decem. Olei olivarum unciam semis. Caléfiant, donec phosphorus solvatur. Adde adipis suillae unciam semis. Frigefactia admisce camphorae scrupulum unum. D. S. linimentum (hoc linimentum aegrum facile adurit, et exulcerat, doctus hinc phosphori valde imminuerem). Quodsi jam usus externus phosphori periculosus sit, quid de illius usu interno dicendum erit? Responsum habetur apud BERRI *riflessioni medico prat. sull' uso interno del fosforo, particolarmente nell' emiplegia, Pavia* 1798. Cfr. HUFELAND *Journ.* 1811. Jan. p. 78, 80. *Rust Mag.* 1812. B. 13. St. 2 (paralysis spinalis, praecipue phosphori medio curata). GRUBBSEN l. c. (hemiplegiae faciales sanatae infractionibus phosph. gr. VI. solut. in Ol. anim. aether. 3iij). F. A. KÖCHLIN in HOEN *Archiv.* 1835. II. 5 (excitavit remedium impetiginem harpeticam, quo facto hemiplegia disparuit). — Phosphoro et interne usi sunt: L. BOCHARDT l. c. (in paralysi artuum, linguae, vesicae urinae et genitalium). FRANK in HUFELAND *Journ.* 1824. St. 7.

100) FRANKHOFF in *nouv. mémoires de Berlin* 1774. p. 391. THUNBERG *diss. de oleo cajeputi.* Upsal. 1797. SCHWABER *pr. Beob. u. Erfahr. a. d. Med. Dresd.* 1827 (in paralysi

*unguento tartari emetici*<sup>101)</sup>, *spiritu formicarum*<sup>102)</sup>, *tinctura cantharidum*<sup>103)</sup>, nec non alia irritantia<sup>104)</sup> reprobemus; attamen mitiorem medend-  
rationem eligere solemus. Consistit haec inprimis  
in *fotu partis paralyticae ope*<sup>105)</sup> vel *panni lane*  
*sicc*

linguae). SCHNORR *glossoplegie nach d. Verewind, hyster. Zufälle u. ihre Heilung*; in SIEBOLD *Journ.* 1828 B. 7. St. 3. p. 995.

101) *Salzb. med. chir. Zeitung.* 1797. p. 295.

102) *Eph. nat. cur.* Dec. I. an. 4 et 5. obs. 128.

103) ANDREY et CARRER in *hist. de la soc. de méd.* v. *Abb. f. pr. Ärzte.* 6. B. p. 184. J. LENZ l. c. (cum spiritu camphor.). BARTHELS l. c. (c. spir. Angelic. comp. et Tinct. Pimpin.). HERZOG in *med. Ver.-Ztg.* 1837. N. 25 et 26.

104) Faciei paralysis irritantibus sanatae exemplum refert RADNACHER in HUFELAND *Journ.* 1. B. 2. St. p. 136. *Emplastrum c. argento nitrico.* J. C. BOSWELL in *transac. of the m. and phys. soc. of Calcutt.* 1831. Vol. 5. WOLFF *ausw. Anwend. des Ol. croton.* in *med. Ver.-Ztg.* 1833 N. 5. et 15. *Jahresber. d. ärztl. Gesellsch. z. Petersb.* i HUFELAND *Journ.* 1834. St. 1 (fero inessum adhibitum *Der ätherische Salmiakgeist*, in DZONDI *Aeskulap.* 1833 B. 1. H. 2. p. 282. *Unguentum veratrinum*: TURNBULL l. VOGEL in CASPER *Wochenschr.* 1834. N. 13. FRANK i *Sanitätsber. f. d. Prov. Brandenb. v. J.* 1834. *Berl.* 1833 EBEL in HUFELAND *Journ.* 1839. St. 8. L. in *med. Ver. Ztg.* 1839. N. 41. p. 203 (paralys. extremit. infer. sanatio *Formicae viventes*: HAUSBRAND in CASPER *Wochenschr.* 1833 N. 14. *Armoracia*: D. BIANCHI ex *antologia med.* 1833 *Settbr.* in SCHMIDT *Jahrb.* 1836. B. 9. p. 41. *Ol. Sinapeo.* HERZOG l. c. *Liquor ammon. caust.* id. ib. WOLFF *med. Ver.-Ztg.* 1836. N. 41.

105) *Panis recenter cocti*: HAUSERAND in CASPER *Wochenschr.* 1836. N. 14.

*sicci exsiccifaciti* <sup>106)</sup>, vel *telae ceratae* subtilis, vel *pellis leporinae*, vel *emplastri de galbano crocato*, *saponaceo Barbettii* <sup>107)</sup>, de *pice Burgundica* etc. Consistit porro in *frictionibus lenibus* <sup>108)</sup> cum *pannis laneis*, *subfumigio aromatico* <sup>109)</sup> imbutis, in *fustigatione* sive *pulsatione* <sup>110)</sup> ipsaque in *titillatione* cum *penna anserina* <sup>111)</sup>, in *balneis vaporosis* <sup>112)</sup>, *arenae* <sup>113)</sup>, *sulphuris* <sup>114)</sup>, *humis* <sup>115)</sup> et

106) Et *lanugo dolichi prurientis* hoc modo applicata, ntilem se praestitit. GRÄFKE u. W. Journ. 1831. II. 15. II. 3.

107) Laudatur a KÄULEIS L. c.

108) Hinc merito CELSUS dixit: „membrum aliquod resolutum ipsius frictione confirmatur“ (L. II. C. XIV. p. 89).

109) P. II. ed. alt. Vol. I. Sect. 1. C. I. §. VI. N. 45 (78).

110) „Utebantur ad hanc rem veteras ferulis parvis levibus, mediocriter junctis, quibus percutiebant partem atrophicam, donec rubere et tumescere inciperet“ SWIETEN L. c. §. 1069.

111) Case of palsy cured by titillation with some obs. on the effects of titillation on the nervous system. By J. WARDROP. v. the Edinb. med. and chir. Journ. Vol. 8 (sanata paralysis brachii et manus sinistrae).

112) E. c. ope vaporis spiritus vini accensi. v. WEPFER obs. med. pr. obs. 32. p. 72. SWIETEN §. 1068. 4. POWELL L. c. RAPOT ann. de la méthode fumigatoire. T. 1. Par. 1827. J. WENDT üb. d. Bedeut. u. Wirk. d. russ. Dampf-bäd. Bresl. 1830 (exempla habet paralyseos sanatas). ROMBERG in CASPER Wochenschr. 1833. N. 13. RUNGE üb. d. weingeist. Luftbad, in med. Ver.-Ztg. 1833. N. 5. J. J. SIEBENHAAR Heil. ein. allmählig. entstand. vollkomm. Paralyse d. untern Gliedmass. in HUFELAND Journ. 1834. St. 4. p. 77.

113) „Et arenae calidae, et laconici, et alibani, et quarundam naturalium sudationum, ubi a terra profusus calidus Frank Prax. II. I. 2. 1. S 8

et in *fotu animalium recenter mactatorum* <sup>113</sup>); quae auxilia ita eligere solemus, ut constanter rigiditatis aut laxitatis musculorum paralyticorum rationem habeamus, ne forte illis pharmaco adstringentia, his emollientia admoveamus. Si obijciatur: corpus humanum vivum aliter, quam corpora vita destituta, a rebus applicitis affici, respondemus, partes paralyticas, ut mortis imaginem referentes, privilegio partium vivarum minus gaudere. Quod SWIETENIUS jam dudum intellexerat,

vapor aedificio includitur." CELSUS L. II. C. XVII. p. 93. Cfr. BACCIIUS de thermis. L. IV. p. 118.

114) Sulphuris vaporibus plus vice simplici at paralyces et hemiplegiae sanatae sunt, ut facullas medicae, quae Parisiis florant, testatur: *mém. et rapports sur les fumigat. sulfur. appliq. au traitem. des affect. cutanées et plusieurs autres*. Par. 1816. Legimus ibid. p. 129: „Le succès des fumigations sulfureuses nous a paru plus constant contre la paralysie, même quand cette affection succédoit à l'apoplexie." CASTELLA L. c. (quatuor in hemiplegia utilisissimi).

115) J. C. GERHARD *üb. d. Gas- u. Schlamm-bäd. . . am Eilsee . . . in Lähmungen*. Berl. u. Stettin 1811. 2. B. 1812. W. KLEBERG *üb. d. Herrmannsbad u. Muskau*, in *Regt Mag.* 1831. B. 34. II. 2. p. 305. GUTZLER *üb. d. Miner.- u. Kohlenschlamm-bad u. Gleissen*, 1833. HORNUNG in *Oesterr. med. Jahrb.* 1835. B. 17. p. 581. KIRCHNER in *Oesterr. med. Jahrb.* 1838. B. 25. p. 217.

116) CAYOL et BOCCANERA in *osservat. med. anno 7. Napol.* 1829, sanguinem laurinum calidum adhibuerunt. Cfr. FROMM *Notiz.* 1830. B. 28. N. 2. SCHERER *Nutz. d. Thierbäd.* (adversus apoplexiam incompletam), in *HUYSLAND Journ.* 1829. St. 9. HAUSERAND *Mittel geg. Lähm.* in *CASPER Wochenschr.* 1836. N. 14. EITNER L. c. (1840), cas. I.

xerat, ubi ait<sup>117)</sup>: „Interim tamen haec (unguenta aromatica), cum pinguibus et oleosis consent, forte *laxabunt* partes jam inde nimis flaccidas; hinc spirituosae et vapores illi aromatici videntur praefereendi: pulchrum tamen usum et haec habent, si debito modo applicantur. Solent enim in membris paralyticis flexores musculi, semper validiores musculis extensoribus, propria contractilitate breviores reddi, et articulos in continua flexione retinere, tum simul ligamenta articulorum diuturna quiete fiunt magis rigida: ideo unguenta talia post frictionem, si illiniantur musculis flexoribus et articulis, proderunt; dum simul spirituosae et vaporibus aromaticis emendatur laxitas extensorum, a praevalente contractilitate flexorum per longum tempus distractorum.“ Absit caeterum, ut istis principiis therapeuticis mechanicis eas postponamus notiones, quas recentiori aevo, vel per anatomiam pathologicam, vel per leges principii vitalis acquisivimus. Inter illas magni momenti censenda notio vitiorum, quae aut in pulpa nervea, aut in neurolemmate, aut in vagina externa nervorum, per *prae viam inflammationem* generantur. Loquimur inprimis de humoribus inter partes illas extravasatis, nec non de adhaesionibus morbois. Quae si ut causa paralyseos adesse videantur, *mercurius* ut praecipuum sese exhibet auxilium. Sic aliorum<sup>118)</sup>, sic propriae<sup>119)</sup>

Ss 2

do-

117) L. c. §. 1069.

118) FAIDENICH pr. de paralyti musculorum faciei rheumatica. CHRISTISON l. c. cas. I et III.

docent observationes. Si locus, ubi liquor extravasatus nervo, quem circumdat, vim infert, facile divinari posset, *acupunctura*<sup>119)</sup> securum foret auxilium. Tandem nervi perscisio tentata est<sup>121)</sup>. Si *sensibilitatis defectus* nervi cujusdam paralyseos videatur caussa, ut post violentias ex-

ter-

119) Plures aegros paralyseos musculorum faciei laborantes hydrargyri ope, addito interdum antimonio, sanavi; e c. Rj. Pulveris calomel, sulphuris aurati antimonii aa granum unum. Sacchari grana sex. M. Cap. semel biave de die talem pulverem.

120) G. B. BELLINI *di una paraplegia curata felicemente coll' agopuntura*, Venezia 1825. Cfr. OMOIDEI *ann.* 1825. Vol. 36, p. 88. ROUX in *novv. bibl. méd. Par.* 1826. Mai (paralyse, extremitatum inferiorum ex tumore, spinæ adhaerente, electro-punctura sanata). Cfr. FRORIER *Notiz.* 1828. B. 19. N. 2. E. GRAEFER *Beitr. z. Electropunkt.* in GRAEFER u. W. *Journ.* 1828. B. 12. II. 2. p. 333 (duae curae). PICHONNIÈRE l. c. (electropunctura). H. G. SCHNEIDER *Erfahr. üb. d. Einwirkg. des Acupunctur-Foitaism.* etc. in *Rust Mag.* 1831. B. 31. II. 3. p. 462. A. ANDREAS *Med.-Ber. des K. Pr. Med.-Colleg. d. Provinz Sachs. f. d. J.* 1830. *Mugdeb.* 1831 (acup. in paralyse rheumat.). FERNITZ *Acupunct. geg. Lähm. d. Gesichtsmusk. u. Sprachwerkz.* in CLARUS u. RAD. *wöchentl. Beitr.* 1833. B. 3. N. 6. NIC. NARDEZZI *Beob. üb. d. Wirksamk. d. Acup. ex Possevat. med. di Nap.* 1831. Genn. 1. in SCHMIDT *Jahrb.* 1834. B. 3. p. 144. obs. 4. FRANCESCO DA CAMIN *sulla agopuntura. Venez.* 1834 (adversus hemiplegiam salutari). — Electro- et galvano-puncturam v. sub electricitate et galvanismo.

121) HELM *Rückkehr d. Sensibilität des Armes u. d. Hand nach Durchschneid. des Radiulus* (in paralyse), *ex gaz. méd. de Par.* 1837. N. 17, in DIEFFENBACH *Ztschr.* 1837. B. 5. II. 4. p. 530.



ternas contingere solet, non obliviscendum, *alcalia* virtute extinctam jam jam sensibilitatem re-ficiendi pollere <sup>122</sup>). Ac re quidem vera forte unguenta *ammoniam* continentia ipsa forteque *alcalia fixa* <sup>123</sup>), forte *balnea cum hepate sulphuris*, per illam virtutem paralysi aliquando medentur. Ex eodem principio vis *electricitatis* <sup>124</sup>), *galvanismi* <sup>125</sup>) (quae in paralysi ex affectione topica singulorum nervorum maxima est quaeque per ipsam membri paralytici frictionem evolvi videntur) et *magnetismi animalis* <sup>126</sup>) (dubia adhuc) explicari posset. Quae quidem singula hypothesium

122) P. H. ad. alt. Vol. I. Sect. 1. C. 1. §. VI. 23.

123) STÜTZ in HUFELAND Journ. 10. B. 4. St. p. 49.

124) STEINRUCK hemiplegiam et paralysin musculorum faciei unius lateris ope electricitatis sanavit. v. HUFELAND Journ. 1816. Jan. p. 117. Cfr. supra. N. 3 (74).

125) De paralysi musculorum faciei cum vires debilitate galvanismo sanata loquitur THILENIUS *med. chir. Bemerk. 2. Th. Frankf. 1814. Cfr. supra. N. 3 (75).*

126) WEINHOLD *Heilkr. d. thier. Magnetism. N. 5. 49. REINHOLD Gesch. ein. durch den thier. Magnetism. geheilten Nervenkrankh. in vermischte Abh. a. d. Geb. d. Heilk. v. ein. Gesellsch. pr. Ä. zu St. Petersburg. Leipz. 1825. Samml. 3. p. 212 (paralysis extremitat. infer. ex causa incognita). BOCKARDT in PIERRE allg. med. Annal. 1827. II. 4. p. 433. MATTHAEI Gesch. dreier Krankheitsfälle mit vollkomm. Lähmung d. Extremität., in denen der thier. Magnetism. angewendet wurde, in HORN Archiv. 1830. H. 5. p. 755. (1) Paralysis transversalis ex febre nervosa: sanatio non soli magnetismo animali debetur. — 2) Paralysis extremitat. ex terrore; sanabatur. — 3) In simillimo casu magnetism. anim. incassum adhibitus est).*

sium referre imaginem libenter concedimus. Realia magis sunt praecepta, paralyti e praepostere sanatis ulceribus et psora, instaurationem illorum opponendi <sup>127</sup>).

C. paraly-  
seus com-  
plicatae.

5. *Paralysis ex affectione plurimarum partium systematis nervosi* ortum ducens, *methodum compositam exposcit*. Ad quam methodum, saepe etiam ad temperandam aegrorum eorumque familiarum impatientiam, quin id absolute necessarium sit, confugimus. Quoniam enim rerum medicarum ignari, cur in paralyti faciei et extremitatum originis encephalicae et spinalis auxilia capiti et specui vertebrali, nequaquam vero partibus resolutis applicantur, intelligere nequeant, medicum saepe incuriae accusant, quae accusatio evitatur pharmaca ipsis paralyticis partibus prudenter admovendo.

Monita.

6. Juvat praeterea aegrotis paralyti laborantibus animum addere <sup>128</sup>), fidemque in proprias vires injicere <sup>129</sup>) atque partem paralyticam, in quantum fieri potest, movere <sup>130</sup>).

#### CAPUT

127) Cfr. §. LXI. 2 (42). SCHLEGEL *Material. f. d. Staatsarzneiwissenschaft. I. Samml. N. 8* (scabiei restitutio). Sic et P. K. MÜLLER l. c.

128) Exempla non desiderantur, praecipue feminarum, quae, levioris generis paralyti laborantes, facta exhortatione precibus junctâ, praeter expectationem lectum deseruere et passus fecerunt. Imaginatio paralyticorum, quid valeat, lege in PARIS *the life of Davy*; in FROBIEP *Notiz. B. 31. N. 9. p. 148.*

129) Vidi virum ex paralyti convalescentem, qui proprio

## CAPUT XIII.

*De tetano et trismo.*

## §. LXV.

*Definitio. Literatura.*

1. **M**usculorum externorum imperio volun- Definitio.  
tatis subditorum rigiditas permanens et immobi-  
litas *tetanus* <sup>1)</sup>) constituit. Idem morbus ad

muscu-  
morte incidere potuit, ast nihilominus baculum exposce-  
bat, ut illi animus adderetur.

130) Celsus lib. III. C. 27 ait: „Tum id membrum quod  
deficit, si potest per se, sin minus, per *aliu*m moveatur  
et vi quadam ad consuetudinem redeat.“ Ex PORTALI ob-  
servationibus (ex *cours d'anat. méd.* in *Samml. auserles.*  
*Abh. f. pr. d. B.* 23) membra resoluta intentione movandi  
in integrum restitui possunt. Suadet ergo, ut sana manu  
paralyticam arripiat aeger et continuo moveat. Eadem  
spectat DUPONT salla mechanica, quam construxit (FRONKE  
*Notiz.* 1829. B. 24. N. 3). — Ad manus digitosque reso-  
lutos curandos aliis auxiliis mechanicis quasi localibus uti  
sunt auctores supra (§. LX. 9 (102)) allati at HERZOG l. c.  
hist. I. III et VI. J. GRANTHAM lib. *paralyt. . . Nervenleid.*  
ex *Lond. med. gaz.* Vol. 20. p. 70. in SCHMIDT *Jahrb.* 1839.  
B. 21. p. 194 et 195. hist. I. J. ELDERTON *Erleichter-*  
*ungsmittel f. Gelähmte*, ex *Lond. med. gaz.* Vol. 19.  
p. 865. in SCHMIDT *Jahrb.* 1840. *Septb.* 2. p. 195.

1) Gr. *Tétanos* (a *τείνω*, tendo). *Synon.* Spasmus tonicus.  
Rigor seu distantio nervorum. GERM. *Starrkrampf.* GALL.  
*Tetanus.* ANGL. *Tetanus.* POL. *Kurcz kłowy.* ROSS.  
*OgennenEñie.*

musculos maxillae inferioris limitatus, oris apertionem impediens, *trismus* <sup>2)</sup>) appellatur.

Literatura.

2. Tetani HIPPOCRATES clare meminit <sup>3)</sup>). Exactissime vero describitur ab AETAEO <sup>4)</sup>). Ulterior hujus aegritudinis notio FERNELIO <sup>5)</sup>), maxime veroscriptoribus de morbis regionum tropicarum <sup>6)</sup>) exercituum <sup>7)</sup>), observationum chirurgicarum <sup>8)</sup>) e dissertationum inauguralium <sup>9)</sup>) debetur. Exstan

prae

2) Gr. *Τραυμός* (stridor). Synon. Spasmus maxillae inferioris, gnathospasmus SWEDIAURII (a Gr. *Γνάθος*, maxilla). Tetanus maxillae, GERM. *Kinnbackenkrampf*, *Mundklemme*. GALL. *Tic*, *mal de mâchoire*. ANGL. *Locked-jaw*. POL. *Kurcz kołuwaty szczęki niższej*. Ross. Судорогъ нб челющмахъ.

3) De morbis. Lib. III. C. 12.

4) De morbis acutis. Lib. I. C. 6.

5) *Universa medicina*. Francf. 1573.

6) P. I. ad. alt. Vol. I. S. 1. §. IX. 4. §. X. 7. §. XI. 10.

7) LARREY *mém. de chir. militaire*. MACGREGOR *medical hist. of the British armies in Spain and Portugal, during the late campaigns*. v. *medico-chir. transact.* 1815. Vol. 6.

8) Locis in curriculo paragraphi citandis.

9) KEYSER diss. de rarissimo, nec non gravissimo humani corporis affectu, tetano. Altdorf, 1668. FRIDERICI diss. de convulsione maxillae inferioris. Jen. 1672. KRAUS diss. de spasmo cynico. Jen. 1677. KRÜGER diss. de opisthotono, emprosthotono, et tetano. Helmst. 1754. MÜCK diss. hist. tetani nuper observati. Jen. 1770. ACKERMAN diss. de trismo comm. Goett. 1775. Versio: *Abhandl. üd d. Kenntniss u. Heilung d. Trismus*. Nürnberg. 1778. Anglic in *med. comment.* Vol. 6. Edinb. 1779. BAUMER diss. d. tetano. Giss. 1776. STARK diss. de tetano ejusque speciebus praecipuis. Jen. 1778. Commentatio theoretico-prae de tetano ejusque speciebus. Jen. 1781. STORR diss. d.

praeterea monographiae nonnullae non solum de  
teta-

trismo. Tübing. 1780. MONRO diss. de tetano. Edinb. 1783.  
et in *Samml. auserl. Abh. f. pr. A. B.* 5. p. 219. CO-  
CHMANN diss. de tetano. Edinb. 1784. STADTMANN diss. de  
tetano. Argent. 1785. WILSON diss. de tetano. Edinb. 1788.  
CLERKE diss. de tetano. Edinb. 1791. CROOKS diss. de  
tetano. Edinb. 1793. SIEBOLD diss. observationes medico-  
chir. circa tetanum ejusque species praecipuas. Wurceb.  
1793. BOURKE diss. de tetano. Edinb. 1794. JONES diss.  
de tetano. Edinb. 1796. HAUSCOMB diss. de tetano. Edinb.  
1799. CZEKRASKI diss. de trismo. Francf. 1800. THOMSON  
diss. de tetano. Edinb. 1801. WALMOOD diss. de tetano.  
Edinb. 1801. PASQUIER diss. sur le tétanus en général et  
particulièrement sur le tétanus traumatique. Paris 1805.  
J. C. G. REUSS diss. hist. tetan. trennet. largo opii usu  
sanati. Tübing. 1810. Germ. in J. G. WEBER *Samml. med.  
Dissertt. v. Tübing.* ib. 1824. Th. 4. J. H. B. LÖHNERS  
(pr. AUTENRIETH) diss. de utilis. hydrarg. in febre typh.,  
annex. thesib. chir. de tetano. Tüb. 1813. Germ. in J. S.  
WEBER l. c. C. SCHWARZER diss. de tetano. Vienn. 1814.  
LEBAIVE diss. sur le tétanos des adultes. Paris 1815. P.  
LEDRECHAULT diss. sur le tétan. en gén. et particul. sur le  
tétan. traum. Par. 1815. MURAT diss. essai sur le tétanos  
traumatique. Paris 1817. J. G. SCHAAL diss. de tetano.  
Berol. 1820. J. GÖPPEL diss. de tetano. Jen. 1822. PH. J.  
WEISS *Inauguralabh. üb. den Starrkr. Würzb.* 1824. C. CA-  
VALLI diss. de tetano ejusq. specietim nosogenia. Tic.  
Reg. 1824. J. C. KIRCHNER diss. de maxillae infer. diver-  
sitate. tetanoides. Berol. 1825. A. B. WEINLIG diss. de  
net. tetani. Jen. 1826. A. L. BELTZ diss. sur le tétan.  
Par. 1826. C. L. O. SCHULTHEIM diss. de tetano. Berol. 1829.  
C. E. DE MICKWITZ diss. nonnull. teten. caus. proxim. et  
cur. Dorpeti Livon. 1829. C. H. T. SCHUMANN diss. de  
trismo. Lips. 1830. C. M. MAYRHOFER diss. de tetano  
rheumat. Vienn. 1832. B. J. KETTELER diss. de tetani ve-

tetano<sup>10</sup>), sed etiam de trismo recens natorum<sup>11</sup> et permultae observationes<sup>12</sup>).

## §. LXVI

riis speciebus. Berol. 1834. G. VERNIER *sur le tétan*. Pa  
1834. G. A. WALLIS diss. de tetano disquisit. arithme  
Hal. 1837. A. FRIEDRICH diss. de tetano traumat. Bero  
1837. G. CLERICI diss. de tetano. Pav. 1837. S. BLUMEN  
GARTEN diss. de tetano. Berol. 1837. C. F. KESLER dis  
de tetano. Berol. 1837. H. PFLÜGL diss. de tetan. Vin  
dob. 1838. M. N. KEIL diss. de tetano. ib. 1839.

- 10) J. D. BILGER de tetano seu convulsione universali. Ar  
gent. 1708. BILFINGER de tetano lib. singular. theoret.  
pract., monument. veter. suffultus et observ. rec. propriis  
Illustr. Lindav. 1705. W. TRNKA DE KRZOWITZ oommen  
de tetano. Vindob. 1777. DAZILLE obs. *sur le tétan*. Pa  
1788. N. HEDYELOUF *précis sur le tétan, des adulte*  
Par. 1789. R. WORTHINGTON a tr. *on the dorsal spasm*  
Lond. 1792. J. A. LAURENT *mém. cliniq. sur le tétan, che*  
*les blessés*. Strasb. 1798. ERMANN *nouv. méthode de trai*  
*ter le tétan, qui survient aux plaies*. Mayence 1801. P. I  
FOURNIER *du tétan, traumat*. Brux. 1803. et in dict. de  
sc. m. T. 4. W. A. STÜTZ *Abh. v. d. Wundstarrkr.* Stuttg  
1804. et in HUFELAND *Journ.* B. 10. St. 4. p. 3. C. I  
PARRY *cas. of tetan, etc.* Bath 1814. J. MORRISON a *trea*  
*tise on tetan*. Newry 1816. R. REID *on the nat. and treatn*  
*of tetan*. Dubl. 1817. G. BERGAMASCHI *sul mielitide sten*  
*sul tetano*. Pav. 1820. p. 163 sq. J. SWAN *an essay of te*  
*tan., found. on cases and experiments*. Lond. 1825. E  
WARD obs. *on tetan*. Glouc. 1825. C. GÖTZNER d. *Krampf*  
*ins Besond. d. Wundstarrkr.* Bresl. 1828. D. FERNAND  
CASAS *memor. sobre el tetano*. Madrit 1832. Cfr. GERSON  
M. JUL. *Magaz.* 1833. St. 3. p. 482. J. MORGAN a *lectur*  
*on tetan*. Lond. 1833. B. TRAVERS a *further inquiry con*  
*cerning constitut. irritat. and the pathol. of the nerv. sys*  
*Lond.* 1835. P. 2. chap. 2. p. 287—338. TH. BLIZAN  
CHURLING a tr. *on tetan, being the essay for which the Jaci*

pr. Lond. 1836 (qua utor). Germ. ab A. MOSER. *Berl.* 1838. et in BLAUIUS *Analect. d. Chirurgie. B. 1. H. 2.* G. WARNEKE de tetani causa et nat. comment. praemio R. ornat. Goett. 1839. 4.

- 11) WRAHLHOF pr. de tanelor. convulsione maxillae infer. in comm. Norimb. 1737. hebd. 27. p. 43. BRENDL pr. de spasmo maxill. infer. infantil. Goett. 1755. v. opp. Vol. I. p. 189. ANDREAS descript. spasmi maxillar. inter infant. per Hispan. endemic. app. ad compend. RIVERRI. PATUNA mem. sopra il trismo dei fanciulli recentem. nati. *Gerixia* 1785. J. CLARKEN an account of disease, which until lately, proved fatal to a great number of infants in the Lying-in Hosp. of Dublin, with obs. on its caus. and prevent. in *transact. of R. Irish acad. Vol. 3. Dubl.* 1790. BAUMES v. d. Convulsion, d. Kind., v. ihr. Ursach. u. ihr. Behandl. *A. d. Fr. Lpz.* 1791. N. B. NOTTBECK diss. de tetano rec. nat. Goett. 1793. LENZON diss. de trismo neonator. *Duisb.* 1802. SCHNEIDER *Abh. üb. d. Kinnbackenkr. neugeb. Kind. Herb.* 1805. A. SIMON diss. de trismo rec. nator. *Berol.* 1817. A. COLLIS on the cause of the disease termed trism. nascent. in hosp. rep. *Dublin* 1818. Vol. 1. S. B. LABATT an inquir. into an alleg. connex. between trism. nascent. and certain diseases, appear. in the umbilic. in *Edinb. m. and s. j.* 1819. Vol. 15. P. B. J. VOSS diss. de tetano res. nat. *Berol.* 1820. SIEBOLD *Journ.* 1828. B. 7. p. 115 at 826. A. J. ZACHEL diss. de convuls. infant. .. de trismo neonator. *Prag.* 1829. Germ. a FR. OTTO. *Lpz.* 1834. J. FURLONGH case of tetan. nascent. successf. treat. in *Edinb. m. and s. j.* 1830. Jan. German. in *HUFELAND Journ.* 1830. St. 10. p. 113. M. DUPIERRIS in *BEREND allg. Journalistik.* 1830. N. 7. p. 35. J. HANCOCK obs. on tetan. infant. in *Edinb. m. and s. j.* 1831. Vol. 35. German. in *Samml. auserl. Abh. f. pr. A.* 1832. B. 15. St. 2. p. 305. J. GHISIO diss. de trismo neonator. *Pav.* 1832. BELLINGER in *Amer. journ. of the med. sc. Philad.* 1832. Febr. Vol. 9. ROSENTHAL trism. spurius neonator. v. *des.*

- dece, *Behandl. in Horn Archiv*, 1833, H. 6. J. MAXWELL a paper on acute traum. tetan. and trism. nascent, with dissect. in *Jamaic. phye. journ.* 1834. R. FINKH üb. d. episod. Starrkr. d. Neugeb. *Stuttg.* 1835. Vers. Gall. a J. MATURZYNSKI in *gaz. méd. de Par.* 1837, N. 22. J. M. STRASAK diss. de trismo neonotor. adnexa histor. morb. *Prag.* 1836. CURLING l. c. p. 207—221. P. G. CEDER-SCHÜLD epidem. Vorkomm. des Trism. u. d. Eclampsia neonot. ex *Ärs Berüttelie* etc. 1835. in DIEFFENBACH *Ztschr.* 1837, B. 6, St. 7. LNYT *Erfahr. üb. d. Trism. d. Neugeborn.* in n. *Ztschr. f. Gbrtak.* B. 7, H. 3. BIERMANN *pract. Bemerkg. üb. d. Kinnbackenkr. d. Neugeb. u. dessen Behandl.* in *Summar. des Neuest. u. Wissenswert. a. d. gesommt. Med.* 1839, B. 12, p. 372.
- 12) L. CHALMERS of the opisthoton, and tetan. in *med. obs. and inquir.* Vol. 1. Lond. 1757. J. CLEPHANE cas. of a locked jaw successfully treat. in *ibid.* J. MACAULAY a case of a locked jaw, in *ibid.* CH. WHITE an account of the successf. treatm. of a locked jaw, *ibid.* Vol. 2. 1761. W. FARR a case of the locked jaw and opisthoton, *ib.* Vol. 3. 1768. BAZON *mém. pour servir à l'hist. de Cayenne et de la Gujane franç.* Par. 1777. Vol. 1. B. RUSH obs. on the cause and cure of tetan. in *philos. transact.* Vol. 2. Philadelphia. 1786. T. DALLAS *hist. of different tetanic complaints* in *ann. of med.* Vol. 3. Edinb. 1798. D. HOSACK obs. on tetan. in *med. reposit.* N. York 1800. ZULATTI sul tetano in *giorn. per servire alla stor. rag. del med. Venezia.* T. 3. C. L. MURRINNA cas. of idiopath. tetan., with obs. in *med. and surg. journ.* Vol. 2. Edinb. 1806. J. HOWSHIP cas. of locked jaw, with obs. in *Lond. m. and phye. j.* 1809. Vol. 21—23. VALENTIN *coup d'oeil sur les differ. mod. de traiter le téten. en Amériq.* etc. Par. 1811. W. C. WELLS a case of tetan. with obs. in *Lond. transact.* of a soc. etc. 1812. Vol. 3. J. LATHAM cas. of tetan. arising from wounds, in *Lond. med. transact.* 1813. Vol. 4. N. DICKINSON cas. of tetan. in *Lond. med. reposit.* 1814.
- Vol



Vol. 1. E. GRIMSTON on the treatm. of tetan. in med. and s. j. Edinb. 1815. Vol. 2. D. DICKSON obs. on tetan. in Lond. m. and chir. transact. 1816. Vol. 7. p. 2. D. M'ARTHUR letter on tetan. in ibid. J. W. HEUSTIS obs. on tetan. in med. reposit. N. York 1816. Vol. 3. CROSS descript. of two cas. of tetan. in Lond. m. and phys. j. 1817. Vol. 37. J. HALL cas. of tetan. with remarks by Dr. DICKSON in Edinb. m. and s. j. 1819. Vol. 15. TH. BRAYNE Fall v. Starrkr. nebst Leichenöffn. ex med. repository 1820. in GERSON u. JUL. Magaz. 1821. B. 1. p. 117. SANDERS opin. respect. tetan. in Edinb. m. and s. j. 1820. Vol. 16. J. KENNEDY on the treatm. of traum. tetan. with cas. and dissect. in Lond. m. reposit. 1822. Vol. 17. E. MAGNIN Behandlungsart des Wundstarrkr. ex revue méd. 1822. Octbr. in GERSON u. JUL. Magaz. 1823. B. 5. p. 164. BURGUET in journ. méd. de la Gironde. Bord. 1824. Janv. BEGIN in rec. de mém. de méd., chir. et de pharm. milit. Par. 1824. T. 14. R. CARMICHAEL six cas. of tetan. in transact. of the king etc. Dubl. 1824. Vol. 4. CRUVEILHIER in revue méd. franç. et étrang. Par. 1824. Avril. FLECCIA in repert. med. chir. di Torino 1824. Luglio. SPERANZA ann. clin. med. Parm. 1825. L. v. DE KREE in bull. de la soc. méd. d'émulat. Par. 1825. BECK in Heidelb. klin. Annal. 1825. B. 1. H. 2. MANIFOLD case of tetan. with remarks by Dr. BRIGGS in Edinb. m. and s. j. 1825. Vol. 24. p. 277. G. ALEXANDER case of tetan. successf. tr. ib. p. 309. W. BRIGGS further remarks on tetan. in Edinb. m. and s. j. 1826. Vol. 25. P. C. GIBSON a case of tetan. and locked jaw, ibid. 1826. Vol. 26. ANDERSON case of tetan. in Edinb. m. chir. transact. 1826. Vol. 2. WENDT üb. d. ärztl. Behandl. des Wundstarrkr. in Heidelb. klin. Annal. 1827. B. 3. H. 2. p. 235. CH. PFREUFER Beobachtg. üb. d. Trism. in FRIEDREICH u. HESSELEACH Beitr. z. Nat.- u. Heilk. Nürnberg. 1827. p. 87. CONTAMBERT in compte rendu des trav. de la soc. d'agricult. etc. par A. MOTTEN. Macon 1827. A. LE PELLETIER mém. sur la nat. et le traitem.

du tetan. traumat. in *revue méd. Par.* 1827. Tom. 4. B. BRODIE abstract of a clinic. lecture on tetan. in *Lond. m. gaz.* 1828. Vol. 2. BLANCKMEISTER *Wahrnehm. üb. d. Wundstarrkr.* in HUFELAND *Journ.* 1828. St. 6. p. 81. FRITZ *Beitr. z. Behandl. des Triism. u. Tetan.* in *med. chir. Ztg.* 1828. N. 9. AMSTEIN *Beobacht. u. Heil. ein. Starrkr., wobei sich Chin. sulphur. vorzügl. wirksam zeigte,* in *Verhandl. d. med. chir. Gesellsch. des Kant. Zür.* ib. 1828. E. LEAH case of tetan. in *Edinb. m. and s. j.* 1828. Jul. Vol. 30. GORREHL *Beobacht. ein. Fülle v. Tetan. u. Rückenmarkserschütter.* in *Heidelb. klin. Annal.* 1829. B. 5. St. 1. p. 78. A. F. LÜDEFS *Gesch. ein. geheilt. chron. Wundstarrkr. nebst ein. Bemerkg. üb. d. Nat. u. Behandl. dies. Krankh.* in HUFELAND *Journ.* 1829. St. 4. p. 3. G. REIDMOUR glücl. abgelauf. Fall v. Starrkr. ex N.York m. and phys. j. Vol. 7. p. 248. in GERSON u. JUL. *Magaz.* 1829. St. 5. J. M. WINKLER ein Tetan. in *Österr. med. Jahrb.* 1829. neueste Folge. B. 1. St. 3. p. 100. J. SYM case of traumat. tetan. in *Glasgow m. journ.* 1830. Vol. 3. TH. ADAMS on tetan. with cases. ib. Idem Fall v. glücl. geheilt. Tetan. ex *Lond. m. gaz.* 1834. Vol. 4. in SCHNIDT *Jahrb.* 1835. B. 7. p. 155. VANDERBACH ein Fall v. Wundstarrkr., geheilt durch entzündungswidrige u. Revulsiv-Mittel ex *ann. de la méd. phys.* 1830. Févr. p. 123. in BEHREND *med. chir. Journalist.* 1830. II. 6. p. 312. BETTAZZI allg., auf chron. Spinitis d. Nackenwirb. folgend. Tetan. ex *soc. med.-fisic. Fiorent.* 1829. in BEHREND l. c. B. 6. p. 127. WINGAND *Gesch. ein. durch Verhält. entstand. u. schnell tödtenden Starrkr.* in HUFELAND *Journ.* 1830. St. 8. G. B. MUGNA *Beob. üb. d. Tetan.* ex *OMODEI annal. univ. di med.* 1831. Febr. in BEHREND l. c. 1831. B. 7. p. 102. COMBETH Fülle v. spontan. Starrkr. ex *revue méd.* 1831. Mai. in GERSON u. JUL. *Magaz.* 1831. N. 6. COMLOSSY *Heil. ein. Wundstarrkr. nach 14täg. Dauer,* in *Badische Annal. f. d. gesammte Heilk.* Karler. 1831. H. 1. F. F. G. ROBERT *üb. d. Wes. des Tetan. u. Triism.* in *GAUPE u. WV. Journ.*

*Journ.* 1831. B. 16. H. 1. p. 90. PERRY *Beitr. z. Pathol. des traumat. Tetan, ex the med.-chir. review.* 1831. Jul. in BEHRND I. c. B. 7. p. 196. J. TÖNNERMANN Tetan. nach ein. Lungenentzünd. in *Würtemb. med. Conversat.-Bl.* 1831. N. 8. PUMMER Tetan. traumat. ib. 1832. N. 5. EICHREBERG Wundstarrkr. glüchl. geheilt in *HUFELAND Journ.* 1832. St. 7. R. FROBIEP Tetan. in Folge ein. Stiehwunde in d. Fußsohle, nebst anat. Nachweis. d. Verletz. ein. Nerven, in CASPER *Wochenschr.* 1833. N. 36. p. 885. Idem, Tetan. u. Tod in Folge ein. Aderlasses. ib. N. 39. p. 899. Idem, üb. d. Urench. des Wundstarrkr. u. d. Behandl. desselb. in FROBIEP *Notiz.* 1837. B. 1. N. 1. p. 7. J. MURRAY case of tetan. with remarks on the divie. of nerv. as a method of cure in *Lond. m. gaz.* 1833. Vol. 12. Germ. in BEHRND *allg. Rep.* 1833. N. 6. p. 250. Idem Heil. ein. Tetan. traum. mittelst Durchschneid. des N. saphen. dagegen ex Lond. m. and phys. j. 1833. Mart. p. 210. in GERSON u. JUL. *Magaz.* 1833. St. 5. F. A. BERNDT (tetan. chronic.) *klin. Mittheil.* Greifsw. 1833. H. 1. Abschn. V. 3. BRUNN Tetan. spontan. mit Sectionsber. in CASPER *Wochenschr.* 1833. N. 49. J. BANNER Tetan. traum. ex Lond. m. and s. j. in KALISCH *med. Ztg. des Ausl.* 1833. N. 75. 3). ORLIZ Heil. ein. 4monatl. Schlafsucht mit Starrkr. (ex metastasi morbillosa) bei ein. 11jähr. Mädchen in *HUFELAND Journ.* 1833. N. 10. p. 1. C. H. FUCHS Tetan. rheumat. in *Heidelb. klin. Ann.* 1833. B. 9. H. 1. p. 54. A. L. RICHTER tödl. verl. Trism. u. Tetan. gastric. in *med. Ver.-Ztg.* 1834. N. 17. et Trism. u. Tetan. in Folge v. Entzünd. des R. M. ib. 1835. N. 15. MÜNZERTHALER Trism. dolorosus in *HUFELAND Journ.* 1834. St. 5. BALDWIN Heil. ein. Wundstarrkr. ex Amer. j. of med. ec. 1833. Jan. in GERSON u. JUL. *Magaz.* 1834. St. 1. p. 130. A. RACIBORSKI Fall u. ein. Varietät des Tetan. ex *Journ. hebdom.* 1834. N. 12. in SCHMIDT *Jahrb.* 1834. B. 3. p. 160. C. F. BELLINGERI Fall v. ein. tödl. Opisthoton. nebst phys.-path. Bemerkg. darüb. ex OMIDHI ann. kniv. di med. in KALISCH *med. Ztg. des Ausl.* 1834. N. 9. GIUL. FERRO

Geesch.

*Gesch. ein. tödl. Opisthoton, nebst d. Leichenuntersuch., u. Bestät. d. Theorie des Dr. Bellingeri üb. d. Nervenantagonism.* ex OMOLIDI l. c. 1834. Oktbr. — Decbr. in SCHMIDT Jahrb. 1836. Spptb. l. p. 252. et ex repertor. del Piemonte 1834. Decbr. in ib. p. 253. F. MAROTTI Fall v. Emprosthoton, nebst d. Leichenuntersuch. ex OMOLIDI l. c. in ibid. p. 253. M. PAOLINI Opisthoton, welcher auf d. Operat. des Wasserbruchs d. Vaginalis folgte u. Bellingeri's Ansicht üb. d. Nervenantagonism, bestät. ex OMOLIDI l. c. in SCHMIDT l. c. HANSEN *Gesch. ein. schnell verlauf. Tetan.* in PFAFF Mittheil. 1834. II. 3 u. 4. p. 28. MARTINET *Heil. des Tetan.* ex journ. des connoiss. méd. 1834. Avril, in SCHMIDT Jahrb. 1834. B. 4. p. 186. DIETZ *Gesch. ein. ohne äuss. Verletz. entstand. Starrkr.* in Würtemb. med. Corr.-Bl. 1834. N. 29. V. T. JUNOD *traumat. Tetan. mit ein. betrüchtl. Verlangsamung d. Respirat. u. des Kreislaufs* ex revue méd. 1834. Sptr. in SCHMIDT Jahrb. 1835. B. 6. p. 130. NEUMANN Fall v. idiospath. Trism. u. Tetan. in med. Fer.-Ztg. 1835. N. 3. et Tetan. nach gr. Blutverlust in CASPER Wochenschr. 1839. N. 47. HEYFELDER in SCHMIDT Jahrb. 1835. B. 8. p. 124. et ein Fall v. Opisthoton, traum. ohne Trism. in HUFELAND Journ. 1837. St. 9. p. 117. C. OTTO *Starrkr. nach ein. Anfalle v. habituell. Fallsucht mit tödl. Ausg.* in CASPER Wochenschr. 1835. N. 14. A. COOMANUS DE RUITER *Heil. ein. Tetan.* in pract. Tydschr. 1835. Suppl.-II. 3. St. 4. R. LISTON *a clin. lecture on tetan.* in the lancet. Lond. 1835. A. DALRYMPLE *case of traum. tetan.* in med. quarterly review. Lond. 1835. Vol. 4. N. 8. Germ. in SCHMIDT Jahrb. 1836. B. 11. p. 317. M. FRANCESCO in OMOLIDI ann. unio. di med. 1835. Germ. HOLER Fall v. *Starrkr. nach überstand. Typhus* in med.-chir. Ztg. 1835. N. 96. KREUZWIENER Trism. entstand. durch ein. seit  $\frac{1}{4}$  J. nach d. Verwund. zurückgeblieb. fremd. Körp. in CASPER Wochenschr. 1835. N. 51. HULWEG *Heil. ein. Trism. u. Tetan.* in Rust Mag. 1835. B. 44. II. 3. BÜRGH ein. Fülle v. *Starrkr.* in HUFELAND Journ. 1835. St. 11. Idem ein Fall v. glüchl. geheilt. Opisthoton. ib.

ib. 1837. St. 5. p. 102. et *zwei Fälle v. Trism. nach Verwund.* in *Würtemb. med. Corr.-Bl.* 1839. B. 9. N. 10. p. 79. J. L. ARONASOHN in *mém. et obs. de m. et de chir. pr. Par.* 1836. Fasc. 1 et 2. HERTEL *Tetan. v. Scharlach-Metastase (?)* in *med. Ver.-Ztg.* 1836. WALLACE *a clin. lect. on tetan. with cas. in the lancet.* Lond. 1836. Feb. R. BRIGHT *case of tetan. in Guy's hosp. rep.* Lond. 1836. Vol. 1. C. A. KEY *case of traum. tetan. ibid.* PRITZ *Behandl. des Tetan. ex gaz.* de Par. 1836. Juill. N. 39. in DIEFFENBACH *Ztschr.* 1836. H. 3. p. 111. ECKSTRÖM *Fall v. Tetan. traum. ex Äre Berüttelung of Setterbl.* 1835. p. 55. in DIEFFENBACH l. c. 1837. B. 6. H. 2. p. 254. PLITT *ein Fall v. Myelit. rheum. in Form ein. Tetan. mit Opiethoton. auftritt.* in *PARZT allg. med. Ztg.* 1837. N. 22. BRÜGGEMANN *üb. d. Tetan.* in *CASPER Wochenschr.* 1837. N. 18—21. HORNUNG *melancholia subsequa tetano.* in *Oesterr. med. Jahrb.* 1837. B. 21. St. 4. p. 593. SPÖRER *Fall v. glüchl. geheilt. Tetan. mit Trism.* in *DIEFFENBACH Ztschr.* 1837. B. 6. H. 1. p. 99. WANDTKE *Tetan. v. eingedrung. Holzsplinter.* in *med. Ver.-Ztg.* 1837. N. 48. p. 238. T. S. KIRKBRIDE *Wundstarrkr., durch Anwend. v. Opiat., Schröpfk. u. Blasenpflast. auf d. Wirbels. geheilt.* ex *Amer. j.* 1835. N. 31. in *SCHMIDT Jahrb.* 1838. B. 17. p. 336. FRIEDRICH *a. Lehre v. Wundstarrkr.* in *CASPER Wochenschr.* 1838. N. 29. p. 457. N. 30. p. 478. BALLING *ein Fall v. rheumat. Tetan.* in *GRAEFE u. W. Journ.* B. 26. H. 2. SHIDLER *tetan. rheumat.* in *med. Ver.-Ztg.* 1838. N. 16. ETTMÜLLER *Tetan. u. Trism. innerhalb 8 Stund. tödl.* in *Summar. des Neuest. u. Wissensw. a. d. gesammte. Med.* 1838. B. 9. p. 260. HAUFF *tetan. traum.* in *Würtemb. med. Corr.-Bl.* 1838. N. 28. p. 297. J. W. HANKE *d. Wundstarrkr.* in *RUST Magaz.* 1838. B. 53. H. 1. p. 98—142. GRISLER *Fall v. Trism. u. Tetan. traumat.* in *Würtemb. med. Corr.-Bl.* 1839. B. 9. N. 5. p. 33. W. WENKE *trism. idiopath.* in *MUFELAND Journ.* 1839. St. 6. p. 107. A. M. GLÜCKSELIG *Leberentz. mit Tetan. gepart.* in *Oesterr. med. Jahrb.* 1839. B. 29.

## §. LXVI.

*Symptomata. Necroscopia.*

S. prodromis tetani.

1. *ARETAEUS* tetanum extemplo invadere statuit<sup>1)</sup>. Illi fornicationem ad frontem<sup>2)</sup> et vertiginem, tensionem nuchae<sup>3)</sup>, sensum ingratum ad basin linguae, cardialgiam, deglutionem difficilem praecedere, alii defendunt, quae symptomata, si pro ingruente jam tetano potius quam pro prodromis habueris, vera erit *ARETAEI* sententia.

S. trismini infantilia.

2. Quadrabit illa et *trismo infantum*, quae constanter sine prodromis ingruisse vidimus<sup>4)</sup>. Pro prodromis alii habent alvi obstructionem inquietudinem<sup>5)</sup>, motum tremulum musculorum faciei<sup>6)</sup> et circulum plumbei coloris circa labia<sup>7)</sup>

3. Te

*B. 29. St. 1. p. 158. C. F. RUFF trism. rheumat. in Russ. Magaz. B. 56. II. 2. p. 251; trismus et tetan. ib. p. 268. 358; opisthoton. (gravidarum), ibid. p. 293. NEUMANN Tetanus nach gross. Blutverlust, in med. Ver.-Ztg. 183 N. 47. p. 235 et passim citandi.*

1) l. c. 2) SPRANGEL instit. medic. Vol. IV. p. 59

3) §. LXVI. 5 (67). LÜDERS l. c. cas. I. HAUMBACH l. citand WIRGAND l. c. HANKE scribit: „Ziehen zwischen d. Schultern bis zum Nacken u. Hinterkopfe, — als ob ei Zugluft diese Theile berührte, womit ein Riesel in d. Haut verbunden ist, Steifigkeit der Nackenmuskeln“ (l. p. 99). „Der Nacken nimmt nun mehr an Steifigkeit zu wird schmerzhaft, wenn sich der Kranke bewegen sol (ib. p. 100).

4) Idem testatur SCHNEIDER l. c. p. 13.

5) FINKE l. c. C. 2. CEDERSCHÜLD l. c.

6) FLEISCH Handb. d. Krankh. d. Kinder. Leipz. 1893. p. 26 CEDERSCHÜLD l. c. („ein leichtes krampfhaftes Zusammen-

3. Tetano, praevis indicatis signis<sup>6)</sup>, evo-8. tetani. luto, varia plane et stupenda observantur symptomata<sup>9)</sup>. Modo enim universum corpus a capite ad calcem ita riget, ut, si pedes attollantur jacenti, occipiti tantum insistat, non secus ac statua (*tetanus tonicus*<sup>10)</sup>); — modo corpus ad anteriora flectitur, ita ut mentum pectori affigatur, genuaque antrorsum vertantur (*tetanus emprosthotonicus*<sup>11)</sup>), — modo caput versus occiput inflexum remanet et corpus in arcum postice incurvum tenditur (*tetanus opisthotonicus*<sup>12)</sup>); — modo corpus ad latus alterutrum inflexum riget (*tetanus lateralis*<sup>13)</sup>),

Tt 2

lis<sup>13)</sup>,

*siehen der Lippen, wobei der Mund, besonders beim Schreien, etwas abgeplattet erschien“).*

7) J. P. FRANK interpretationes clin. observationum selectarum. Tubing. 1812. p. 372. De trismo infantum Tergesti endemico.

8) N. 1.

9) Inter haec observatio ex schedis paternis pertinet: „Mense Augusto an. 1784 Dr. FRANKAGLIA, Vogherensis, feminam hystericam simulque tetano afflictam se observasse mihi communicavit, quae (quod jam BILPINGER animadvertit) balneo utens accidente icsultu aquae innabat; illo praeterito iterum demergebatur. Aegre nec vaporibus laborabat, nec ulla re, ut neteret, fiebat.“

10) SAUVAGES nosol. meth. morb. Class. IV. Ord. II. 7. Cfr. WIGAND l. c. („der ganze Körper war durch tonische Krämpfe in einer anhaltenden Steifigkeit, Unbeweglichkeit u. Erstarrung“). BRÜCKEMANN l. c. cas. I. („der ganze Körper, mit Ausnahme der obern Extremitäten u. Untersehenkel, starr u. hart wie Holz“).

11) Αὐτοπροσθεν, ante, et retro, tendo.

12) Αὐτοόπισθεν, retro, et retro.

lis<sup>13</sup>), *pleurothotonus*<sup>14</sup>). *Cutis* musculos rigidos obducens dncilis est et a statu normali minime recedit, praeterquam quod saepe praeviis horribus vagis intense urat, et sudore madeat. Artuum dolores ejulatus expellunt. *Pulsus* nunc frequens<sup>15</sup>), plenus, nunc lentus, vacillans, intermittens. *Facies* modo rubet intense<sup>16</sup>), modo livet<sup>17</sup>), modo a statu consueto non recedit, modo risu sardonico, aut spasmo cynico, seu convulsione, quâ utraque gena aures versus retrahitur, deformatur<sup>18</sup>). In plurimis *oculi* caligant, protruduntur, et traculenti admodum adstantes intuentur. *Aures* multis inter se ipsae sonitant. Trismo, quandoque stridente<sup>19</sup>), detenti, voce rauca murmurant<sup>20</sup>). Maxima  
aegro-

13) FRANKLIN path. Lib. V. p. 372.

14) Α πλευρότονος, a latere, et tetos.

15) WELL (l. c.) pulsum ab 80 ad 170 vidit. Cfr. R. FROBIEP l. c. (ictus 120 et plenus pulsus). CURLING l. c. p. 15 („the pulse was as much as one hundred and eighty during the paroxysmus“) et alii. Hinc non semper normalis, ut HILLARY et CHALMERS declararunt.

16) GOMBEL l. c. cas. I. WINGAND l. c. OTTO diss. citanda, R. FROBIEP l. c. etc.

17) WINGAND l. c.

18) W. FARR l. c. (facies spasmi musculorum sic deformata fuit, ut eegrotus, 26 annos natus, vultu sexagenarii esset). CURLING l. c. p. 7 („distorsion of the face is so great that patients are not recognized by their most intimate friends,“ ut jam ARETAeus adnotavit).

19) SAUVAGES l. c.

20) HANKE l. c. p. 100 („die Stimme ist verändert, heiser, rauk u. dennoch leise, das Sprechen erschwert“). CURLING l. c. p. 6 („the voice is sometimes altered“ etc. en ex con-



aegrorum pars mentis compotes sunt<sup>21)</sup>. Somnus semper interpellatur, aut tumultuosus est. Frequenter pectus angitur et opprimitur<sup>22)</sup>, ac respiratio anhelans et laboriosa fit<sup>23)</sup>. Deglutitio ipsius salivae in multis impedita<sup>24)</sup>. Ciborum desiderium perstitisse fertur<sup>25)</sup>. Alvus et urina (plerumque cum sedimento puriformi<sup>26)</sup>) interceptantur<sup>27)</sup>. Interdum levis dysuria. In viris rigor penis et pollutiones occurrunt<sup>28)</sup>. Memorabile est, dum membra tota obrigescunt, flecti tamen posse digitos<sup>29)</sup>. Cuncta allata symptomata remissiones et

EX-

tractione spastica musculorum glottidis, cujus autor mentionem facit?).

21) BAUMER (l. c.) immerito contenderet delirium ad communia tetani symptomata pertinere. CURLING scribit (l. c. p. 22): „In some few instances delirium has occurred a short time previous to death.“

22) HANKE l. c. p. 100 („Behlammung, der Erstickung ähnlich“).

23) LÜDERS l. c. cas. I. WINGAND l. c. BRÜGEMANN l. c. cas. I („das Athemholen bis zum Ersticken erschwert“).

24) WINGAND l. c. CURLING l. c. p. 9 („from the spasmodic action of the muscles of the tongue and soft palate“). HANKE l. c. p. 100 („Unvermögen zu schlucken, heftiger Duret, Furcht vor Flüssigkeiten“).

25) J. P. FRANK in puero novem annorum. SEIDLER l. c. („Verlangen nach Speisen lebhaft“).

26) RICHERAND *notographie chirurgicale*. Paris 1812.

27) WINGAND l. c. R. FROBER l. c.

28) SPRENGEL l. c. p. 601. MORGAN l. c. p. 14.

29) SPRENGEL l. c. p. 600. T. ROE (ex *transact. of the med. and phys. soc. of Calcut.* 1836, in FRICKE u. OFFENHEIM. *Ztschr.* 1839. B. 2. H. 2, p. 221) ait: „5 Stunden nach dem Tode waren Fuss u. Zehen noch so nach innen gedreht,

exacerbationes agnoscunt, quae ultimae praecipue spasmō cynico, risu sardonico, palpebrarum contractione, fronte corrugata, doloreque cardialgico aucto insigniuntur<sup>30)</sup>, ac a minimo vel movendi, vel loquendi conatu<sup>31)</sup>, nec non ab animi pathemate provocantur<sup>32)</sup>. Declinante morbo aeger pruritum ad spinam dorsi, ac sensum liquidi inter scapulas ad os sacrum usque depluentis persentit<sup>33)</sup>. Caeterum symptomata vario ordine sensim et gradatim imminuantur, donec sudor universalis isque calidus convalescentiam adducat. Re male procedente, paroxysmi ad se invicem accedunt, remissiones evanescent, ac sudor frigidus<sup>34)</sup> cum convulsionibus<sup>35)</sup> vitae finem imponunt. Generationis curriculum morbi quinque vel sex dierum spatio terminatur; potest tamen vel ad plures hebdomadas, quin immo ad plures menses protrahi<sup>36)</sup>.

#### 4. Re-

*dass sie luxirt erschienen u., wenn man sie drehte, in die widernatürliche Lage zurückkehrten.*<sup>30)</sup>

30) BANG *prax. med.* p. 319. Quem dolorem CURLING (l. c. p. 9) ex diaphragmatis spasmō ducit.

31) Aegrotus, da quo HAUFF (l. c. p. 298) refert, contactu simplici convellebatur.

32) CALLISEN *principia systematis chirurgiae hodiernae*. Petrop. 1800. Vol. II. p. 124.

33) PINEL *nosographie philosophique*. Paris 1811. Vol. 3. p. 174. Jam GILB. BLANE (*obs. on the disease incident to seamen*. Lond. 1785) hoc symptoma observavit, est in tetano post dies 4 lethali. Cfr. CURLING l. c. p. 8.

34) BERGAMASCHI l. c. *osserv.* 2. p. 175.

35) R. FROBIEP l. c. BRÜGGEMANN l. c. csa. I. HAUFF l. c. p. 298. CURLING l. c. p. 23. 21.

36) P. CL. GIBSON (ex *Edinb. m. and s. j.* N. 86. in BEHRND

4. Recens natus, inter tertium et sextum a S. trismi <sup>infantum.</sup> nativitate diem, ubera, avide quaerens, ab oris constrictione sugere impeditur<sup>37)</sup>, ac solum pauculum illud lactis, quod nutrix instillat, ad stomachum libere deducit. Oculi turbidi, lacrymantes et fixi evadunt. Pupilla dilatata. Vagitus in lamenta permutantur<sup>38)</sup>. Respiratio cum angustia et sibilo absolvitur. Pulsus valde creber et parvus. Facies collabitur. Musculi mandibulae inferioris obrigescent: zygomatico, massetere, temporali et pterygoideo valde contractis et tumentibus; mandibula inferior ad superiorem attrahitur, labia ita coarctantur, ut nec haec, nec maxillam diducere queat. Interdum et os immobiliter apertum servatur, musculis mastoideis, sterno et mylohyoideis valde contractis<sup>39)</sup>. Obrigescit etiam lingua, pharynx constringitur, ut nullo modo vel salivam, spumam coram ore efformantem, aegrotulus deglutire possit<sup>40)</sup>. Abdomen inflatur, et alvus durissima. Accedunt spasmi<sup>41)</sup>, livor cutis, rigor

*neueste Journalistik*, 1830, II. 2, p. 225) trisimum in tetanum transientem tres fere menses curavit, qui sponte evanuit.

37) FINKH, LEVY II. cc.

38) FINKH (l. c.): „Ein nicht näher zu beschreibendes, gelendes, grillendes, stossweise ausgestossenes Geschrei,“ quod symptoma pathognomicum nominat.

39) SPRENGEL l. c. p. 602.

40) FINKH l. c.

41) Interdum tana vehementes, ut LEVY (l. c. histor. VII) scribere posset: „Die spasmodische Muskelspannung war so stark gewesen, dass sich in den letzten 4—5 Tagen die beiden Kniegelenke dadurch in subluxirtem Zustande befanden, in-

rigor musculorum colli et dorsi<sup>42)</sup>, atque miser vel tetano correptus, vel suffocatus<sup>43)</sup>, praesente quandoque lucido intervallo, moritur.

Necroscopia.

5. *Cadavera* tetano et trismo peremptorum obtulerunt: ecchymoses in superficie corporis externa, musculos tumidos, lividos, instar carnis assatae friabiles<sup>44)</sup>, sanguinem extravasatum in encephalo<sup>45)</sup>, cerebrum oppletum<sup>46)</sup>, vertebrarum colli<sup>47)</sup> et vertebrae dorsalis decimae<sup>48)</sup> cariem, meninges medullae spinalis sanguine turgidas<sup>49)</sup> cum sero<sup>50)</sup> et cruore<sup>51)</sup> in specu vertebrali,

*dem die Capita tibiae ganz schief nach aussen verdreht u. die Kniescheiben ganz an der äussern Seite der Schenkel hinaufgezogen waren. Als Wirkung der enormen convulsivischen Einwärtskrümmung der Finger sah man an beiden Handflächen tiefe, den eingedrückten Fingerspitzen entsprechende Verschwürung.*<sup>42)</sup>

42) FINKH l. c. 43) CEDERSCHÖLD l. c. (ex spasmo laryngis).

44) RICHERAND l. c.

45) BANG in act. reg. soc. med. Havn. Vol. 3. p. 126. FINKH l. c. C. 3. CEDERSCHÖLD l. c.

46) LARREY l. c. REID in *transact. of the association of physicians etc. in Ireland, Dublin 1817. Vol. I.* SCHNEIDER l. c. p. 54. RICHTER l. c. (1835). CURLING l. c. case 4. p. 161. R. FRORIEP l. c. (1837). BRÜGGEMANN l. c. cas. II. SEIDLER l. c. ETTMÜLLER l. c. p. 262. GEISLER l. c. LEVY l. c. hist. l. II. V. VI. RUFF l. c. p. 271. SIEBOLD apud WARNEKE l. c. p. 29.

47) Act. nat. cur. Vol. II. obs. 98. 48) AQUINO l. citando.

49) SIEBOLD *Journ. B.* 7. St. 3. p. 828. TH. BRAYNE l. c. p. 119. PYEUPPE l. c. cas. I. DUBREUIL ex *Ephémér. de Montp.* 1826. 12. in HECKER *lit. Annal.* 1827. Octbr. CARON l. citando. WINGAND l. c. CURLING l. c. p. 48.

brali, saepe nil morbosi hoc in specu<sup>22</sup>), aliàs ejus medulla anterior mollior<sup>23</sup>), lamina ex phosphate calcis obducta<sup>24</sup>); nervos inflammatos<sup>25</sup>),  
sal-

90. 161. R. FROBIEP, BELLINGERI, NEUMANN II. cc. BRÜGGEMANN I. c. cas. I et II. CURIOTTI in *repert. delle sc. med. del Piemont. Turin*, 1837. SEIDLER, GRISLER II. cc.
- 50) REID I. c. COURONNÉ in *revue méd.* 1827. *Septbr.* E. BLASIUS in *Rust Magaz. B.* 27. *H.* 1. p. 53. PFREUPER I. c. cas. I et II. WIESAND I. c. PARRY I. c. cas. II. BRUNN I. c. RACIBORSKI I. c. p. 161. NEUMANN, HANSEN, G. FERRO, DALRYMPLE, BALLING II. cc. CUELING I. c. p. 49.
- 51) *Transact. of the assoc. T.* 1. p. 1 (coagula duo duram inter matrem et canalem osseam). SIBOLD I. c. p. 829 (specus totus cruore nigro et coagulato abundans). R. BLASIUS I. c. PARRY I. c. cas. I. CAPPELER I. citando. R. FROBIEP, BRUNN, BELLINGERI, NEUMANN II. cc. BRÜGGEMANN in *SCHMIDT Jahrb.* 1836. *B.* 10. p. 227. et I. c. cas. I et II. FINKH I. c. C. 3. LEVY I. c. cas. VI. RUFF I. c. p. 271.
- 52) OLLIVIER op. cit. p. 818 („dans beaucoup de cas (tetani) on ne trouve rien dans la portion rachidienne du système nerveux qui puisse expliquer les phénomènes observés pendant la vie“). R. CARNICHAU I. c. DEPUTTEN in *FROBIEP Notiz.* 1829. *B.* 26. *N.* 7. p. 112. HILDENERAND ann. schol. clin. Ticin. P. II. p. 278. E. BLASIUS I. c. cas. II. BARTHEL in *SCHMIDT Jahrb.* 1834. *B.* 2. p. 349. LEVY I. c. (plura affert exempla). RUFF I. c. p. 252 et 261.
- 53) POGGI necroscop. di una donna morta per tetano reumat., che viè più comprova la distinta funzione dei nervi spinali, in *ONOIDI ann. univ. di med.* 1828. fasc. 45. p. 299. Cfr. GERSON u. JUL. *Magaz.* 1829. *St.* 2. p. 364. COMBETTE I. c. cas. I. CAPPELER *Beob. ein. Erweichung des vordern Theiles des R. M. nach ein. am 6. Tage tödl. spontan. Tetan.* ex MAGENDIE *journal. de physiol.* T. 11. in GERSON u. JUL. *Magaz.* 1832. *St.* 4. p. 117. Cfr. CUELING I. c. p. 60. SEIDLER I. c.

saltem laesos in vulnere tetanum excitante<sup>44</sup>), imprimis si gangraena nervorum velamenta aggre-  
distur<sup>45</sup>); nervum vagum sinistram ad oesophagum  
ossi-

54) TH. BRAYNE l. c. p. 119. CURLING l. c. p. 64 (plura enumerat exempla).

55) WALTHER *Abhandl. aus d. Gebiete d. Medicin, besond. Chirurgie u. Augenheilkunde*. 1. B. Landshut 1810. BRAGAMASCHI l. c. p. 172. 185. 188. FRÈRE l. citand. (n. brachial, valde rubicundus et emollitus). LE PELLETIER ex *revue méd.* 1827. Nouv. in FRONIEP *Nptiz*, B. 41, N. 5. p. 79 (n. cubital. et median.). Idem ib. 1833. *Juill.* (neurilemma n. ischiat. inflamm.). Cfr. MÜLLER *Archiv f. Anat.* etc. 1834. H. 2. MONOT ex n. *biblioth.* 1826. in HUCKER *Ht. Annal.* 1827. Octobr. SCHÜTZEL citand. SÖNDRERBERG et DAHLIN in C. J. ECKSTRÖM *Års-Berättelse om Svenska Läkares-Sällskap. Arbet.* Stockh. (n. ulnar. et nervi plexus brachial.). PHRY l. c. cas. II 1828 (omnes median.). R. FRONIEP (1837) l. c. (n. phrenic. dextr., plantar. intern., tibial. post., digital. volar. radial., ramus superficial. n. radial., n. dorsal. pollic. et indicis). CURLING l. c. cas. 4. p. 162 (neurilemma n. plantar.). Antor de hoc argumento fasius disserens (p. 66—74) permulta exempla affert, postquam non immerito admonuit (p. 65), ut medici attento animo systema nervi sympathici in tetano mortuis perscrutentur. SIMSOLD apud WANNKE l. c. p. 29 (radices nervor. cervical. anteriores post trisimum recens nati). — J. SWAN (l. c.), CURLING alique ganglia inflammata reperiunt, ut DUPUY (*encycl. méthod. Art. tétanos*) in equis tetano mortuis.

56) JACOBI in HUFELAND *Journ.* 15. B. 4. St. p. 74. PHRY l. c. cas. I. CURLING l. c. p. 67 (n. ischiat. sanguine inject.). R. FRONIEP l. c. (n. plantaris vulnerat. et partiatim inflammatus. Hujus necroscopiae phaenomena omni attentione digna sunt). HUFELAND l. c. (n. radial. digiti med.). FRONIEP (l. c.) 30 casus et ultra affert RUFF l. c. p. 361 (n. mediani ramus laceratus).

ossificatum, aculeatum<sup>57</sup>); glandulam trachealem ossificatam, prope eam<sup>58</sup>) ossiculum pungens ex glandula indurata enatum et in nervum intercostalem adactum<sup>59</sup>), hunc nervum inflammatum<sup>61</sup>), ossiculum nervum infraorbitalem laedens<sup>62</sup>), inflammationem laryngis<sup>63</sup>), tracheae<sup>64</sup>) et ventriculi<sup>65</sup>), ossificationem pleurae<sup>66</sup>), abscessum pulmonis sinistri cum diaphragmate concreti<sup>67</sup>),

cor

57) MICHAELIS v. ARNEMANN *Magazin*. 1. B. p. 387.

58) MEYER *Samml. med. Beobachtungen*. p. 671.

59) VETTER *Aphorism. aus d. pathol. Anatomie*. 1. Th. p. 131.

60) Observatio patris mei in puero.

61) Cfr. OMOIDIS *ann. univers. di med.* 1827. Fasc. 127. p. 428.

62) Altera observatio patris mei in puero, qui a lapide impacto contusionem ad os maxillae superioris perpassus est et ex tetano post triduum decessit.

63) COXB in *Philadelph. med. museum*. Vol. I. N. 1. p. 57. v. *Abh. f. pr. Ärzte*. 22. B. p. 252. WIRGAND, DALRYMPLE II. CO.

64) PARRY I. c. III. DALRYMPLE I. c.

65) M'ARTHUR in *med. transact.* Vol. 7. ANDRAL *clin. med.* T. 4. p. 444.

66) MEYER I. c. p. 676.

67) Horologarius in laboribus officii sui persulendis, instrumentum ferreum acutum inter costam sextam et septimam lateris sinistri sibi in cavitationem pectoris intravit. Extracto licet instrumento laedente, peripneumonia sputo cruento stipata secuta est, huncque phthisis pulmonalis, quo morbo jamjam conclamato in nosocomium civicum Vindobonense an. 1798 illatus curae mense commissus est. Praeter consueta nefandae aegritudinis symptomata, singultus, praesertim post pastum, urgebat. Ultima vitae hebdomade asper de rigore aelli conquerebatur, quam triduo ante mortem episthotonus secutus est. Simile exem-

cor rigidum<sup>68</sup>), aneurysmata arteriarum vertebrarum prope locum, ubi in arteriam basilearem conveniunt<sup>69</sup>); intestina contracta<sup>70</sup>) et vermes in iis<sup>71</sup>).

## §. LXVII.

## C a u s s a e.

C. prae-  
disponen-  
tes.

1. Praedisponunt ad tetanum et trismus<sup>1)</sup> regio calida<sup>2)</sup>, maritima<sup>3)</sup>, aer corruptus, praecipue

plum in phthisica Villaensi observavi. Affectio nervi phrenici haec phaenomena perbelle explicat.

68) LARRY *relation de l'expédition de l'armée en Egypte. Vol. II. p. 45.* HAWSHIP (l. c. Vol. 22. p. 186) cor valde contractum videbat. Ideirco alii cum eo crediderunt, in tetano cor spasmo corripi, quem errorem CURLING (l. c. p. 9 at 12) convicit docens (p. 14): „that the organ (cor) can never be considered as remaining in a state of permanent spasm, which is the state of the voluntary muscles in tetanus. Such a condition of this important organ is certainly incompatible with the continuance of life.“

69) HOWSHIP l. c. 70) CARRICHAEL l. c. FINKEL l. c. C. 3. 71) CURLING (l. c. p. 78. 79) permulta exempla collegit.

1) Sexus masculinus, ut CURLING, FRIEDERICH et WALLIS (ll. cc.) ex casibus, quos secundum tabulas ordinaverunt, concludunt. Peccarunt autem in eo, quod casus collegerint, qui fere omnes ad tetanum traumaticum solummodo spectant. Causas vero fortuitas, hanc tetani speciem provocantes, multo frequentius in virorum, quam mulierum vivendi ratione occurrere, patet. Relate ad tetanum non traumaticum praedispositio non differt inter utrumque sexum.

2) Cfr. l. c. in §. LXV. 2 (6). Tetanum et trismus haud raro in Italia, rarius in Germania et rarissime in Russia vidi. Frequentissime obveniunt post operationes chirurgicas in climatibus calidis. DABILLE obs. sur les maladies des climats chauds etc. A. HENKE Handb. z. Erkenntn. u. Heil,



cipue nosocomiorum<sup>4)</sup>, cubiculorum infantilium, puerperarum, decubitus supinus diuque protractus<sup>5)</sup> et mala corporis nutritio<sup>6)</sup>).

2. Excitatur tetanus et trismus utplurimum <sup>C. excitantes.</sup> a vulnerationibus, maxime iis, quae cerebro, medullae spinali<sup>7)</sup>, nervis<sup>8)</sup>, musculis<sup>9)</sup>, tendinibus<sup>10)</sup>,

d. *Kinderkrankh. Frankf. a. M.* 1818. B. 1. p. 219. HANCOCK in *Edinb. m. and s. j.* Vol. 35. p. 343. H. MARSHALL *Entwurf d. geograph. Vertheil. d. Krankh. auf d. Erdoberfläche* in *KALISCH med. Ztg. des Ausl.* 1833. N. 8 (40). *Zur heilkund. Statist. d. Insel Portorico*, ex P. TOM. DE CONDOREA *mem. geográf., hist., económ. y estadíst. de la Isla Puerto-Rico. Sanmiltan* 1831. in *GESSON u. JUL. Magaz.* 1834. St. 4. p. 1 (trismus neonatorum endemicus est). CURLING l. c. p. 36 sq.

3) BAYON l. c. (plures exhibet observationes egregias); aliter sentit BAZILLE l. c.

4) TRENDEN *neue Bemerck. u. Erfahrungen.* 1. B. N. 24. CLARCK apud OZANAM *hist. des epidém.* T. 5. p. 200. 201 (in Nosocomio Dublin. 1789 ex ille causa epidemice gressatus est tetanus). C. H. T. SCHUMANN l. c. p. 16.

5) Ex C. I. §. III. 6 (22) elucet, decubitus supinus, diuturnum, morbis columnae vertebralis favere, moxque infra demonstrabitur, tetanum saepe ex affectione medullae spinalis proficisci.

6) STREUMER in *Abhandl. d. K. K. Josephs-Akademie.* 2. B. p. 418.

7) RHESB in *Americ. med. record.* 1825. Jul. Duo minuta plumbi segmenta in canalem vertebralem punari, per ictum fistulae ignivomae vulnerati penetrata paralyin extremorum inferiorum vesicaeque urinae eo die septimo opisthotonum excitant.

8) Puncturem nervorum tetanum excitare jam ARSTAEUS (Acut. L. I. C. 6) animadvertat. Animadvertant et acu-

bus<sup>10</sup>), aponeurosibus<sup>11</sup>) et articulis<sup>12</sup>) infensae sunt, et a partium vulneratarum medendi ratione nimis irritante<sup>13</sup>). Sic tetanus et trismus adultorum<sup>14</sup>) observatus est, a vulnere frontis<sup>15</sup>), capitis<sup>16</sup>), musculi temporalis<sup>17</sup>), faciei<sup>18</sup>), oculi<sup>19</sup>),

a

punctatae fautores. Cfr. EWBANK in *med. gaz.* Vol. 2 p. 346 (laesio n. periton.). R. LISTON in *the Edinb. m. and s. journ.* 1821, Apr. Vol. 21. p. 292 (ex nervo mediano laniato tetanus lethalis). DUPUYTREN ex *Lond. med. gaz.* 1830. Aug. Vol. 5. p. 574. in GERSON u. JUL. *Magaz.* 1830. II. 6. p. 524 (laesio n. cubitalis). R. FROBIEP (1837) l. c. (ex contusione n. ischiat. trismus). HOLSCHER *Trism. durch Reiz. ein. Nerv. am Oberarme vermittelt ein. Knochensplitters in Hannöv. Annal.* 1837. B. 2. II. 1.

9) GÖBEL l. c. cas. II (trismus).

10) DUFOUART *analyse des blessures d'armes à feu.* 2. Part. GÖBEL l. c.

11) ODIR *manual de médecine pratique.* p. 189.

12) LARREY l. c.

13) LESAIVE l. c. LÜDERS l. c. cas. II (ex irritatione fonticuli medio lapidis infernalis trismus).

14) De trismo recens natorum mox infra speciatim sermo erit (animadverto praeterea, citationes simplices hinc tetanum respicere; nam ubi causa allata trismus producit, in parenthesi id citationi additur).

15) LA BILLARDIERE *Reise nach d. Südmeer.* 2. Th. p. 194. PLOUQUET *repart.* art. tetanus. CERRIOLI l. c. J. GRANT *Full v. Wundetarrkr.* in GERSON u. JUL. *Magaz.* 1833. St. 1. ex *transact. of the med. and phys. soc. of Calcutta.* 1831. Vol. 5.

16) FABR. HILDEBRAND cent. V. obs. 9. STREUBER *Samml. v. Beobachtungen.* N. 2. 11. SPYER in HENKE *Ztschr. f. d. Staatsarznei.* 1830. II. 2. p. 253.

17) HALLER *bibl. chirurg.* Vol. I. p. 267.

a laesione maxillae sub extractione dentis<sup>22</sup>), a dentium peregrinorum<sup>23</sup>) vel artificialium<sup>24</sup>) insertione, a dentitione difficili<sup>25</sup>), ab expressione parvi steatomatis sub mento<sup>26</sup>), a perforatione auriculae<sup>27</sup>), a violentia ossibus nasi illata<sup>28</sup>), a laesione infra cervicem<sup>29</sup>), a setaceo nuchae<sup>30</sup>) et pectoris<sup>31</sup>), a dorsi ictu<sup>32</sup>) et levi vulnere<sup>33</sup>), ab eleva-

18) WRIGHT in *medial obs. and inquiries*. Vol. 6. *Journ. de méd. continué*. T. XVII. p. 195. LUDENS l. c. cas. I (trismus).

19) Nov. act. nat. cur. Vol. I. obs. 53. GRACH in *Phil. transact.* Vol. 53. p. 254 (trismus). Ab extirpatione oculi (trismus) describitur in *Salzb. med. chir. Zeitung*. 1791. 13. B. p. 220. LOCHER apud RAHN in *Verhandl. d. med.-chir. Gesellsch. des K. Zür.* in d. *Herbstzeit. des J. 1827*. Zür. 1828 (trismus ab extirp. fungi bulbi oculi).

20) RUSH in *transact. of Philadelphia*. Vol. 1. P. I. N. 3 (trismus). B. TRAVES l. c. (trismus chronicus).

21) LUPIN apud ACKERMANN l. c. p. 71 (trismus).

22) MANGET in *med. Comment. v. Edinb.* 1. B. p. 355 (trismus). ODIER l. c. p. 189. HOLSCHER in *Hannö. Annal.* 1837. B. 2. H. 1 (trismus).

23) HUFELAND *Bibl.* 3. B. 2. St. p. 47. 66.

24) ANDRÉE in *mem. of the med. soc. of Lond.* Vol. 6. App.

25) HUFELAND *Journ.* 23. B. 3. St. p. 210 (trismus).

26) PENADA in *memorie della soc. Italiana*. Vol. 10. N. 2. WENDT l. c. (trismus a cocumine rudis praepilatae in nares alte descenso).

27) HIPPOCRATES *Ἱπιδήμ.* L. V. N. 47.

28) WALTHER *Abhandl.* 1. B. p. 324 (trismus).

29) ANDRAL *clin. méd.* T. 4. p. 445.

30) LUPIN *hist. morborum difficilium*. N. 49.

31) PORTAL *cours d'anatomie méd.* T. IV. p. 267. NICHOLLS *piqûre mûrie d'ascidens tétaniques. Ex med. and phys.*

elevatione ponderis<sup>33</sup>), a lapsu super lumbos<sup>34</sup>), a concussionem spinæ<sup>35</sup>), a verberibus tergo inflictis<sup>36</sup>), a colli vulnere<sup>37</sup>), a spina piscis in larynge<sup>38</sup>), a castanea in pharynge<sup>39</sup>), a mammae extirpatione<sup>40</sup>), a dilaceratione musculi pectoralis magni<sup>41</sup>), a laesione scapulae<sup>42</sup>), ab operatione tumoris subaxillaris<sup>43</sup>), ab illa empyematis<sup>44</sup>), ab umbilici vulnere<sup>45</sup>) et inflammatione gangraenosa<sup>46</sup>),

*journ.* 1825. *Mart.* p. 180. in *bull. des sc. méd.* 1825. *Nouv.* p. 289.

32) Hoc ex causa tetanus observatus est in schola clinica Ticinensi ann. 1787. Idem observavit SPÖRER l. c.

33) WRÓBLEWSKI in *Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Wileńskiego*. T. II.

34) STOLL ratio medendi. Vol. I. §. 298.

35) WRÓBLEWSKI l. c. (una ex tetani causis inter milites). MORRISON l. c. (tres Aethiopes flagellati). MORGAN l. c. p. 6 (duo pueri a scholae magistro verberibus castigati).

36) BINNINGER obs. cent. 4. N. 75.

37) LARREY l. c. at *Abh. f. pr. Ärzte*. 22. B. 1. St. p. 22.

38) GUATTANI de aneurysmatibus (trismus).

39) BORRHAAVE praelect. de morb. nerv. T. I. p. 70. SCHMUCKER *Wahrnehmungen*. 2. B. N. 6. KLEIN *chir. Bemerk.* p. 252 (trismus). BRÜCKMANN in *Horn Archiv f. med. Erfahrung*. 1811. Jan. p. 1 (trismus). B. BRODIE in *méd. gaz.* 1826 Vol. 2. p. 345. S. COOPER in *surg. dict.* 1830. artic. *tetanus*. HANKS l. c. p. 104 (ab extirpatione mammae carcinomatosa) et p. 108.

40) DUPUIS in *act. de la soc. de Lyon*. 1801.

41) ELSER in *Salzb. med. chir. Zeitung*. 1807. p. 23.

42) MURKINNA *Journ. f. d. Chirurgie*. 1. B. 1. St. p. 112. 126.

43) LEVAUCHUR in *journ. gén. de méd.* T. 21. p. 61 (trismus).

44) BAYON in *journ. de méd.* T. 30. p. 408. FINKH l. c. C. 4. J. F. OSTANDER in *Praxis d. Geburtsh.* Hannov. 1836.

nosa<sup>44</sup>), a herniotomia<sup>45</sup>), ab abortu<sup>47</sup>), partu<sup>48</sup>), castratione<sup>49</sup>), ab apertione bubonis syphilitici<sup>50</sup>), ab illius erosione per calcem vivam<sup>51</sup>), a vulnere sclopetario cruris<sup>52</sup>) et glutaeorum<sup>53</sup>), a luxa-  
tione

45) J. W. HEUSTIS l. c. p. 122. COLLES ex *Dublin hosp. reports*. Vol. 1. p. 285. in GERSON u. JUL. *Magaz. B.* 3. St. 2. K. G. ZIMMERMAN Fall v. Kinnbackenkr. ein. neugeb. Kind. v. Entzünd. u. Brandigewerd. d. Nabelschnur, in GERSON u. JUL. l. c. 1822. B. 4. p. 369. BESCH Entzünd. d. Nabelarter. als Ursache d. Trism. in *neue Ztschr. f. Geburtsh.* 1838. B. 5. H. 3. LEVY l. c. (idem tastatur). LABATT (l. c.) vero hanc sententiam rejicit.

46) *Breslauer Samml.* 1719. 1. B. p. 93 (trismus). CALLERN in act. reg. soc. med. Havn. Vol. II. N. 1 (trismus, dum omentum cum caustico tostum fuerat). HEY *prat. obs. chap. 3* (trismus). FRITZ l. c. (ab hydrocele operata trismus et tetanus). CLOT-BEY ex BROUSSAIS *jeurn.* 1834. *Avril*, in SCHMIDT *Jahrb.* 1835. B. 5. p. 223 (ab hydrocele operata trismus et tetan.). M. PAGLINI l. c. (item, opisthotonus), R. FRORIEP (1837) l. c. (operat. hern. umbilic.).

47) ARCHIGENES apud ARTIUM. *Tetr. II. L. 2. C. 39.*

48) FORESTUS L. X. obs. 112 (trismus). *Breslauer Samml.* 1726. 2. B. p. 632 (trismus). CHRISTIE in *Edinb. m. and s. j. Vol. 8.* p. 415 (trismus). CURRIE in *med. repository.* Vol. 1. p. 142 (trismus).

49) CAVALLINI *collezione di casi chirurgici. T. 2. MORAND vermischte Schrift.* p. 311. MURSIMA *Journ. f. die Chirurgie.* 1. B. 1. St. p. 124. SABATIER in *mém. de l'Institut. nat. des sciences. an. VI.* p. 179 (trismus). PLENK *Samml. v. Beobacht.* 2. B. (trismus). COURONNÉ l. c. (trismus et tetan.). Equos post castrationem non raro tetano corripi, adnotat CURLING l. c. p. 83.

50) STOLL. *rat. medandi.* Vol. I. p. 297 (trismus).

51) BALDINGER *Journ.* 20. B. p. 42 (trismus).

Frank *Prax.* II. 1. 2. 1.

Uu

tione brachii<sup>54</sup>), pollicis<sup>55</sup>), ab acu brachio<sup>56</sup>), pollicis<sup>57</sup>) infixa, a laesione nervi ulnaris<sup>58</sup>), a femoris<sup>59</sup>), cruris<sup>60</sup>), brachii<sup>61</sup>) et manus<sup>62</sup>) amputatione, ambustione<sup>63</sup>), ex morsu illius a muliere irata<sup>64</sup>), a venaesectione<sup>65</sup>), post operatione-

- 52) D. H. TREZEVANT l. citando. p. 505. WAGNER tet. traum. in HORN Archiv. 1828, H. 3. p. 463.
- 53) WILD in LODER Journ. f. d. Chir. 4. B. p. 471.
- 54) VALENTIN in KALISCH med. Ztg. des Ausl. 1833. N. 62.
- 55) HIPPOCRATES l. c. N. 74. 75. 76. VANDERBACH l. c. R. FROMIEP l. c. 1837 (trismus). RUPE l. c. p. 358 (trismus et tetan.).
- 56) POISSAK in med. repository. 1800. v. KÜHN Repert. 4. B. p. 635.
- 57) PLINNINGER in Würtemb. med. Corr.-Bl. 1834. N. 25 (trismus).
- 58) DUPUYTREN Tetan. durch Verwund. des N. uln. ex lancette franç. 1829. Nouv. in FROMIEP Notiz. 1829. B. 26. N. 7. p. 112. Cfr. (8).
- 59) F. A. HERNDT l. c.
- 60) LE PELLETIER l. c. (trismus). BLEICHNER in Würtemb. med. Corr.-Bl. 1838, B. 8. N. 6 (trismus).
- 61) E. LEAN l. c. LARREY mém. de chir. milit. et champagne. Par. 1812—17. T. 3. p. 287 (cum arterie simul nervus medianus interligatus fuit).
- 62) BELLOT in journ. de méd. continué. Vol. 2 p. 416.
- 63) BONHOMME in recueil périodique. T. X. p. 162. SANSON tetan. nach heftiger Verbrennung. in FROMIEP Notiz. N. 432. p. 224. AQUINO Wundstarrkr. in Folge v. verschiedenen Brandwunden (in utroque genu) u. mit ein. Affection d. Wirbelsäule (v. supra §. LXVI. 5 (48)) complicirt, in BERNHARD allg. Repertor. 1832. N. 10. p. 109.
- 64) Select. med. Francf. T. II. p. 147.
- 65) FORMISTUS L. X. obs. 118. SCHENK obs. L. I. N. 250. BENEVIENUS de abditis morb. causis. C. 48. DE LA ROCHE

rationem aneurysmatis brachii<sup>66</sup>), a panaritio<sup>67</sup>), ab indice contrito<sup>68</sup>), a contusione pollicis<sup>69</sup>) et primæ phalangis digiti minimi<sup>70</sup>), post lacera-  
tum<sup>71</sup>), abscissum digitum<sup>72</sup>), a levissimo illius<sup>73</sup>),  
brachii<sup>74</sup>) et cruris<sup>74</sup>) vulnere, ab hallucē con-

Un 2 trito<sup>76</sup>),

in *journal. de méd.* T. 40. p. 213. R. FRORIER in CASPER  
*Wochenschr.* 1833. N. 39 (ex læsione rami n. cutan. me-  
dii, ut suspicatur). — Nec non ab ipsa *hirudinum appli-*  
*catione*: P. JOLLY ex n. *biblioth. méd.* 1827. Août. in  
FRORIER *Notiz.* 1828. B. 19. N. 5. et a *cucurbitulis scari-*  
*ficantibus*: CURLING l. c. p. 34.

66) CALLISEN in diss. de vulneribus arteriarum in genere.  
Havn. 1786.

67) FRITZ l. c. (trismus). SCHÜTTE in *Heidlb. klin. Anz.*  
1828. B. 4. II. 3. p. 481 (trismus).

68) BUISTRERET in *journal. de méd. continué.* Vol. 5. p. 103.  
PONMER l. c. (index et medius contriti).

69) BRERA *prospetto di risultam. ottenuti nella clin. med.*  
*nell' a.* 1816 e 1817 (trismus).

70) ELSER l. c. p. 18.

71) MATUSSIERE in *journal. de méd.* Vol. 14. p. 453. SCHULTZEN  
diss. cit. (trismus). CAMBERG l. c.

72) FARR. HILDANUS cent. III. obs. 94. GRIESELICH in *Reut*  
*Magaz.* 1831. B. 35. II. 2. p. 255. cas. I (phalanx potius  
abscissa erat; trismus). HANKE l. c. p. 113.

73) FARR in *med. Bemerk. u. Untersuchungen.* 4. B. N. 7.  
GRABBE *tödl. Verwundg. durch ein. Rosendorn,* in ejusd.  
et WALTHER *Journ.* 1831. B. 15. II. 3.

74) HENCKEL n. *Anmerkungen.* 2. B. MONOT *nouv. bibl.*  
*méd.* 1826. Août (vulnus brachii conspicuum). BLANK-  
MEISTER l. c. cas. III (a sinapismo applicito feminae hy-  
stericae trismus et tetanus). FRÈRE *Starrkr., veranlasst*  
*durch ein mittelst Aetzkali bewirkt.* Fontanell am Oberarm,  
ex *revue méd.* 1839. in FRORIER *Notiz.* 1839. B. 10. N. 21.  
p. 327.

trito<sup>76</sup>), a surae<sup>77</sup>) et pedis<sup>78</sup>) ejusque digitorum<sup>79</sup>) contusione, a clavo<sup>80</sup>), vel festuca<sup>81</sup>) pedi et ab assula manui<sup>82</sup>) infixa, a calcis vulnere<sup>83</sup>), a fractura brachii<sup>84</sup>), tibiae<sup>85</sup>), patellae<sup>86</sup>),

75) OLLIVIER op. cit. obs. 119. p. 820.

76) BLANKENISTER l. c. cas. I (trismus) et II.

77) FRITZ l. c. (trismus).

78) MORGAGNI de sede et caus. morborum. Epist. LIV. art. 49. SIBBOLD *Chiron.* l. B. p. 329.

79) FRORIUS *Notiz.* 1828. B. 19. N. 22. COMLOSSY l. c. PARRY l. c. cas. II. HAUFF l. c. p. 297 (trismus).

80) Nov. act. nat. cur. Vol. I. obs. 6. BELLOT l. c. p. 415 (plantae pedis). CLARKSON in *transact. of Philadelphia.* Vol. I. P. I. N. 5. COLLOB *med. chir. Werke.* obs. 30. *Journ. de méd.* T. 58. p. 57. MATUSSIERI l. c. p. 462. GÖREL l. c. cas. I (trismus). FRORIUS in CASPER *Wochenachr.* 1833. N. 36. et in *Notiz.* 1837. B. 1. N. 1. J. MURRAY l. c. (trismus). DAWOSKY l. citando.

81) Nov. act. n. c. Vol. V. obs. 40. *Bresl. Sammlung.* 1718. 2. Th. p. 1896 (lignea), l. c. BUISTERSET p. 102 (festuca vitri plantam pedis vulnerans). CONGRIGHAM in *mem. of the med. soc. of Lond.* Vol. II. N. 11. E. BLASIIUS l. c. (ex assula, quae in plantam pedis sinistri intraverat, trismus et tetan). WINKLER l. c. p. 104 (assula in calca dextra). WANDTKE l. c.

82) KANZWIESER l. c. (trismus). HELWIG l. c. (trismus). B. FRORIUS l. c. 1837 (trismus).

83) BROWN in *med. repository.* Vol. 4. N. 4. Art. 2.

84) LE PELLETIER l. c. *Med. Ver.-Zig.* 1837. N. 48. p. 236. SCHLESIER *Fractur des Vorderarm. mit Tetan.* in *med. Ver.-Zig.* 1837. N. 48.

85) CHAVASSE in *med. Comment.* v. *Edinb.* IX. p. 84. Cfr. HAEN rat. medendi. P. VI. C. 4. §. 9. HORNSTÄDTTER Dec. V. C. 6. VIMONT in *recueil périod. de la soc. de méd. de Paris.* N. XXIX.



lae<sup>86</sup>), ab incisione pedis gangraenosi<sup>87</sup>), a per-  
 nionibus pedum sphacelatis<sup>88</sup>), ab operato circa  
 genu tumore<sup>89</sup>) cystico<sup>90</sup>), a genu laesione<sup>91</sup>),  
 a laesione tendinum pedis<sup>92</sup>), inprimis Achillis<sup>93</sup>),  
 a fractura cruris<sup>94</sup>), femoris<sup>95</sup>), pedis<sup>96</sup>), a  
 morsu apis<sup>97</sup>), araneae<sup>98</sup>), viperæ<sup>99</sup>), crotali  
 horridi<sup>100</sup>), galli<sup>101</sup>), canis<sup>102</sup>) et animalium ra-  
 bido-

86) LANGENBECK *Bibl. f. d. Chirurgie*. 3. B. p. 64.

87) HOPFENGARTNER in *HUFELAND Journ.* 1. B. p. 550.

88) STOLL *rat. medendi*. Vol. I. p. 297 (trismus). *Trismus*  
*in Folge v. Erfrieren d. Fusszehen*, in *RUST Magaz.* 1829.  
 B. 30. H. 1. p. 184.

89) MICHAELIS in *PFAFF Mittheilg. a. d. Geb. d. Med.* etc.  
 1832. B. 1. H. 1.

90) BUISTERSHT I. c. p. 104.

91) MÜCKE I. c. A. GILMORE *ex transcript. of the med. and*  
*phys. soc. of Calcutta* 1831. Vol. 5. in GERSON u. JUL.  
 1833. St. 1. HANSEN I. c.

92) CHALMERS *on the weather and diseases of South-Carolina*.  
 p. 23.

93) BILGURE *Wahrnehmungen*. p. 489 (trismus). CURLING  
 I. c. p. 31.

94) PARKINSON in *med. chir. transcript. by the med. and chir.*  
*soc. of London*. Vol. II. p. 23.

95) WINSLOW in *collect. soc. med. Havn.* 1. Vol. N. 35.

96) MAUNOIR in *journ. de méd. continué*. T. 18. p. 195 (trismus).

97) CH. RANDOLPH *ex the med. record. for med. and surg.*  
*Baltimore* 1827. January in *FRONIER Notiz*. 1828. B. 20.  
 N. 9. p. 144.

98) *The Philadelph. journ. of the med. and phys. sc.* 1825.  
 Vol. 1. N. 2. Aug.

99) ALEXANDER in *med. Comment. v. Edinb.* II. Dec. 4. B.  
 p. 46 (trismus).

100) MASSIE *experimental inquiries into the properties of the*  
*polygala Senega.* v. VALENTIN I. c. p. 139 (trismus).

bidorum<sup>103</sup>). Quae singulae laesiones eo facilius tetano et trismo ansam porrigere solent, quo magis cum indicatis caussis praedisponentibus conveniunt, aut cum aliis caussis excitantibus (quae et per se affectiones tetanicas excitare valent) societatem ineunt. Hujuscemodi sunt refrigerium<sup>104</sup>),

prae-

101) Ephem. nat. cur. Dec. III. an. 3. obs. 107 (trismus).

102) FRITZE in HORN *Archiv f. med. Erfahrung.* 1816. p. 304 (trismus).

103) ROSSI in *mém. de l'acad. des sc. de Turin.* T. 6 (trismus).

104) RIVERRIUS, BONTIUS, RUSH, WRIGHT, BAYON, CHALMERS, LARREY etc. etc. Ex mamma cancro aperto laborante refrigerata trismus describitur in *the Lond. med. and phys. journ.* 1818. Novemb. GUERSANT in *gaz. méd. de Par.* T. 3. N. 8. WENDT l. c. (ex refrigerio post mammam operatam scirrhosam uno in casu tetanus, altero trismus). K. O. OTTO diss. obs. de trism. et tetan. ex refrigerio oborto. Lips. 1825. Germ. in n. *Samml. auserles. Abh. f. pr. A.* 1829. B. 13. St. 2. p. 652. BLASIUS l. c. BAUNBACH *Tetani. v. Nagelwunde u. Erkältung*, in HUFELAND *Journ.* 1830. St. 7. WIEGAND l. c. (aestuate corpore; trismus et tetanus). GRIMSKLICH l. c. cas. II (trismus). HETZFELDER l. c. (trismus). SEGOND ex *journ. hebdom.* 1835. N. 12. in SCHMIDT *Jahrb.* 1835. B. 8. p. 181 (trismus). BALLING l. c. SEIDLER l. c. (trismus). HANKE l. c. p. 107. „Pro secunda vica gravis uxor Dni Kunz, Viennensis, mulier laxi pallidique habitus, spasmis hinc inde crurum laboravit. Peperit tandem anno 1800 mensis Junii sub fine sat feliciter puerum. Post partum sanguinem magis copia ex utero amisit, quara latentem placentam extrahere debuit Dnus Lescr. Hoc facto, haemorrhagia cessavit quidem, sed lipothymiae plurimae continuarunt. Ope volatilium, tincturae cinnamomi, castorei, anodynae, ad vitam, de qua ex momento periclitari videbatur, revocata fuit misera. Ab his lochia

praecipue susceptum dormiendo super solum humi-

sat bene procadabaat. Pulsus erant valde frequentes, debiles. Sic quatuor per dies se habuit aegra, dolores ebdominis, modo semel, brevi tempore, saepius vero lumborum dolores, non tamen atroces experte. Caput dolebat; prima a partu die nil se videre, per horas testata est. Laboraverat autem jam diu et saepius dolore capitis, et ad oculum sinistrum toties fera visu privari solebat. Etsi varo lochia rectius fluerent alvusque soluta esset, et prolem lectaret mulier, pulsus tamen semper fuit valde celer, frequens et febrilis, sitis urgebat. Ventar autem mollis, tractabilis, indolens erat. Quarta tandem die a puerperio frustum coagulati, putridique sanguinis ex utero secessit; unda febris immixta, lochie vero mucosa excreta fuerunt. Die e partu nona, cum semper hucusque sudasset, aperta fenestra ac janua, per momentum a vento frigido fuit adflata. Mox abhinc linguae difficultatem experte est. Haec die decima, etsi heri hilaris et jocosa fuisset, continuavit, et instans oris aperiendi difficultas accessit. Haustum salinum praescripsi. Die 11. maxille utraque recte claudabatur et dentes dentibus edprimebantur, nulla vi sepersudi. Deglutitio omnis impedita, non tam ob dolorem, quam ob spasmus. Hinc clystere, ex tinct. anodynnae scrupulo, ex eadem moschi dosi, aliquoties, — dein alii ex asa foetida, dein ex camphora dati fuere. Circa collum et mandibulas fomentationes aromaticae, — linimentum volatile cum camphora, ad spinam dorsii, quae, simul se occiput, dolebat illiniebatur vesicans nuchae impositum. Die 12. a partu omnia in pejus ruebent; a guttula medicinae inter dentes porrecte (etsi linguae motus ab hesternae die, at loquela, per dentes, restituta esset), fere suffocata fuit. Mucus multus in faucibus colligitur, respiratio anxiosa. Unguentum mercuriale linimento superadditur; ad hrecbie duo ponatur vesicantis, jam heri emollientes in uterum factae iniectiones lochia suppressa

midum<sup>105</sup>), flumen pervadendo<sup>106</sup>), vel sub actu submersionis<sup>107</sup>), insolatio<sup>108</sup>), aestuatio<sup>109</sup>), menstrua aberrantia<sup>110</sup>), epistaxis<sup>111</sup>) sup-  
pressa<sup>112</sup>),

restituunt, sed omnia iocassum, et mors eadem die insecta est." Scripsit J. P. FRANK.

105) AVICENNA l. c. C. 8. K. O. OTTO l. c. (trismus). RACIBORSKI l. c. p. 160. E. ENZ in *Rust Magaz.* 1834. B. 41, H. 2. p. 276. BELLINGHRI l. c. SONNELGER in *recueil de mém. de méd., de chir. et de pharm. milit. par ETIENNE, BÉGIN et JACOB. Par.* 1838. Vol. 45, p. 166 (tetanus spontaneus ex causa allata). HANKS l. c. p. 106.

106) Auditor quondam meus Dr. MEYER, an. 1817 die 21. Mart. emprosthotonum in duobus fratribus vidit, quorum natu major 17 annos, minor 14 numerabat. Rustici hi lignis in aliea sylva cadendis at colligendis intenti, ac profuso sudore madidi, cum a custodibus nemorum deprehensi et prosecuti fuerint, fugam tentando ad rivulum perducti illum pervadere debuerant. Quo superato cum cursum renovaverint, natu minor circiter quinquaginta adhuc passus, major vero cantum fera absolvit, ad quam metam perducti veluti exanimas et emprosthotono corrupti humum prosternabantur (*Pamiętnik Towarzystwa lek. Wileńskiego. T. II*).

107) HAWES *Abhandlungen der Lond. K. Gesellsch. zur Rettung Verunglückter und Scheintodter.* p. 145.

108) WRIGHT in *medical observations and inquiries.* Vol. 6. F. MOROTTI l. c. (emprosthotonus).

109) CURRIE in *memoirs of the med. society of London.* Vol. 3. p. 147. ETTMÜLLER l. c. p. 260.

110) BIRLING medicus. p. 737. BOHNNECKER *Franck. Samml.* 6. B. p. 21. *Edinb. Versuche u. Bemerkungen.* 5. B. p. 43. WAHL trismus a retentione mensium, in n. *Ztschr. f. Geburtsh. B. 8. H. 2.*

111) Nec non gonorrhoea: G. C. FENOGLIO ein durch (aqua gelida) unterdrückt. Gonorr. erzeugter Trismus durch künstl.

pressa<sup>112</sup>), ira<sup>113</sup>), terror<sup>114</sup>), datura stramonium<sup>115</sup>), cicuta aquatica<sup>116</sup>), opium<sup>117</sup>), nuxvomica<sup>118</sup>), solaninum<sup>119</sup>), mercurius<sup>120</sup>), vitia  
gastri-

*Hervorruft. des Ausfl. geheilt, ex ONCOIDHI ann. univers. med. 1826. Lugl. in HUFELAND Journ. 1827. St. 2. p. 118.*

112) CARRON in *journ. général de méd. T. 20. p. 366.*

113) Eph. nat. cur. Vol. II. obs. 158 (trismus). GANUA caso di pericolosiss. convuls. tetan. produt. in tre ore da mal frenata ira. *Repert. med. di Torino. 1825. N. 67. p. 301. Bulletin des sc. méd. 1823. Sept. p. 58.*

114) BIERLING I. c. p. 735. HANSA in HUFELAND Journ. der pr. Heilk. 2. B. p. 370. FIDBRIT *prakt. Annalen. 2. St. p. 206. RAMEL journ. de méd. T. 75. p. 421. Lond. m. reposit. 1828. Decr. in HORN Archiv. 1829. II. 2 (ex intuitu epileptici). — Huc spectat gaudii subitanei effectus, cujus exemplum singulari habet MONRO (L. c.). Miles scilicet, cui eodem momento, quo in eo erat, ut glandis plumbeae ictu necaretur, delicti veniam dabant, extemplo tetano lethali correptus est. Cfr. C. XI. §. LV. 2 (113).*

115) KAAW BOHRHAAVE impetum faciens. p. 282.

116) WEPFER histor. cicut. aquat. p. 7. 8 (trismus).

117) DELACROIX in *journ. de méd. T. 39. p. 313 (trismus). MEGLIN in journ. de médec. continué. 1810. Nov. p. 359. VALENTIN I. c. p. 140.*

118) Sub illius usu saltem rigiditatem tetanicam extremitatum paralyticarum vidi, observaruntque alii. MANSFELD üb. Lesieur's méthode enderm. in *gemeins. deutsche Ztschr. f. Gbrtsk. 1827. p. 303 (tatan. ex gr. ij Strychnini). SÉGALES D'ETCHEPARR ex archiv méd. 1827. 9. in HUCKER lit. Annal. 1828. Mai (Extr. N. v. in venas inject.). BOUILLAUD Vergift. durch d. N. v. ex *journ. hebdom. 1834. N. 12. in SCHMIDT Jahrb. 1834. B. 3. p. 162. J. MORGAN in FROBIEP Notiz. 1834. B. 41. N. 2.**

119) Ut suspicamur; nam comestis fructibus solani tuberosi

gastrica<sup>121</sup>), vermes intestinales<sup>122</sup>), ulcus siccatum<sup>123</sup>), pustula maligna<sup>124</sup>), zoster fugatus<sup>125</sup>), erysipelas retropulsum<sup>126</sup>), lichen urticatus suppressus<sup>127</sup>), febres<sup>128</sup>) etc.<sup>129</sup>). *Trismus et tetanus*

- germinantibus quatuor individua tetano correpta sunt. KANLERT in *Österr. med. Jahrb.* 1836. B. 20. II. 4. p. 636.
- 120) Act. nat. cur. Vol. II. obs. 158 (trismus). DE HANN *ret. med.* P. X. C. 4. N. 7 (item). *Observ. clin. in nosoc. Warsow.* Fasc. II. p. 53 (item). CARRON in *journal. général de méd.* 1811. Juin, p. 133.
- 121) BARTHOLINUS *hist. anatom.* cent. III. hist. 24 (ab anguilla comesta). MICHAELIS *med. pract. Biblioth.* 1. B. 2. St. *Anhang.* GAY in *journal. de médecine par CORVISART.* 1812. Sept. (ingesta nimia). BURLINGH SHART §. LXVIII. 4 citand. RICHTER l. c. (trism. et tetan. lathal. ex ingluvie).
- 122) SCHENK obs. L. III. N. 20. HIESTER *Wahrnehmungen.* 1. B. p. 172. N. 372. LAURENT *mémoire clinique sur le tétanus des blessés.* Strasb. an. V. FOURNIER l. c. BELLINGERI l. c. (12 lumbricos in jejunio reperiēbat). B. TRAVERS l. c. EARLE (apud TRAVERS) trismus expulsa taenia sanari vidit.
- 123) TARANGET in *journal. de méd.* T. 87. p. 341.
- 124) MONOT *nomu. bibl. méd.* 1826. Août.
- 125) HENKE in HORN *Archiv f. med. Erfahr.* 2. B. p. 30.
- 126) COLLIN obs. circa morbos acutos at chronicos. P. IV. C. 4. Cas. 6 (trismus).
- 127) ALBERS *Beobachtg. gesamm. auf d. Geb. d. Patholog.* Bonn 1838 (impetigine, qua laborabat puer, quinquies suppressa, semper tetano correptus, qui, quoties ille effloresceret, recessit).
- 128) HIPPOCRATES *Ἐπιδημιων.* VII. AUTENRIETH ad RUSCH *Beschreibung d. gelben Fiebers.* p. 465. HOFFMANN *consult.* cent. I. N. 55 (trismus). Cfr. *journal. de méd. continué,* T. 37. p. 182.

*nus recens natorum a variis causis derivandus. Prima omnium impuritas atmosphaerae. Est enim trismus et tetanus recens natorum morbus inter nationes semi-cultas<sup>129)</sup>, nec non inter inferiores civium ordines<sup>131)</sup> maxime obveniens. Communissimus quondam erat trismus inter infantes judaeos Vilmenses<sup>132)</sup> utriusque sexus, nunc autem, quo tempore incipiunt puritati magis studere ac cubicula ampliora inhabitare, morbus de die in diem rarior evadit. Nullum cum *circumcisionis* opere is nexum agnoscit, cum sine discrimine sexus, et ante octavum diem, quo tantum illa operatio in pusionibus institui solet, obveniat. Caeterum laesiones corpusculi tenerrimi pusionum posse trisimum excitare, illorum docent testimonia, qui ut causas hujus morbi *compressiones capitis sub partu<sup>133)</sup>, frenuli et linguae lacerationem<sup>134)</sup>*,  
et*

129) Ex tumore glandulae inguinalis ROSSCH (*Würtem. med. Corr.-Bl. Jahrg. 3. N. 34*); ex tumore parotidis CLESS (*ib. Jahrg. 5. N. 28*) tetanum exoriri viderunt, et KÖLLER (*med. Ver.-Ztg. 1837. N. 3*) ex plica latente, qua erupta tetanus disparuit.

130) Barbados (HILLARY), Cayannae (BAJON), in Carolina meridionali (CHALMERS) et in Islandia (omnes infantes insulae islandicae *Westmann-Eyer*) trismo (vulgo *Gin-klope*) perire, ita ut incolae non aliter quam per adventus resarciri possint, narrat Sir G. ST. MACKENZIE (*Reise durch die Insel Island im Sommer 1810. Weimar. v. Anhang*).

131) E. c. Galliae meridionalis (BAUMES), in Hispania (ANDREAS). Cfr. SCHNEIDER l. c. p. 718.

132) Sic testatur medicus Vilmensis senex Dr. LINSCHITZ.

133) SCHNEIDER l. c. p. 16. C. G. CARUS *Lehrb. d. Gynäk. Lpz. 1820. B. 2. p. 637*. C. H. T. SCHUMANN l. c. p. 16.

et funiculi umbilicalis laesionem et ligaturam incongruam<sup>134</sup>) et putredinem<sup>135</sup>) incusant. Errant vero causas istas exclusive stabiliendo<sup>137</sup>). Experientia enim multiplici edocti sumus, trisimum recens natorum quoque a refrigerio<sup>136</sup>), e. c. si puerperae curandae gratia, exclusus foetus negligatur, si St. Baptisma in Ecclesia nimis frigidum aut cum aqua gelida fiat<sup>138</sup>), et maxime per balnea

134) „In modum, quo obstetrices nostrates post partum cum proliis procederent, inquirens, mox expertus sum: quod, usu hac in civitate (*Terpesti*) ambiguo, insciae illae mulieres recens nati infantis ori digitum unguibus armatum inferre, et linguae frenulum cum impetu lacerare solent, credentes nimirum quod absque tali auxilio nec ubera sugere nec verba quondam articulate proferre puer valeret.“ RUSS apud J. P. FRANK interpr. clia. l. o. RUSSII opinionem jam PATENA defenderat (l. c.).

135) LA FOSSE avis aux habitans de St. Dominique. BERTRAM in *transact. of Philadelphia*. Vol. I. N. 22. 25. MORAND *vermischte Schriften*. 2 B. RAHN *Magazin*. 3. B. 1. St. COLLES *report of the r. infirmary of Dublin*. Vol. 1. Cfr. autores supra (45) cit.

136) NOTTBECK diss. de tetano recens natorum. Goet. 1793.

137) Hoc sub respectu J. P. FRANK, RUSSII opinionem, et LABETT illam COLLESII omni jure refutant (v. LABETT in *the Edinb. med. and surg. journ.* April 1819. p. 216). Interam veritas in medio latere videtur.

138) Duos infantes deinceps septimo die post partum mater trismo perdidit, quod omnia, quibus illi impositi erant, adversus perflatum aureae stabant. HEIM in *HORN Archiv*. 1809. B. 3 p. 150.

139) MAURICIAU obs. sur la grossesse et l'accouchement. T. 2. obs. 422. BEUZET de l'éducation méd. des enfans. Cfr. J. P. FRANK *System e. vollständ. med. Polizey*. 2 B. p. 215.



nea pusionum, in cubiculis frigidis peracta <sup>140</sup>), ortum ducere. — Forte *Tergestum* aliaeque urbes maritimae ob id trisimum infantilem frequentius exhibent, quod praepriis mutationibus temperaturae, iisque repentinis admodum, subjiuntur <sup>141</sup>). Praeterea nec *fumus* in *tuguriis nigritarum* <sup>142</sup>), nec *meconium* <sup>143</sup>), nec *ira gravidarum* <sup>144</sup>) ex aetiologia trismi recens natorum excludi debent.

## 3. Hy-

PLoucquet *Abhandl. üb. d. die gewaltsam. Todesarten.* 2. Aufl. p. 380. *Delle numerose morti dei bambini, dissert. acad. dal Sr. VERRARDO ZUVIANI.* ROOSE *Deytr. z. öffentl. u. gerichtl. Arzneyk.* 1. St. 1798 p. 1. 20. SCHNEIDER op. c. p. 19. LEDERHAULT diss. cit. WUNDERLICH in *Würtemb. med. Correspond.-Bl.* 1835. B. 4.

140) Hanc meam opinionem Dr. WRÓLEWSKI, carissimus quondam meus auditor, postea medicus Vilmensis laudatus, plurimis observationibus propriis confirmavit.

141) „A solo quidem aëre maritimo trisimum endemicum sub coelo calido prodici minus est probabile (DAZILE l. c.); sed cum a tergo saxoso fere igneo, et a splendente maris unda, solis radii unum quasi in punctum undique circumscriptum concentrentur, *virisque magnae simul vicissitudines conspirent*, nil nobis ad tetanum vel spasmus maxillae in tenerrima nascentis hominis aetate producendum, deesse videtur“ J. P. FRANK l. c. p. 378. Interea quam an. 1824 Tergesti fui, medici nro ore mihi fassi sunt, trisimum longe rariorem factum esse, quo ex tempore urbs amplior condita est et habitationes pauperum meliores.

142) CLARK *on the yellow fever. Append. J.* FURLONG l. c.

143) PHLARGUS *med. Jahrgäng.* 3. B. p. 290. CHALMERS l. c. HILLARY *obs. on the epidem. diarr. of Barbadors.* 1759. RUSH l. c. Hanc sententiam spernit MORRISON l. c.

144) SCHNEIDER l. c. p. 24—28. Hujus argumenta refutat FINKH (l. c. C. 4) minus factis quam verbis.

C. proxima.

3. Hypothesium circa tetani et trismi *causam proximam* curiosi SPRENGELIUM<sup>145)</sup>, STÜTZIUM<sup>146)</sup>, OMBONIUM<sup>147)</sup>, GIANIUM<sup>148)</sup> et HANKEUM<sup>149)</sup> ad-eant. Ni fallimur, ex stimulo systematis nervosi partem unam alteramve continuo irritante, musculi inde dependentes, morbose contracti, voluntatis imperio subtrahuntur, donec vel stimulus ille cesset, vel exhausta, tum sentiendi nervorum, tum sese contrahendi musculorum, facultate, mors ingruat. Stimulus musculorum, morbosam contractionem efficiens, variae plane indolis esse videtur. Si enim ex sectionibus cadaverum et ex consideratione caussarum excitantium judicare licet, accusandae sunt: 1° *res inflammationem*<sup>150)</sup> pul-pae nerveae vel meningum aut saltem *congestion-ones cruentas* circa has partes excitantes, e. c. laesiones externae, corpora peregrina in corpus huma-

145) Op. c. p. 606. §. 524.

146) Op. c.

147) *Storia di tetano ... con alcuni brevi riflessioni sulla causa prossima di questa malattia*. OMOIDEI ann. univ. di med. 1827, fasc. 123. p. 417.148) *Fauna de tetani rheumat. ac traum. nosogenia caussa q. proxima*. Ticin. 1836.

149) L. c. p. 101—103.

150) Ait R. FROTHING (l. c. 1837), *causam tetani proximam esse nervi cujusdam inflammationem localem, qua nervi truncum incitante irritationem univarsalem effici et ad consumptionem vitae usque sustineri. Eadem fere docet FRIEDRICH l. c. p. 478. Quin permultis in casibus res sic se habeat, non dubitandum est. Cfr. A. GUASTALLA neuritis dentalis in Verbind. mit Triam. u. Tann. ex OMOIDEI ann. univ. 1836. Decbr. in SCHMIDT Jahrb. 1840. Supplb. 2. p. 91.*

humanum intrusa, vitia gastrica, vermes, rheuma, arthritis, metastases, plethora; 2° *effectus inflammationum*, ut liquores extravasati, abscessus, ossificationes etc. et 3° *stimuli principium vitae exhaurientes*, e. c. venena vegetabilia, animi pathemata violenta etc., quae singulae noxae eo citius aegrotum praecipitant, quo minus pabulum vitae ab aëre puro cibisque nutrientibus suppletur. Sed properemus ad diagnosin.

## §. LXVIII.

*Diagnosin. Prognosin.*

1. Characteres tetani et trismi ita expressi Difficilis  
confusio. sunt, ut, si *indurationem textus cellulosi, catalepsin* et quandoque *rabie caninam* excipiamus <sup>1)</sup>),

nec

- 1) De hoc argumento plurima in capite de rabie canina (P. IV. Vol. II. Sect. 2); interea sequens observatio sufficiet. Die 3. Augusti 1808 ad pauperrimam feminam finem suburbii, *Zarzecz rowne pole* dictam, inebitentem, enjus infans initio mensis Julii ejusdem anni ex rabie canina cum hydrophobia defunctus erat, eccersitas fuit. Meter nunc trismo, cum sensu constrictionis ad guttur et tensionis ad nucham, non sine opisthotoni ingruentis indicibus, a triduo laborabat. Porrectum quidem potum bibere non poterat, et non abhorrebat. Et aëris afflatum non solum non timebat, sed quaerebat potius. Nec a propria prole, nec ab animali rabido morsa erat. At vero ante duas hebdomedas a contusione vulnus ad crus sinistrum recepit. Post paucos horas obiit. Num ex rabie caecus? num ex simplici trismo, ulceris cruris effectus? Fere ultimes ed-beererem opinioni. Büczka (l. c.) in puero 5 ann. nato et tetano universali correpto, quemvis panem deglutire potuit, equae horrorem observavit. Cfr. de tetani affini-

nec cum ullo alio morbo nec cum *rigore cadaveris* confundi possint. Quis enim *rheumatismum acutum universalem*<sup>1)</sup>, ob id, quod aeger statim i star decumbere cogatur, pro tetano habere possit cum immobilitatis causa hic evidenter in st inflammatorio articulorum et musculorum loci sit? Quisne cum trismo confunderet impedit facultatem maxillam inferiorem diducendi, ex haesione morbosa interioris partis genarum cingivis post inflammationem cavitatis oris, picipue mercurialem<sup>2)</sup>?

Distinctio  
tetani ab  
indur.  
text. cel-  
lulosi.

2. *Induratio textus cellulosi*<sup>3)</sup> differt sequentibus a *recens natorum tetano*<sup>4)</sup>.

*Indu*

tate cum hydrophobia: CAMERR in GRAEFE u. W. Jor 1826. St. 3. A. F. LÜDERS l. c. (naturam hujus affinitat evoluit). HANKE l. c. p. 114. 115.

2) *Einige Bemerkg. üb. d. Tetan. u. Trism., sowie die n d. Tode eingetret. Leichenstarre im Allg.* RUST Mag B. 21. H. 3. p. 475. A. GARTNER SOMMER de signis mtem homin. insolitam aut putredinis accessum indicatibus. Havu. 1833.

3) P. I. ed. alt. Vol. III. S. 2 C. XXX. §. CV. 2. Cfr. B GRAYES Unmöglichk. d. Mund zu öffnen, wegen Rheumatism. d. Schlöfenmusk. (duo casus), ex the Dubl. h. reports and communicat. in med. and surgery. 1827. Vol in GERSON u. JUL. Magaz. 1827. St. 5. p. 379. CAMER Geschichte ein. freiwill., ohne Verwund. entstand, Starr welcher glüchl. geheilt wurde in GRAEFE u. W. Jor 1832. B. 18. H. 3. p. 419 (rheumatismus universal, a esse videtur).

4) *Trismus capistratus* SAUVAGESII. Hujus generis sic di trismus, quem HAZON post salivationem descripsit, f videtur (journ. de méd. T. XIV. p. 219).

*Induratio textus cellulosi.*

1. Rigiditas in cute.
2. Cutis partibus subjacentibus adeo firmiter adhaeret, ut moveri haud possit.

3. Articuli membrorum flecti possunt.

*Tetanus recens natorum.*

1. Rigor in musculis.
2. Cutis super musculos moveri potest.

3. Articuli membrorum flecti non possunt.

3. GALENUS morbum, qui tetani rigiditatem imitatur, sub nomine *catochi* statuit. Teste SAUVAGESIO<sup>7)</sup> differunt hi morbi inter se 1° quod *catochus* chronicus sit et diuturnus, tetanus vero acutus, et 2° quod in *catocho* nulla pectoris vehemens agitatio et respirandi difficultas observetur, quae magna est in tetano. Si vero perpendamus GALENUM dixisse<sup>8)</sup>: „jacebat studiosus quidam veluti lignum rigidus et extensus, oculis apertis immobilibus, obscure audiebat, et aphonus erat“ eo magis suspicio aegrum potius catalepsi quam tetano laborasse oritur, cum ex FRANK<sup>9)</sup> audimus, malum illud periodice recurrere. Praeter periodicum autem recursum, catalepsis a tetano et in eo differt, quod ibi membra ad omnes inflexiones recipiendas conservandasque idonea sunt<sup>10)</sup>, hinc autem plane rigida.

4. Si

5) L. c. C. XXIX.

6) LODEMANN in HUFELAND Journ. 1810. 10. St. p. 57.

7) Class. morb. IV. Ordo II. VIII.

8) Comment. in Proorrh. HIPPOCR.

9) Collect. academ. T. III. p. 456.

10) P. II. ed. alt. Vol. I. Sect. 1. C. XIV. §. LIX.

FRANK Praex. II. 1. 2. 1.

XX

De origi-  
ne tetani  
et triam.

4. Si perpendamus, paria quinti nervoru  
*cerebri* ramum tertium musculis maxillae inf  
rioris prospicere, — laesionesque *capitis* sae  
trismus et tetanum gignere; dubitare haud licet  
hujusmodi morbos *originem encephalicam* qua  
doque agnoscere <sup>11)</sup>. Huc potissimum trism  
recens natorum, trismus tetani nuncius et soci  
spectare videntur <sup>12)</sup>. Enim vero cum paria quin  
nervorum *cerebri* ramus secundus radicem ner  
intercostalis largiatur, propagatio affectionis tet  
nicae a maxilla inferiori per universum corp  
facile intelligitur. — Ex altera vero parte qu  
que elucet, quantum irrationes *plexuum nerv  
rum abdominalium* per vermes, vitia gastric  
herniotomiam, vulnera abdominis et extremitatu  
praecipue inferiorum (nexum tantum cum plexib  
mesentericis et solari alentibus <sup>13)</sup>), ad morbo  
de quibus sermo est, excitandos conferre debet  
Quamobrem et *tetanus trismusque originis abd  
minalis* statuimus <sup>14)</sup>, quin cum CROSSIO hos mo

b

11) Vere est WARNKE (l. c. p. 20): „Tetanus non traum  
ticus per nervorum motum e cerebro exeuntem primit  
excitari potest.; tetani traumatici efficaciter nervor  
cerebrum versus tendens causa est.“

12) Lege de hoc argumento ROMBERG (*neuropathol. St*  
in *Rust Magaz.* 1830. B. 32. H. 2. p. 281), qui ait: „  
*Trismus kann nicht anders, als durch eine Affection d*  
*Quintuswurzeln entstehen.*“

13) C. XII. §. LXII. N. 5.

14) Jure id factum esse recentiores observationes HILDE  
BRANDII (l. c.), FOGGII (l. c.), BURLINCH SMARTHII (*F*  
*v. triamat, Starrkr., der durch die Entleerung gross., rauh*

bos in genere ex affectione ventriculi et illius nervorum derivemus <sup>15)</sup>. Communissima caeterum origo tetani, praesertim opisthotoni et emprosthotoni, *medulla spinalis* est <sup>16)</sup>; quam opinionem et REID <sup>17)</sup> defendit. Neque id mirum, si in memoriam revocemus: quod nervi qui musculis cervicis, dorsi, lumborum, abdominis et extre-

X x 2

mita-

u. eckig. Stücke Thonerde (ab aegra deglutitas) a. d. Darmkanale in d. Scheide entstanden, ex the Amer. Journ. of the med. scs. 1830. Aug. p. 337. in GERSON u. JUL. Magaz. 1831. St. 1. p. 114), H. L. v. ROOSII (erst. med. Jahresber. v. Marienkrankenhaus f. Arme in St. Petereb. v. J. 1836. Petersb. 1837) aliorumque (cfr. §. LXVII. 2 (121)) docent. Illem opinionem defendit quoque HANKE (l. c. p. 113. 114), sed erret eo, quod tetani sedem nonnisi in systematis gangliorum centro esse contendat.

15) L. c. Jam J. HAMILTON (obs. on the utility and administration of purgativ. medic. Edinb. 1806) haec docuit.

16) ROMBERG l. c. („der Tetanus geht ohne Zweifel vom Rückenmarks aus“). LARREY l. citando („entzündliche Affection des Rückenmarks u. der zu ihm gehörenden Nerven ist eine der constantesten Erscheinungen beim Tetanus“). TRAVERS l. c. (semper ex systemate cerebro-spinali oriri). CURLING l. c. p. 82. 86. 101 (Bellii tractus motorii affectionem (irritationem) ut causam tetani accusat). Sic quoque WARNEKE l. c. p. 17 sq. Ait autor p. 19: „Nulla alia pars systematis nervorum tanto jure morbi sedes haberi potest quam tractus motorius, qui tamen non solus omnino per se considerandus est. Nam quum et nervorum systema arctissime cohaereat . . . tetanus sive ex medulla ortum trahere sive per vehementem vulnerationem nervorum longe a medulla positum cerebrum versus provocari potest“).

17) L. c.

mitatum provident, quique maximam in indicatis morbis scenam ludunt, maxime a medulla spinali proficiscuntur<sup>18</sup>). Cum *nervi systematis cutanei* ex eodem fonte pullulent, verisimile est, *indurationem textus cellulosi* (morbum non semper recens natorem<sup>19</sup>), quoque ex affectione medullae spinalis emanare<sup>20</sup>), atque cum tetano originis spinalis maximam alere affinitatem. Differre enim videntur solum in eo, quod in induratione textus cellulosi *nervi systematis cutanei*, in tetano vero *nervi systematis musculorum* patiuntur. Posse vero nervos hujusmodi *separatim* affici, eorum diversa origo ex medulla spinali docet<sup>21</sup>). Postremo exstat tetanus, cui *affectio*

18) Pergit WANNEN (l. c. p. 20): „nihil, quod ad effectum pertinat, interesse, num propius vel remotius a medulla spinali causae dantur occasionales, an ex medulla spinali irritatio causalis moveatur, an denique a partibus remotioribus in medullam spinalem motu reflexo irritatio provocatur.“

19) „Adolescentula Neapolitana an. 1752 cutem colli, dein faciei, demum totius corporis sibi indurari sensit, ita ut corium siccum, vel corticem ligneum firmitate aemularetur, anno aetatis decimo septimo nonnullum erat manstruata, ceterum sana.“ CURZIO *rara e stravagante morbo*. v. SAUVAGES nosol. morb. class. IV. ordo II. VIII. §. Catodina cutanea.

20) Quam olim has inter morbos affinitatem statuimus (*Reise nach Paris, London etc.*), unque dein renunciavimus (P. I. ad. alt. Vol. III. §. 2. C. XXIX. §. Cl. 3), hanc iterum revocamus. Eadem enim causa, quae dum nervos systematis dermoidei afficit, indurationi textus cellulosi ansam porrigit, haec dum nervos systemati musculorum dicatos aggradiatur, tetanum generare videtur.



*affectio singulorum nervorum* ortum praebet, affectio scilicet, quae ex vulneribus, ulceribus systematis dermoidei partiumque subjacentium, nec non ex suppressione operis transpirationis, secretionum habitualium in cute, gignitur. Sicuti enim affectiones medullae spinalis, quae *originem* nervorum systematis dermoidei et musculorum laedunt, tetanum excitare valent, ita etiam affectiones cutis et musculorum, quae *fini* nervorum spinalium infensa sunt. Dubitare etenim hand licet, similem plane nexum inter centrum et peripheriam, quam inter peripheriam et centrum exstare. Caeterum per se patet, tetanum et trismus, ex affectione singulorum nervorum vel abdominis ortum, semper vel ad *encephalicum* vel ad *spinalem* pertinere, cum illorum morborum ortus, quin cerebrum aut medulla spinalis afficiatur, nequidem cogitari possit. Quae singula si colligantur, apparet: tetanum et trismus esse originis, modo *encephalicae*, modo *abdominalis*, modo *spinalis*, modo *nervae*. Quibus speciebus eritne et altera addenda, tetani scilicet, ex vitio, ut dicunt, *dynamico totius systematis nervosi pullulantis*? Quoniam plurimae causarum, quae *partem* systematis nervosi afficiunt, e. gr. plethora, rheuma, inanitio, venena etc., et *totum* afficere possint, neutiquam intelligimus, cur tetani ex affectione *universi* systematis nervosi emergentis existentia neganda foret.

5. Interea tetanus et trismus frequentissime

De indole  
tetani et  
ex trismi.

21) C. XII. §. LX. N. 2.

ex vi parti systematis nervosi illata oritur — *traumaticus* <sup>22)</sup> dicendus. Mirum est, effectum hic causam sero admodum sequi. Constat enim tetanum et trismum post laesiones non illico, sed plerumque vulneribus jam jam sanationem attingentibus ingruere <sup>23)</sup>. Quamobrem a multis potius rerum positiones accidentales (aër nosocomialis <sup>24)</sup>, diaeta stricta, frigus vulneribus deligationis tempore admissum, humorum ex protracta suppuratione, vel ex haemorrhagiis jactura, vis dolorum, timor operationum chirurgicarum et mortis), quam laesiones systematis nervosi accusantur. Nec ipsa *vulnerum sanatio* hic praetervidenda est. Ni enim fallimur, omne, quod diu apertum manserat vulnus, imprimis si abunde suppuraverit, dum repente dein sanetur, suppressae excretionis habitualis culpa nervis injuriam infert. Sic quantum vulneris a canis rabidi morsu excitati diu protracta suppuratio nervis prospiciat, et evolutioni hydrophobiae rabiosae obstet, neminem latet. Praeterea si aeger vulneratus, antea quadam labe e. c. syphilide, arthritide mulctatus fuerit, nonne

ex-

22) De eo lega LE PELLETIER l. c. WENDT l. c. p. 236. PAILLARD lib. d. *Wundstarrkr. u. dessen Ursach.*, n. d. *Klinik des Prof. DUPUYTREN*, ex *journal. hebdom.* 1831. Juill. in BEHRND *allg. Repert.* 1832. N. 1. p. 20. R. FROBER (1837) l. c. A. FRIEDRICH l. c. (casus 252 collegit) et HANKE l. c.

23) Intra 10—14 dies, ait TRAVERS (l. c.) afferens donnullos paucos, multo prius afflicto. FRIEDRICH (l. c.) plurimos die 28. post laesionem tetano affligi asserit.

24) Legi meretur SPRENGEL l. c. p. 605.

expectandum, vulnus characterem simplicem amittere, illum labis latentis induere summasque in cura cautelas exposcere<sup>25)</sup>? Praeter traumaticum et inflammatorium, rheumaticum, arthriticum, gastricum, nerveum et periodicum stabilimus tetanum et trismus. Tetanus et trismus inflammatorius, rheumaticus, arthriticus<sup>26)</sup> saepe nil aliud, nisi effectum inflammationis sive cerebri, sive medullae spinalis, sive nervi<sup>27)</sup>, sive stomachi<sup>28)</sup> sistunt. Docent id febris, dolorum praesentia, necroscopia, aetio-

25) Tetanus syphiliticus RIVIERI obs. 10. v. SAUVAGES nosol. method. morb. class. IV. ord. II. VII. „D. BOLLOU militaris abscissionem brachii ex ictu tormenti bellici vulnereti passus erat, cicatrices obducta convulsiones experiebatur, quibus caput versus partem dextram et mandibulam frequenter agitabat, ita ut lintea continuo intra dentes habere cogeretur. D. AIMAR ex male sanata olim gonorrhoea virus syphiliticum in ejus sanguine latere aiebat, itaque, cum irrita fuissent caetera auxilia, imo iterete amputatio, demum exhibito litu mercurioli et ptyalismo excitato aeger eb illis convulsionibus immunis evasit.“

26) DE HAHN rat. medendi, P. X. C. 4. §. 7. STOLL rat. med. T. IV. p. 76.

27) Cfr. C. I. §. II. 2. C. III. §. XIII. 7. BERGAMASCHI l. c. p. 202 et scripsit p. 230: „che in due circostanze il tetano dee ripetersi dall' azione accresciuta da qualsivoglia causa nel cervello, e nella midolla spinale, cioè o nella diretta infiammazione di questi visceri, o nell' azione tramandata loro da un qualche punto lontano nella macchina umana, come avviene nelle ferite. Nel terzo caso poi non sappiamo riconoscere nel tetano, che una causa meramente nervosa a guisa d'ogni altra neurosi.“

28) BISSAT medical essays.

aetiologia et medendi ratio. *Tetanus et trismus gastricum* pro consensualibus habemus. Nomine *tetani et trismi nervi* illam designamus speciem, quae ex vitio idiopathico universi systematis nervosi constante <sup>29)</sup> pullulat, aut saltem, quae tale vitium socium agnoscit. Patet hinc, *tetanus et trismus traumaticum* quodammodo et ad nerveum spectare. Utrum *tetanus periodicus, febris scilicet intermittens perniciose tetanica* <sup>30)</sup> encephalitidis, rhachialgitidis aut neuritidis effectum sistat, an potius indolis sit gastricae aut nerveae, necdum determinare audemus. Sunt qui *tetanus partialem* <sup>31)</sup> atque *semi-lateralem* <sup>32)</sup> observaverint.

#### 6. Mor-

29) Hystericarum enim transitorius tetanus vel trismus nequaquam huic spectat. v. C. XIV. §. LXXI. N. 3. Inter eos et trismi hysterici chronici, sex scilicet mensium, legimus exemplum fauste terminatum (*Journ. de méd. chir. et pharm.* T. 3. p. 293. 1755. Octobr.).

30) De tetano periodico lege ephem. nat. cur. cent. III et IV. obs. 72. CASIMIR MEDICUS v. periodisch. Krankh. Abth. 1. p. 16. et ejusd. Samml. v. Beobacht. a. d. Aik. B. 1. 2. SCHÜTTE Heilg. ein. intermitt. Trism. in Heidelb. klin. Annal. 1828. B. 4. H. 3. p. 481. SUFFERT in HUBLAND Journ. 1830. St. 3. p. 128 (tetan. sub typo quotidiano). DANCHE in archiv. gén. de méd. 1831. Juin. GIBSON in Jul. Mag. 1851. St. 5. p. 328. ANDRUSZEWSKY in GRAEFES u. W. Journ. 1838. B. 20. H. 2. p. 277. KÖHLERAND trismus intermitt. in CASPER Wochenschr. 1835. N. 26. H. HERGENHANN febris interm. quartana tetanica in Österr. med. Jahrb. 1840. B. 21. p. 234. — De tetano sub forma febris intermittens ex fonte traumatico disserit A. FR. LÖBNER in d. intermittend. Fieber, Hamb. 1831. p. 76.

31) Saltem in dubium vocare non possumus, quin muscu-

6. Morbus tetano et trismo periculosior vix Prognosis. datur. Ait quidem HIPPOCRATES: „qui tetano corripiantur, in quatuor diebus pereunt, si vero hos effugerint, sani fiunt“<sup>32</sup>); atque alibi: „febre accedente solvi solere tetanum“<sup>33</sup>); at vero saepe nimis contrarium docuit experientia. Teste PARRY<sup>34</sup>), si pulsus quinto morbi die, frequentia centum, aut centum decem ictus non excedat, aeger sanabitur, secus neutiquam. Tetani ad quartam hebdomadem protracti ac nihilominus morte terminati, exstant exempla<sup>35</sup>). Aliàs tamen ad plures hebdomades sine noxa protrahabatur<sup>36</sup>). Irrita febre, tetanum lethalem pluries vidi-

lorum flexorem manuum pedumque digitorum retractio, quam, praesentibus DANCÉ, TONNELÉ, GUERSANT et MURDOCH, LOUIS DE LA BERGHE (üb. gewisse kurz dauernde Muskelretractionen, welche besonders die Beuger d. Finger u. Zehen betreffen, ex *journal. hebdom.* 1835, N. 45. 48 et 49, in SCHMIDT *Jahrb.* 1836. B. 10. p. 179) graphice descripsit, ad tetanum referenda sit.

32) *Lond. med. gaz.* 1838. Mai (musculi unius lateris a spinis dorsi ad lineam corporis mediam tetanice affecti erant).

33) *Lib. aphor. Sect. V. aph. 6.* Cfr. CORNUTI ergo tetanus intra quatuor dies letalis.

34) L. c. GUERSANT (l. c. cas. II) de tetano loquitur, febre accedente morbillosa, sanato.

35) *Op. c.*

36) STRASSENHAGEN in *Abhandl. d. Josephin. Acad.* 2. B. p. 418. BERGAMASCHI l. c. p. 206.

37) HORNSTATTEN Dec. V. C. 6. TRAVERS (l. c.) prognosin praecipue ex intervallis liberis inter paroxysmos spasticos desumit: ea, quo liberiora et longiora, eo melius et vice versa.

vidimus<sup>38)</sup>. Verissimum autem est in tetanis e opisthotonis, maxillam resolutam perniciem portendere<sup>39)</sup>. Tetani a terrore orti ac emphysemat mammarum cedentis, cujus et renum apostema<sup>40)</sup> et capitis allisio<sup>41)</sup> auxilia fuerunt, casus narrantur<sup>42)</sup>. Opisthotonum emprosthotono, ob i quod nervi ex medulla spinali emanantes ibi magis comprimuntur, periculosiorem esse, LARRE contendit<sup>43)</sup>. *Tetanus et trismus traumatici* omnium periculosissimi sunt<sup>44)</sup>. Nihilominus gradus periculi minime a plagae praegressae amplitudine et gravitate pendet, sed potius a climate et aëri conditione aliisque rerum positionibus<sup>45)</sup>. *Tetanus inflammatorii et rheumatici* mature riteque curati plurima exstant exempla<sup>46)</sup>. *Recens natorum trismu*

38) Quae lethalitas facile intelligitur, si TRAVERSIO assentimus, febrem, tetanum concomitantem, pura symptomatice et nimia systematis nervorum musculorumque commotione provocatam esse (l. c.). CURLING l. c. p. 41 „the prognosis in acute tetanus must always be unfavorable.“

39) HIPPOCRATES Coacae. 36.

40) LUCY in *journal de méd.* T. LXXI, p. 19.

41) HIPPOCRAT. Epid. V. 42) PENADA *saggio d'osservazioni*.

43) *Mémoires de chirurgie militaire*, Vol. I.

44) B. TRAVERS l. c. p. 292. CURLING (l. c.) ex intervallo valde inter et tetani eruptionem praeterlapso desumi prognosin, dicens (p. 35): „It has been noticed, that the longer the interval before the appearance of symptoms the more chronic is the disease, and the greater the probability of recovery.“

45) HANKE l. c. p. 117.

*trismus* communi consensu letalis<sup>47)</sup>. Letalis et puerperarum trismus<sup>48)</sup>).

## §. LXIX.

## C u r a.

1. Prophylaxis potissimum *tetani* et *trismus*<sup>Prophylaxis.</sup> *traumaticum*, nec non *trismus* et *tetanus recens natorum* respicit. Illis, praecipue in regionibus tetani et trismi in vulneratis evolutioni faventibus, occurrere studemus saltem<sup>1)</sup>, ope atmosphaerae puritatis, temperaturae mediae, victus debiti, lecti commodi et mollis<sup>2)</sup>, cubitus lateralis; praeterea vulnera blande curanda (rejectione scilicet usu praepostero alcoholis camphorati, causticorum etc.), accessum aëris deligatione rara<sup>3)</sup> et prompta praepediendo, nimiam puris abstersionem lavationemque frigidam evitando, verbo processum inflammatorium et suppurationis secundum regulas artis ducendo<sup>4)</sup>, potissimum primas vias a saburris liberas tenendo<sup>5)</sup>, tuncque vires lan-

46) Sic adolescentes, de quibus supra (§. LXVII, N. 2 (106)), morbum eluctabantur.

47) In Islandia creberrime occurrere et trucidare, fertur in *FRONTIER Notiz.* 1834. B. 8. N. 4. Cfr. §. LXVII. 2 (130).

48) Unus exstat casus feliciter curatus: BUCH *Beobacht. üb. d. Kindbettfeb. mit dem Sitze des entzündl. Localleid. in d. Schädelhöhle*, in *gemeins. deutsche Ztschr. f. Gbirtsk.* 1828. B. 3. H. 1.

1) Rite monente DANUS aliquando omnia frustra adhibentur (*annals of med.* Vol. III. N. 2).

2) ARNTANUS *curet. acut.* Lib. I. C. 6.

3) VALENTIN l. c. p. 34.

4) LESSAIVE l. c.

languentes cortice cinchonae sustinendo \*), somnum modica dosi opii \*) ad noctem porrecti conciliando, ac repentinae ulcerum sanationi fonticulo in parte prius laesa, ac si de cura vulneris a cane rabioso inflictis ageretur \*), occurrendo. *Prophylaxis trismi et tetani recens natorum*, ex notione caussarum hos morbos gignentium, nec non ex regimine pusionum generali sponte elucet \*).

C. tetani  
trauma-  
tici.

2. *Cura tetani traumatici multiplex*. Si pars affecta phlogoseos signa exhibeat, ea illico vel *hirudinibus* numerosis circumdanda, vel *scarificanda* \*); *fotuque frigidiusculo* obiter fovenda \*).

Prae-

5) MOSLEY l. c. J. FURLONGE l. c. 6) MOSLEY l. c.

7) FURLONGE, HANCOCK ll. cc. Atropam belladonnam hic commendat SAUTER *Anweis. d. Beinbrüche zu heilen*, v. *Salzb. med. chir. Zeitung*. 1812. p. 195.

8) VALENTIN in *journ. général de méd.* 1811. Janv. et Févr. p. 13. 27. 129.

9) Plura de hoc argumento v. apud F. FURLONGE, J. HANCOCK ll. cc., SCHNEIDER in *gemeins. d. Ztschr. f. Gbtsk. B. 3. H. 3.* et FINKH l. c. C. 8, quibus umbilici cura nimis valet.

10) LARREY l. c.

11) Circa frigoris in tetano applicationem multum pro et contra disceptatum est. Nemo interea illam indicata sub rerum positione hucusque rejecit, imprimis si de *affusione* aut *embroche* ope aquae frigidae agatur. Lege de hoc argumento SCHENK obs. L. I. N. 246, ubi opiniones plurimorum medicorum ad trutinam vocantur, porro TH. COCHRANE obs. on the use of cold bathing in tetan., in *med. comm. Vol. 3. Edinb.* 1775. WRIGHT *med. obs. and inquiries. Vol. VI. N. 13.* ROSE *transact. of Philadelphia. Vol. II.* MOSLEY op. c. CURRIE *mem. of the med. soc. of London.*



Praeterea quo magis aetas, corporis et annua constitutio diathesi inflammatoriae favet, quoque certiora illius adsunt signa, eo securius universum regimen antiphlogisticum in usum deducitur<sup>12)</sup>. Quod si membrum aliquod ita destructum sit, ut illius instauratio nequiquam, aut saltem haud cito expectari possit, illud, si alioquin fieri potest, sine temporis jactura extirpandum<sup>13)</sup>. Si nervi,

mu-

*Vol. III. p. 147. GALLMAN transect. of Philadelphia. Vol. I. P. I. N. 21. DE LA VERGNE journ. de méd. T. 90. p. 168. ARNOLDI in med. and surg. journ. of Edinb. Vol. 4. 1808. Cfr. med. transact. 1813. N. 13. MAGLIN sur l'usage des bains dans le tétanos. Par. et Straßb. 1822. F. O. DOUCET Beobacht. des Wundstarrkr. u. Heil. desselb. durch kalte Douchebäd. ex transect. méd. 1832. in FRONIER Notiz. 1833. B. 36. N. 20. p. 315. CURLING l. c. p. 184—188 (valde laudat dicens: „With the exception of tobacco, I know of no remedy so well adapted to produce an impression on the nervous system, of power adequate to control the severe epaeme of this disease, as cold affusion“).*

12) Vide infra. N. 3.

13) Tetanum incipientem ex vulnere, contusione extremitatis, his fugavit per amputationem istius illico susceptam cl. LARREY, cum copiae Galliae Vindobonam occuparent anno 1809. Scheda J. P. FRANK. Plures casus felices v. apud LARREY l. c. et ejusd. chir. Klin., eine Samml. v. Erfahr. in d. Feldzög. u. Militairhosp. v. 1792—1822. A. d. Fr. v. J. ANELUNG. Lpz. 1831. B. 1. p. 39. FLUNK Samml. v. Beobacht. 2. B. N. 6. VALENTIN l. c. p. 28. HOWSHIP in med. and phye. journ. 1809. Aug. CARRON in journ. génér. de méd. T. 20. p. 363. Allg. Liter. Zeitung. Halle 1815. N. 7 (tetanus ex laesione digiti ortus solum per amputationem sanari potuerat). WAYTE in the Edinb. med. and c. j. 1821. Vol. 17. p. 394 (tetan. traum. amputatione

musculi<sup>14)</sup>, tendines<sup>15)</sup> pro parte dissecti morbu excitaverint, sectio transversa profunda supra vnu, ut in totum illae partes resecantur, instuenda<sup>16)</sup>. Absentibus in vulnere signis phlogosae indicataque ibi processus inflammatorii instaurtione, applicatio topica remediorum irritantiur ut balsami peruviani<sup>17)</sup>, olei terebinthinae<sup>18)</sup>, v  
sici

manus, ambustae calce viva, sanatus). *The Lond. m. r.* 1822. *Juny* (amputato digito laeso tetanus desii). SCHÜR in *Heidelb. klin. Annal.* 1828. *B.* 4. *H.* 3. p. 481 (polli amputatione trismus fugatus). Praeterea CURLING (*L. Tab. N.* 14. 23. 55. 99 et 119) quinque casus enumerat, quibus amputatio cum successu suscepta est, aut sim medicamina interna adhibita sunt. Sed alii, at inter h A. COOPER et TRAVERS (*surgic. essays. P.* 2. p. 174 GRISTANE (*the Edinb. m. and s. j. Vol.* 11. p. 419 B. BRODIE (*med. gaz. Vol.* 2. p. 346) et H. L. HARRIS (*pract. remarks on amputat. etc. in FROBIEP Notiz.* 181 *B.* 40. *N.* 6) utilitatem amputationis in dubium vocat casus infelices afferentes. — Excindendo particulam vi KREUZWEISER (*L. c.*) trismum extemplo fugavit.

14) SCHNUCKER *Beobachtungen.* 1. *B.* *N.* 31.

15) DE LA ROCHE  *Journ. de méd.* T. 40. p. 213.

16) Si haec sententia (§. LXVII. 3 (150) allata) naturae i convenit, pergit FROBIEP, ut savandi scopus attingati pars nervi inflammata a trunco sano separari debeat, qu at amputatione totius membri affecti (13), at nervi p scissione fieri potest. Itaque HICKS (apud CURLING *L.* p. 133), LARREY (*L. c.*), J. MURRAY (*L. c.*) hanc oper tionem tentarunt, partimque malum sanaverunt, part levamen attulerunt. Cfr. H. S. MICHAELIS in GERSON *JUL. Magaz.* 1833. *B.* 20. *St.* 2. p. 333. FRIEDRICH *L.* p. 482 (commendat nervi sectionem).

17) ROLLOCK in *Philadelph. med. and chir. Journ.* Vol. (jungit usum internum ejusdem balsami).

*sicatorii* <sup>19)</sup>, *tincturae cantharidum* <sup>20)</sup>, non timenda <sup>21)</sup>. Generatim tamen morbosae sensibilitatis ratio habenda est, et blandissime incedendum. *Emollientia* <sup>22)</sup>, usus topicus *olei* <sup>23)</sup> cum *opio* <sup>24)</sup>, de cuius usu interno plurima infra <sup>25)</sup>, inprimis sese commendarunt. Item remedia quae *latenti saepe complicationi gastricae* prospiciunt <sup>26)</sup> et inter haec maxime radix *convolvuli jalappae* <sup>27)</sup>. Viribus decrescentibus *arnica*, *moschus*, *vinum*, *cinchona* aliaque mox enumeranda <sup>28)</sup> pharmaca indicantur.

## 3. Dum

- 18) RUSH in *mem. of the med. soc. of London*, Vol. I, N. 3. et *medical inquiries*, N. 14. 15. GAERTNER in GRAEFER u. W. Journ. 1823. B. 4. St. 3 (optato cum successu ol. terebinth. fervens in vulnus artus amputati et tetanici fudit). HANKE l. c. p. 125.
- 19) LARREY l. c. (s. c. in truncum amputatum).
- 20) PIDERIT *prakt. Annalen*, 1. St. p. 65. HANKE l. c. p. 125.
- 21) VALENTIN l. c. p. 24. 22) Idem l. c.
- 23) PAULUS AEGINETA L. III. C. 20. PETIT *essai sur la médecine du coeur*, N. 4. ODIER *manuel de méd. pratique*, p. 189. MÉGLIN l. c. PRYER *Heil, ein. Tetan. mit Einreibg. mit warm. Mandelöle*, in SIBOLD Journ. 1828. B. 8. p. 847. COMLOSSY l. c. SPORRR l. c. HAUFF l. c.
- 24) WINDSLOW in *collect. soc. med. Havn.* Vol. I, N. 35. BONTFLOWER in KÜHN *phys. med. journ.* 1802. p. 368. M. WARD *facts, establish. the efficacy of opium frictions ... tetanus*. Manch. 1809. FLOUQUET *diss. hist. tetani traumatici, largo opii usu sanati*. Tüb. 1810. POMMER l. c.
- 25) N. 6.
- 26) HILDENBRANDT, POGGI II. cc. HANKE l. c. p. 117 („die ausleerende, ableitende Methode ist die beste u. sicherste“).
- 27) WENDT l. c. 28) N. 6.

C. tetani  
inflammationis.

3. Dum legimus arteriotomiam<sup>29)</sup>, phlebotomiam<sup>30)</sup>, hirudines<sup>31)</sup>, cucurbitulas cruentas<sup>32)</sup>, scarificationes<sup>33)</sup>, affusionem frigidam<sup>34)</sup>, verbo methodum antiphlogisticam<sup>35)</sup>, morbos, de quibus quae-

29) VOGL diss. de febr. intermitt. metastasibus. Goett. 1778. app. p. 2.

30) CARLIUS AURELIANUS. p. 210. PAULUS AEG. L. III. C. 20. FORESTUS. L. X. 66. 116. GARDANE *gazette de santé*. CROSS l. c. GANCIA in *repert. med. chir. di Torino* 1825. *Lugl.* (e vena jugulari). *Journ. univers. des sc. méd.* T. 39. cah. 113. 1825. Mai. p. 240 sq. LISFRANC ex *journ. gén. des hôp.* N. 56. in *FRONIEP Notiz.* 1829. B. 24. N. 9.

31) *MEDICUS Briefe.* CONNELL *journ. de méd.* T. XX. p. 335. LISFRANC l. c.

32) CELSUS L. IV. C. 3. ASCLEPIADES apud CARL. AURELIANUM. p. 216. PAULUS ARGENTATA l. c. A. L. RICHTER (1835) l. c.

33) *Allgem. deutsche Biblioth.* 8. B. p. 19.

34) F. O. DOUCET ex n. *bibl. méd.* 1828. 3. in HACKER *lit. Annal.* 1829. Mürx (tres casus trismi traumat. magus utilitate curati); idem *kalte Douche gegen traumat. Tetan.* ex *transact. médic. Par.* 1832. *Nouv.* in KALISCH *med. Ztg. des Ausland.* 1833. N. 25. idem *Fälle v. Wundstarrkr., die durch kalte Begießung. geheilt wurden.* ex *gaz. des hôpit.* 1833. B. 7. N. 4. in GIBSON u. *Jal. Mag.* 1834. St. 1. p. 125. MURRAY l. c. Cfr. supra 2 (11).

35) Favent quummaxime methodo antiphlogisticae DICKSON obs. on tetanus. v. *medico-chir. transact.* Vol. VII. P. 2. Lond. 1816. BERGAMASCHI, FLUCCILLA, SPERANZA II. oc. CARRON in *compte rendu des trav. de la soc. de méd. de Lyon.* 1826. ONOIDEI *ann. univ. di méd.* 1831. Febr. p. 241. MARTINET l. c. R. FRONIEP l. c. (1837). FREUDRACH l. c. p. 484. CARRON l. c. EARLE in n. *Samml. auserl. Abh. f. pr. A.* B. 24. St. 1. HANKS l. c. p. 119.

quaestio est, sanasae, medendi istam rationem, speciatim in *tetano, et trismo inflammatorio*, eo minus commendare haesitamus, quo magis aderant signa vel reconditae encephalitidis, vel rhachialgitidis, vel neuritidis.

4. Quae antiphlogistica methodus etiam *te-* C. tetani  
*tano et trismo rheumatico* in primo morbi limine <sup>rheuma-</sup> tici.  
accommodata est <sup>36</sup>). Serius transpirationi <sup>37</sup>),  
*fotus calidi* <sup>38</sup>) et *balneorum tepidorum* <sup>39</sup>) ope  
stu-

36) Venaesectionibus largis Dr. MEYER adolescentas, de quibus supra (§. LXVII, 2 (106)) quaestio fuit, sanitati restituit. Peractam vix phlebotomiam convulsiones horrendae sequabantur.

37) Diaphoretica commendata sunt in tetano a PISONI de med. Brasil. L. II. HONCHSTETTER obs. Dec. V. cas. 5. BLANE Beobacht. üb. d. Krankh. d. Seeleute. p. 374. RAMBL in Journ. de méd. T. LXXXV. p. 417 etc. in trismo a CHEVALIER lettre sur les maladies de St. Domingue. BERGAMASCHI l. c. p. 229 („Egli è certo, che mercè tali esercizi, riducesi alla cute una liue traspirazione, che dissipa ogni cosa“). FLEININGER l. c.

38) HIPPOCRATES περί τῶν ἐν τῷ παθῶν. p. 561. COLLIN de morb. acut. et chron. P. IV. C. 4. cas. 6. VALENTIN l. c. (ad serotum).

39) MAROARD v. Büdern. p. 224. CHALMER l. c. DU BOREIX in Journ. de méd. T. XLII. p. 215. ST. HERAN D'AMBON ibid. T. XII. p. 241. HUFELAND Bemerk. üb. d. Blattern. p. 373. MACKIN in med. Comment. v. Edinb. II. Dec. 10. B. p. 77. BODIN recueil périod. etc. T. V. p. 295. HOHN Archiv f. med. Erfahr. 1810. Jan. p. 177. TH. CHRISTIN in Edinb. m. and a. j. 1812. Vol. 8. GÖBEL l. c. cas. III. GUERSENT l. c. cas. I. DAWOSKY Tetan. u. Triem. durch Camillenbad geheilt, in n. Ztschr. f. Gebirck. B. 7. H. 3. Frank Prax. II. I. 2. 4.

studendum<sup>42</sup>). Praeterea prope morbi fomitem<sup>43</sup> encephalum inprimis, aut spinam, *vesicatoria*<sup>44</sup> *sinapismi*<sup>45</sup>, *ignis*<sup>46</sup> aliaque *caustica*<sup>47</sup> apponenda.

Balnea quidem calida, ut remedium universale teturae reprobatur a MÉGLIN. *N.* 2 (11) cit.

- 40) Et balnea vaporis commendata sunt: H. MARS ex *Dublin hosp. reports* 1827. *Vol.* 4, p. 567. in GERSOI JUL. *Magaz.* 1828. *St.* 1. p. 208. MICHAELIS NOBISSEN, GRAEFFE u. W. *Journ.* 1829. *B.* 12. *H. S.* p. 504 (duo te sanati, trismus decrescens). G. VERNIER l. c. (tati idiopathico medicatus est). SCHAEFFER *das russi Dampfbad geg. Trismus rec. nator.* in *med. Ver.* 1836. *N.* 9 (infans extemplo ex orci faucibus ereptus). CRAMER *Nutz. d. Dampfbad. b. ein. Tetan. rheum.* CASPER *Wochenschr.* 1837. *N.* 21.

- 41) GARATNER (l. c.) pedis digitum tetano affectum incidit, quo facto liquor, ammon. caust. infundebat leui successu. — Acupunctura malum sublevarunt: FINCH the *Lond. med. repos.* 1823. *Nouv.*, PIPELET in *je complém. du dictionn. des sc. méd.* 1823. *Avant*, LOCHER

- 42) CARTEN in *med. transact.* T. 12. *N.* 4. ALIX obi chir. *Fasc.* IV (ad nucham posito, trismus sublatus). B DIX in *med. Comment.* v. *Edinb.* 13. *B.* p. 325 (capiti positum trismus sanans). RUSH in *mem. of the soc Lond.* *Vol.* I. *N.* 3 (inter scapulas in tetano). GUINE in *journ. de méd.* T. XXV. p. 509 (in tetano ad su VALENTIN *sur le tétanus.* *Vol.* I. p. 143 (in trismo maxillas). SCHNEIDER in SCHMIDT *Jahrb.* 1835. *B.* 7. p. (opisthotonum vesicator. cervici applicato fugavit).

- 43) CELSUS L. IV. C. 3 (cervici in tetano). HUNTER obs the *diseases of the Army in Jamaica.* RUSH in *mém Vol.* I. *N.* 3.

- 44) CELSUS L. IV. C. 3 (cervici in tetano). ALBUCASIS P. I. C. 7. VALENTIN l. c. POCHON v. SEDILLOT *je de méd.* 1812. *Janv.* p. 107. et BERRA *giorn. di med.* ;

canda, non neglectis *unctionibus* \*). Maxima spes in *mercurio*, cum aegri raro deglutire possint, sub forma *frictionum* adhibito, locatur \*), quam spem propria experientia sustinere nequimus \*).

## Y y 2

## 5. Te-

Fol. 2 (per approximationem non immediatam ad spinam. Ferrum etiam non candens a fossa axillari usque ad epices digitorum, secundum nervorum cursum deductum, tantum (verisimiliter hystericæ tantummodo symptoma) fugasse, narratur a PFAFF in MECKEL *Deutsch. Archiv f. Physiol.* 1817. 2. *Heft*). Moxa a BLANKENSTEIN (l. c. cas. II) ipso in tetano traumatico optato cum successu applicata est ad vertebrae lumbales. CLARUS apud K. O. OTTO l. c. A. L. RICHTER (1835) l. c. (ferrum candens). RUFF l. c. p. 294 (ferr. cand.).

45) In ipso tetano traumatico cum successu applicata falsae ad vertebrae lagitur: LEWIS in *the Americ. record. of origin. pap. and intelligenc. in med. and surgery. Philad.* 1820. Vol. 3. N. 2. D. M. RENCH *Heil. ein. Tet. traum. durch Anwend. des Kali caust. auf d. Rückenwird. ex Land. m. reposit.* 1826. June, in HORN *Archiv.* 1826. St. 3. p. 545. GERNARD *Aetkali auf die Rückgratgegend eingerieb. geg. Tetan.* in FROBIEP *Notiz.* 1832. B. 34. N. 17. CANNES l. c. RENAULT in n. *Samml. auserl. Abh. f. pr. Ä. B.* 24. St. 1. PETIT in *gaz. méd. de Par.* 1836. *Déc.* (ol. Tarabinth. c. Liq. Amm. caust. ad spinam applicitum).

46) ARISTARUS *chelat. acut.* L. I. C. 6. AVICENNA l. c. C. 10. BENIVERNUS de *abditis morborum causis.* C. 103 (capitis).

47) De usu mercurii in tetano at trismo legantur D. MONRO on the use of mercury in tetan, in *phys. and liter. essays.* Vol. 3. *Edinb.* 1771. RUSH in *mem. of the soc. of Lond. L. I. N.* 3 (innectio colli). TROCT in *med. and phys. journ. N. XCVII.* p. 211. v. *Abh. f. pr. Ärste.* 24. B. p. 450. RENAULT in *journ. de méd. continué. Vol. XI.* p. 266 (dulcis). *Abh. f. pr. Ärste* l. c. p. 232. DE LA ROCHE *journ. de méd. T. XL.* p. 213. *Abh. f. pr. Ärste.*

C. tetani  
gastrici.

5. *Tetani et trismi gastrici cura in clystibus*<sup>49</sup>), *emeticis*<sup>50</sup>), *purgantibus*<sup>51</sup>), et *antimithicis*<sup>52</sup>) (*calomel*<sup>53</sup>) *præ aliis*) consi

Que

2. B. 3. St. p. 133. BLANE l. c. p. 366. RAMEL l. c. A. in RIVERII obs. commun. N. 10. DU BRUX L. c. Yc in *Philadelph. med. and phys. journ. P. I. Vol. I.* 1 v. HARRIS *neues Journ. d. ausl. med. chir. Lit.* 10 2. St. p. 159. VALENTIN l. c. p. 137. BONAFIX in *répériod. T. XII.* p. 390. WELL in *trans. of a soc. for improvement of med. and chirurg. knowledge. Vol. 3. B* RUPPIUS in *RUST Magaz.* 1822. B. 12 (calom. c. di purp.). PH. F. WEISS l. c. WENDT l. c. *The Philad journ. of the med. and phys. sc.* 1825. Vol. I. N. 2. (calomelano et opio). *Glückl. Heil. ein. Tetan.* (cal lano et op.) in *FRONIER Notiz.* 1828. B. 19. N. 22. BERNDT l. c. (c. opio). Cfr. CURLING l. c. p. 140 sq
- 45) G. PIDONE *sui cattivi effetti del mercurio nelle, m nervose a particolarmente nel tetano. Palermo* 1833.
- 49) ARETAEUS curat. scut. L. I. C. 6. ELLIS in *med. ment. v. Edinb. II. Dec. 7. B.* p. 126 (ex tartaro eme
- 50) PRAXAGORAS apud CAELIUM AURELIANUM. p. 214. SCH in n. *Samml. auserles. Abh. f. pr. Ä.* 1828. B. 11. p. MÜNZENHALER l. c.
- 51) FORESTUS L. X. obs. III. BELLOT in *journ. de méd. sinué. Vol. 2.* p. 425. H. BRIGGS *hist. of a case of eur. by purgatives*, in *Edinb. m. and s. journ. Vol. 5.* HAMILTON obs. on the utility of purgative medicine. p v. *Abh. f. pr. Ärzte.* 24. B. p. 523. W. W. MANIFOL the *Edinb. m. and s. j.* 1825. N. 88. p. 277 (praeprism eroton, utitur). W. BRIGGS ib. 1826. Jan. W. HILDENBRANDT, POGGI, MÜNZENHALER II. c.
- 52) LAURENT *mémoire clinique sur le tétanos chez les bl* BERGAMASCHI l. c. p. 227. HASBACH in *FRIEDRICH gaz.* 1832.
- 53) DICKSON *repository.* 1814. Febr. BERGAMASCHI l. c.



Quodsi aeger os plane aperire haud posset, via pro pharmacis per nares aut per foramen dentem unum inter et alium fortuito obvium, invenienda foret. Verum neutiquam sufficit, ut pharmaca ori intrudantur, cum etiam *eorum deglutitio* requiratur; quæ si ob statum tetanicum musculorum pharyngis et oesophagi impedita sit, aeger, ut vidimus, suffocationis incurrit periculum. Quare optandum est, ut methodus per infusionem successum habeat<sup>54)</sup>.

6. *Cura tetani et trismi nervi* et quodammodo *traumatici*<sup>55)</sup> indicationes amplectitur 1° <sup>C. tetani nervi.</sup> stimulum systema nervosum intendentem, infrangendi, 2° systema nervosum ad actionem hujusmet stimuli percipiendam minus idoneum reddendi, 3° sensibilitatem exhaustam instaurandi et 4° vires languentes excitandi. Si stimulus, systema nervosum intendens, affectionem inflammatoriam indu-

- 54) H. D. JONAS diss. de chirurgia infusoria. Berol. 1825.  
C. W. COINDET in GIBSON u. JUL. Magaz. B. 6. p. 467  
(By. Op. 3j. Aq. 3j. filtr. 3jß. in venam basilicam injectit.  
Quinque injectionibus malum tetanoides sanatum fuit).  
PERCY et LAURENT in PAUL SCHUKL d. *Transfus. des Bluttes* u. *die Einspritzung d. Araneien in die Adern* etc. fortgesetzt v. J. J. DIEFFENBACH. Berl. 1828. Th. 3 (Extr. op. gr. XXIV. Aq. dest. 3ß. Fluidum guttatim in venam intrare debet) et ex *journ. des progrès des sc.* etc. 1830. T. 3. in BERNARD *allgem. Repert.* 1831, B. 5. H. 1. p. 154 (operatio bis reiterate mitigavit malum, sed non sanavit). — Solutio tartari stibii in venam medianam injecta, mortem attulit. H. KÖHLER in *Rust Magaz.* 1836. B. 46. H. 2.  
55) Vide N. 2.

induxerit; methodus *antiphlogistica*, ut docemus \*\*), indicatur. Absentibus indiciis inflammatoriis, et praesertim rheumaticis, *affusio aquae frigidae* nec non *balnea frigida* \*) locum habent quae auxilia praesertim in climatibus calidis cellunt. Systematis nervosi facultas stimuli morbo actionem percipiendi *opio* aut ejusdem compositionibus \*\*) imminuitur. Pharmacum istum quamvis saepe saepius votis neutiquam respondeat \*\*), cum efficaciora auxilia adhuc desiderantur, praecipue si tetanus et trismus nervus traumaticus sine febre obveniat, sacram constituit

56) Vide N. 2.

57) N

58) *Morphium aceticum* endermice applicatum: LEMBERT *la méthode enderm. Par.* 1827. FROBERG *Notiz.* 1828. B. N. 1. Ex Lond. m. repository 1828. Decbr. in HORN *A* 1829. H. 2 (duae sanationes). G. CEROLI ex OMORI *ann. univ. di med.* 1829. Maggio, in FROBERG *Notiz.* II B. 25. N. 7. p. 103 (remedium interne porrectum malum non tangebatur; at, endermice nuchae applicatum, fugam fecit; auctor, remedium nervorum functiones, proci-phlogistico turbatas, in ordinem redigere, hunc vero processum antea removendum esse). ROMBERG *Aphonia Triem. nach Convulsion. durch Morph. acet. enderm. geh.* in CASPER *Wochenschr.* 1833. N. 50. A. L. RICHTER (II l. c. A. ANDERSEN *diss. de meth. enderm.* Hafn. II HANKS l. c. p. 123 (morph. muriat.). SCHMIDTMAHN *glückl. Anwendg. des essigsaur. Morph. geg. Starrkr.* in HUFELD *Journ.* 1840. St. 1.

59) RUSH in *trans. of the soc. of Philadelph.* Vol. 2. N. REMINGER *diss. obs. med. et chir.* Goett. 1789. DE ROCHE in *journal. de méd.* T. XV. p. 313. Et ego plene sine effectu adhibui.

anchoram<sup>60</sup>). Ad conspicuas autem ut adhibeatur doses, opus est<sup>61</sup>). *Opium cum affusione frigida*

con-

60) De opii efficacia recentes de tetano scriptores PARRY (op. c.), TAUNTON (*the Lond. med. and phys. journ.* 1817), E. MAGNIN (l. c. tetan. traum. larga opii usu sanavit), STOLL (in GRAEFE u. W. *Journ.* 1823. B. 4. St. 2 tetano traumat. cum miliaribus opio et calomelano medicatus est), BLAISE (*journ. méd. de la Gironde. Bord.* 1824. I. ann.), BEGIN (*rec. de mém. de méd., chir. et pharm. militaires. Par.* 1824. T. 13), MARTINI (*Rust Magaz.* 1824. B. 16). TALENDER (n. *Samml. auserl. Abh. f. pr. A.* 1825. B. 8. St. 4). P. C. GIBSON (*the Edinb. m. and e. j.* 1826 Octbr.), E. LEAN l. c. BAUNSACH l. c. (laudanum). POMMER l. c. DÖLLINGER in HUFELAND *Journ.* 1833. St. 2. HUSS Tetan. idiopath. ex *Tidskrift för Läkare* 1837. B. 5. in SCHMIDT *Jahrb.* 1839. B. 22. p. 97 testantur.

61) Nihilominus caute tamen exempla WHITE (*med. obs. and inquiries. Vol. 2. N. 34*) et VALENTIN (l. c. p. 36) imitanda esse censeo, quorum scilicet ille, opium spatio quinque hebdomadarum ad grana 317 et hic, spatio septendecim dierum ad grana 1005, praescripsit. Causa memorabilis tetani a HULLIO asstratur (*the Edinb. med. and surg. journ.* 1819. April), ubi aeger per errorem spatio unius noctis tincturae opii uncias duae, usui externo dictae, intus sumsit, atque convaluit. Multo magis audacter et plus quam per est larga opium dederunt GLOSTER a *cure of tetanos and lock jaw cur. by amazing quantities of opium*, in *Edinb. med. and philos. comment.* 1775. Vol. 1. p. 72. MOSLEY in *med. transact. of Calcut.* 1829. T. 4. Cfr. FROBER *Notiz.* B. 31. N. 5. DORSEY ex *the Amer. j. of the med. sc.* 1836. N. 36. in DIERFFENBACH *Ztschr.* 1837. B. 5. H. 2. p. 262. et BLAISE in *med. gaz.* Vol. 17. p. 70. De his insanis dosibus CURLING (l. c. p. 154) iudicat: „the opium therefore unacted upon by the gastric juice, the muscular fibres of the stomach being very

connubium suadet CURRIE \*<sup>2</sup>). Peculiari vero tentione methodus autore STÜTZ \*<sup>3</sup>), opium al natim cum potassa \*<sup>4</sup>) adhibendi, digna videtur \*<sup>5</sup>). Eam methodum (a paucis confirmatam

*probably, at the same time paralysed, remains in organ inert and useless.*" HANKE (l. c. p. 123) op. g seu morphii muriat. gr. jij propinavit et dolein augeba  
62) L. c. 63) I

64) Alkali in convulsionibus edhibuerunt jam MICHAEL HUFELAND Journ. 3. B. et WIEDEMANN ibid. 6. B. 2 CASTELLA (drei Fälle geheilt. Wundstarrkrampfes durch Verbind. des Op. mit kohleneurem Natrum, in FOM schweiz. Ztschr. 1836. B. 2. H. 2) kali carbonico nat carbonicum, et HANKE (l. c. p. 125) ammonium cerbi cum praeferunt.

65) Innititur haec methodus experimentis HUMBOLDTI (l ed. alt. Vol. I. S. 1. C. 1. §. VI. 23), quatenus demonstrant, potassam irritabilitatem fibrae muscularis jam semi-extinctam refocillare, forteque instaurare, atque novos stimulos recipiendos idoneam reddere. Solvit STÜTZ subcarbonatis potassae drechmam unam in un septendecim aquae destillatae, etque in uncias totidem grana octo. Liquide haec ita adhibet, ut solutionis a liniae dosi ingestae illico liquidum opietum portionem subj gat. Praeterea balnea tepida alcalina (Lixivii caustici unctia una ad uncias sex pro balneo) in usum ducit.

66) BREHREND in LODER Journ. f. d. Chir. 4. B. 2. St. p.: BREHMANN nouv. méthode de traiter le tétanos qui surv aux plaies, Mayence. an. IX. v. Salz. med. chir. Zeits 5. Ergänzungsband, p. 45. ELSE in Salz. med. chir. 2 1807. p. 18. SCHÜTZ v. BARTH. SIEBOLD Samml. selt ausserles. chir. Beobacht. 3. B. 1812. N. 2. RUPPIUS in R Magaz. 1822. B. 12. TSCHERNKY Wundstarrkr. durch Stütz, Methode geheilt, in HUFELAND Journ. 1827. St. FRITZ l. c. REES in Badische Annal. f. d. gesam

a multis vituperatam<sup>67)</sup>) adhibendi opportunitas nobis non fuit concessa. Quodsi ab ulteriori ea non confirmaretur experientia, salus tandem in pharmacis vires languentes excitantibus quaerenda foret. Celebratissima hic auxilia sunt: *aether sulphuricus*, *moschus*, *vinum* et *cinchona*. *Aether* ab experientia comprobatus<sup>68)</sup>), etiamsi aeger eum deglutire nequeat, attamen cum illico evaporetur, suffocationis periculum non producit. Conspicuae illius requiruntur doses<sup>69)</sup>. *Moschus*, famae hic laesae pharmacum<sup>70)</sup>), vel per se<sup>71)</sup>), vel opio junctus<sup>72)</sup>) praescribitur. *Vini* efficacia in tetano

et

Heilk. Carler. 1832. B. 4. St. 1. HORNUNG in Österr. med. Jahrb. 1835. B. 17. p. 574. HELER l. c. L. WAGNER in Österr. med. Jahrb. 1837. B. 21. II. 2. p. 334.

67) MARCUS Magaz. f. Therapie u. Klinik. 1. B. 1. Heft. p. 26. MURSIMA Journ. f. d. Chirurgie. 1. B. 1. St. p. 124. MÖGLIN, WENDT II. cc. etc. HANKE (l. c. p. 140) tandem de ea existimat: „Aus der grossen Anzahl der Beobachtungen hochverdienter Ärzte u. aus der geringen Zahl meiner eigenen Beobachtungen geht hervor, dass beim Gebrauche der Stüts'chen Methode die Kranken selten den 3. Tag überleben.“

68) PLINAIRE in Journ. de méd. continué. Vol. XI. p. 421. GAY in Journ. de méd. p. CORVISART. 1812. Sept. p. 54. P. C. GIBSON l. c.

69) Uncia una alterave de die.

70) FARR med. Bemerk. u. Untersuchungen. 1. B. p. 46. CLAPHAM ibid. 1. B. p. 76.

71) NOV. act. nat. cur. Vol. III. obs. 74. Vol. V. obs. 40. HILLARY p. 274. ACKERMANN l. c. p. 47. HUCK in med. obs. and inquiries. Vol. III. N. 31. ROBERT. v. Abh. f. pr. Ärzte. 9. B. p. 877. HANKE l. c. p. 124.

et trismo apyrectico, magna virium jactura stipato, aut dum aeger reliqua pharmaca respuit, a remotissimis temporibus<sup>72)</sup> ad nostrum usque aevum celebratur<sup>74)</sup>. *Cinchona* in tetano periodico specificè agens<sup>75)</sup>, in reliquis hujus morbi speciebus ut tonicum usurpatur<sup>76)</sup>. Ut tonica<sup>77)</sup>, excitantia, nervina, farrago auxiliorum auctoritate plus minus fide digna commendatur, inter quae meminisse sufficiet *carbonatem ferri*<sup>78)</sup>, *campho-*

72) CHAFF in *journ. gén. de méd.* T. XXIV. p. 290. Methodus patris mei. R $\bar{y}$ . Moschi grane tria. Opii granum unum. Sacchari grane quatuor. M. Cap. omni hora pulverem unum.

73) HIPPOCRATES περί τῶν ἐν τῷ παθῶν. p. 561.

74) RUSH in *trans. of Philadelphia.* Vol. I. P. I. N. 3. CURRIE *mem. of the med. soc. of Lond.* Vol. III (narrat de viro, tetano traumatico afflicto: „In less than a month, he drank, mixed with nourishment, 140 bottles of Madeira wine, finishing four or five in the twenty four hours, besides ale and brandy, two gallons of strong broth, and about two drachms and a half of laudanum.“ Post haec aeger quidem a tetano deliberatum se vidit; nihilominus ejus vestigiis non ingrediamur) et HAESAK in *medical repository.* Vol. III. N. 1. Art. 4. v. *Abh. f. pr. Ärzte.* 20. B. p. 197. CROSS l. c. (ad ebrietatem usque). SCOTT apud CURLING l. a. cas. VII. p. 194.

75) STORCK *ann. med.* II. p. 166.

76) SCHOUT in *mem. of the med. soc. of Lond.* Vol. II. FISCHER v. HUFELAND *Journ.* 1. B. p. 261. PLENK in *Abh. d. Josephin. Acad.* 1. B. p. 76. BRIGHT ex Guy's *hosp. rep.* 1826. Vol. 1. in *DIFFENBACH Ztschr.* 1837. B. 6. H. 3. p. 343 (chinin. sulphur.).

77) Extollantur e BRIGHT l. c., KEY ex *ibid.* in *ibid.* p. 344. et e CURLING l. c. p. 191.

*phoram* <sup>79)</sup>, *alkali volatilis fluorem* <sup>80)</sup>, *acidum hydrocyanicum* <sup>81)</sup>, *valerianam* <sup>82)</sup>, *castoreum* <sup>83)</sup>, *asam foetidam* <sup>84)</sup>, *terebinthinam* <sup>85)</sup>, *solanum Caroli-*

78) ELLIOTSON ex *med. chir. transact.* Vol. 13. et Vol. 14.

1828. Vol. 15. 1829. p. 161. in n. *Samml. auserl. Abh. f.*

*pr. A.* 1828. B. 11. St. 2. p. 308. et 1830. B. 13. St. 2.

p. 338. Idem *ib. d. Anwend. des kohlens. Eisens b. Tetan.*

ex *the Lond. m. gaz.* 1833. Jan. in BEHNARD *allg. Repert.*

1833. N. 4. p. 9. E. F. DEHANE ex *the Lond. m. gaz.*

1833. Septbr. in GERSON u. JUL. *Magaz.* 1834. St. 4. J. HA-

MERTON in *the transact. of the provinc. m. and s. assoc.*

*instit. Lond.* 1837. Vol. 5 (electuar. ex ferr. carbon. et

spirit. terebinth.). In larga quidem dosi propinari oportet;

sed quis TRALLIERO (ex *revue méd.* 1834. in SCHMIDT

*Jahrb.* 1835. B. 6. p. 124), tetano afflictum mensis curriculo

quotidie libram integram ferri carbonici deglutivisse, refe-

renti fidem tribuet? CURLING l. c. p. 196.

79) A. permultis.

80) *Gazette de santé.* 1787. N. 15. *Sur les effets salutaires*

*de l'alkali volatile fluor contre le tétanos.* RUPPIUS in

*Rust Magaz.* 1822. B. 12 (liq. C. C. succ., omni bihor.

gtt. 20, puerperam tetano deliberavit).

81) KLEIN in *Heidelb. klin. Annal.* B. 2. p. 112. D. H. TRE-

REVANT ex *med. record.* 1825. Octbr. in GERSON u. JUL.

*Magaz.* 1826. B. 11. p. 505. WARD l. c. BÄHRENS et

STRANSSEN binæ obs. de virtutib. acid. hydrocyan. in te-

tano et eclampsia pertur. *Rig.* 1827. CLARUS apud K. O.

OTTO l. c.

82) ODHRIUS in n. *Schwed. Abhandl. II. B.* p. 216. v. EICKER

*Samml. I. B.* p. 229. HORN *Archiv.* 1810. Jan. p. 178

(cum opio). WANDTKE l. c. HANKE l. c. p. 125.

83) ARISTARUS curat. acut. L. I. C. 6. CILSUS L. IV. C. 3.

FORESTUS L. X. obs. 113. Schol. SCHENK obs. L. I. N. 237.

84) FIDERICI *prakt. Annalen.* 2 St. p. 206. CARTER in *Ars-*

*neyk. Abh. v. London.* 2 B. (cum opium et moschus non

*rolinense*<sup>84</sup>), *hyoscyanium*<sup>87</sup>), *atropam belladonna*<sup>88</sup>), *daturam stramonium*<sup>89</sup>), *colchicum autumnale*<sup>90</sup>), *capsicum annum*<sup>91</sup>), *micaniam Guaco*<sup>92</sup>), *allium*<sup>93</sup>), *nicotianam*<sup>94</sup>), *cantharides*<sup>95</sup>),

*arse-*

juarent). BERNDT in SCHMIDT *Jahrb.* 1834. B. 4. p. 228 (trismus neonati sanatus).

85) Teste EDWARD PHILIPPS (in *medico-chir. transact.* Vol. VI. Lond. 1815) puella, quae, post nsum in urinae retentionem, in hemiplegiam et trismus incidit, injecto clystere ex infuso foliorum sennae cum uncia dimidia (!) olei terebinthinae illico sensum caloris per columnam vertebralem ad caput ascendentem persentiit, redeunte extemplo motu maxillae. J. KENNEDY in *the Lond. med. reposit.* 1822. N. 101. J. GIBSON *Behandl. des Wundstarrkr. durch Terpentiniölklystiere*, ex *the Lond. m. gaz.* 1831. Jan. in BEHRND *allg. Repert.* 1831. p. 96 (ter de die clysmata ex: Ol. Terebinth.  $\frac{3}{4}$ , Ol. Amygd.  $\frac{3}{4}$  et Macilagine). PEARCOCK ex *the lancet.* 1836. Decbr. 10. et 1837. January 28. in DIEFFENBACH *Ztschr.* 1837. B. 5. H. 2. p. 261 (gtt. XII omni triborio. Tres sanationes).

86) VALENTIN l. c. p. 14 (baccae). 87) WALROOD diss. cit.

88) BLANKENBISTER l. c. cas. III. GRANT in *transact. of the med. and phys. soc. of Calcutta.* 1831. Vol. 5.

89) BECHIE ex *transact. of the m. and chir. soc. of Edinb.* in FRORIER *Notiz.* 1829. B. 25. N. 15 (Extr. D. stramon. una cum balneis tepidis medicatus est tetano idiopathico). GRANT l. c.

90) Dr. SMITH's *auf Haiti Behandlungsweise des Starrkr.* ex *Jamaica phys. journ.* in FRORIER *Notiz.* 1838. N. 139. p. 112 (autor tincturam colchici vinosam propinavit felicissimo cum successu).

91) HUFELAND *Journ.* 1833. St. 2 (Infus. seminis cum succo citri, sale et eq. tepida, ut clysmo).

92) OTTO in CASPER *Wochenschr.* 1836. N. 11 (Sucus expressus in- et externe adhibitus).



*arseniatem potassae* <sup>92</sup>), *tartarum stibiatum* <sup>97</sup>),  
zin-

- 93) VALENTIN l. c. p. 19 (frictiones columnae vertebralis cum succo).
- 94) *Philadelph. med. and phys. journ.* T. II. p. 131 (in clysmate). T. DUNCAN in *the Edinb. med. and surg. journ.* 1815. Apr. Vol. 2 (in clysmate). GERSON u. JUL. *Magaz. B. A.* p. 479 (sanatio). J. O'BRIEN in *the Dublin hosp. reports.* 1822. Vol. 3. Cfr. n. Samml. *auserica. Abh. f. pr. A.* 1823. B. 7. et in FRORIER *Notiz.* 1834. N. 913 (in clysmate; sanatio). TH. ANDERSON in *transact. of the med. and chir. soc. of Edinb.* 1824. Vol. 1. et 1826. Vol. 2. Cfr. GERSON u. JUL. *Magaz.* 1825. St. 5. p. 283. 1827. St. 4. et Samml. *auserica. Abh. f. pr. A.* B. 34. p. 141. et B. 35. St. 1 (nec non clysmata, sed et fomentationes ex nicotiana colli et partis laesae commendat). R. SMART l. c. GRAVES ex *the lancet.* 1832. Mai. in FRORIER *Notiz.* 1833; B. 31. N. 8 (frustra tentatum). T. DUNOAN case of *traumat. tetan. cured by injections of tobacco-smoke*, in *Edinb. m. and s. journ.* B. 11. p. 196 (clysmata valde extollit). TRAVERS l. c. p. 323 (ex 3<sup>o</sup> in §. j.). Cfr. CHURLING l. c. p. 163sq.
- 95) *London med. and phys. journ.* 1808. Vol. I. v. Salz. *med. chir. Zeitung.* 1810. 1. B. p. 189 (tinctura usque ad inflammationem vetriculi et intestinorum!! — addita vulneris irritatione perenni). *Med. repository of New York.* T. IV. p. 337. VALENTIN l. c. p. 142.
- 96) JENKINSON in *med. repository.* v. SEDILLOT *journ.* Vol. 36. p. 114. *Tinctura Fowleri* ad guttas decem omni hora cum aequali dosi tincturae opii et coeblesari majore alcohol, quatuor aegros tetano detentos sanatos fuisse contendit NATHANIEL MILLER in *the new England journ. of med. and surg. and the collateral branches of science.* Vol. 7. Boston 1818.
- 97) BUCCHIASCHI l. c. p. 209. 215. E. WOODWARD ex *the Doubl. j. of m. and chem. sc.* 1835. Mai. Vol. 7. N. 21. in SCHMIDT *Jahrb.* 1836. Septb. 1. p. 256, et OGDEN ex *Lond.*

zincum<sup>88)</sup>, electricitatem<sup>89)</sup>, galvanismum<sup>100)</sup> etc.<sup>101)</sup>).

## 7. Cum

- m. and s. j. 1836. *Mai*, in DIEFFENBACH *Ztschr.* 1836. B. 2. p. 371 sanaverunt hoc remedio; totum contra A. L. RICHTER (1835) et G. FERRO ll. cc.
- 98) SMITH in *mem. of the med. soc. of Lond.* Vol. 6. p. 77. v. *Abh. f. pr. Ärzte*, 23. B. p. 299. HANKE l. c. p. 126.
- 99) SIGAUD LA FOND de l'électricité médicale. p. 208. HARRIS in *med. repository*. Vol. 4. *med. news*. WATSON in *philos. transact.* Vol. 53. v. *LESKE auserl. Abhandl.* 5. B. p. 226. WILKINSON in *med. facts and obs.* Vol. 3. HUTCHINSON in *mem. of the med. soc. of Lond.* Vol. 2. N. 15. SPAY in *philos. transact.* ad 1767. 1. Vol. N. 10. VALENTIN l. c. p. 143. MATTHUCCI *Behandl. des Starrkr. durch Electricität*, in FROBIEP *Notiz*, 1838. N. 137 (cum successu sanationis adhib.).
- 100) MARCUS *Magaz. f. Therapie u. Klinik*, 1. B. p. 324. VON HERBER *diagnost. pract. Beitr. z. Erweiter. d. Gbtes*, Lpz., 1803. STRUBE in *HUFELAND Journ.* 23. B. 4. St. p. 16.
- 101) E. c. operatio torolosi dicta v. Lond. *med. and phys. journ.* T. XII. p. 113. et *journ. universel des sciences méd.* IV. année. N. 44. 1819. Août. p. 227. „Le tétanos est fort commun chez les peuples de Tonga; et encore plus chez les insulaires de Fiji. Ils nomment cette maladie gita. Ils pratiquent une operation à laquelle ils ont donné le nom de torolosi en introduisant dans l'urètre un roseau humecté de salive, de manière à y faire naître une irritation et un saignement considérable. Si le spasme général est très violent, ils attachent à l'extrémité du roseau un fil double. Lorsque cette extrémité introduite dans le canal est sentie au perinée, ils y font une incision, saisissent le fil et retirent le roseau. De cette manière le fil dont la partie doublée sort par l'ouverture artificielle du perinée, et les deux extrémités par l'orifice de l'urètre, forme un cecum qu'ils font aller et venir. Cette manœuvre produit

7. Cum *trismus et tetanus recens natorum*, C. trismi <sup>et tetani</sup> hucusque omnia artis conamina (opium scilicet, <sup>recens nato-</sup> <sup>rum.</sup> alcali volatilil, fluorem, camphoram, valerianam, hyoscyamum, oxydum zinci, alcali, emetica, purgantia etc.) eluserit <sup>102</sup>), methodum medendi, exceptis purgantibus, vix indicare audemus. *Tincturam ambræ cum moscho* conduxisse, SCHNEIDER

ASSE-

*une forte douleur et une hémorrhagie considérable.* Post hæc hujus operationis mentio facta est in *the Lond. med. and phys. journ. for July 1829. p. 78.* et 1830. *Debr. Vol. 5, N. 30.* Cfr. BEHRND *neueste med. chir. Journalistik des Ausl.* 1831. B. 5, H. 1. p. 80: „MACINET üb. d. Torolosi-Operation, ein eigenthümliches in den Süddeutschen gebräuchliches operatives Verfahr. gegen den Wundstarrkrampf.“ MACINET hæc operationem pluries et perfici vidit et ipse fecit prospero cum successu. Cfr. GUTHRIE in GRAHSE u. W. *Journ.* 1832. B. 18, H. 2. — Ope asperetas cujusdam ad ærem rarefaciendum JUNOD (l. c.) tetanum se debellasse enarrat.

- 102) FURLONGE (l. c.) se trismo neoneti medicatum esse, asserit; quo autem remedio, non determinare eudemus. MUXIAL DUPINNEIS (BEHRND *neueste Journalist.* 1830. H. 7, p. 35) duobus hiradinibus applicitis trismus et tetanum neoneti fugavit. Tinct. op. crocat. gtt. j. sæpius trismus neonetorum se senesse persuasum sibi habet ESCHSIEGT in FRICKE u. OPPENHEIM *Ztschr.* 1838. B. 8, H. 2. p. 242. F. X. VERNONI (d. *Arzt am Krankenbette d. Kind. u. an d. Wiege d. Säuglinge.* Wien 1838) methodus medendi trismo parum fecit fiducias. BIERMANN (l. c. p. 374) artemisia vulgeri, interne propinata, et belneis tepidis cum floribus Sambuci se feliciter curasse effirmit. Belnea tepida ab aliis commendantur, ut e BELLINGER (*the Americ. j. of the med. sc. Philadelph.* 1832, Febr. Vol. 9) et CURLING (l. c. p. 26) tracheotomia in periculo suffocationalis.

asserit<sup>103</sup>). Ni fallimur, ex eo, quod morbus in recens natis obvenit, non sequitur, eum necessario jure ejusdem semper esse debere indolis. Quae de caussa sicut varias causas illius admisimus, ita et variam medendi rationem indicatam fore suspicamur. Triamo et tetano recens natorum hinc obveniente gradus probabilitatis, num in aegrotulo, quem coram habemus, morbus vel ex cerebro, vel ex medulla spinali, vel ex gangliis abdominalibus proficiscatur, determinandus foret, non neglectis conjecturis circa mali indolem inflammatoriam, rheumaticam<sup>104</sup>), gastricam, nerveam. Quo facto methodus generalis, variis rerum positionibus accommodata, corpusculo tenero recens natorum, cum omni cautela et prudentia, ne, quem salvare nequimus, ipsi interficiamus, adaptanda erit.

## CAPUT

103) L. c. p. 37. R $\bar{y}$ . Ambrae griseae drachmam unam. Aetheris vitriolici unciam dimidiam. Stent per horas duodecim saepe agitando, dein adde Moschi drachmam unam. Liquoris anodyn $\bar{i}$  mineralis Hoffmanni uncias tres. Dosis pro recens nato gutta una omni octava horae parte, cum syrupo aut aqua cerasorum. — Moschum per se commendat WENDT L. c.

104) E. c. infans sex septimanas nata singulta cruciatur et deglutitione impedita, cui trismus et opisthotonus mox accedunt. Adsunt praeterea faciei collapsus et livor, extremitates gelidae, pulsus creber et parvus. Certi cum simus, malum refrigerio admissio recentem exortum esse, extemplo balneum tepidum aromaticum instituo, quod intra 12 horas bis adhuc repetitur. Exinde calor cutis et sudor universalis, et infans salva. Ex sched. editor.

## CAPUT XIV.

*De affectionibus spasmodicis vagis generatim  
et de hysteria in specie.*

## §. LXX.

*Definitio. Literatura.*

1. **S**yndrome symptomatum fugacium, sub-Definitio.  
bito mutabilium, per intervalla redeuntium, quae  
morbos infinitos, praesertim systematis nervosi,  
aemulantur, *affectionum spasmodicarum vagarum*  
nomine <sup>1)</sup> comprehendimus. — Eadem affectio-  
nes, quatenus ex utero proficiscuntur, *hysteriam* <sup>2)</sup>  
constituunt. Brevitatis causa, vocabulo generali  
*spasmodorum* <sup>3)</sup> utemur.

2. Doctrinam generalem spasmodorum, praeun- Literatu-  
tibus HIPPOCRATE <sup>4)</sup> et AEGINETA <sup>5)</sup>, multi quidem <sup>ra</sup>  
illu-

1) *Synonyma.* Mobilitas nervosa nimia. Ataxia spirituum.  
Hyperkinesia (a GRÆC. ὑπὲρ, nimium, κίνησις, mobili-  
tas). GALL. *Vapeurs, spasmes.* GERM. *Krämpfe.* POL.  
*Spazmy.* ROSS. Корчи, Судорога.

2) A GR. ὑστέρα, uterus. GERM. *Mutterkrämpfe.* GALL.  
*Hystérie, hystéricie, hystéralgie, vapeurs hystériques, mal*  
*de mère, neurose utérine.*

3) GR. Σπασμός. GALL. *Les spasmes.* GERM. *Die Krämpfe.*  
ITAL. *Gli spasmi.*

4) De virgin. morb.

5) *Artis medicae compendium.* L. III. C. 71.

Frank PRAX. II. 1. 2. 1.

illustrarunt<sup>6)</sup>, at vero, ut classicos de hoc a-

mo

- 6) ROCKEL diss. de spasms. Halmst. 1587. FLAHER diss. de spasmo seu convulsione ejusque causis. Tübing. LAURENTIUS de hysterica effectibus, infantilibusque Lugdun. 1595. STUPANUS diss. de suffocatione app. hysterica. Basil. 1604. TANDLER diss. de matricis pro- catione. Vittenborg. 1614. JARNICH diss. de passione sterica. Basil. 1614. SALZMANN diss. de spasmo seu vulsione. Argent. 1620. CASPAR. HOFFMANNUS diss. de spasmo, seu convulsione ainsque caus. Altd. 1620. SELLEN diss. de passione hysterica. Vittenborg. 1625. ROSS diss. de spasmo seu convulsione. Jen. 1631. RIVKINUS med. et curat. insignes. Paris. 1646. HENRICUS de sione hysterica. Amstelod. 1660. DALLEN diss. de passi hysterica. Lugd. Bat. 1661. TIRLEN diss. de passione sterica. Lugd. Bat. 1662. PLACIUS Lucretia hyst Duisburg. 1666. LAMMUS diss. de causis hysterica variis ptomatibus stipetee. Groen. 1666. HARTENFELS diss. de passione hysterica. Erford. 1672. WADDEL diss. de suffocatione. Jen. 1674. C. V. SCHNEIDER diss. de sp aorumq. nature. Viteb. 1676. Ejusd. de spasmod. subjecto, nec non de caus. aerum motion. spasticar., aliquando in rec. defunctis et in occis. corporib., militum, deprehenduntur. ib. 1678 (contineus quatuor sartett. de nominib. spasmod. grasc. et latin. — de mor. nature, — subjecto, — at caus., an. 1675 — eb eodem eutora aditas). Ejusd. diss. de spasmi sul vero. ib. 1679. MURZERA diss. de passione hysterica. 1677. JORDEN diss. de passione hysterica. Lugd. Bat. SCHWITZER diss. de passione hysterica. Lugd. Bat. ORLEN diss. de suffocatione hypochondriaca, vulgo sione hysterica. Ultr. 1684. RÜCKERT diss. de sp Ultraj. 1685. HOLLAND diss. de hysterica passione. Bet. 1687. BUSSIS diss. de passione hysterica. Lugo 1692. DE VERUS diss. de passione hysterica. Ultraj. MALUS diss. de passione hysterica. Ultraj. 1693. VV

## DE AFFECTIONIB. SPASMODIC. VAGIS. 723

- diss. de passione hysterica. Lugd. Bat. 1691. ELNBERGER  
diss. de passione hysterica. Duisb. 1695. DE KRUYT diss.  
de passione hysterica. Ultraj. 1696. FRESSENIUS diss. de  
spasmo seu convulsione. Gies. 1697. G. D. COSCHWITZ  
(praeside G. E. STAHL) diss. de motib. humor. spasmodicis  
e motu pulsus ordinarii diversis. Hal. 1697. BEBEREN  
diss. de aegra, suffocatione uterina laborante. Erf. 1698.  
KLAUNIG diss. de spasmo. Lugd. Bat. 1699. PURCELL on  
vapours and hysteric fits. Lond. 1701. J. P. PAULI (praeside  
G. E. STAHL) diss. de spasmis. Hal. 1702. VUERT cas.  
passione hysterica laborantis, ejusque curatio. Erf. 1703.  
VERNON diss. de passione hypochondriaca, hysterica dicta.  
Lugd. Bat. 1704. DUVERNOY diss. theoria vaporum uteri-  
norum. Basil. 1710. GRUNGER diss. de magnetismo rerum  
et uteri ascensione. Zittavise 1712. JOHANN diss. Idolam  
muliebrem in passione hysterica elevatum et excusum. Jen.  
1712. HUNAULT diss. sur les vapeurs et les pertes de sang.  
Paris 1716. J. PH. EYSELIIUS diss. de convuls. et spasmo.  
Erf. 1717. VATER diss. de passione colica et hysterica.  
Vittenb. 1726. FISCHER de strangulatione uteri. Erf. 1727.  
J. F. CLEMENS diss. de melancholia hysterica. Erf. 1727.  
BÜCHNER diss. de atrocissimo sexus sequioris flagello, sive  
passione hysterica. Erf. 1721. Diss. spasticorum motuum  
theorie et therapie generalis. Erf. 1738. Pathologie et  
therapie passionis hystericae. Erf. 1739. Diss. de obser-  
vatione morbor. spasticor. Hal. 1750. Diss. de eleva-  
tione hysterica. Hal. 1751. Diss. sistens casum rariorum affectus  
spasmodico-convulsivi vagi. Hal. 1764. SPASENHOFF diss.  
de spasmis in genere. Heidelb. 1738. BURCHARD diss. de  
affectibus quibusdam spasmodicis frequentius occurrentibus.  
Rost. 1738. JUNKER diss. de morb. spasmodico-convul-  
sivis. Hal. 1739. Diss. de spasmis eorumque quadruplici  
respectu. Hal. 1764. SCHULER diss. de spasmo dolorifico  
saepius remedio quam morbo. Hal. 1740. W. E. FRANKEN  
diss. de spasmis, convulsionib. et motib. convulsiv. L. B.  
1740. RICHTER diss. de malo hysterico. Goett. 1741. JARVIS  
diss.

diss. de hysterica affectione. Edinb. 1744. GZAUER diss. de spasmo fixo Paracelsi, Erlang. 1746. FLHIG diss. de malo hysterico, Argentorst. 1750. LUDOLV diss. de clavo hysterico, Erf. 1750. FAENICIUS diss. de miris quibusdam motibus spasmodico-convulsivo vagis. Helmst. 1751. H. D. BROCKMANN diss. de clavo hysterico. Hal. 1751. CHAUF-  
FERIÉ diss. de malo hysterico. Lugd. Bat. 1752. CAR-  
THEUSER diss. de ver. spasmodorum caus. et remed. Francf. 1753. KALTSCHNID diss. de affectionibus spasmod. vagis. Jen. 1754. PENNY *a mechanical account and explication of the hysteric passion*. Lond. 1755. JUCH diss. de spasmo in genere. Erf. 1755. VRIEG diss. de motu spasmodico. Lugd. Bat. 1755. A. H. GERNHARD diss. de spasmo ab inanitione. Lips. 1755. RAULIN *traité des affections vapo-  
reuses du sexe*. Paris 1758. ASTRUC *traité des maladies des femmes*. Paris 1761. BOHNER diss. de spasmodorum externe ratione ad viscera, indeque oriunde morborum complicatione. Hal. 1762. Ejusd. diss. de spasmi periphe-  
rici signo in febrilib. contin. ib. 1764. UYEN diss. de mali hysterici aymptomatum diversitate, ob regionum et vitæ regiminis diversitatem, habite præsertim ratione ad hy-  
stericas in Frisia orientali. Hal. 1762. BACHER diss. de mali hysterici vera indole et curatione. Erf. 1762. J. F. HENR theoria passion. byster. Jen. 1762. RICHARDSON diss. de malo hysterico. Edinb. 1763. G. A. LANGCOUTH diss. sist. ess. de motib. spasmod. vagis. Viteb. 1764. MARX diss. de spasmis sive motibus convulsivis optimaque iisdem medendi ratione. Hal. 1765. JACHELKI diss. de passione hysterica. Lugd. Bat. 1765. DUBOIS diss. de passione hy-  
sterica. Vindob. 1765. KERN diss. de malo hysterico. Basil. 1766. VAN STYVENINCK diss. de hysterica passione. Lugd. Bat. 1766. MITTERBACHER diss. de secretione urinae feminarum hystericarum, et de ea ut signo affectionum earundem. Prag. 1766. MORGAGNI de aedibus et causis morborum. Lugd. Bat. 1767. Epist. XLV. Art. 17. 20. ALERFELD diss. de pathematibus hystericis. Gies. 1767.

J. F.



J. F. CARTHEUSER diss. de limitando emollient. usu in spasmis, Francf. ed V. 1767. J. PH. NONNE diss. de anti-spasmod. modo agendi et usu. Erf. 1769. GÜTZ *Beitr. z. Gesch. v. d. hyster. Krankheiten. Meinung.* 1771. BOHNEN diss. de censis, cur malum hystericum morbum malo hypochondriaco majorem constituat? Hal. 1772. J. F. LANN-FLANN *Fereuch ein. pract. Anmerk. üb. d. Nerven z. Erläuter. . . hyster. u. hypochondr. Zufälle.* Erf. 1774. WOOLCOTTE diss. de hysteria. Edinb. 1776. WILSON *med. researches on the origin and nature of hysterics.* Lond. 1776. LANG diss. de passione hysterica. Vindob. 1776. J. G. BAUNER pr. de iis, quae spasm. rigid. universalib. commun. sunt. Gies. 1776. KÄHLER morbi spasmod. aliquot historiae. Soraviae 1778. STEWART diss. de spasm. Edinb. 1779. LEIDENFROST opusc. T. III. N. 3. Diss. de differentia passionis hysteric. e morbis convulsiv. reliquis. GALDWELL diss. de hysteria. Edinb. 1780. VAN MUYSEN diss. de malo hysterico. Colon. 1781. A. W. BERTRAM diss. de spasm. ab inanitione. Hal. 1781. CH. F. G. PRÜNDEL diss. sist. obs. quaed. de spasmis. Jen. 1783. VAN KESSEL diss. de passione hysterica. Lugd. Bat. 1785. FLOSSER diss. de malo hysterico. Argent. 1785. GROSCHMANN diss. de malo hysterico. Gies. 1785. BUSCH diss. de spasm. Marb. 1785. MITCHELL diss. de hysteria. Edinb. 1789. ROBERTSON diss. de hysteria. Edinb. 1790. BANKHAD diss. de hysteria. Edinb. 1790. MANNING *über die Mutterbeschwer.* A. d. Engl. v. F. ST. HANKE. Wien 1790. NEBEL diss. de Hippocratis doctrina semiotica de spasmis et convulsionibus. Marb. 1791. HEINECKE diss. de hysteria. Helms. 1791. MARC diss. morbi varioris spasmodici. Erlang. 1792. TODD diss. de morbis spasmodicis, hystericis praesertim. Havn. 1793. BULCHE diss. de hysteria. Edinb. 1793. KERN diss. de hysteria. Edinb. 1794. J. K. H. ACKERMANN *üb. Blähung. u. Vapours; Briefe, hypochondr. u. hysteric. Personen gewidm.* Zeiz u. Naumb. 1794. SEHNANN diss. de hysteria. Jen. 1796. ANDREA diss. de constitutionis eevi nostri

nostri spasmodicaa quibusdam momentis. Erford  
 J. W. L. v. LUCH *Vers. üb. Hypochondr. u. I*  
*Gotha u. St. Petersburg. 1797. LUSHL momenta quasc*  
*neraliora circa affectionam hystericam. Goett. 1798.*  
 MANN diss. momenta quaedam circa affectum hyst  
 Vittenb. 1800. TUCKER diss. de hysteria. Edial  
 DUBERNY *diss. sur l'hystérie. Paris 1801. CAMPER*  
*de hysteria. Edinb. 1801. LANG diss. de spasmo fra*  
*Erlang. 1802. JANNASCH diss. de spasmodorum differe*  
*natura communi. Francf. 1804. E. S. v. ENDBER*  
*ein. Hypochondralgologie, od. Lehre v. d. Milz*  
*Mutterbeschwerde. Brem. 1801. BERENDS de hystari*  
*etione apilapsiam simulanta. Francof. ad Viadr. 1806.*  
 CARY *essai sur l'hystérie ethén. et asthén. Paris 1811*  
*diss. sur l'hystérie. Paris 1812. REID essays on hyp*  
*driacal and other nervous affections. Lond. 1816.*  
 German. c. additam. a HAINDORF. *Essen 1819.*  
 ZIMMERMANN *Vers. üb. Hypochondr. u. Hyster. G*  
*St. Petersburg. 1816. F. C. SAMBERGER diss. de hyster.*  
 1816. G. L. W. HONNSTOCK *üb. Hypochondr. u.*  
*u. der Heilg. Sondersh. 1816. VILLERMAY traité d*  
*ladies nerveuses ou vapeurs, et particul. de l'hysté*  
*Par. 1816. et in dict. des sc. m. T. 23. p. 107. ME*  
*Arzt f. Hypochondriat. u. hyster. Frauenzimmer. Pose*  
 J. CH. REIL *Rhapsod. etc. Halle 1818. p. 29. J. I*  
 diss. de morbo hyster. Berol. 1820. J. C. A. CLA  
*Krampf, in pathol. u. therap. Hinsicht. Th. 1. Lpz*  
 M. GROSSET *üb. d. Physiolog. d. Nerveneyst. . . Unt*  
 . . . *üb. d. Sitz, d. Nat. u. Behandl. d. Hysterie et*  
*d. Fr. v. G. F. KUNNER. Lpz. 1823. F. A. WILDI*  
 de spasmod. nat. atq. curat. Berol. 1823. C. RING  
*üb. d. Nat., das Wes. u. d. Behandl. d. Hypochos*  
*Hysteria. Würzb. 1824. F. G. BRÄUNLICH diss. de hy*  
 Lips. 1825. N. M. SORRANI de hypochondr. atq. hys  
 nosographia. Pavina 1825. J. SCHRODER diss. de s  
 etiol., praesertim de nat. et cur. morbi hypochon

# DE AFFECTIONIB. SPASMODIC. VAGIS. 727

hysterici. Rostoc. 1827. H. SCHNAUBERT *Beitr. z. Kennt-*  
*niss des Wes. d. Hypochondr. u. Hysterie u. deren richtige*  
*Behandl.* Eisenb. 1827. C. H. BIRNBAUM *diss. de spasmi-*  
*fragmenta.* Berol. 1828 (duo ess. memoratu digni). C. GÖRTZ-  
 NER *d. Krampf u. s. w.* Bresl. 1829. HENRICH *Heilung v.*  
*hartnäckigen, sehr heftigen Krämpfen . . . durch den Gebr.*  
*des Sirona-Schwefelwass. z. Nierstein,* in HUFELAND *Journ.*  
 1829. St. 9. p. 74. N. DUMONT *diss. de hysteria pathologi-*  
*ca quaed. atq. therap.* Berol. 1830. G. TATE *a tr. of*  
*hysteria.* London 1830. ELLIOTSON *üb. Hysterie, deren Ur-*  
*sachen, Verwicklung, u. Unterscheidungsmerkmale v. Epi-*  
*lepsi u. üb. d. Wirksamk. des Terpentins geg. dieselbe,* ex  
*the lancet.* 1830. Apr. in BEHRND *Journalistik.* 1830. H. 6.  
 p. 394. LUCAS *ein merkwürd. Fall v. Hysterie,* ex ib. 1831.  
 Jan. in ib. 1831. Juli. p. 46. G. KNELLIO *diss. de hyste-*  
*ria.* Pest. 1831. VENCESLAUS HELD *diss. de hysteria.* Ca-  
 san. 1832. J. L. BRACHET *recherch. sur la nat. et le siège*  
*de l'hystérie.* Par. 1832. BRIGHT *Hysteria ex ejusd. reports*  
*of med. cas. Vol. 2. p. 2. in BEHRND Journalist.* 1832.  
 Octobr. p. 35—40 (plures casus afferuntur). *Uwins the dis-*  
*orders of the brain and nervous system.* Lond. 1833.  
 HAUFF *üb. d. Hyster. u. ihr Verhältnis z. Hypochondr.* in  
 HUFELAND *Journ.* 1833. St. 6. p. 3 sq. E. FR. DUBOIS *hist.*  
*philosoph. de l'hypochondr. et de l'hystérie.* Par. 1833 et  
 1837. CAJ. CHIAPPA *diss. nonnulla de passione hyster.*  
 Pavise 1834. CHAMHON DE MONTAUX *v. d. Krankheit. un-*  
*verheirathet. Frauenzimmer. 2. Ausg.* Nürnberg. 1834 (Kap. 11.  
*üb. d. Hysterie).* J. B. THOMSON *Fälle v. Krämpfen,*  
*ex Lond. med. gaz.* 1834. Vol. 14. Mai 31. in SCHMIDT  
*Jahrb.* 1835. B. 6. p. 80. L. v. VEST *üb. Hysterie,* in *Österr.*  
*med. Jahrb.* 1835. B. 7. St. 1. p. 166. L. REDBLOFF *diss.*  
*de morbo hyster.* Berol. 1835. C. F. HELLMUTH *diss. de*  
*hysteria.* Berol. 1835. J. ROBERTSON *üb. Ursach. u. Wesen*  
*d. Hysterie,* ex *Lond. m. gaz.* 1835. Vol. 15. Jan. in SCHMIDT  
*Jahrb.* 1836. B. 36. p. 309. H. TRAVERS *a further inquiry*  
*concerning constitut. irritat. and the pathol. of the nerv.*  
 eyes.

## 728 DE AFFECTIONIB. SPASMODIC. VAGIS.

*yst. Lond. 1835. chap. 2. p. 268. NEUBER glückl. Heil. v. heftigen Krämpfen, welche das Mittel zwischen Epileps. u. Catalepsie hielten, in HUYBLAND Journ. 1835. St. 8. p. 83. TINELLI Fall v. hartnäck. Hyster. ex ONOIDEI ann. univ. di med. 1835. Giugno, in SCHMIDT Jahrb. 1836. B. 12. p. 57. HACKER Krampfszufälle v. ein. 20jähr. Dauer u. den verschiedenst. Schattirung. in Summarium des Neuest. u. Wissenewürd. a. d. ges. Med. Lpz. 1836. B. 1. p. 21. T. C. KLEVESAH. diss. de hyster. quæd. Berol. 1836. BRAU statist. Untersuch. z. Gesch. d. Epilepsie u. Hysterie, ex archiv. gén. de Par. 1836. Juill. in SCHMIDT Jahrb. 1836. B. 13. p. 297. G. SUBOTTA diss. de hysteriasi. Pad. 1837. FORTUN. CALIARI diss. de affect. hysterico-hypochoendr. ib. 1837. D. FIORINI diss. de hysteriasi. Pav. 1837. FR. EAGLE üb. d. Identität d. Nat., Symp. u. Ursach. d. Hysterie u. Hydrophobie, ex the lancet. 1837. Jul. 15. p. 563 sq. in DIERFFENBACH Ztschr. 1837. B. 6. H. 3. p. 376. B. C. BRODIE lectur. of certain local nerv. affect. Lond. 1837. German, a KÜRSCHNER. Marb. 1838 (qua utor). p. 27—65. C. A. TOTT in SIEBOLD Journ. 1837. B. 16. St. 3. DANIBSKI diss. de hysteria. Wärczb. 1838. M. ZOLLER diss. de hysteria. Viadob. 1838. J. PRICHARD pract. obs. on hysteria, especial. relating to its organic charact. Lond. 1838. TH. LAYCOCK in the Edinb. m. and s. j. 1838. Octbr. C. J. HEIDLER Krampf u. Krämpfe. Prag 1838. LEONE. DEI CLOCHE merkw. Fall ein. Hyster. ex ONOIDEI ann. univ. di med. 1837. Noubr. u. Debr. in SCHMIDT Jahrb. 1838. B. 20. p. 186. J. JACOB Fall v. Hysterie, ex Lond. m. gaz. 1838. March. p. 976. in FRINCKE u. OFFENH. Ztschr. 1838. B. 9. H. 2. p. 213. LEBKÜCHNER Krankh.-Gesch. u. Heil. ein. sogenannt. Besessenen, in Würtemb. med. Corr.-Bl. B. 8. N. 52. J. CONOLLY die Hysterie, ex encyclop. of pr. m. edit. by FORBES etc. Vol. 2. p. 557. in Analect. d. chron. Krankh. Stuttg. 1839. B. 2. H. 1. FLECKLES ein merkwürd. Fall v. Hyster. complicirt mit Plica Polon. in AMMERS Monatschr. f. Med., Augenheilk. u. Chir. 1840. B. 3.*

mento scriptores, hodieum adhuc SYDENHAMUM<sup>7)</sup>, FR. HOFFMANNUM<sup>8)</sup> et ROBERTUM WHITT<sup>9)</sup> agnoscimus, commendamusque eorum opera iis praesertim medicis, qui praxin in urbibus magnis, ac inter ordines civium superiores, sexus potissimum sequioris, exercitaturi sunt. Solum, summos quoque illos viros hypothesebus indulsisse<sup>10)</sup>, dolendum.

## §. LXXI.

*Symptomata. Necroscopia.*

1. Morbus, ad quem describendum nos accin-<sup>Habitus,</sup>  
gimus, saepe sub *habitu corporis* sano abscondi-<sup>status</sup>  
tur. Plurimi tamen, praesertim inter feminas, <sup>mentis.</sup>  
structuram delicatam<sup>1)</sup>, extremitates frigidas, cum  
pulsu

B. S. H. I. p. 92, et *Österr. med. Jahrb.* 1840. B. 30. St. 4. p. 516. Fusius hic casus enarratur ab AD. BARACH in *Österr. med. Jahrb.* I. c. St. 3. p. 399 sq.

7) *An epistle from Dr. THOM. SYDENHAM to Dr. W. M. COLE treating of the small-pox and hysteric diseases.* Lond. 1684. v. *Works*. V. Edit. p. 407.

8) *Medic. ration. syst.* Pars III. C. 3. De motibus spasmod. vagis, et diss. de morbi hystERICI vera indole, sede, origine et cura. Hel. 1733.

9) *Obs. on the nature, caus. and cure of those disorders which are commonly called nervous, hypochondriac or hysteric.* London 1764. Ed. II. 1766. Versio Germ. Lips. 1794. Ed. III. 1767. *Works*. Edinb. 1768. p. 489—712.

10) R. c. sic ait SYDENHAM: *The chief curative indication is to strengthen the blood which is the source and origin of the spirits* (I. c. p. 425). — Sic HOFFMANN „aut enim illa (materia spasmos excitans) est vaporosa, narcotica, sulphurea, acris aut magis salina, acris volatiliss“ (med. rat. syst. cur. §. II).

pulsu parvo et irregulari exhibere solent. Praeterea mentis maxima in iis animadvertitur mutabilitas<sup>1)</sup>, fluctuatio<sup>2)</sup>, et extravagantia<sup>3)</sup>. Noctes saepe somniis terrificis perturbatae<sup>4)</sup>. Quocunque tempore ad impressiones improvisas, fortes, ingratas, sine agitatione, metu et tremore perferendas impares sunt. Hinc nulla de sanitate nec per horulae momentum securitas<sup>5)</sup>.

Mala consueta.

2. *Mala consueta*, quibus hujuscemodi aegroti anguntur, sunt dolores vagantes capitis, dorsi, lumborum; calores partiales, cum facie mox rubente, mox pallescente<sup>6)</sup>, organi tactus sensibilibitas

1) CLARUS l. c. p. 123 addit: „dass der schwammige Habitus, bei dem ebenfalls noch immer eine wenigstens relative Gesundheit bestehen kann, unter übrigen gleichen Umständen, eine grössere Anlage zu Krämpfen darbietet, als ein festes Gefüge,“ et p. 125: „Mädchen von dieser Constitution . . . werden nach der ersten Niederkunft hysterisch; Knaben sind oft schon im 20. J. vollendete Hypochondristen.“

2) SYDENHAM l. c. p. 414 „and are constant only to inconstancy.“

3) Idem l. c. „This instant they propose doing one thing, and the next change their mind, and enter upon something contrary to it, but without finishing it.“

4) Idem l. c. „They love the same person extravagantly at one time, and soon after hate them without cause.“

5) Idem l. c. „Their dreams being accompanied with the representations of funerals and apparitions of their departed friends.“

6) „Merkwürdig war es auch, dass Patientin selbst durch den Gedanken an ihre Anfälle dieselben zu erwecken vermochte.“

BARACH l. c. p. 405.

litas aucta<sup>9)</sup>, visus obnubilatio; perceptio odoris absentis, e. c. fumi, sensus internus aegritudinis, anxietatis, inquietudinis, inflatio colli, constrictio oesophagi<sup>9)</sup>, perceptio cinguli costas spurias circumdantis, oscitationes, suspiria, languor operis digestionis, screatio frequens, anorexia<sup>10)</sup> alternatim cum bulimia<sup>11)</sup>, pica, adipsia, alvus tarda, ventris inflatio, et borborygmi.

3. *Paroxysmi* symptomatibus adeo multipli-<sup>Paroxys-</sup>  
cibus et variis annuntiantur<sup>12)</sup> et insiguntur<sup>12)</sup>,  
<sup>mus.</sup>

ut

7) CLARUS l. c. p. 46: „eine scharf umschriebene Bläse, so wie man unter andern Umständen eine umschriebene Rötthe bemerkt (cfr. p. 48). War der Anfall an u. für sich schwächer, so blieb es oft bei dieser Erscheinung, auch konnte derselbe oft noch verhütet werden, wenn man gleich bei seinem Eintritte dienliche Mittel anwendete.“

8) P. I. ed. ult. Vol. III. Sect. 2. C. XXIV. §. LXXX. 1 (5).  
BARACH l. c. p. 400 („entwickelt sich in dem ganzen äussern Hautorgane, so wie in den Kopfhaaren eine solche krankhafte gesteigerte Sensibilität, dass die leiseste Berührung dieser Theile einen Krampfanfall (convulsion. hyster.) hervorrief“). Hac sensibilitate caruerunt facies et manus. lb. p. 403.

9) GOLLAUD ex journ. des conn. méd. et chir. 1834. Mars, in SCHMIDT Jahrb. 1834. B. 4. p. 205.

10) Mira est hystericarum nonnullarum inedium perferendi potestas. Cfr. P. III. Vol. I. Sect. 2. C. XVI. §. LVI. 6. D. G. KISER klin. Beitr. Lpz. 1834. Th. 1. p. 186 fgd. L. DE CLOCHER l. c. p. 187 (ipse aversio cibi potusque).

11) JAGIELSKI eigenthümliche Krampfkrankh. in Rust Mag. B. 54. H. 1 („der Hunger war unersättlich u. Pat. vertrug zehnfache Portionen ohne Beschwerde“).

12) „Mense Martio 1798 ad comitissam, virginem 17 annorum in consilium vocatus sum. Medicus ordinarius erat Di. Dr.

## 732 DE AFFECTIONIB. SPASMODIC. VAGIS.

ut re vera Protei formas et Chamaeleontis colores antecellant. Haec vero consistunt: modo in capitis dolore <sup>14</sup>), inprimis hemicrania, clavo <sup>15</sup>), ovo <sup>16</sup>), saepe cum vomitu herbaceo, seroso, inani; — modo in statu apoplectico <sup>17</sup>) cum indicibus hemiplegiae aliarumque paralyisium <sup>18</sup>); — modo in odontalgia <sup>19</sup>); — modo in cataphora <sup>20</sup>); — modo in agrypnia <sup>21</sup>); — modo in incubo <sup>22</sup>); — modo

*Closset.* A 16 jam mensibus eegrotet etsi menstrua recte fluxerint. Mirae convulsiones nempe miseram prehenderunt, suffocationis metui non raro junctae, saepe periodicae. Quod vero mirum erat, fuit, quod ubique fortior paroxysmus imminabat, semper in plurali loqui soluerit; in singulari vero, quotiescunque mitior accessio erat futura. Mane tussis laborat atroci, sicca, interdum atrocissima. Haec ultima fere cesset illico, dum convulsiones artuum subintrant aut oscitatio.<sup>4</sup> Ex sched. J. P. FRANK.

13) Rei raris conssa lege JAHN eine Krankheitsgeschichte a. d. 17. Jahrh., abgedruckt a. sin. alt. Chronik Meiningens (poligraphia Meining. auctore GUTH. 1676) in med. Convers.-Bl. 1832. N. 6.

14) BARACH l. c. p. 400.

15) CONOLLY l. c. p. 166.

16) P. II. ad. ult. Vol. I. Sect. 1. C. II. §. VIII. 3. 4.

17) L. c. C. V. §. XXVII. 15. VILLERMAI l. c. I. Vol. p. 67. CONOLLY l. c. p. 164.

18) C. XII. §. LXII. 3. BRIENT l. c. p. 38 et 39. Quae paralyis e vere distinguitur eo, quod muscoli voluntati obediendi non impotes sint, sed quod voluntas ipsa ebsit. BRODIE l. c.

19) SYDENHAM l. c. „The teeth also (which we would scarce believe) are subject to this disease.“ Cfr. P. III. Vol. I. Sect. 1. C. XIX. §. LXXIX. BARACH l. c. p. 402.

20) P. II. ad. ult. Vol. I. Sect. 1. C. VI. §. XXXII. 2 (2—13).

21) L. c. C. VII. §. XXXIV. 2. CONOLLY l. c. p. 168.



— modo in somniatione spontanea<sup>21</sup>); — modo in catalepsi<sup>22</sup>); — modo in lacrymarum profusio, fletum summopere moerentis imitante<sup>23</sup>); — modo in diaphragmatis musculorumque faciei convulsionibus risum simulantibus<sup>24</sup>); — modo in furore<sup>25</sup>); — modo in delirio<sup>26</sup>); — modo in rhachialgia<sup>27</sup>); — modo in neuralgia<sup>28</sup>); — modo in

22) L. c. C. X. §. XLVI.

23) L. c. C. XII. §. LI. FR. HOFFMANNUS med. rat. syst. I. c. obs. III. RICHARD in HUFELAND Journ. 1815. St. 2. p. 3 (duo casus memoratu digni). *Salab. med. chir. Ztg.* 1818. B. 4. p. 332.

24) PRETIN de l'électricité méd. Lyon 1806. RICHARD in HUFELAND Journ. 1815. Jun. NORTH Fall v. hyst. Cataleptis, ex med. and phys. j. 1821. Nov. in FRENCH Notiz. 1828. B. 19. N. 16. G. BURNETT period. Hyster. u. Kataleptis, in BERNESE Journalist. 1833. Juni. p. 256.

25) MANUELPHI de fletu et lacrymis. Rom. 1618. SCHNEIDER diss. de fletu. Lugd. Bat. 1628. De lacrymis et fletu. Lips. 1620. HUFELAND Journ. 1815. St. 1.

26) BRUNELIUS tract. de risu. Florent. 1608.

27) Hystericas novi, quae, mente caeterum illassa, fumulebus, ut veniem ipsas impune verberandi darent, pecuniam persolvebant.

28) NURN. progr. de delirio hysterico. Erf. 1762. BAUMER diss. de delirio hysterico. Erf. 1763.

29) C. II. §. VIII. 16. De spinæ affectionibus hystericis lego BRONN L. c. 2. Forles. CONOLLY L. c. p. 167.

30) C. VI. §. XXX. 14. CHOMET ex gal. méd. de Par. T. 3. N. 127. in HARNEL Summar. 1833. B. 4. p. 205 (neuralgia epigastrica). Crebriores sunt neuralgiae hystericæ articulorum. Neuralgia rebelli genu cruciatur femina et tandem accesserunt paroxysmi hystericæ. Quibus feliciter sanatis, neuralgia illa disparuerat. BRONN L. c. citator

## 734 DE AFFECTIONIB. SPASMODIC. VAGIS.

in tremoribus<sup>31</sup>); — modo in contractione dolorifica unius alteriusve musculi<sup>32</sup>); — modo, et saepissime quidem, in convulsionibus<sup>33</sup>) (quibus saevientibus veluti in epilepsia<sup>34</sup>) aegroti caput

<sup>31</sup> hos dolores, qui medicum non raro in errorem ducunt, sub nomine *hysteriae localis* describit, et CONOLLY l. c. p. 167 de iis ait: „Schmerzen in den Gliedern sind häufige Plage Hysterischer, ... häufig mit Störungen im Sehen u. in der Stimme verbunden.“ Sic puella 13 annor. paralytica, partim coeca et fatua aedit etc. ibid.

31) C. IX. § XLV. 7.

32) Haec affectio spastica, subito accedens et subito recedens rigiditas cum dolore saepe atroci in artubus vel in collo, *crampus* nuncupatur. Tentet musculos digastricos, imprimis eos digitorum manuum pelumque etque surae at conglobat per breva tempus praeter voluntatem cum dolorifico illo rigidityte. Cfr. Vogel de cogn. et cur. morb. p. 39. SAUVAGES nosolog. RUST Repertor. B. 22. H. 2. p. 306 (contractio spasmodica extremitatum inferiorum). An hoc spectat *anxietas crurum*? de qua SAUVAGES (l. c.) ait: „Hoc effectu nil est in praxi frequentius, at non altius de quovis morbo, quam de illo apud auctores est silentium... Quotidie videmus mulieres et viros, potissimum arthriticos, rheumaticos, qui accedente vespere tibies ne per minutum in eodem situ et loco retinere queunt, ob importunam quandam sensationem, quae motu illo paulisper sedatur, quaeque vulgo decubita in lecto evenescit.“ Cfr. P. II. ed. ult. Vol. I. Sect. I. C. VIII. §. XXXVIII. 2.

33) Tam fortibus, ut ossa ab hinc frangerentur. Eph. n. c. Dec. I. an. II. obs. 225; quod at de spasmis valet LORSEN in *med. Ver-Ztg.* 1837. N. 16. HEYFELDER *Stud. im Geb.* d. *Heilw.* Stuttg. 1839. B. 2. p. 95.

34) FR. HOFFMANNUS pulcherrime paroxysmam convulsivam hysteriicam describit. l. c. §. V.

in omnes plagas rotant, oculos violenter aperiunt<sup>35)</sup>, — in gyrum movent, os vicissim clausum, hians, huc illuc torquent, linguam exerunt, commordent, dentibus strident<sup>36)</sup>, sonos edunt varios<sup>37)</sup>, mirificosque boatus, animalium voces aemulantes<sup>38)</sup>, membra variis modis agitant, ac si tripudiarent, propriis pugnibus pectus allidunt<sup>39)</sup> seque cruciant<sup>40)</sup>, vestes lacerant, parietes scalpunt, terram validissime quatiant conculcantque, mox in terra insectorum instar reptant, retro ambu-

35) Hujus symptomatis loco nictationem palpebrarum observavit FLECKLES et BARACH II. CC.

36) DEL CHIAPPA in OKOIDEI ann. univ. di med. 1831. Apr. p. 13 („il feroce stridore dei denti si forte e continuato, fè che altri dei denti si spezzarono, altri se ne svellessero (ed uno di questi si trovò nel ventricolo) e tutti gli restanti poi venissero iassosi dai loro alveoli“). LUCAS I. c. L. DE CLOCHE I. c. p. 188 („das Zähneknirschen war so bedeutend, dass man das Geräusch einer auf Eisen wirkenden Feile zu hören wähnte“).

37) SCHNIDER sonderbare Convulsion. in CASPER Wochen-schr. 1839. N. 8. p. 123.

38) ELLIOTSON Hysterie mit Bellen, ex the lancet. 1832. Octbr. 21. in HARNEL Summarium. 1833. B. 4. p. 204.

39) L. DE CLOCHE I. c. p. 188: „Die mit verechlungenen Händen gegen die Brust geführten Schläge waren so furchtbar gewaltig, dass sie nicht allein überall im Hause der Kranken, sondern auch auf der Strasse u. ziemlich fern von demselben gehört werden konnten.“ Similia observavit FLECKLES (I. c. p. 93) et BARACH (I. c. p. 400, 406).

40) „Zuweilen drückte die Patientin mit ihren Händen so stark die Magen- u. Lebergegend des Bauches zusammen, dass sie vor Schmerz ächste“ BARACH I. c. p. 406.

## 736 DE AFFECTIONIB. SPASMODIC. VAGIS.

ambulant<sup>41)</sup>, vixque a robustissimis hominibus coërceri queunt<sup>42)</sup>; aut veluti in tetano totum corpus antrorsum, retrorsum, ad latera movent, attollunt, circumgyrant, contremiscunt, spinam dorsi incurvant, arcum formant et sanguinem sudant<sup>43)</sup>; — modo in aponia<sup>44)</sup>; — modo in hydrophobia<sup>45)</sup>; — modo in tussi sicca nec momentam pacis concedente<sup>46)</sup>; — modo, et sæpius qui-

41) M. A. RACHOWSKI *précis prat. et raisonné de diagnostic*, etc. Par. 1837. p. 397 (hystérica in paroxysmo convalescebat et cancri modo retrogredebatur).

42) SCHNEIDER l. c.

43) CHAUFFARD *hyster. Anfälle mit blutigem Schwies*, in *FROMIER Notiz*, 1831. B. 29. N. 14. p. 223, ex *bull. des sc. méd. Par.* 1830.

44) ZACUTUS LUSITANUS *prax.* L. VII. obs. 18. Eph. nat. cur. Dec. II. an. 7. obs. 133. BERDOY in *act. Helvet.* Vol. VIII. p. 196. VAN DER HONT in *Abh. f. pr. Ärzte.* 9. B. p. 387. M. SAKTORPH *gesammelte Schrift*, etc. herausgeg. v. SCHERL. Kopenhag. 1803. p. 266. DUFOUR in *gazette de santé de Par.* 1817. Septbr. F. W. AN HILDEBRAND *ann. schol. clin. med. Tic. Pav.* 1830. P. II. P. BLUNDELL in *Lond. m. gaz.* 1835. Vol. 16. June 6. BRODIE l. c. CONOLLY l. c. p. 158. Cfr. P. II. ed. alt. Vol. I. Sect. I. C. XIII. §. LVII (3).

45) HALBUS de immuni quadam passione hysterica et equifuga. v. ORTSCHI *diar.* an. 1766. p. 196. DASSIT *merk-würd. Fall v. hydrophobischer Hysterie*, ex *bull. de therap.* T. 17. p. 329. in *SCHMIDT Jahrb.* 1840. B. 26. p. 208 (historia lectu digna).

46) WHYTT l. c. p. 603 „a nervous cough“ (Memorabilis narratur morbi historia). SINCLAIR in *the Edinb. m. and s. j.* Vol. 82. Jan. 1825. DUCHES l. citanda. TH. DAVIES *lect. on the disease of the lungs and heart.* Lond. 1835

quidem in asthmate<sup>47)</sup>; — modo in cordis pal-  
pitatione arteriarumque vibrationibus<sup>48)</sup>; — modo  
in lipothymia<sup>49)</sup> et ipsa asphyxia<sup>50)</sup>; — modo in  
singultu canis latratu saepe simili<sup>51)</sup>; — modo in  
cardialgia<sup>52)</sup>; — modo in pulsatione abnormi  
aortae abdominalis<sup>53)</sup>; — modo in ructibus so-  
noris

(in appendica ad cap. de catarrhis tussis hystarica descri-  
bitur).

47) *Synonym.* Suffocatio uterina. Uteri strangulatus. Suf-  
focatio hystarica. Praesufocatio hystarica. Matricis praesufoca-  
tio. Cfr. P. II. Vol. II. Sect. 1. C. XIII. §. LXII. 3  
CONOLLY I. c. p. 161.

48) Cfr. P. II. Vol. II. Sect. 2. C. XVII. §. LXXI. 3. LES-  
KŒCHNER I. c. Virgo 36 annorum at ultra, vitam degens  
castam, ex amore deluso hystarica evadit. Paroxysmi  
annuntiantur anxietate et pectoris oppressione cum lacry-  
mas retinendi impotentia; quibus mox accedit cordis pal-  
pitatio tam vehemens, ut ab adstantibus audiatur. Statum  
cordis auscultavi reiteratis vicibus mediata at immediate  
paroxysmo vigante at in liberis intervallis, quia vitium  
organicum dataxiisam. Ex sched. auditor.

49) WHITT I. c. „Many hysteric women are liable to be  
seized with faintings during which they lie as in deep  
sleep, only their respiration is so low as scarce to be per-  
ceived.“ Cfr. HOFFMANN de animi deliquiis. Obs. III. opp.  
Vol. III. p. 274. FORRESTUS L. XVII. obs. 7. 12. P. II. V. II.  
S. 2. C. XXII. §. XCV. 2.

50) MARCELLUS DONATUS L. IV. C. II. BONET aspuler.  
L. III. obs. 9. *Journ. des sçavans.* 1745. CONOLLY I. c.  
p. 164 („die Thätigkeit des Herzens u. der Lungen kann  
scheinbar aufhören u. d. Körper so sehr erhalten, dass er  
einem Leichnam ähnlich sieht“) et p. 165 (plures casus).

51) RANOR in act. r. soc. med. Havn. Vol. I. p. 460. Cfr. (38).

52) *Neuralgia coeliaca?* BARACH I. c. p. 400. 403.

Frank Prax. II. I. 2. 4.

Aaa

noris acidis<sup>54</sup>); — modo in palpitatione musculorum abdominalium<sup>55</sup>); — modo in vomitu herbaceo aut in diarrhoea<sup>56</sup>); — modo in colica<sup>57</sup>); — modo in nephralgia calculum renalem aemulante<sup>58</sup>); — modo in dysuria<sup>59</sup>); et in omni fere<sup>60</sup>) casu in profluvio urinae limpidae aquosae<sup>61</sup>), quo profluvio paroxysmi per horas, dies et

53) De hoc symptomate sermo est P. II. Vol. II. Sect. 2. C. XVI. Pulsationes, quibus hysterice cruciantur, generatim F. JAHN (*Vere. f. d. pr. Heilk. Eisenach* 1895. II. 1) vasorum erethismum nervocum denominat.

54) Commune symptoma. 55) C. IX. §. XLIV. 1 (6).

56) SYDENHAM l. c. p. 412.

57) NEUNHAUS casus colicae hystericae cum epierial. Argent. 1769. P. BLUNDELL, JAGIELSKI II. cc. — Addit BRODIE (l. c.) *tympanitidem* non raro cum obstipatione alvi conjunctam. Cujus causam proximam aequae ac deglutitionis impeditae et dysuriae hystericae nec ad stricturam nec ad spasmum, sed ad musculorum inertiam reducit. CONOLLY l. c. p. 168 („die qualvollsten Kolikanfälle, welche wir uns erinnern, kamen bei Hysterischen vor; sie dauern viele Tage fort“).

58) „So that it is hard to distinguish, whether the symptoms arise from the stone or any hysteric disorder.“ SYDENHAM l. c.

59) „The bladder also is occasionally affected with this delusory symptom, which not only causes pain, but a suppression of urine, as if there was a stone, tho' there is none.“ SYDENHAM l. c. Dysuria hysterica, ait BRODIE l. c., tam saepe occurrit, ut ejus descriptio superflua videatur. L. DEI CLOCHÉ l. c. CONOLLY l. c. p. 168.

60) Urinam cum sedimento lateritio hysterica, de qua BARACH (l. c. p. 403. 406) narrat, emittebat.

61) SYDENHAM l. c. p. 414. NICOLAI progr. de diabete ex

et quamvis raro per menses protracti, minimisque ut plurimum sejuncti intervallis, terminari solent. „Remanent ineffabiles corporis languores, vel alti sopores, haud raro truces articularum agitationes terminantur in tumores inflammatorios, in quibus cutis veluti bile suffusa flavescit <sup>62)</sup>; aliis pustulae foedae ulcerosae <sup>63)</sup>, vel vesiculae magnae aqua repletae <sup>64)</sup>, corpus obsident <sup>65)</sup>. Sunt quae febricula lenta <sup>66)</sup> et atrophia corripiantur.

4. „Post mortem in dissectis cadaveribus in-<sup>Necroscopia.</sup>flammationes ventriculi, intestinorum, hepatis, lienis, pulmonum observantur; vesicula fellis admodum turgida, et ipsa bilis ad aliquot cochlearia in ventriculum effusa adparet <sup>67)</sup>. Verum haec phaenomena cum affectionibus spasmodicis vagis nexum habuisse vehementer dubitamus, credimusque potius illa morbis accidentalibus, a quibus

#### A a a 2 bus

spasmo. Jen. 1773. *Sur la composition de l'urine d'une personne hystérique*, in *bull. des sc. méd.* 1826. Juin. N. 6. p. 177. G. DEL CHIAPPA in *OMOIDEI ann. univ. di med.* 1831. Lugl. J. CONOLLY l. c. Nihilominus G. TATE (l. c.) hoc symptoma abnuit et nunquam se observasse asserit.

62) *Ecchymoma*. Cfr. P. I. ed. alt. Vol. III. S. 2 C. IV. §. X. 3.

63) *Hydroa nervosum, criticum*. Ibid. C. XIII. §. XXXIV. 4.

64) *Pemphigus* ibid. C. XIV. §. XXXVI. 3.

65) FR. HOFFMANN l. c. §. VI.

66) *Opinio BALLONII et MORGAGNI*. v. VILLHARTAY l. c. p. 89. *Hyster. Fieb. besonder. Art.* v. HOFFENGARTNER in *rhein. Jahrb. Suppl. f. d. ersten 4 Bände*, p. 1.

67) FR. HOFFMANN l. c. §. VII. Cfr. BONATI *sepulcr. anat. et opera de motibus convulsivis*, p. 120. et *eph. nat. cur. cent. III. obs. 84*. Cfr. R. BRIGHT in *med.-chir. transact. Lond.* 1839. Vol. 22 (de vitiis pericardii et cordis hystericarum).

bus nec hystericæ nec consortes immanes sunt, tribuenda esse. Contra vero nexum inter motus spasmodicos vagos et vitia ovariorum animadvertimus, quæ scilicet viscera in cadaveribus hystericarum cum steatmate<sup>68)</sup>, et vesiculis, liquido quodam repletis<sup>69)</sup> reperta sunt.

## §. LXXII.

## C a u s s æ.

C. prædisponen-  
tes.

1. Ad causas prædisponentes spasmodorum spectant: vitium hæreditarium<sup>1)</sup>, congenitum<sup>2)</sup>, clima calidum humidum<sup>3)</sup>, structura corporis gracilis<sup>4)</sup>, sexus sequior<sup>5)</sup>, pubertatis epocha<sup>6)</sup>, illa-

68) BINNIGER cent. II. obs. 90.

69) VESALIUS Lib. V. de humani corporis fabrica. C. XV. RIOLANUS anthropographia. VILLERMAY l. c. p. 143.

1) FR. HOFFMANN l. c. §. IX et quotidiana experientia.

2) Feminae sanissimæ, dum eo tempore, quo utero gerunt, terrore, animique pathematibus ingratis vexantur, prolem, affectionibus spasmodicis vagis obnoxiam, generare solent. Sic infantes spurii sæpe mobilitate nervorum et ingenio præ cæteris antecellunt. Idem testatur CLARUS l. c. p. 128: „Kinder, deren Mütter während der Schwangerschaft heftigen Gemüthserschütterungen ausgesetzt gewesen sind, bringen oft eine auffallende Erregbarkeit des Nervensystems mit zur Welt“ etc.

3) Quamvis spasmi nec in regionibus septentrionalibus desiderentur, eos tamen longe frequentius in Italia obvenire, meæ docent observationes, a recentibus mea in Insubria mora omnino confirmatæ. Lege de hoc argumento LINDON *diseas. incident. to hot climates.* p. 170. 258. E. F. DUBOIS l. c.

4) „There is often an uncommon weakness or delicacy or an unnatural or depraved feeling in various parts of the body



illaque critica in feminis dicta<sup>7)</sup>, caelibatus<sup>8)</sup>, matrimonia immatura, abortus<sup>9)</sup>, partus crebri, educatio voluptuosa, effeminata, praesertim contracta inde consuetudine, ut omnibus desideriis illico satisfiat<sup>10)</sup>, philautia, vita luxuriosa, otium, vigiliae nocturnae, somnus diurnus<sup>11)</sup>, protractus<sup>12)</sup>, mora in lecto<sup>13)</sup>, poeseos et musicae stu-

*which exposes certain persons to violent, and sometimes very extraordinary affections from causes which would scarce produce any disturbance in people of sound constitution.*" WHITT l. c. p. 543.

5) Quamvis, nostro imprimis aevæ, et mares spasmis saepe laborent, nihilominus frequentissime in feminis obveniunt. CLARUS l. c. p. 123.

6) Spasmi, exceptis iis, qui a vermibus excitantur, raro ante pubertatem utroque in sexu obveniunt.

7) „L'époque critique est encore une condition favorable au développement de cette maladie, et nous verrons par fois les effets de cette révolution se prolonger long-tems après la cessation du tribut périodique." VILLERMEY l. c. p. 43.

8) Virgines annosae et monachae maxime spasmis laborant. Quam ob rem his personis et viduis hystericis, „digitum sibi imponero, ut ex motu et titillatione possint spermatizare," commendare PLATHARIUM (pract. f. 221. b) non pudet.

9) FLECKLER l. c. p. 93. BARACH l. c. p. 400.

10) „Quand leur (des femmes) susceptibilité a été trop ménagée, lorsqu'elles ont été entourées des soins trop recherchés ou prévenues jusque dans leurs moindres désirs; elles éprouveront souvent une forte commotion, par suite d'une contrariété légère." VILLERMEY l. c. p. 39.

11) Inter homines, qui noctes vigiles transigunt, ac diu ad moridiem usque somno indulgent, paucos mehercle invenies, spasmis non obnoxios.

12) CLARUS l. c. p. 125.

studium indefessum, lectio fabularum milesiarum, inedia<sup>14)</sup>, jactura humorum, praecipue sanguinis<sup>15)</sup>, seminis, lactis, item fluor albus, diarrhoea etc.

C. excitantes.

2. *Excitant* spasmos eorumque repetitos accessus: animi pathemata<sup>16)</sup>, praesertim ira, invidia, zelotypia, amor (maxime occultus<sup>17)</sup>), taedium<sup>18)</sup>, moeror<sup>19)</sup>, terror<sup>20)</sup>, item expectatio protracta, nisus

13) „Lying to long in bed will weaken and relax.“ WHITT l. c. p. 643.

14) CLARUS l. c. p. 180 sq.

15) Venaesectiones habituales systeme nervosum tandem laefectare, nemo ignoret. Cfr. CLARUS l. c. p. 132 sq. et 169 sq. et 185 de turgescencia venerum et collapsu seu inanitione docens. SCHLEIFER in *Österr. med. Jahrb.* 1833. B. 14 (5). St. 2. p. 267 (convulsiones ex venaesectione abusu).

16) CLARUS l. c. p. 144 sq. et 394. C. F. SCHWARZE *pr. Beobacht. v. Erfahr. a. d. Med.* etc. *Dresd.* 1827. 15. Cfr. §. LXXIV. 22.

17) FR. HOFFMANN l. c. C. V. Exam. morb. obs. IV.

18) Hinc divites, quorum vota sine omni cure impleri solent, saepe spasmis, a quibus solum per adversitatem liberantur, laborare solent. Sic medicorum Perisiensium plurimi mihi narrarunt, spasmos ante revolutionem Gallicam tam communes, illa saeviente omnino fere evanuisse. Mercatorum uxores coram oculis habeo, quae, florente quondam inter nos commercio, sub lenta vivendi ratione, continuo hysteriæ excruciebantur, nunc vero commercio circumscripto, curisque vexatae, ut ipsae ajunt, tempus egrotandi amplius non habent.

19) Homines sanissimos post interitum personae carae in spasmos perpetuos incidisse vidi. L. DEI CLOCHU l. c.

20) Cfr. C. XI. §. LV. Mirum insultus spasmodicos saepe

nisis imitandi<sup>21</sup>), contrarietates, corporis motus violentus, sessio<sup>22</sup>), loquela<sup>23</sup>), sibilus continuus<sup>24</sup>), res suaveolentes<sup>25</sup>), odores fortes ingrati<sup>26</sup>), sonus vehementes<sup>27</sup>), gratissimi<sup>28</sup>),

con-

ea ipse hora, qua primum excitati fuere, denique omni nycthemero redire.

21) Si ad epilepsiam excitendam valeat (C. XI. §. LV. N. 2 (117)), eo magis ad simplices spasmos. SIEBOLD *Journ.* 1828. B. 8. p. 538. BRACHET in *compte administr. des deux hôp. civils de Lyon pour l'an. 1836. Lyon 1837.* MEYER in *med. Ver.-Ztg.* 1838. N. 8. A. DEWAR ex *Edinb. m. and s. j.* 1839. Jul. in *FRONIER Notiz*, 1839. B. 12. N. 11. p. 169. Cfr. §. LXXIV. 22.

22) NIC. TULPIUS obs. med. lib. I. C. XIV (Virgo 15 annos nata, hystericis affectibus antebac subjecta, invasa fuit admirabili quadam nervorum contractione, invasit haec illam non nisi sedentem, stanti quippe et ambulanti nihil peperit unquam negotii. Causam morbi TULPIUS credidit inhaerere cum lumbis, tum ligamentis, uterum ilei ossibus utrimque ednectentibus).

23) SEMMOLA de singulari neurosi dias. Neapoli 1830 (juvenis, alioquin bonae valetudinis et robustae corporis constitutionis, non nisi locuturus convulsionibus corripitur. Ex causa ignota exortae hae convulsionibus quotiescunque redeunt et perdurant quamdiu ille in eo est ut clara et distincta voce loquatur: silent, si ipse dicendi finem facit. Cfr. BREHEND *Journalist.* 1833. Juli. p. 82).

24) HONNBAUM *sonderbare Entstehungsweise v. Convulsionen*, in *CASPER Wochenschr.* 1834. N. 20 (Ad vocem inter centum musicum edentes deficientem supplendam vir aetatis 35 annorum sibilavit horam integram. Nunc convellebantur oris anguli: tandem convulsionibus universales fiebant et lethales).

25) E. c. moschus, oleum essentielle roserum.

conspectus objecti motu rotatorio et alio continuato agitati, nauseosi, vel ob peculiarem idiosyncrasiam antipathici<sup>26)</sup>, ut ranarum, hirudinum<sup>27)</sup>, murium, felium, horumque animalium exhalationes<sup>28)</sup>, narcotica, inprimis opium, hyoscyamus, digitalis, belladonna aliaque venena<sup>29)</sup>, hydrargyrum<sup>30)</sup>, dolores, e. c. sub partu, operationibus chirurgicis, dentitione<sup>31)</sup>, a panaritio, tumore cystico<sup>32)</sup>, calculo renali; porro laesiones levio-

26) E. c. fumus nicotianae, quo aevo nostro mares saepe feminas molestant.

27) A tubarum clangore hystericam Principem in lipothymiam incidisse vidi. Alia spasmodorum genere ab explosione ignium artificiosorum, et tormentorum ballicorum, quin timor hinc scenam luderet, observavi.

28) E. c. concentus instrumenti vitrei, vulgo *harmonica* dicti.

29) WEIGLEIN in *Österr. med. Jahrb.* 1840. B. 30. St. 4. p. 568 (*auf die Berührung von Metall*).

30) Matrona Vilnensis, ab hirudinum intuitu, in spasmos incidit.

31) Cfr. P. II. ed. alt. Vol. I. Sect. 1. app. ad C. XIV. p. 544. et KAAU BOERHAAVE impetum faciens. §. 409.

32) Amygdalae amarae (10—12). C. F. SCHWARZ I. c. 14.

33) Accessus spasmodorum sub cura lula non rari. Cfr. P. II. ed. alt. Vol. I. Sect. 1. C. XVII. §. LXXIV. 1 (12). CLARUS I. c. p. 297.

34) CLARUS I. c. p. 192. J. FR. ONSTERLEIN *Convuls. u. Zähnen* in *N. Chiron* 1822. B. 1. St. 2. BIERMANN in *HUFELAND Journ.* 1834. St. 3 et 7. Huo pertinet casus a ALBRECHT (*Wirkg. (spasmi) d. schiefen Stellung ein. Zahnes*, in *CASPER Wochenschr.* 1837. N. 8) relat. Dente extracto spasmi disparuerunt.

35) REYNAUD *hartnäck. Hysterie, geheilt durch d. Ausrottung ein. klein. unterhalb des Busens belegenen Balggeschwulst*,

leviores <sup>34</sup>), contusiones, compressio, inprimis thoracis, per vestes nimis arctas, titillatus <sup>35</sup>), manipulationes magnetismum sic dictum animale excitandi gratia institutae <sup>36</sup>), attactus et intuitus voluptuosus, refrigeratio corporis et transpiratio suppressa <sup>37</sup>), calor atmosphaerae, temperaturae repentinae mutationes, ventus *scirocco*, aër conclusus, electricitas <sup>38</sup>), alimenta copia et qualitate peccantia, maxime mel, saccharum, cruda <sup>39</sup>), porro ea, quae imperium peculiare in genus nervosum, potissimum partium genitalium <sup>40</sup>) exercent,

ex *archiv. gén. de méd.* 1829. Novbr. in *BEHNKE Journalist.* 1830. H. 3. p. 312.

36) BRODIE l. c. Puella 14 ann. acu se pangabat in digitum. Dolorem persequitur ad decursum nervi mediani; musculi contrehebantur at aegra convalescebat.

37) CLAUDE l. c. p. 209.

38) L. c. C. XII. §. LII. 2.

39) Ex vestium levitate, mammarum et uteri refrigeratione, saepe spasmis. Hysteria ex refrigerio crebrius occurrit inter Marburgenses. Cfr. BARTELS in *HORN Archiv.* 1827. St. 5. p. 778.

40) Feminas novi haud penes, quae ex longinquo appropinquantem tempestatem cum tonitru praesagiant, ex variis scilicet spasmodis, quibus tunc tentantur, simul cum peculiari somnolentia, sudoribus profusis, palpitacione cordis etc. TISSOT *Nervenkr.* B. 2. p. 214 (Individuum, quod ut magne vi electricae impleretur jasseret, omni tonitru appropinquante, quemvis id non timeret, valde convalescebat).

41) E. c. file xylina in tracta intestinorum uxoris hysteriam exciteruat. HARTMANN *eine Partie verschluckter Tambourbaumwolle verursacht Wurm- u. Krampfzufälle*, ex *Ärzt-Berättelung om Svenska Läkare* etc. in *SCHMIDT Jahrb.* 1839. B. 23. p. 50.

## 746 DE AFFECTIONIB. SPASMODIC. VAGIS.

cent, ut lycoperdon tuber, cancer astacus, fragaria vesca<sup>42)</sup>, cioccolata cum aromatibus, cofea<sup>43)</sup>, thea<sup>44)</sup>, crematum, vina, acida primarum viarum, flatus, vermes<sup>45)</sup>, bilis spissa, abusus clysterum irritantium, alvi, quin immo ipso urinarum evacuationio, congestiones haemorrhoidales<sup>46)</sup>, menstrua appropinquantia<sup>47)</sup>, eorum suppressio<sup>48)</sup>, aut fluxus

42) Lago apud VILLERMAY (l. c. p. 32) ubi de causis morborum spasmodicorum loquitur: „En première nous indiqueront encore les pastilles dans lesquelles on fait entrer quelquefois la teinture, ou une très petite dose de cantharides!“

43) CLARUS l. c. p. 257.

44) Pluribus abhinc annis, virgo, ut a spasms magna cordia palpitatio et anxietate stipatis liberaretur, curae mae commissa est. Accessus omni die hora octava ingruiebant. Cum parum antea potum cofeanum epotare fuerit solita, imperavi ut ab eo se abtineat. Nullus tunc observabatur paroxysmus, ac ancilla, quae multa prius ingurgitavrat pharmaca, nullo eorum amplius adhibito, per eolam a potu cofeae abstinentiam convaluit.

45) „I once imagined to be in a great measure unjustly accused; but experience has since taught me the contrary.“  
WHYTT l. a. p. 642.

46) LOHMANN in CASPER Repert. 1830. B. 27. H. 1. C. G. NEUMANN v. d. Krankheit, des Gehirns des Mensch. Coblenz 1833. Kap. 17 (ascaridas quidem, verumtamen nunquam (?) lumbricos ut causam convulsionum agnoscit). L. v. WINDISCH in SCHMIDT Jahrb. 1836. B. 9. p. 217. ANDRAE merkwürd. Krämpfe a. elten. Ursache (ex julo terrestri vivo in dare), in CASPER Wochenschr. 1838. N. 13.

47) L. FLECKLES in Öeterr. med. Jahrb. 1837. B. 12. St. 2. p. 278 sq. (hystaria ex plethora abdominali). BARACH l. c.

48) Ex venarum turgore. CLARUS l. c. p. 196.

fluxus irregularis, coitus<sup>49</sup>), veneris desiderium inane<sup>51</sup>), graviditas<sup>52</sup>), partus<sup>53</sup>) et puerperium, impetiginis<sup>54</sup>), praecipue urticatio, nec non fluor albus<sup>55</sup>) praepostere fugatus<sup>56</sup>).

3. *Causa proxima* spasmodorum quaerenda vi-  
detur, in sensibilitate corporis totius, aut partis<sup>ma</sup>  
illius sive aucta sive perversa<sup>57</sup>), quâ contingit,  
ut

- 49) LISCovius in KLOSs *Ztg. f. d. ges. Med.-Wes. Lpz.*  
1831. N. 11. KIMsH L. c. ALT in SCHNIDT *Jahrb.* 1835.  
*B. 8. p. 122.*
- 50) Praeterquam quod coitus per se symptomata spasmi ex-  
hibet, plurimae feminae exstant, quae nunquam illum  
exercent, quin dein per diem unum altiorumque nervorum  
malis excrucientur.
- 51) Caelibem vitam plures sine noxa ducere possunt fami-  
nae, sed vix unam illarum invenes, quae prope maritum  
impotentem impuna decumbere possit. Idem de uxoribus,  
a maritis neglectis, valet. Pluras mætrices, variorum  
morborum curandorum causa in nosocomium translatae,  
hysteria tentabantur, quod, ut repentine dinque coitu ab-  
stinerent, coactae erant. CHAMsON DE MONTAUX L. c.
- 52) P. IV. Vol. II. Sect. 2. cap. de graviditate.
- 53) Praecipue abortus: NAUMANN in *Zeitschr. f. Nat.- u.*  
*Heilk. Dresd.* 1827. Th. 5. H. 2. p. 218. SIEBOLD *Journ.*  
1831. B. 10. St. 3. p. 444. STIRNA v. STIRNITZ in *Österr.*  
*med. Jahrb.* 1830. *Neueste Folge. B. 1. St. 3. p. 116.* hist. 18  
(hysteria ex abortibus). Cfr. N. 1 (9)
- 54) HOFFMANN *med. rat. syst.* l. c. §. XIV.
- 55) Ibid. C. V. enarrat. morb. obs. 12.
- 56) Febris intermittens tertianae suppressio: SCHLEIFER in  
*Österr. med. Jahrb.* 1833. B. 14 (5). St. 2. p. 272 (hac fabre  
tandem redeunta, convulsionum paroxysmi quotidiani si-  
luerunt).
- 57) In eo consentit BRODIE (l. c. *Vorles.* 3), systematicis ner-

ut quivis stimulus aut externus aut internus, quin semper absolute limites excedat, relative impressionem nimiam vel abnormem faciat<sup>16)</sup>). Caeterum quis intimam spasmodorum naturam, praesertim quatenus anima in iis scenam ludit, perspicere posset? Nec aditus talem ad labyrinthum patet!

## §. LXXIII.

*D i a g n o s i s.*

Difficultas.

1. Si morborum hucusque recensitorum diagnosis ob id, quod illorum quivis cum aliis *nonnullis* adfectibus similitudinem aluerit, difficultates exhibuerat; — quanto majores difficultates, respectu ad diagnosin affectionum spasmodicarum vagarum, utpote adspectum fere *omnium* corporis humani morborum usurpantium, expectandae erunt? Neque satis! Affectiones spasmodicae vagae, cum saepe gravissimas easque rebelles simulent aegritudines, ipsae vero hae affectiones non tanti sint momenti; patet, errores in diagnosi commissos nullibi magis quam hic palpabiles et opprobriosos esse. Sunt aliquando et *crudeles in aegros*, dum scilicet gravis quidam morbus pro *spasmo* proclamatur et ut spasmus curatur, aut, aegro pro imaginario et importuno declarato, vilipenditur. Clamantia hujusmodi peccata iis praesertim medicis familiaria esse solent, qui debita vel

doctrina

vosi evolutionem imperfectam causam proximam agnoscens.

58) Autorum opiniones numerosiores de spasmodorum causa proxima legantur apud CLARUS l. c. p. 70—107.



## DE AFFECTIONIB. SPASMODIC. VAGIS. 749

doctrina vel diligentia destituti, morborum reconditorum diagnosin instituere aut nequeunt aut negligunt, ac propriam sive ignorantiam, sive levitatem, magico illo *spasmodum nomine* cooperire satagunt.

2. Ne vero charybdis vitans in scyllam incidat! Monitum. Compertum enim habemus, medicos juvenes prudentia magis quam experientia excellentes, ac honorem diagnosin morborum abstrusorum instituendi ambientes, viscera, solum motibus abnormibus transitoriis tentata, ac si gravi eoque organico vitio laborarent, designasse, — itaque terrorem in familiis, non sine propriae famae detrimento, sparsisse <sup>1)</sup>.

3. Utriusque generis errores evitare licet probe Castalae. cognitis spasmodum *notis, formis et indole*.

4. *Notae* essentialis affectionum spasmodicarum ex definitione <sup>2)</sup>, quin immo ex inscriptione hujus capituli, elucet. *Vagae* enim illae sunt, *fugaces et subito mutabiles et per intervalla redeunt*. Qua de causa, quo magis morbus definiendus symptomatibus *fixis, constantibus, et perseverantibus* insignitur; eo minus illum ad affectiones spasmodicas vagas pertinere, exstat probabilitatis gradus, et vice versa.

5. Porro:

1) Hic error quotidie invalescit, quum mos diu ferat, morbos a vitiis organicis repetere. Pulchrum ideo argumentum elegit E. Linn in opere suo: *a treat. on some nerv. disord. being chiefly intended to illustr. those which simulate structural disease. Lond. 1833.*

2) §. LXX. 1.

## 750 DE AFFECTIONIB. SPASMODIC. VAGIS.

Formae.

5. Porro: quamvis *formae* spasmodorum, ut monuimus<sup>3)</sup>, infinitae sint; attamen quaevis illarum sat constanter tum determinatae vitae periodo alligari, tum sub data rerum positione evolvi solet. Crescit aut decrescit hinc probabilitas, morbum problematicum adfectionibus spasmodicis vagis adnumerandum esse, nec ne, quo magis vel minus ille ad normam generalem accedit, aut ab ea recedit. Examen peculiare hujus argumenti rem clariorem reddet.

Spasmi  
recens nan-  
torum.

6. Admittendo sensibilitatem nimiam pro causa proxima affectionum spasmodicarum vagarum<sup>4)</sup>, quisne magis illis subjicietur, corpusculo tenello *recens nati*<sup>5)</sup>, tot inusitatis stimulis expo-  
sito?

3) §. LXXI. 3.

4) §. LXXII. 3.

5) Ita, ut ex observationibus BLACKMORE (ex the Edinb. m. and s. j. 1829, Jul. in *FRONTIS Notiz. N. 546*) convulsiones inter infantes octies crebrius, quam inter adultos occurrant. Cfr. SCHAFFER in *HUFELAND Journ.* 1818. St. 2. G. P. F. MARKE diss. de eclampsia infantum. Goett. 1822. BRACHET *mém. sur les caus. des convuls. chez les enfans.* Par. 1824. 2. ed. 1837. German. a FINKL. Reutling. 1839. J. NORTH pr. obs. on the convuls. of infants. Lond. 1826. L. v. p. KREH *mém. sur les convuls. chez les enfans et les moy. d'y remédier*, in *journ. compl. du dictionn. d. sc. méd.* 1826. Mars. p. 16. et 1827. N. 109. p. 77. BURNET in *journ. hebdom.* 1829. T. 5. p. 261. A. J. ZECHEL de convuls. infant. Prag. 1829. German. a J. F. OTTO Lpz. 1834 (compilation). URBAN in *HUFELAND Journ.* 1830. St. 11. p. 96. W. RAV in *gemeins. d. Ztschr. f. Gbtsk. B. 5.* p. 294. WITTE in *med. Convers.-Bl.* 1831. N. 28. HONNBAUM ib. N. 37. PH. A. FISCHER d. *Kinderprax. im Findelh. u. in d. Hosp. f. kr. Kind. x. Paris. Götting.* 1831.

aito? Subjiciuntur recens nati potissimum *colicac*, *crampis*, *singultui*, *oscitationi*, *risui*<sup>6)</sup>, et *sopori*. Quorum malorum caussae quaeri debent in meconio, in prava lactis conditione (nutrice scilicet menstruante, coitu, potu cremati aut vini perturbatâ, animi pathematibus, inprimis irâ, vexatâ) in refrigerio, in exhalationibus narcoticis<sup>7)</sup>, et in obstaculis, quae sanguis potissimum in circuitu suo per pulmones et circa cor invenire solet. Cavendum vero, ne spasmis effectus violentiarum, sub partu encephalo vel columnae vertebrali illatarum<sup>8)</sup>, item *hydropachitidis congenitae*, *inflammationum ventriculi intestinorumque*, *vitiorum organicorum systematis arteriosi aut venosi*, nec non *trismi* et *tetani* adscribamus. Examen uni-

versi

p. 337. G. DEL CHIAPPA in OMIDEL ann. univ. di med. 1831. Lugl. J. ZANGHER ub. d. *Convuls. im kindl. Alter. Wien* 1834. ADELMANN in *allg. med. Annal.* 1835. Apr. J. D. PONTIKES diss. de singulor. spasmor. infant. form., quae vulgo *echampsia* dicitur. Ticini 1835.

6) Infans ante quadragesimum aetatis suae diem neutiquam riq. naturali gaudere solet (LANZONI act. nat. cur. Dec. III. an. I. obs. 45. p. 62), quâ de causa risus, citius obveniens, morbosus est atque convulsivus.

7) SFORCK infantis sex hebdomadam meminit a liliorum odore soporosi (*Kinderkrankheiten. J. B.* p. 266). Idem a fumo nicotianae accidere compertum habeo, cujus observationis parentes ipsa cubicula infantilia fumo illo adimplere soliti, memores esse deberent.

8) E. c. ex BANCHET et ROUSSEL (*rapport gén. sur les trav. du conseil de salubrité de Nantes. N.* 1828) observationibus compertum habemus, praepriis infantes, forcipi ope atos, facile convelli.

versi corpusculi recens nati, et absentia symptomatum constantium vix allatorum diagnoseos arduum opus adjuvant.

Spasmi infantum.

7. Quamvis, firmato magis corpusculo infanti, proclivitas ad spasmos decrescere debere videatur; attamen potius contrarium, sub intrante in *infantibus periodo dentitionis*<sup>9)</sup>, uberrimo maiorum generis nervosi fonte, observari solet. Spectant praecipue huc *pavores sub somno*<sup>10)</sup> et *convulsiones*, quae, dum morbum primum constituunt, probe a malis similibus, utpote symptomatibus *encephalitidis, hydrocephali; rhachialgitiidis et hydrorhachitidis* distinguendae sunt. Interea ex observationibus nostris circa *indolem* spasmodorum palam fiet, inter illos et inflammationes non semper tantum discrimen, ut vulgo creditur, intercedere, easdem causas, puta congestiones cruentas circa cerebrum<sup>11)</sup> et medullam spinalem<sup>12)</sup>, metastases ad has systematis nervosi partes, pro re nata nunc *simplices motus spasmodicos*, nunc *inflammationem medullae nerveae et meningum* gignere<sup>13)</sup>. Differentia solam in eo locata videtur, quod causae motuum spasmodicorum effectus transitorios sine gravibus reliquiis, illae

vero

9) Cfr. P. III. Vol. I. Sect. 1. C. IX.

10) P. II. ed. alt. Vol. I. Sect. 1. C. VIII. §. XXXIX.

11) HEYVELDER üb. d. Ursache d. Convulsion. z. Zeit d. erst. Dentition, in med. Conversat.-Bl. 1830. N. 9.

12) „Krämpfe u. Zuckungen entstehen, wenn das Rückenmark zu Reactionen aufgefordert wird“ HEIDLER l. c.

13) Ç. BILLARD tr. des malad. des enfans etc. Par. 1828. URBAN l. c.

vero inflammationum, effectus constantes cum proventu liquoris extravasati, aliisque processus inflammatorii exitibus, gignunt. Unde colligitur, motus spasmodicos saepe *praecursores inflammationum* esse, quarum adventus usu remedium antispasmodicorum calefacientium saepe properatur. Caeterum convulsiones ex simplici spasmo ab illis, quae inflammationis sistunt symptoma, distinguimus ex eo, quod ibi status febrilis ex calore, siti, pulsum frequentia, sudore, urinae conditione determinandus, abest, secus in convulsionibus ex inflammatione.

8. Quam scenam in infantibus prima dentitio *Spasmi* ludit, haec, minori solum gradu, in *pueris* sub <sup>*puero-*</sup> altera dentitione repetitur <sup>*rum.*</sup> 14). Praeterea pueri *convulsionibus* ex ingruentibus variolis, ex ingluvie et praecipue ex vermibus subjiciuntur. *Eclampsiae* hujusmodi, ab *epilepsiis*, duratione, reditu et conditione memoriae distinguuntur. Juvat hic et ad aetiologiam respicere, quae si de injuriis externis, de terrore, de retropulsione impetiginum testetur, morbus spasmodicus problematicus, potius ad legitimas epilepsias, quam ad simplices convulsiones pertinebit. Tandem non obliviscendum, ex glandulis mesaraicis scrophulis tentatis, quatenus illae induratae plexibus nervorum mesaraicis, cum plexu solari communicantibus, vim inferunt, nervorum intercostalis et vagi culpa, multa symptomata nervea excitari posse.

9. *Periodus pubertatis* in utroque sexu, non *Spasmi* <sup>*juvenum.*</sup> <sub>*mino-*</sub>

14) Cfr. P. III. Vol. I. Sect. I. C. X.

Frank Prax. II. 1. 2. 1.

minores quam dentitiones excitare solet tumultus. Juvenes, praeter convulsionum varia genera, haud raro quidem *spasmis*, sub forma *hemicraniae*, *palpitationis cordis*, *tussiculae* obnoxii sunt. Verum diuturna praxi edocti sumus, symptomata haec longe saepius ex latentibus in pulmonibus tuberculis pullulare. *Phthiseos* enim *tuberculosae primum stadium* toties symptomata spasmodica (a spasmis simplicibus mehercle probe distinguenda) producit, quoties vel glandulae lymphaticae pulmonis induratae ramos paris nervorum vagi irritant, — vel cruor ex venis jugularibus ad venam subclaviam sinistram et ad venam cavam descendentem, difficulter perveniens, in encephalo, stagnans, cerebrum ac nervos, inde ortum ducentes, offendit, — vel sanguis in circulo suo per pulmones impeditus, cor praeter modum expandens, plexus nervorum cardiacorum molestat. Medici harum rerum ignari, ut spasmis occurrant, quos simplices coram se habere credunt, ad remedia antispasmodica calefacientia saepe confugiunt, quae remedia, oleum igni addendo, inflammationem tuberculorum pulmonis excitant, phthiseosque evolutionem properant, quae tamen mala, debita medendi ratione, nisi plane evitare, saltem quodammodo impedire licuisset. Jam vero *functiones sexuales* cum magnum imperium in affectiones spasmodicas vagas exercent, in utroque sexu separatim considerandae veniunt.

*Spasmi  
virosum.*

10. Annum vigesimum inter et quadragesimum,

num, viri quandoque, ob veneris abusum et maxime ob onaniam, circa epocham pubertatis exercitam, saepissime ob gravia animi pathemata, et ob studia vitamque sedentariam, morbo nervoso, hypochondriasi scilicet, subjiciuntur, qui morbus cum alibi descriptus fuerit <sup>14)</sup>, hic silentio praeteritur. Juvabit solum in mentem revocare spasmos hypochondriacos, probe a symptomatibus nerveis, quae ex morbis potissimum organicis cordis, ventriculi, hepatis, lienis, pancreatis, intestinorum, renum, testiculorum, proficiscuntur, distinguendos esse.

11. Quamvis mulieres, virgines annosae spas-  
 ma, ex multifariis causis utrique sexui commu-  
 nibus, emergentibus, laborare possint, attamen  
 plerumque affectiones spasmodicae vagae, quibus  
 tentantur <sup>15)</sup>, ex utero <sup>17)</sup> proveniunt, ideoque hy-

Spasmi  
mulie-  
ram, hy-  
sterie.

Bbb 2

etc-

15) P. II. ed. alt. Vol. I. Sect. 1. C. XVII.

16) H. S. SINOOWITZ üb. Krampfform. eigenthüml. Art u. der. Verhältnisse zu Sexualstörung, b. weibl. Individ. in Rust Mag. B. 23. H. 2. p. 195.

17) „Pendant les accès de l'hystérie, la main placée sur l'hypogastre reconnaît un mouvement vermiculaire, qui se fait également sentir au doigt introduit dans le vagin“  
 VILLERMAY l. c. T. I. Cfr. KRIMER in HUFELAND Journ. 1820. St. 12. Hysterie v. ein. Prolaps. uteri incomplet. erzeugt, ex Miscell. pr. A. ibid. 1830. St. 3. H. AUTENRIETH in med. Conversat.-Bl. 1830. N. 27 (virgines saepissime ex utero retroverso hystericas reddi, docet). NEUMANN in SIEHOLD Journ. 1831. B. 11. St. 2. p. 240. OROIDEI ann. univ. di med. 1833. Ott. Nov. p. 339. LISFRANC ex gaz. méd. de Par. 1833. N. 64. in SCHMIDT

*steriae*<sup>18)</sup> nomen merentur. Spasmi ex utero emergentes characteres gentilitios agnoscunt, quibus, nisi ab affectionibus spasmodicis vagis generatim, saltem a hypochondriasi speciatim distinguuntur.

Distinctio  
hysteriae  
ab hypo-  
chondria-  
si.

12. Quamvis enim gravissimi auctores, inter quos HIGHMORUM, SYLVIVM et SYDENHAMUM nominasse sufficiet, hysteriam et hypochondriasin pro uno eodemque morbo proclamaverint<sup>19)</sup>, attamen contrariae cum FRIDERICO HOFFMANNO multisque aliis adhaeremus opinioni, ad quam suffulciendam sequens inserviet tabula diagnostica comparativa.

*Hypochondriasis.*

1. Invasio morbi lenta.

2. Paroxysmi in longum trahuntur.

3. Symptomata in ipsis intervallis liberis potius remittunt, quam intermittunt.

4. Symptomata simplicia sunt et constantia.

*Hysteria.*

1. Insultus morbi subitaneus.

2. Curriculum insultus breve.

3. Symptomata in liberis intervallis intermittunt.

4. Symptomata multifaria et volubilia.

5. Signa

*Jahrb.* 1831. B. 1. p. 215. PHILIP ex Lond. m. and s. j. 1833. Vol. 4. N. 89. in SCHMIDT l. c.

18) Cfr. §. LXX. 1.

19) Ut adhuc decennio praeterlapso J. C. G. JOÛA (*Handb. d. Krankh. des Weibes* etc. 2. Aufl. Lpz. 1821), BUCHHEIM (*Altenb. med. Annal.* 1823. Juni). HAUFF (l. c.) aliique. Immo hysteriam maris describit GRAUVE in *Liverp. Journ.* 1834. Vol. 1. N. 4. Cfr. SCHMIDT *Jahrb.* 1835. B. 8. p. 41. Sic quoque J. ROBERTSON l. c. aliique.



## DE AFFECTIONIB. SPASMODIC. VAGIS. 757

5. Signa morbi maxime ex aegri narratione innotescunt.

6. Sedes praecipua morbi in gangliis nervorum abdominalibus.

7. Alvi obstructio malum aggravat.

8. Venter extrorsum distenditur.

9. Scrupulosa est aegri ad corporis sui statum et in excretionem attentio.

10. Aegrotus morbos, de quibus legit et audit, hos ipse se jam habere autumat.

11. Praeter coenae-stheseos et imaginationis vitia, sensus et facultates animi illaesae sunt.

12. „Nulli unquam hypochondriaci pro mortuis ac sepulchro destinatis fuerunt habiti....“

13. Timor continuus mortis.

5. Signa morbi plurima in sensus medici cadunt.

6. Origo morbi e systemate nervorum hypogastrico.

7. Alvi libertas incommoda auget.

8. Musculi abdominales introrsum contrahuntur.

9. Aegrotae ad excrementa examinanda vix unquam deveniunt.

10. Multifaria aegrotae accusat symptomata, quin ea interpretari soleat.

11. Sensus et facultates animi saepe perturbantur.

12. „.... ut quidem de hystericis fide dignae testantur historiae“<sup>20)</sup>.

13. Potius vitae valedudinariae timor.

14. Mor-

20) FR. HOFFMANN l. c. §. V.

14. Morbus inter vitae annum 20. et 50. communis.

15. Causae excitantes sunt vita sedentaria et literaria.

16. Magnam hinc scenam ludunt haemorrhoides.

17. A pharmacis vix levamen.

18. Aeger morosus, consiliis medicorum rebellis, nulli illorum addictus.

14. Urget circa pubertatem et cessationem menstruorum.

15. Causae excitantes sunt animi pathemata, inprimis amor.

16. Magnam hinc scenam ludunt menstrua.

17. Multum praestant pharmaca, aliquando jam solus pennarum accensarum suffitus.

18. Aegroti quidem garrulitate peccat, at prompta est ad obediendum, medicoque addictissima.

Quodsi quis objiceret, hystericas saepe et symptomata hypochondriaca exhibere, respondendum, hysteriam haud raro cum hypochondriasi complicari. Interea palam est, hac in quaestione facile *petitionem principii* subrepere. Qua de causa, quamvis persuasi simus, hysteriam ab hypochondriasi differre <sup>21)</sup>, attamen cum iis, qui contrarium defendunt, ob id neutiquam bellum geremus. Ad hysteriam maxime illa accedit hypochondriasis, in qua systema partium genitalium marium evidenter laesum est, et vice versa ad

hypo-

<sup>21)</sup> De differentia ac similitudine amborum morborum perbene disseruit E. F. DUBOIS l. c.

hypochondriasin evidenter illa accedit hysteria, quae systemate abdominali labefactato insignitur.

13. Majoris momenti objectum nostrae hîc se <sup>Monitum.</sup> exhibet observationi. Contingit enim saepe, ut vel hystérica, vel hypochondriacus, in *alienum novumque quemdam morbum* incidat, cujus, ut propria consuetudo fert, amplam rationem reddere, haud facile omittere solet. Accidit inde, ut medicus incautus complicationem praetervidens facile, quotquot accusantur mala, ex hysteria vel hypochondriasi explicare inducatur. Ex gravi illo errore vita aegrorum et fama medici periclitatur.

14. *Spasmi senum et vetularum* potissimum <sup>Spasmi senum et vetularum.</sup> sub forma *asthmatis, tussis, vertiginis et apoplexiae* obveniunt. In iis definiendis, periculo gravem quemdam morbum cordis, arteriarum, pulmonum et cerebri praetervidendi, circumdamur. Ad quod evitandum, nil magis exactâ historiâ morborum quondam praegressorum refert.

15. Verum non solum aetas sed et aliae re- <sup>Animadversiones.</sup> rum positiones, inprimis corporis constitutio, imperium in affectionum spasmodicarum vagarum varias formas exercent. Auctor hujus animadversionis, SYDENHAM<sup>22)</sup> monet: praecipue subjici affectionibus spasmodicis vagis sub forma *apoplexiae*, — mulieres post partum difficilem, sanguinis jactura stipatam, post violenta animi pathemata; illis sub forma *convulsionum*, et *sensu strangulationis ad guttur*, — feminas plethoricas

et

et robustas; illis sub forma *palpitationis cordis*, — virgines aliasque delicatioris et debilioris structurae; illis sub forma *tussis siccae*, — feminas constitutionis phlegmaticae; illis sub forma *vomitibus*, — mulieres textus corporis laxi, aut quae infantes magnos in lucem ediderunt; et illis sub forma *calculi renalis*, — feminas a praegressis insultibus hystericis labefactatas valdeque valetudinarias.

Designatio  
formae.

16. Quaeritur nunc, quomodo *forma affectionis spasmodicae vagae designanda sit*? *Duplex* hic nomenclaturae species se exhibet; altera, nomen morbi a forma desumendi, adjecto epitheto *spasmi* (e. c. *epilepsia hysterica*); altera, spasmm pro morbo primario stabiliendi, adjecto epitheto formae (e. c. *hysteria epileptica*). Prima illa magis nobis arridet, propterea quod diversos generis humani morbos describendo, quid spasmus in iis producendis valeat, longe facilius, quam formas, quot quot spasmi inducere possunt, indicare liceat.

Indoles.

17. Quomodocunque res se habeat, ne credamus, determinata affectionum spasmodicarum vagarum *forma*, diagnoseos opus jam ad complementum perductum esse. Restat enim adhuc, ut *indoles* mali probe indicetur. Inter spasmm enim et spasmm ejusdem plane formae magna aliquando intercedit differentia. Nimirum quamvis causa proxima affectionum spasmodicarum vagarum in sensibilitate nimia aut perversa et in impotentia inde orta, impressiones sine tumultu per-

perferendi, consistat<sup>23)</sup>, hoc non impedit, quominus mali indoles, et quodammodo illius forma a qualitate caussae sensibilitati infensae, morbumque excitantis, pendeat. Quae observatio adeo vera est, ut non solum in diversis hominibus, sed et uno eodemque in aegro confirmetur. Differt enim unus spasmodorum paroxysmus ab altero, quatenus nunc ab animi pathemate, nunc a potu excalescente, nunc ab errore in diæta, nunc a refrigerio, nunc ab excretionem quadam retenta etc., excitatur. Intelligitur inde quod **FRIDERICUS HOFFMANNUS** de pharmaciis paroxysmis accommodatis dixerat: „neque quod semel profecit, id alio tempore juvet“<sup>24)</sup>. Nec *character morborum annuus*, nec *climatis imperium*, affectionibus spasmodicis vagis alienum est. Sic *annua constitutio* morbis inflammatoriis, rheumaticis, gastricis etc., favente, affectiones spasmodicae vagae saepe eundem exhibent characterem inflammatorium, rheumaticum, gastricum. Neque mirum, constitutionem annuam, cujus vis tanta est, ut fortissimos adeo homines imperio suo subjiciat, debilioribus non parcere. Ad *clima* quod spectat, potentia illius in indolem spasmodorum vel ex eo elucet, quod egregii medici, prout variis in regionibus praxin exercent, variam admodum mendi rationem commendant. En cur illorum consilia non indiscriminatim in usum deduci possint, curque methodus, ab Anglis indicata, haud

23) §. LXXII. 3.

24) L. 4. C. V.

semper in mediterranea regione prospere succedat. Verum praeter clima, et modus vivendi civi et gentium cultura, considerari merentur. Certe sime enim spasmus a tragoediae adspectu excitatus ab illo, cui potus cremati ansam dedit, diffunditur. Quae cum ita sint, in varia spasmodorum indicatione determinanda tuti erimus.

Spasmi  
traumati-  
ci.

18. Primum sese exhibent spasmi *traumatici* quibus subjiciuntur praecipue *infantes* — cuiusmodi insectorum, corporum extraneorum ad cavum aurium, narium etc. perductorum, lapsus aliarumque violentiarum; et *feminae* culpa vestimentorum, praecipue fibulatarum, partus laboris et illius reliquiarum. Inter has maxime *prolapsus uteri* notandus, a quo hysteriam pharmacis per multis incassum tractatam solis auxiliis mechanicis sanata<sup>24)</sup> observavimus, et observavit et *Herniae* porro utroque in casu, ut *spasmodorum* causae, obvenire possunt; ne dicamus de calculi biliosis et urinalibus, de vermibus etc.

Spasmi in-  
flammati-  
cii.

19. Affectiones spasmodicae vagae, saepe ad aspectum inflammatorium exhibent. Nisi vero aegrotorum habitus, aetas, morbi antecedentes causae malum excitantes revera de *diathesi inflammatoria* testentur, illius praesentia caute suscipienda. Enim vero signa inflammatoria hic saepe per nervorum in cor, arterias et venas imperiguntur. Praeterea spasmi et viscerum constrictiones, circulo libero sanguinis obstant.

244

saepe efficiunt, ut cruor (forte majore vi expandente gaudens et secretioni cujusdam gasis favens<sup>26)</sup>) in nnam corporis partem (ob morbos praegressos labefactatam, vel ob praesentiam transitorii cujusdam stimuli ad plethoram dispositam) nimia copia irruet, ac pulpa nerveae ibi obviae infensus evadat. Si congestiones oriantur in encephalo, specu vertebrali, circa cor, pulmones, hepar, lienem et praecipue circa *uterum*, causam communissimam spasmodorum et potissimum hysterae, sistunt. Viscus congestionem laborans, ex ipsa spasmi *forma*, saltem a medico, nervorum diversis motibus praepositorum gnaro, divinari solet.

20. *Gastricos* nominavimus *spasmos*, qui ex <sup>Spasmi gastrici,</sup> visceribus et nervis abdominalibus proficiuntur. Frequens eorum causa in *erroribus dietae* latet, qui in infantibus et mulieribus altioris ordinis<sup>27)</sup> saepe difficulter eruuntur. Accedunt *vermes intestinales*, qui, ut diximus<sup>28)</sup>, saepe spasmos, non solum in pueris, sed et in adultis, praesertim sexus

sequio-

26) Vide mox infra N. 20 ubi de passione fatalenta quaestio est.

27) Plus vicia simplici ad faminas sensitivas, quae solo, ut ita dicam, aëre ac spirita vesci videbantur, paroxysmi spasmodici medendi gratia, vocatus sum. Jam causam in animi quodam pathemate sublimi quaerere paratus eram, dum ex signo, ab ancilla antea mihi clam dato, ad praegressam ingluviem concludere debueram. Nec ista in cibo quodam exquisito ac delicato, sed e contrario in caseo, halecibus, brassica, carne sũlla etc. consistebat.

28) C. XI. §. LVI. N. 14.

sequioris, excitant<sup>29)</sup>. Fons spasmodorum praeterea saepe in *acidis primarum viarum*, et maxime in *flatibus* quaerendus. Istorum imperium in spasmodis excitandis adeo magnum est, ut nisi nobis ab hypothesebus plane abstinendi lex esset, doctrinam de *spiritu flatulento* quondam a GALENO et nuper a VIDALIO<sup>30)</sup> jactatam admitteremus. Meretur ea saltem examini eique experimentalis subijci. Sic forsitan origo flatuum intelligeretur, qui non solum per tubum intestinale hystericarum, sed aliquando per universum textum cellulose decurrunt atque tumores emphysematicos colli, pectoris, aliarumque partium excitant<sup>31)</sup>. De quo argumento in tractatu de flatu<sup>32)</sup> ampla quaestio instituetur. Porro frequens spasmodorum causa in *hepate* et *cystide fellea* invenitur, imprimis si ira, moeror, zelotypia subreperint, si mercurii multum adhibitum fuerit, sique caput antea valde doluerit. Spasmi originis hepaticae praesertim latus corporis dextrum detinere, et maxime ventriculum et cor in consensum trahere solent. Contra vero si *lien* spasmodorum focus constituet, maxime latus corporis sinistrum patitur, quod prae-

29) Feminas elegantissimas curavi, in quibus nemo hospites tam immundos ac vermes expectasset, quae tamen non prius quam illis fugatis sanitati restitui potuerant.

30) *Essay sur le gaz animal considéré dans les maladies, ou renouvellement de la doctrine du GALIEN concernant l'esprit flatueux. Marseille 1809.*

31) P. I. ed. alt. Vol. III. S. 1. C. XXVII. §. XCIV. 2 (27).

32) P. III. Vol. I. S. 2. cap. de affectionibus flatulentis.



praecipue in aegris; aut haemorrhoidibus, aut febris intercurrentibus obnoxia, aut ad scorbutum pronis, contingit. Spasmi tunc saepe sub forma melancholiae <sup>33)</sup> et vomitus obveniunt. Urgent ipsi appropinquante menstruorum periodo, in herniosis, in iis qui vitam sedentariam ducunt, aut si *complicationes* adsiunt; quas inter complicatio cum *plethora*, praesertim *venosa*, et cum *vitiis scrophulosis glandularum mesaraicarum*, prima loca obtinent.

21. Spasmi *rheumatici* saepissime ex corpo-  
 ris, praesertim mammarum, uteri et pedum re-  
 frigerio, ac transpiratione suppressa oriuntur.  
 Derepente sub forma cephalaeae, lumbaginis, coli-  
 cae, singultus, obveniunt. Rheuma maxime illis,  
 qui alioquin *arthritide* laborant, infensum evadit.  
 Interea et ex simplici arthritide, inprimis si ea  
 medullam spinalem et uterum aggrediatur, spasmi  
 gignuntur multifarii. Ab illis haud multum spasmi  
 ab *herpete* et ab *urticatione* excitati, differre vi-  
 dentur. Urticatio praecipue cum systemate ute-  
 rino nexum agnoscens <sup>34)</sup> in regionibus septen-  
 trionalibus, quibus alioquin familiaris est <sup>35)</sup>,  
 hysteriae saepe nisi causam, saltem socium sistit.  
 Generatim spasmorum arthriticorum diagnosi in-  
 stituitur ex notis generalibus arthritidis, praeci-  
 pue ex praegressa podagra <sup>36)</sup>, ex urina specifico  
 sedi-

33) ANGELICH. *Spleen*. POLONICH. *Sledziona*.

34) CLARKE obs. of those diseases of females which are at-  
 tended by discharges. Lond. 1814. P. I. C. II.

35) P. I. ed. ult. Vol. III. S. 1. C. XII. §. XXXI. 4.

sedimento instructa, ex reditu morbi periodico, doloribus insignito, ex imperio mutationum tempestatis in aegros, habitu peculiari praeditos etc. — Subjiciuntur spasmi *arthriticis* praesertim feminae plethoricae circa tempus sic dictum criticum. Verum hinc gressus duntaxat unus requiritur, ut spasmi illi indolem induant *carcinomaticam*. Rerum talem conditionem arguimus, si morbus solitis spasmis rebellior sit, si sub forma dolorum lancinantium obveniat, si fluor albus isque rodens et foetidus adsit, si cancer in familia aegrotae regnet, sique habitus corporis carcinomatici quid indicet. A spasmi *carcinomaticis*, vix aut ne vix quidem *spasmi plicosi* ac *leprosi*, de quibus jam WHITT loquitur<sup>36)</sup>, differunt. Communissimi illi sunt in Lithuania, ubi ipse vulgus spasmos rebelles, inprimis symptomatibus arthriticis stipatos, a recondita vel imperfecte evoluta plica derivare solet. Spasmi plicosi tria sat pathognomica agnoscunt signa, videlicet *susurrum aurium*, *cardialgiam* et *formicationem*. Maxime illi sub temperiei mutationibus saeviunt, ita ut aeger cuivis nubi tributum persolvere debeat. — Tandem cum nobis spasmi obvenerint, qui cum *syphilide* ingruerant, neque prius eradicari potuerint, quam profligata syphilide, *spasmos* quoque ex *diathesi venerca* statuere cogimur. Num vero spasmi hujusmodi directe ex actione principii venerei in systema nervosum, num indirecte per exostoses, topnos,

36) Lege FR. HOFFMANNI observ. II. l. c.

37) L. c. p. 656.

tophos, ulcera etc. excitentur, non audemus determinare. Nec signa gentilitia hic indicare valemus. Restat hic solum, ut moneamus, ne spasmos a *mercurio* excitatos cum venereis confundamus. *Diathesin scorbuticam* spasmos gignere posse principes medicorum jam dudum docuerunt<sup>38)</sup>. Diagnosin ex conspectis diatheseos scorbuticae signis statuitur.

22. *Spasmi primitivi* sunt illi, qui immediate ex sensibilitate aucta aut perversa systematis nervosi prodeunt; ac a causis imponderabilibus, ut ab animi pathematibus<sup>39)</sup>, aestu venereo, idiosyncrasia, nisu imitandi<sup>40)</sup>, fanatismo<sup>41)</sup>, odoribus,

sonis,

38) FR. HOFFMANNUS l. c.

39) „Sie können mir nicht helfen, exclamabat virgo infornata, de qua supra (§. LXXI. 3 (48.)); ich habe den edlen Zweck des weiblichen Daseins (infantes legitimos procreandi) verfehlt, u. das ist meine Krankheit!“ Idcirco non abhorreo quodammodo ab A. TH. BRUCK (*Beitr. z. Erkenntn. u. Heilg. der Lebensstörung. mit vorherrsch. psychisch. Krankheitserscheinung. Hamb. 1827. B. 1*) dicente: „Hysterie ist Hauptform des weiblichen Erkrankens aus verfehltm Leben für das Bestehen der Gattung.“

40) Causa haec praesertim in scholis, opificinis valet, qua de re legantur: GERSON u. JUL. *Magaz. 1822. H. 4. p. 97. Rapport sur les filles convulsionnaires de la commune de Baisieux*, in *bull. des sc. m. 1830. Août. p. 258. J. F. C. HUCKER die Tanzwuth. Berl. 1832. p. 64sq. TRANNOY in FROST Notiz. B. 28. N. 14. Cfr. §. LXXII. 2 (21).*

41) „C'étoit au cimetière de St. Médard à Paris, que cette farce miraculeuse (les convulsions au tombeau) fut jouée l'an. 1726. 1727 sq. Il-y-avoit des gens reconnus pour très instruits, qui ajoutèrent foi à cette charlatanerie pieuse, tels que les Arnaud, les Nicol, les Pascal.

sonis, narcoticis, electricitate etc., provocari Exhibent illi summo in gradu notas essent affectionum spasmodicarum vagarum <sup>41</sup>). *Fin*, tur saepe, inprimis a sexu sequiori, scopo, quisitam sentiendi facultatem patefaciendi, aut minium simplicium commiserationem, aut publi admirationem excitandi <sup>42</sup>), indeque propos

*Un conseiller du Parlement de Paris, nommé Car Montgeron, repandit dans le public un ouvrage où ces prodiges étoient rapportés et certifiés. L'appare-proeds-verbaux ne manquoit point à ces guérisons mi-leuses par l'intercession du diacre de la paroisse de Médard. Non seulement les témoins étoient nomb-mais on en trouvoit plusieurs d'un nom imposant et piété recommandable. La police vit pendant trois e-délire fanatique sans oser l'arrêter. Enfin le eimet-St. Médard fut fermé en Janvier 1732. On y v-fichée le lendemain de sa clôture cette plaisante inscrip*

*De par le roi, défense à Dieu*

*De faire miracle en ce lieu.*

*Le Parlement et les prélats jansénistes avoient affec-croire. Le cardinal de Noailles avoit été un m-séduit par la prétendue évidence de ces miracles.* L-TELLER le jeune l'hist. de France pendant le dixhuit. T. 2. p. 94 sq. Cfr. J. F. C. HUCKER l. c. p. 73, e-aliarum fanaticorum mentionem fecit, et OZANAM h-des malad. épidém. etc. T. 5. p. 189.

42) N. 4.

43) E. c. jactendo phaenomenon quoddam extraordin-ut evocationem acicularum per ventrem (J. D. HUN-obs. de affectib. morbos. virgin. hawaiiens., cui plu-ecus e ver. corp. pertib. excisae et extractae sunt. 1822. Idem *Auszüge aus d. üb. d. Rahel Hertz-rend d. J. 1807—1826 geführt. Tagebüch. Kopenhag.*

aliquod extorquendi etc., unde medicos juvenes serio monemus, ne in talem incidant decipulam<sup>42</sup>). Illam aliquando ab expertis licet practicis diffi- culter evitari per plura exempla edocti sumus<sup>43</sup>).

EO

E. BÜCHNER versucht, Selbstmord durch Verschlucken von Stecknadeln, in HENKE *Ztschr. f. Staatsarzneik.* 1823. B. 8. p. 305. MÜLLER *Gesch. ein. convulsiv. Krankh.*, in deren Verlauf mehr, Nadeln auf d. Körperoberfläche z. Vorschein gekommen sind, in *Badische Annal. f. d. ges. Heilk. Karlar.* 1829. Jahrg. 3. H. 2. p. 54), scarabaeorum (MOR- NICH in *MURBINNA Journ. f. Chirurg. Berlin.* 1812. B. 4. St. 3. Puella 11 annor. spasmis afflicta ultra centum sca- rabaeos conspuentes per alvum evacuavit), limacem rufum (J. TRÜMPER *merkhw. Fall ein., beinahe 2 J. lang im menschl. Körp. enthalt. gewesen, ausgeart. Schnecke*, in *HUFELAND Journ.* 1823. St. 10. p. 3) per alvum etc.

44) Juvenis medicus, ex optimis quondam discipulis meis, ad Aspasiam quandam derepente vocabatur, quae, praevis cum amasio rixis, in statu asphyxiae sim- mili jacebat. Conditio feminae, causa excitans, de- cumbendi modus, pulsuum donique ratio, dolum cuilibet fraudium et artium seminarum peritiori, facile revelasset. Ille vero, aegrae obitum timens, meum consilium implo- ravit, qui panico terrori irrisi. Revera cum applicationem ferri candentis ad cervicem proposuerim, asphyxia oculi ietu evanuit. Quod cum vidisset juvenis medicus, adeo indignatus fuit, ut exercitio ulteriori artis medicae val- dixerit.

45) En unum! Uxor medici viri egregii per nonnullos men- ses quotidie in saevas convulsiones incidebat, quarum, si dicero liceat, integra facultas P...na ludibrium fuit. Do- cuit enim eventus, quod femina haec astuta convulsiones tantum simulaverit, ut maritus juvenem medicum, quocum invicem alios aegrotos in urbe visitare erat solitus, domi, scopo uxori aegrotanti auxiliandi relinqueret. Cujus inter

## 770 DE AFFECTIONIB. SPASMODIC. VAGIS.

Eo major occurrit difficultas, cum persuasi simus,  
 inter spasmos simulatos et veros *tertium quid* la-  
 tere. Enim vero feminas cognovimus, quae vo-  
 luntatis quidem nisu spasmos excitabant, at vero  
 spasmos jam excitatos non amplius in propria  
 habebant potestate. Nec satis. Feminae et quo-  
 dammodo juvenes alterius sexus, dum imagina-  
 tione fervida praediti sunt ac male educati fuerant,  
 ita sensationibus a quocunque animi pathemate  
 fortiori excitatis se praedam dare solent, ut in  
 saevas quandoque systematis nervosi turbas inci-  
 dant<sup>46)</sup>, quae quidem haud plane simulatae dici  
 possunt, sed altera ex parte etiam ad spasmos  
 omnino sinceros neutiquam spectant. Hi instar  
 alio-

brachia sese convulsive aequae ac obscenae jactans, altera  
 Putiphar imperitum rerum adolescentulum seduxit; qui  
 dein, animi grati erga maritum benefactorem suum imme-  
 mor, praevio divortio, nuptiis cum aegra, ablata larva,  
 sanitati restituta, celebravit. Poena brevi crimen secuta  
 est. Perit enim phthisi pulmonali post anni jam aurri-  
 culum exhaustus sponsus, ac vidua ab omnibus derelicta  
 misera jam dudum perempta esset, nisi primus maritus  
 eam ex longinquo sustinuisset.

- 46) Pulchre hinc ait illustrissima GENLIS sexus sui decus:  
 „J'ai toujours remarqué, que, lorsque les gens sans édu-  
 cation de la classe du peuple, dont le caractère n'a pu être  
 modifié par l'usage du monde, éprouvent des vives sensa-  
 tions, ils les expriment par des démonstrations et une vé-  
 hémençe, qu'on ne trouve jamais parmi les personnes bien  
 élevées, toujours contenues par la raison et par un senti-  
 ment délicat de convenance“ (*Les Parvenus. Tom. III.*  
 3. édition. p. 78. Paris 1819).

aliorum morborum generis nervosi ex variis corporis humani partibus proficisci possunt, ex cerebro <sup>47)</sup> scilicet, medulla spinali <sup>48)</sup> et plexibus nervorum pectoris, abdominis et pelvis <sup>49)</sup>.

23. Monita circa *complicationes* aliorum morborum systematis nervosi tradita, et *spasmis* <sup>Spasmi complicati.</sup> quodant. Qui spasmi, dum sese in alios morbos <sup>50)</sup>,

Ccc 2

aut

47) ELLIOTSON in the lancet. Lond. 1830. Vol. 2. N. 350.

48) Fratres GRIFFIN in the Lond. m. and phys. j. 1830. March p. 207 et permulti, qui de irritatione spinali scripsere. Cfr. S. ANNAN in the Americ. j. of med. sc. 1837. Mai. p. 85 sq.

49) Hystericas interdum omnia graviditatis signa, praecipuis quae e systemate nervoso pullulant, et foetus motus immo sentire opuiari, nemini medicorum ignotum est. OASILA hunc statum „grossesse nerveuse“ nuncupat. Hujusmodi casum rariorem silentio praeterire nefas est. Hysterica nampe 48 annos nata et non amplius menstruata, paulo post cum filiam suam partum edere vidisset, ipsa dolores ex partu sentit: sanguinem emittit ex utero plures per dies, mammae tumescunt et fluidum lacti non abeile secerunt intra sex integros dies, quo facto omnia phaenomena disparent et valetudo redit (FICHON in journ. des progrès 1827. Vol. 6).

50) Sic in simplici coryza, apud hystericas, subsultus tendinum et delirium pluries observavi. Cum nobilissimae feminae quondam ab saevam tussim vesicatorium proposuerim, libenter me submittam, inquit, et spasmos, ut sub hujus auxillis usu semper experta sum, iterum habeo. Ac re quidem vera, quartâ ab applicito vesicatarie horâ, motus convulsivi, subsultus tendinum in conspectum venarunt. Inprimis medici, quorum materia medica fere unice ex pharmacis inter venena petitis constat, spasmos in morbis, quos curant, expectare debent.

aut in *convalescentiam* <sup>61)</sup> insinuant, nonnunquam statum rerum adeo complicatum inducunt, ut medico necdum canescente, si filum Ariadnes illico non inveniatur, revera condonandum sit.

## §. LXXIV.

*P r o g n o s i s.*

Genera-  
tim.

1. Spasmi generatim, malum non adeo periculosum, quam molestum sistunt. Molestum, inquam, aegrotis non modo, sed et illorum affinibus. Ens marito hystericæ infelicius vix reperiemus, nisi ille forte in varietate delectationem inveniat. Enimvero hystericæ unius nychthemeri curriculo vicissim tristes, serena, dura, placida, irascibilis, mansueta etc., decem et ultra seminarum diversarum characteres includit, quæ, ut diximus, varietas mares facile captat. In genere spasmi, quo magis tumultuarii, dummodo transitorii, eo magis salutare. Sicuti enim tempestates cum tonitru atmosphaeram, ita spasmi corpus humanum expurgare solent. Quod præcipue de spasmis morborum acutorum crisin comitantibus intelligendum est. Sic convulsiones variolarum quandoque expulsionem accelerant, et haud raro febrem solvunt <sup>1)</sup>. Verum aliquando et contrarium contingit. Viscera iterum iterumque a spasmis tentata, tandem in graviora incidunt mala; inter quæ jam SYDENHAM <sup>2)</sup> uteri hydropem locavit.

2. *Spas-*

61) SYDENHAM l. c. p. 422.

1) HIPPOCRATES aph. IV. 57.

2) L. c. p. 421.



2. *Spasmodorum traumaticorum* prognosis a Pr. spasmodorum traumaticorum, causa laedente, a loco laeso pendet. Laesiones traumaticorum, medullae oblongatae et cervicalis, plexusque solaris, maxime periculosas esse, notum est.

3. *Spasmi inflammatorii* saepe cujusdam sy- Pr. spasmodorum inflammatoriorum, stematis nervosi partis inflammationem praesagiunt, quod jam indicatam <sup>3)</sup> nonnullorum spasmodorum cum inflammationibus affinitatem clare ostendit. Eadem affinitas spasmodorum cum quibusdam haemorrhagiis, debito loco <sup>4)</sup> palam fiet. Hic meminisse sufficiat, multorum spasmodorum crisin in fluxu sanguinis spontaneo consistere.

4. *Spasmi*, qui ex vitiis abdominalibus pullulant, nisi plexui solari immediate infensi sint, aut male curentur, minus reliquis artis praesidia efudunt. Interea si diu durant, cerebrum, et uterus tam diu inde in consensum trahuntur, donec ipsa haec viscera dein in morbos idiopathicos conficiantur. Pr. spasmodorum gastrico-rum.

5. Affectiones spasmodicae vagae ex causa Pr. spasmodorum rheumaticorum, arthriticorum, etc. rheumatica ephemerae sunt, nisi in arthriticis locis obtineant, quo scilicet in casu, difficulter, atque si carcinomatici aut plicosi quid lateat, vix unquam eradicantur. Ipsa scirrhi aut plicae evolutio, non semper nervorum turbas compescit. *Spasmi indolis syphiliticae* debellata lue evanescent, vel nervei primitivi fiunt.

3) §. LXXIII. 7.

6. Qui

4) P. II. Vol. II. Sect. II. cap. XX.

Pr. spas-  
morum  
primitivo-  
rum.

6. Qui spasmi, ex *primitivo* scilicet *systema-  
tis nervosi* vitio orti, quod spectat ad periculum,  
omnium minoris momenti, quod vero ad curam  
attinet, difficillimi sunt. Praeterea diu neglecti  
aut male curati, tandem in morbos nervosos, quos  
antea solum aemulabantur, revera transeunt, e. c.  
in epilepsiam, maniam etc. Aliàs vero spasmi  
illi, citra omnem expectationem<sup>1)</sup>, inprimis vel  
contracto matrimonio, vel graviditate<sup>2)</sup>, vel ab-  
soluta partu<sup>3)</sup>, vel celebrata lactatione, vel mutata  
vitae ratione, sponte evanescent.

## §. LXXV.

C u r a.

Genera-  
tim.

1. Quaevis spasmorum species *duplicem me-  
dendi rationem* agnoscit, quarum altera paroxysmo,  
altera tempori libero, adaptanda. *Paroxysmo* ea  
pharmaca opponere solemus, quae in morbo, cujus  
scenam ille ludit, si indolis nervosae foret, indi-  
carentur. Generatim in auxiliis pharmaceuticis  
chirurgicis et diaeteticis eligendis semper *com-  
plicationum*<sup>1)</sup> memores sumus. Antequam vero  
ad

5) RÖDENBACH *Convulsionen durch Schreck geheilt*, in *Med.  
Ver.-Ztg.* 1837. N. 48.

6) De clavo hysterico scribit CONOLLY l. c. p. 166. „Wir  
haben ihn während der Schwangerschaft vollkommen ver-  
schwunden u. einige Monate nach der Entbindung wieder-  
kehren sehen.“

7) BLUFF *gynäkolog. Miscell.* in SIEBOLD *Journ.* 1833. Bd.  
13. St. 1.

1) Nullibi complicationes frequentius obveniunt quam in  
spasmi, praesertim in hysteria. Quo fit, ut saepius uno

## DE AFFECTIONIB. SPASMODIC. VAGIS. 775

ad ea confugiamus, num spasmi, quorum curam suscipimus, revera detrimentum asserant nec ne, probe determinamus, ne scilicet *salutaria naturae conamina* praepostere cohibeamus.

2. In *spasmis traumaticis* curandis, scopus C. spasmorum traumaticorum. proponitur, irritamentum locale vel auferendi vel leniendi, illius propagationi obstandi, sentiendi-que facultatem imminuendi. Quo pacto indicationibus hujuscemodi satisfaciendum sit, tum ex praeceptis generalibus <sup>2)</sup>, tum ex therapia epilepsiae et tetani traumatici <sup>3)</sup> elucet. Praeter curam topicam, in selecta pharmacorum ad illa respiciendum erit, quae specificè in nervos, irritamenti conductores, agunt.

3. In *spasmis inflammatoriis*, vigente paro- C. spasmorum inflammatoriorum. xysmo, ad *phlebotomiam* <sup>4)</sup> confugiendum est: — si aeger antea a methodo antiphlogistica non fuerit exhaustus, si venaesectionem habitualementer intermiserit, si morbus ex cohibito quodam profluvio cruento, menstruis videlicet, haemorrhoidibus, lochiis, ortum duxerit; si aeger vera plethora laboret, sique organon nobile vexetur. Pro varia illius sede, sanguis modo e brachio, modo e pede <sup>5)</sup> educitur, lateris nunc dextri, nunc sinistri.

eademque in aegro cura ab evacuatione sanguinis incipitur, deveniatur dein ad resolutantia, ac claudatur illa tandem tonicis.

2) P. II. ed. alt. Vol. I. Sect. 1. C. 1. §. VI. 17. 41.

3) C. XI. §. LVIII. N. 4. C. XIII. §. LXIX. 2.

4) CHIAPPA in OMODI *enn. univ. di med.* 1831.

5) M. v. WOLFF in L. LEO *Mag. f. Heilk. u. Naturwiss. in Pohlen. Warsch.* 1828. H. 4. p. 522.

stri. At vero cavendum, ne phlebotomiâ abutamur, et levamen temporaneum inde obtentum cum effectu salutari eoque constanti confundamus! Negari enim haud potest, venaesectionis reiteratum usum, praesertim si solum ob habitum floridum instituatur, systema nervosum temporis tractu magis magisque labefactare. Tutius hinc est, nisi phlebotomia clare indicatur, ad *hirudines*, vel prope loca congestionibus obnoxia, vel circa illa, e quibus quondam sanguis cum levamine fluere erat solitus, applicandas, confugere. Immo si congestiones sine omnibus plethorae generalis indiciis obveniant, et simplex *cruroris revulsio*<sup>6)</sup>, scilicet ope *cucurbitularum siccarum*<sup>7)</sup>, *semicupii*, *balneorum tepidorum pedis*, *clysterum emollientium* aliquando sufficit. Praeterea *foliorum digitalis purpureae* virtutem in spasmis cum motu abnormi cordis et arteriarum quotidie magis magisque celebramus; egregii enim huiusmodi pharmaci ope diros aequae ac rebelles spasmos, ex nervorum cardiacorum et plexuum pulmonalium irritatione emergentes, utque saepe post animi pathemata, praesertim moerorem occurrere solent, sedavimus<sup>8)</sup>. Accedit *elixirii acidi*

6) TROUSSHAU *üb. Compression d. Carotis bei Behandl. v. Convulsion.* nebst *Erklärung d. Wirkg. u. Indikat. für deren Anwend.* in *FRORIEP Notiz.* 1837. Bd. 4. N. 8.

7) Suadentur a BOIVIN et DUGÈS *tr. pratiq. des malad. de l'utérus et de ses annexes.* Par. 1833. T. 2. (c. c. ad abdomen et femur virginum hystericarum applicandae).

8) R. Foliorum digitalis purpureae drachmam semis. In-

*acidi Halleri* non diu continuandus usus<sup>9)</sup>. Tempore aestivo *aqua Selterana*, vel alia *gaz acidum carbonicum* evolvens, indicatur. *Nitratem potassae* systema nervosum admodum sensile respuere solet. Tandem, cum plurimi aegrorum, insultus tempore, auxilium aliquod momentaneum exposcant, ac pharmaca volatilia, quae aliàs sub paroxysmo exhiberi solent, excalefaciendo noceant<sup>10)</sup>, *aqua pruni lauro-cerasi* praesto est<sup>11)</sup>. Sunt qui *acidum hydrocyanicum* suadeant<sup>12)</sup>. Tem-

pore

funde c. s. q. aquae fontis fervidae. Stent in digestionē per horae dimidium. Colatura unciarum septem D. S. (pro adulto aegro) omni tertia hore unciam unam capiat.

9) Cum remedium, de quo agitur, palato gratum sit ac aegrotis saepe conducatur, contingit haud raro, ut ipsi, vel inscio medico, per menses et annos in illius usu continent, ex quo gravia ventriculi et renum incommoda orta vidi. Porro si elixirium acidum Halleri per se praescribatur, pluries contingit, ut aegri, spasmodorum tempore, illud cum aliis guttis antispasmodicis confundentes, quia diffluat sumant, os, fauciumque cavitatem comburant. Nec satis, saepe lugens elixirium acidum Halleri continens, sub itineribus frangitur, lintea vestesque vicinas erodit. Ex quibus omnibus colligitur, medicum, hoc in pharmaco praescribendo, cautissimum esse debere. Debet etiam post illius usum os aqua tepida ablui, ne dentes ex acido detrimentum capiant. Cfr. DÜRLING in *Allenb. med. Annal.* 1804. Mai.

10) De damno remediorum calefacientium ista sub rerum positione lege RODERICUM A CASTRO de morbis mulier. L. II. LUDOV. MERCATEN L. II. de morbis uteri C. III. et FR. HOFFMANNUM L. c. C. V. cautel. et monit. pract. §. I.

11) Adulto, a guttis decem ad drachmam semis pro dosi.

12) HENNING in HUFELAND *Journ.* 1821. St. 10. G. HAY-

*pore* a spasmis *libero* morbus praesertim regimine dietetico, quale in diathesi inflammatoria generatim requiritur, radicatus evellendus. Potus coctae, theae viridis et liquorum fermentatorum severe interdicendus, atque illius loco, *aqua fontana* naturali frigiditate, praesertim absoluto digestionis negotio, copiose haurienda commendari debet. Porro decubitus in lecto ita indicandus, ut cruoris in partem congestionibus obnoxiam influxus impediatur. Anni tempore favente, nisi congestionum circa cor et pulmones obstet periculum, *balnea fluvialia*<sup>13)</sup>, *lacus*, et *praecipue marina*<sup>14)</sup>, scopo sanguinis aestum temperandi, nervorum systema corroborandi, ac debitum inter arterias, venas et nervos aequilibrium instituendi, omnia, quae noscimus, auxilia antecellunt<sup>15)</sup>.

#### 4. Spasmi

WARD ex *N. bibl. méd. Par.* 1829. *Sptbr.* in BREHEND *Journ.* I. p. 69. H. F. A. KALLMANN *disq. de acidi borici usu in spasm. ex perversa syst. sexual. functione exort.* Berol. 1825. J. SCHNEIDER in HENKE *Zeitschr. f. d. Staatsarzneik.* 1830. II. 4. p. 269. 270. (git. ij. Spir. mur. aether. vel Tinct. Valerianae aether. 3ß. Guttal. 20 — 30. sumend.).

13) *Ueb. d. Wirkg. d. Kälte in d. Hysterie*, in FROBIEP *Notiz.* 1830. Bd. 26. N. 17.

14) VOGEL in HUFELAND *Journ.* 1820. St. 9. 1821. St. 3. (Dobberana). MIQUEL in *gaz. méd. de Par.* 1825. N. 23. A. ASSEROND, *manuel des bains de mer etc.* Par. 1825. CHABRON DE MONTAUX l. c. BASACH l. c. p. 401.

15) De diris convolutionibus (in virgine 17 annorum post terrorem exortis) balneo frigido (petienter et longo

4. *Spasmi ex ingluvie*, nulla obstante contraindicatione, *emetin*<sup>16)</sup>, praecipue ope radiceis *cephælidis ipecacuanhæ*<sup>17)</sup> excitatam, poscunt. „Eo magis et necessarius et fructuosus est emetici usus, ait FR. HOFFMANNUS<sup>18)</sup>, si morbus sit

C. spas-  
morum  
gastrico-  
rum.

re-

tempore adhibito) sanctis refert CHR. AYG. HAUNES (N. act. phys. med. N. C. T. IV. obs. 99). Consuluerat haec medicus alter aplepsia curationis huius exemplis celebris. Addit HAUNES: „noveram usum externum aquae frigidae ad epilepsiam a Caes. Aureliano et Celso commendatum fuisse, — Joann. Floyerum casum referre hominis, usu balnei a chorea St. Viti liberati, — Whyttium adversus hunc morbum balneum frigidum laudasse, — utque Meadum affirmare, sibi nunquam difficile fuisse frequentibus in aquam frigidam demersionibus morbum hunc penitus dissipare.“ Cfr. SINBOLD Journ. 1826. Bd. 8. p. 842 (curatio hysterica felicitate perfecta ope aquae frigidae, externe adhibitae). Tournon in FROBIEF Notiz. N. 567. p. 372. BALLY in Journ. analyt. de méd. 1829. Spébr. GRAYES in BEHREND Journalist. 1832. Mai. p. 170. DEL CRIAPPA in OMIDDI ann. univ. di med. 1831 (clysmate ex aqua frigida et glaciali paroxysmus hystericus extemplo mitigatur).

- 16) SUFFERT *Kraft des Brechmittels z. Heil. period. Krämpfe*, ex *Miscell. praeus. Aerat. a. d. ½ jäh. Sanitätsber.* in HUFELAND Journ. 1829. St. 9. J. D. DEAN in the *Americ. m. record*, etc. Philad. 1821. Vol. 4. J. M. SMITH ex *med. and phys. j. N.* 21. in *Samml. auserles. Abh. f. pr. Ärzte*. 1828. Bd. 11. St. 2. p. 532. J. C. W. DYER ex the *Lond. m. and s. j.* 1833. Vol. 4. N. 84. in SCHNIDT *Jahrb.* 1834. Bd. 1. p. 49.

- 17) J. MANON in the *Lond. m. and phys. j.* 1819. Octbr. Vol. 42.

- 18) l. c. §. IV.

recenset aegri adhuc de nausea, cardialgia, praecordiorum anxietate, atque vomendi conatu conqueruntur; claro documento, morbi fontem maxima adhuc parte in ventriculo haerere.<sup>19)</sup> Serius, aut dubia emetici indicatione, ad purgantia deveniendum. Maxime hic sese commendat *tinctura rhei aquosa cum aqua menthae*<sup>20)</sup>. Latentibus simul haemorrhoidibus, — *electuarium lenitivum*. Si tubus intestinalis valde sensibilis allata auxilia respueret, — *calomel*<sup>21)</sup>. Cave autem a continuo hujus pharmaci usu, nam hystericae mercurialia aegre ferunt. Idem de purgantibus dicendum, dum alvum liquidam cient. Tutius plerumque *clysters emollientes*<sup>22)</sup> quandoque *Kaempfsiani*<sup>23)</sup> ministrantur. Si spasmi gastrici aestum socium habent, *citras potassae* conducit<sup>24)</sup>. Leviori in morbo *aqua fontis saccharata*, auxili-

19) Judaeae Lithuanse, systemate nervoso sat excitabili praeditae, ac victu crudo, caseo scilicet, halacibus, carne frigida nutritae, spasmos gastricos saepe patiuntur, a quibus indicato pharmaco veluti per incantamentum liberari solent.

20) e. c. a granis quinque, ad grana decem, pro una dosi, yix amplius repetenda.

21) „'Tis observable that some hysteric women cannot bear the gentlest purgatives or clysters, but are seized with a lowness of spirits as often as they have only a single loose stool.“ Not. ad SYDENHAM l. c. p. 426.

22) Cfr. P. III. Vol. I. Sect. 2. cap. de obstructionibus hepatis.

23) R. Subcarbonatis potassae scrupulos duos. Saturantur e. s. q. succi citri recentis. Adde aquae cerasorum vel rubi idaei uncias septem. Syrupi citri unciam semis.



lium domesticum Gallis familiare <sup>24)</sup>). Acidis primarum viarum lapides cancerorum, magnesia, additis guttis nonnullis olei essentialis anisi vel foeniculi, — ac vermibus intestinalibus extractum tanacetii, pulvis seminum santonici, oleum terebinthinae etc. <sup>25)</sup> opponuntur. Spasmi ex hepatis laesa functione, imprimis praegressa ira aut moerore pullulantibus, pulvis antispasmodicus ruber *Stahlii* aliis pharmacis palmam eripit <sup>26)</sup>. Si vero regio epigastrica valde sensibilis esset, ex indicato pulvere nitras potassae omittenda foret. Praeterea pulvis antispasmodicus ruber ob cinnabarim, quam continet, in hominibus proclivitatem ad diathesin scorbuticam exhibentibus, vix aut ne vix quidem praescribi potest. Generatim non nisi caute illius usus diuturnus locum habere potest <sup>27)</sup>. Nihilominus dum spasmi ex obstructioni-

Cap. cochlearum. — Praeterea liquor kali carbonici a GRAP (chem. pharmaz.-klin. Tab. München 1814.) valde commendatur, ut kali hydrocyanicum a POINTE (in compte rendu des trav. de la soc. de méd. de Lyon per A. DUPASQUIER Lyon, 1837).

24) Eau sucrée.

25) Cort. rad. punie, granator. HRYFELDER Beitr. z. Kenntniss d. Wirksamk. der friischen Granatwurzelrinde gegen d. Bandwurm, in HUPFLAND Journ. 1838. St. 6. obs. II. Fortasse huc etiam pertinet sanatio hystericæ inveteratae illo remedio peracta a BERTHOLD in CASPER Wochenschr. 1834. N. 21.

26) A granis decem ad viginti pro dosi cum aequali sacchari parte.

27) Ex uncis tribus pulveris antispasmodici rubri, spatio

## 762 DE AFFECTIONIB. SPASMODIC. VAGIS.

ctionibus imi ventris, praesertim in scrophulosis, haemorrhoidariis urgent, ad ipsam curam radicalem obtinendam et extra tempus paroxysmi per mensis curriculum omni vesperi dosin indicati pulveris exhibere solemus; postridie mane unciam unam cum dimidio *mellaginis graminis*<sup>28</sup>), tribus vicibus sumendam, propinando. Tempore vernali, aut aestivo aegrotus cyathum vel aquae selteranae, vel seri lactis dulcis (si ventriculus id ferat) mellaginis unicuique dosi superbibit. Simpli-  
cissima ista methodo, aliquando usu *saponis terebinthinati*<sup>29</sup>) suffulta, quovis anno permultos aegros spasmis abdominalibus obnoxios, prius per annorum curriculum quassia, cortice, asa foetida, aethere, aliisque sic dictis remediis antispasmodicis (hic meherele potius ad spasmos excitandos quam sanandos idoneis) a medicorum vulgo incassum curatos, adjuvante Numine, prosperae restituimus valetudini. Idem effectus, majoris etiam certitudinis, per *fontes minerales resolventes salinos*<sup>30</sup>),

prae-

nouuulorum mensium sumti, exentheme mercuriale conspexi.

28) Extractum gremiae liquidum. Curandum, ut omni empyreumate expers, et debitis cautelis paretur.

29) Vulgo: *sapo Starkeyanus*.

30) P. I. ed. ult. Vol. I. S. 2. C. VI. §. XXXVIII. 27 (32.)

STURM *Gesell. einig. Krankh.* (spasmi univers. et duae hysteriae), bei welchen sich das Hermannsbad bei Muskau heilsam erwies, in RUST, *Mag.* 1828. Bd. 26. H. 1. p. 31. ZIEGLER *die Brunnen- u. Molkenkur zu Salzbr.* in HUF-  
LAND *Journ.* 1830. St. 3. p. 93. CHAMBERLAIN DE MONTAUX  
l. c. (*Amisia et Kissingium*). WHEIGLIN in *Österr.*  
*med. Jahrb.* 1840. Bd. 30. St. 4. p. 569. (*Saidschütz*).

## DE AFFECTIONIB. SPASMODIC. VAGIS. 783

praecipue Carolinenses <sup>31)</sup> obtinetur. Auxiliorum istiusmodi sub administratione, sunt diaeta selecta, ex carnibus albis et vegetabilibus non flatulentis, vigiliae, animi pathemata ingrata et venus ad Garamantes relegatae et exercitium corporis modicum. Quodsi absoluta cura spasmodorum ex vitio abdominali pullulantium, primarum viarum atonia relinqueretur, lenibus amaricantibus, e. c. *extractis cardui benedicti, achilleae millefolii, aquis martialibus* locus foret. Cave vero, ne effectum, quem methodo illa obtinuisti, hac iterum destruas, et perfectionem curae quaerendo, adagii: optimum est bono contrarium, recordaberis.

5. Spasmi a causa *rheumatica* aut *arthritica* excitatis, aegrum lecto decumbere oportet, non neglectis *frictionibus* corporis cum pannis laneis *subfumigio* quodam aromatico, e. c. *succini, mastichis, benzoes, styracis* imbuti. Potui *infusum* subcalidum *florum tiliae, sambuci, salviae, melissae* inserviet. Multis *balneum tepidum* conducit. Quibus singulis, si aestus febrilis praesto sit, locus non est, quo scilicet methodus adversus spasmos inflammatorios commendata <sup>32)</sup> in usum ducenda. Si spasmi adhuc urgerent, *pulvis Doveri* exhibetur. Quondam *antimonium diaphoreticum* in usu erat <sup>33)</sup>. In morbo graviore aut latente

C. spasmodorum rheumaticorum, arthriticorum, etc.

31) FLENNING *Nutz. des künstl. Karleb. Neubr. u. Sprudels, geg. ein mit Krämpfen complicirt. materiell. Uterinkiden*, in HUFELAND *Journ.* 1830. St. 9. FLECKLES et BARACH II. cc.

32) N. 3.

33) FR. HOFFMANN I. c.

latente *metastasi*, ut spasmorum causea, *sinapismo*, *vesicatorio*, frictione cum *unguento ex tartaro emetico*, *fonticulis*<sup>34)</sup>, aliisque *ulceribus artificialibus*, sed in certis duntaxat reservatis casibus<sup>35)</sup>, et nunquam cutis formositati praeposere injuriam inferendo<sup>36)</sup>, uti licet. Praeterea in *arthriticis* ad *balnea sulphurea*, *pediluvia acriora*, *decoctum stipitum solani dulcamarae* aliaque hujus indolis pharmaca confugiendum est<sup>37)</sup>. Spasmis ex diathesi *carcinomatica*, *plicosa*, *syphilitica*, *scorbutica* pullulantibus methodus specifica opponitur. Palliativa medendi ratio, curae spasmorum, qui ex vitio primitivo systematis nervosi proficiuntur, similis est.

C. spasmorum  
primitivorum.

6. Consistit autem ea in administratione *remediorum* proprie *antispasmodicorum*, nec non in congruo *regimine*. Inter pharmaca illa eliguntur, quae tum sensibilitati aegrorum, tum loco affecto, tum symptomatibus, maxime vigente paroxysmo urgentibus, accommodata sunt. Summus sensibilitatis

34) BURE DE HUPBLAND *Journ.* 1815. St. 7. (hysteria plene anata).

35) Sunt Fa. HOFFMANNI verba (l. c. Cautel. §. 3), a medicis aegros, ita in spasmis transitoriis, sicuti in epilepsia aut alio gravi morbo solum liceret, excruciantibus, probe retinenda.

36) Medicis pluries irascebar, observando, quod, necessitate id non plane exposcente in cuti tenera candidaque seminarum, et quidem ad loca obvia, foedas cicatrices excitaverint.

37) TH. RAVEN (*the Lond. m. and phys. j.* 1817. Jan. Vol. 37) *tinctura colchici* cum successu usus est.

litatis gradus aliquando nil nisi *emulsiones* admittit, inter quas *emulsio quatuor seminum frigidorum majorum et minorum* excellit. Si uterus praecipue patiat, indicatis seminibus illa *hyoscyami nigri* addimus<sup>38)</sup>. Spasms magis debilitatis quam nimiae sensibilitatis notas exhibentibus, imprimis si eos *lipothymiae*, *ractus*, *constipatioque faucium* comitantur, maxime *liquor anodynus mineralis Hoffmanni* indicatur; quod pharmacum, dummodo rite et cum peculiari solertia secundum mentem inventoris paretur, omnibus aetherum speciebus, quibus hodierna chemia gloriatur, longe anteponimus. Quodsi inter aetheres unum alterumve eligere deberemus, *aceticum et muriaticum* praeferremus. Gravidae optime *spiritum nitri dulcem* ferunt. In spasms vetularum *tinctura castorei*, aut, si ipsae alcohol perferre nequeant, illius pulverem magni facimus. Ita *tincturae castorei cum liquore anodyno minerali Hoffmanni* connubium discipulis nostris sub nomine *guttarum antihystericarum* notum<sup>39)</sup>. Efficax quoque eiusdem generis remedium ex connubio *tincturae radice valerianae, corticum aurantium, castorei et aethere sulphurico*, emergit<sup>40)</sup>.

Mo-

38) A granis decem ad triginta ad libram unam emulsionis.

39) Partes aequales, ut aegrote tempore spasmodum guttas quinddecim capiat.

40) R. Tincturae valerianae, — corticis aurantium ʒʒ unciam semis. — Castorei drachm. duas, aetheris sulphurici Frank Prox. II. 1. 2. 1.

Ddd

*Moschus*, in spasmis infantum sacra anchora, — hystericis vix unquam conducit. Arrident illis inagis pharmaca foetida, ut, *spiritus cornu cervi succinatus* et *asa foetida*, de qua infra. *Camphora* <sup>41)</sup>, praesertim in spasmis ex affectione systematis nervosi partium genitalium pullulanti- bus, minimis tamen dosibus, utimur. Quoties vero agitur de cohibendo terribili quodam sym- ptomate, ut dolore intolerabili, vomitu aut diar- rhoea effreni, convulsionibus toties, saltem pro tempore ad *opium*, generatim hystericis no- cuum <sup>42)</sup>, confugimus <sup>43)</sup>. Magna vero inter varia hujus pharmaci praeparata differentia ob- servatur, ita ut aegrotis nonnullis *opium purum*, aliis illius *extractum aquosum*, aliis *laudanum liqui-*

rici drachmam semis. M. D. S. Cap. cochl. coffeanum tempore spasmodorum.

41) TOURTEL in HUFELAND Journ. 1813. St. 5. (in spirit. sulphur. - aeth. soluta). GUERSANT in Encyclop. d. med. Wissensch. nach d. Dict. de méd. frei bearb. v. F. L. MEISSNER. Lpz. 1830. Bd. 2. p. 457.

42) „Yet we often meet with patients who receive more hurt than benefit from it.“ WHITT l. c. p. 614.

43) „But as the pain, vomiting and purging are sometimes so violent, that they cannot safely be neglected.... we are to disregard the cause for a time, and begin the cure by quieting the symptoms, for that purpose exhibiting an opiate.“ — SYDENHAM l. c. p. 425. — J. M. SMITH in Samml. auserles. Abh. f. pr. A. 1828. Bd. II. p. 330. HUFELAND Journ. 1829. St. 6. p. 1. (cum castoreo con- junctum). LUCAS in the Lancet. Lond. 1831. (doses enor- mes cum fructu se propinasse gloriatur).

*liquidum Sydenhami*, aliis *acetas morphii* <sup>44)</sup> aliisque, et quidem non paucis, *theriaca veneta* <sup>45)</sup> magis conducatur. Sub deterrimo rerum statu e. c. sopore, lipothymiis, mira aliquando est virtus *subfumigiorum foetidorum* <sup>46)</sup>. Ad paroxysmum spasmodorum mitiorum debellandum saepe *infusum florum matricariae, chamomillae, herbae menthae, melissae, rutae* eorumque *aquae destillatae* sufficiunt. Commendantur etiam *herba senecionis vulgaris* <sup>47)</sup>, *indigoferae tinctoriae* <sup>48)</sup>, *mikoniae guaconis* <sup>49)</sup>, *meliae azedirachtae* <sup>50)</sup>, *radix artemisiae vulgaris* <sup>51)</sup> etc. <sup>52)</sup>. Si plexus nervorum

Ddd 2 car-

44) RICHTER in *Rust Magaz.* 1830. *Bd.* 32. *H.* 3. (externa).

45) „Is an excellent remedy in this disease“ — how much soever 'tis condemn'd by most persons, because 'tis common and of ancient date.“ SYDENHAM l. c. p. 440. (Dosis a scrupulo uno ad drachmam semis unica vice haurienda).

46) HOFFMANN l. c. Theses therapeut. §. 3.

47) FINAZZI in *FRONIER Notiz.* *Bd.* 7. *N.* 12. OMODI ann. univ. di med. 1831. *Lugl.* p. 78.

48) GROSSHEIM in *med. Ver.-Ztg.* 1833. *N.* 51. STRAHL in *GRÄFE u. W. Journ.* 1834. *Bd.* 22. *H.* 1. (indat contra hysteriam). ROTH in *HECKER Annal.* *Bd.* 1. *H.* 1. v. STAHL in *Tidskr. för Läkare och Pharm. Utgiv. af RONANDER och MOSANDER.* *Stockh.* 1836. M. HUSS in *SCHNIDT Jahrb.* 1837. *Bd.* 15. p. 73.

49) OTTO in *CASPER Wochenschr.* 1835. *N.* 11. (plantae succi expressi cochlear mane et vespere capiendum).

50) G. SKIPTON ex *Transact. of the med. soc. of Calcut.* Vol. 1. in *N. Samml. auserl. Abh. f. pr. A.* 1827. *Bd.* 10. *St.* 1. p. 180. (remedium anthystericum Calcuttae usitatissimum).

51) R. FRANK et HEUN ex *Erfahr. u. d. ½jähr. Sanitätsber.*

cardiacorum valde afficiantur, ut monimus<sup>33</sup>), folia *digitalis purpureae* et *aqua laurocerasi*, ali- quando *extractum lactucae virosae*<sup>34</sup>) potiora sunt auxilia. Ita affecto plexu coeliaco *oxydum bis- muthi*, illudque *zinci*<sup>35</sup>), nec non *cuprum ammo- niacale*.

- in HUFELAND Journ. 1827. St. 9. KAMINSKY in RUST Magaz. 1832. Bd. 37. H. 1. BIERMANN in HUFELAND Journ. 1834. St. 3. WEIGLEIN in Österr. med. Jahrb. 1840. Bd. 30. St. 4. p. 568. (levamen attulit).
- 52) Cortex *Litsaeae citratae*: BRANDES Archiv. Lemgo 1827. H. 3. — *Belladonna*: PICKS ex Revue méd. N. 531. in FRO- RIER Notiz. 1829. Bd. 25. N. 13. (unguentum bell. in ute- rum illinit). H. AUTENRIETH in Med. Conv.-Bl. 1830. N. 17. (bell. adversus hyst.) — *Tinctura chenopodii vul- variae*: Heidelb. klin. Ann. 1831. Bd. 7. H. 2. (git. 20 — 40. omni bihor) — *Terebinthina*: ELLIOTSON, BATTLEBY, BEHRND Journalist 1831. Dezbr. p. 305. — *Scutellaria lateriflora*: ex Boston journ. Vol. 11. N. 19. in SCHMIDT Jahrb. 1836. Bd. 10. p. 152. — *Veratrum*: EBERS in MÜLLER Archiv. 1835. H. 4. F. A. FORCKE phys.-therap. Untersuch. üb. d. *Veratr.* Hannov. 1837. (externs in hy- steric. sine materio). — *Flor. pruni padis*: KURNER in Würtemb. med. Corr.-Bl. Bd. 9. N. 3. LEHKÜCHNER, l. c. — *Argentum nitricum*: H. C. LOMBARD in Gaz. m. de Par. 1832. Août. R. J. GRAVES in Journ. of m. and chem. sc. 1833. Mai. TINELLI l. c. p. 57.

53) N. 3.

54) et *sativae*: BANG in N. act. soc. m. Haun. 1829. T. 3. (histor. duae).

55) *Zincum hydrocyanicum* laudatur a KÜRST in LEO Magaz. f. Heilk... in Pohlen. Warsch. 1829. St. 4. p. 600. KŁOKOW in HUFELAND Journ. 1829. St. 8. p. 112. 1830. St. 2 p. 125. (gr.  $\frac{1}{16}$  —  $\frac{1}{2}$  p. d.). Gesellsch. d. Aerzte des K. Aargau, 2. Quart. in Verhandl. d. ver. ärztl. Gesellsch. d. Schweiz. Zür. 1829. (omni trihor. gr. j — jß.).



*nicole*. Interea ut istiusmodi pharmaca virtutem exserant, tempore indigent, qua de caussa minus paroxysmis quam *intervallis liberis* accommodata sunt. Hic nempe novus medendi sese exhibet campus. Quin enim aegroti pharmacorum faragine obruantur, scopo nervorum sensibilitatem obtundendi illosque nec non universum corpus a partu, haemorrhagiis, fluore albo, exhaustum roborandi, varia prudenti manu usurpare licet pharmaca, at diu continuanda. Spectant huc *tinctura stomachica Whyttii* <sup>56)</sup>, *elixir balsamicum stomachicum temperativum Hoffmanni* <sup>57)</sup>, *mars*, ac illius praeparata <sup>58)</sup>, *carbonas ferri* <sup>59)</sup>, *tinctura martis pomata* <sup>60)</sup>, *tinctura Bestuscheffii* <sup>61)</sup>, *tinctura*

56) P. II. ed. alt. Vol. I. Sect. 1. C. 1. §. VI. 31. (58.).

57) R. Extracti absinthii, cardui benedicti, centaurei minoris, gentianae, aa unciam unam. Flevedinis corticum aurantium amarorum, ab omni albedine mundatorum, uncias quatuor. Affunde vini Hungarici optimi libras duas, spiritus corticum aurantium rectificati, uncias duas. Stent per triduum infusa in digestionem, postea filtrata reponantur. Dosis a drachma una ad drachmas duas.

58) Martem omnibus praeparatis anteponit SYDENHAM haec memorabilia proferens verbe: „For officious chemists rather lessen than improve the virtues of this and other excellent medecines by their method of preparing them.“ l. c. p. 427.

59) A granis tribus ad sex, ter de die. HACKEN l. c.

60) Ter de die a guttis decem ad triginta. Superbibetar, si placet, cyathus aquae Selteranae.

61) Vidi ibi conduxisse, ubi reliqua mercuria nil praestiterant. Dosis a guttis decem ad viginti bis terve de die.

*ctura ferri acetici aetherea Klaprothii* <sup>62)</sup>, *vinum chalybeatum Fulleri* <sup>63)</sup>, et maxime *aquae chalybeatae* <sup>64)</sup>, porro *vina medicata* <sup>65)</sup>, *viscus quercinus*, *prunus padus* et *cortex cinchonae*. Conducit praesertim sub forma *infusi frigidi*, dummodo complicatio desit haemorrhoidalis. SYDENHAM corticem in pulvere mane et vespere ad scrupulum unum, praesertim aegrotis, qui convulsionibus, sub quorum curriculo pectus percutiebant, obnoxii erant, porrigebat <sup>66)</sup>. Accedit Fa. HORMANN, qui tamen sub hac ipsa circiter rerum positione aliud pharmacum laudat, quod nostro seculo philosophico jam praescribere puderet, *lumbricos* scilicet *terrestres* vel in pulvere vel in succo datos, aiens: „quippe qui *specificam* fere in sopiendis motibus hisce spasmodicis vagis obtinent

vir-

62) Dosis similis illi tincturae *Bestuscheffi*.

63) R. Limaturae chalybis unciam unam. Succī aurantium acidorum Nro. quatuor: dein adde vini albi libras duas. Cinnamomi acuti drachmas duas, caryophyllorum drachmam unam. Macia scrupulos duos. Stent iterum tepide per quatuor dies. Bis de die duo cochlearia colesana.

64) P. I. ed. alt. Vol. I. S. 2. C. VI. §. XXXVIII. 33. (44.). Addimus F. STIRSA v. STIRBITZ in *Österr. Med. Jahrb. neueste Folge. Bd. I. St. 3. p. 115. hist. 18. p. 117. hist. 20. (fontem Krynicensch).* CHABRON DE MONTAUX l. c. (*Eger*). CASPER *Wochenschr.* 1833. N. 41. A. Ch. BRÜCK in *Hufeland Journ.* 1833. St. 3. p. 72. (*Driburg.*). WIGLEIN l. c. p. 567 (*Töbal*). Et tales aquae artefactae: MÜLLER in *Med. Corresp.-Bl.* 1832. N. 8.

65) P. II. ed. alt. Vol. I. Sect. 1. C. I. §. VI. N. 31. (65.).

66) l. c. p. 442.

virtutem“ 67).“ Familiares sunt *gummi resinae*, quarum plurimae in *pilulis antihystericis*, revera commendandis, continentur 68). Quibus singulis pharmacis internis, si pro re nata, tum sub paroxysmo tum extra illum, addas *balnea cum herbis aromaticis*, aut cum *globulis martialibus*, *clysteres* 69) *asae foetidae*; *injectiones anodynas* in *vaginam* 70), *pessaria* 71), *odoramenta et subfumi-  
gia* 72), *epithemata* 73), *unctiones* 74), *frictiones* 75), *emplastra* 76), — materia tua medica, respectu  
auxi-

67) l. o. §. VIII.

68) R. Galbani optimi, asae foetidae, myrrhae electae, aa drachmas duas, castorei drachmam unam, extracti chemo-  
millee unciam semis. Essentiae croci quantum satis. M.  
f. massa pilularum et formetur inde pilulae granorum  
trium. Consurgantur pulvere radice ireos florantiae D.  
S. Cap. bis terre de die N. quinque.

69) *Ammoniac*: MARBOTTIN ex Journ. univ. et hebdom. T.  
6. N. 67. in HAEKEL Summarium etc. Lips. 1832. Bd. 1.  
p. 89.

70) P. II, ed. alt. Vol. I. Sect. I. C. VI. §. VI. N. 43.

71) Dnm scilicet prolapsus uteri spasmos excitant.

72) l. c. N. 45. (76.).

73) l. c. N. 50.

74) „Saepius cit Fa. HOFFMANNUS (op. c. C. III. §. 8.)  
etiā mali vehementia requirit, ut externis linimentis ano-  
dynis atrocas motus paullo consopiamus; quo reliquorum  
remediorum vis eo melior evadat. Inter ea deprehendi  
praestantissimum, quod sic ea habet. R. Axungiae hu-  
manae (!), olei nucis aa unciam semis, olei hyoscyami  
drachmam unam, balsami peruvianii, croci aa drachmem  
semis, olei ligni Rhodii, lavendulae, ratae, majoranae aa  
gutt. decem. M. D. Hoc linimentum ad tempora, cer-  
vicam, spinam dorsi applicare convenit.

75) l. o. N. 51.

76) l. a. N. 52.

auxiliorum antihysteriicorum, sat ampla *Electricitatis et magnetismi animalis* ??), hic perientia destituti, mentionem non injeci. Forte illius gratia *res corpori appensae* ??) quando spasmos anteverunt. Interea nec dubiae adhuc actionis auxiliis, nec pharmaco cura hysteriae nimis fidendum, et maximè *regimen diacteticum* respiciendum. Convenit smis ex vitio primitivo systematis nervosi, iter caussarum fugam ??), *diacta lactea* 80),

nun

77) MANDT in HUFELAND *Journ.* 1826. St. 11. (spasmi remissiones perspicuas effecit). J. HEINECKEN *Beob. u. Erfahr. auf d. Felde d. pr. Heilk.* Bremen 1832. BREYER *Gesch. ein. durch magnetism. animal. sponta geheilt. krampfhaft. Krankh.* in HUFELAND *Journ.* St. 7.

78) l. c. N. 54. Sacculum, sulphur continens, sub lecti locum, comitissam D\*\* Viadobonensem a surarum, cui obnoxia erat, liberavit. Idem malum sulphurato (TRAUTSCH in CLARUS u. RADIUS *Med. Beitr.* Bd. 3. N. 8.) et subere (STEIN in *Berlin Centralztg.* 1838. N. 15.) suram circumligato fugatu — LEHRKÜCHNER l. c. (amuleto ex Flor. Chamom., Rut., Gi. Az. foet., Fol. Aurant., Rad. Valer., Flor. 3j., Camphor. trit. gr. X., finiss. pulverat., ad regionem applicato hystericism atrocissimam mitigav

79) E. c. virgo 16 annorum spasms, quibus et quotque oculos in rem novam conjecerat, multo vehementius cruciabatur, eo plane liberata est, quod oculi aegri ligabantur. Ex *decadas de med. y cyrurg. prat.* T. 5. in HUCKER *lit. Annal.* 1828. Novbr.

80) „Some women (which may seem stranger at first) have been cured of long and obstinate hysteric di

num <sup>81)</sup>, equitatio <sup>82)</sup>, itinera <sup>83)</sup>, consortium <sup>84)</sup>, conjugium <sup>85)</sup> aliaque jam alibi abunde indicata <sup>86)</sup>. Tandem hystericæ monendæ sunt, ne mulierculis vetulis, et agyrtis, qui arcana, elixiria, aliaque huius generis pharmaca jactant, aurem praebeant.

*which had baffled all the endeavours of the physicians, by living on milk only for some time.*“ l. c. p. 442.

81) AIT CELSUS (De med. L. I. C. 8.). „Si quis vero stomacho laborat, non aquam, sed vinum calidum bibere jejunos debet.“ — Hystericæ nostræ vix vinum jejuno ventriculo, at potius ad finem prandii, circa bellaria, sustineant, ac maxime illis conducunt vina Lunelle, muscat etc.

82) SYDENHAM l. c. p. 421. Feminae, vitæ sedentariæ addictæ, *gradatim* equitationi adnescere debent.

83) FR. HOFFMANN l. c. §. IX. GILCHRIST *Treatise on the use of voyages in medicine.*

84) *Peter magnus*, quæ ex causa nescimus, convulsionibus affectus fuit rebellibus, quas hac methodo removerunt. Adducebant nempe imperatori convulsivo aut imperatricem aut, ea absente, virginem quampiam juvenem et suavem enimque alloquentem: „hic adsum quacum tibi colloquendum erit.“ Alterutra consorte et sola cum imperatore is ad se redibat, convulsionibus fugientibus.

85) HIPPOCRATES libro de virgin. morbis. C. S. VALESCUS DE TARANT. philon. pharm. L. VI. C. 10. DUBETUS in enarratione ad C. LIX. HOLLERII. ZACUTUS LUSITANUS prax. med. admirand. obs. 91. FR. HOFFMANN. Op. cit. C. V. §. IX.

86) P. II. ed. alt. Vol. I. Sect. I. C. XVII. §. LXXVII. 2. 3.



Турисъ Ф. В. Виссманни: Lipsiae.

## In bibliopolio Kuehniano prodierunt:

- Auszug eines Briefes, die Illuminaten betreffend ohne Einwilligung des Schreibers, aber in der redlichsten Absicht, den Druck befördert v. s. Freunde. 8. 2 Gr.
- Geschichte, geheime, der Liebhaber der Fürsten. 2 Theile. 1 Thlr. 12 Gr.
- — — Darstellung d. polit. Revolut. in ihren nähern und entfernt. Ursachen entwick. v. ein. Vetter des Hippolit. e. Lapid. 8. 12 Gr.
- Grut Ernst, Cramutius Cordus, oder über die Büchercher 18 Gr.
- Marx — — —, die vier Menschenalter; ein Unterhaltungsbuch für Kinder von 6 bis 10 Jahren. Mit illum. Kupf. 1tes bis 3tes Bündchen, welche das kindliche, jugendliche, männliche Alter enthalten. 12. gebunden, jedes 1 Thlr. 6 Gr.
- Philomale, oder Victor und Metallens Gespräche über die Strickkunst und ihre Gränzen, und über neue Bilderschriften und Hieroglyphen. Ein Beitrag zur Reinigung des Geschmacks in der Stickerei. Für die schöne Welt und für jeden Freund der Kunst. 1 Heft mit 4 illum. Kupfern. 4. 1 Thlr.
- Poetae minores Graeci. Praecipua lection. variat. et indicib. locupletiss. instrux. Th. Gaisford. Ed. nova, F. V. Reiffii annotet. in Hesiodum, E. H. Barkeri epistolis criticis, plur. post. fragment. aliisque accessionib. aucta. V Voll. 8. maj. 11 Thlr. Charta script. 14 Thlr. 16 Gr.
- Prasse, Meur. de, Institutiones analyt. 4. broch. 5 Thlr. 12 Gr.
- Rauss, C. F., Sammlung versch. vorzügl. allgem. anwand. Anordnungen und Anstalten etc. Th. 1. 8. 20 Gr. Th. 2. 16 Gr.
- Riedal's, Joh. Gll., gründl. Unterricht v. d. Gebrauche der Bonsole in der prakt. Geometrie. M. 12 Kupf. 8. 1 Thlr. Neue Aufl. unter dem Titel: Anweis. z. Feldmessk. mit der Bonsole. 8. 1 Thlr. 12 Gr.
- Ruheims Reisen ins sächsische Erzgebirge. 8. 18 Gr.
- Rüdiger's, Chr. Fr., Darst. d. neuen Methoda des Harren du Séjour, Sonnen- und Mondfinsternisse f. e. gegab. Ort analyt. zu berechnen. Nebst Nachricht v. d. Leipz. Sternwarte. M. Kupf. 8. 8 Gr.
- Sallustii, Cail Crispi, quae exstant, item epistolae de rep. ordinanda, declamatio in Ciceronem et Pseudo-Ciceronis in Sallustium, Jul. Exuperantini de bell. civ. et Porcius Latro in Catilinam. Ex recans. et cum integr. annotatt. Theoph. Cortii et var. lect. libr. recans. collatorum accur. addid., vitam Sallustii, et notit. literar. praemittit, divers. lect. Havercamp. in fragm. etiam Gerlach, etnosque comment. etque indices edic. Carol. Haer. Frotscher. Acced. Constant. Felic. Durentions de coniur. Catilin. itamque vet. historicor. fragmenta plenius et emendat. edita. Vol. 1. 8. maj. 3 Thlr. Charta script. 4 Thlr. 12 Gr. Charta membr. 6 Thlr.
- Sammlung v. anat. Aufs. u. Bemerk. z. Aufklär. d. Fischkunde. Th. 1. enth. Vicq. d' Azyr's anat. Kennz. d. Fische, und Loranzi's Beschreibung und Zerglieder. des Krampfrochens. A. d. Ital. und Franz. v. J. G. Schneider. M. 7 Kupf. 8. 16 Gr.

- Schmiedlein's, Gfr. Ben., vollst. Lehrbegr. der Entomologie.  
Mit 4 Kpfen. B. 1. 8. 1 Thlr. 16 Gr.
- Schulze, W., neue kaufmännische kalligraphische Vorschriften,  
für alle, die sich der Handlung gewidmet haben und  
noch widmen wollen. Quer Fol. 1s Heft. 1 Thlr.
- Semmler's, Chr., Untersuchungen üb. d. höchste Vollkom-  
menh. in d. Landschaftsmalerei für Freunde dieser Kunst  
und der schönen Natur. 2 Thle. 8. 2 Thlr. 16 Gr.
- die Gartenlogik; ein Versuch des Unverständliche und  
Widersinnige bei dem Anlegen englischer Gärten zu ver-  
meiden, um dafür das Schöne und Nützliche darin aufzu-  
nehmen. 8. 1 Thlr. 16 Gr.
- Stobaei, Joan., Florilegium. ad MS. fidem ems. supplev.  
Th. Gaisford, IV Voll. Ed. auct. 8. 0 Thlr.
- Charta scrip. 14 Thlr.
- Theocriti, Bionis et Moschi carmina bucol. cum schol.  
Ed. Th. Gaisford, II Voll. Ed. nove et eucti (aus Poetae  
min. graeci besonders.) 8. maj. 4 Thlr. 8 Gr.
- Vorbereitung zu Gall's Vorlesungen üb. d. Cranioscopie,  
v. s. seiner Schüler. Mit Kupf. broch. 8. 8 Gr.
- Wedström, C. B., Versuch über Kolonien, vorzüglich in  
Rücksicht auf die westliche Küste von Afrika, nebst einer  
Beschreibung der bis jetzt dort errichteten Kolonien, beson-  
ders der neuen von Sierra Leona und Bulama. Aus dem  
Englischen mit vielen Anmerkungen, die Naturgeschichte  
von Africa, dessen Bewohner und den Sklavenhandel be-  
treffend, von E. A. W. Zimmermann, M. Kpf. und  
Charten. 1 Bd. 8. 1 Thlr.
- Wehrheit ohne Schmeike über den freien Getraidehandel,  
von einem unparteiischen sachverständigen Manne zur  
Beherr. für jede Classe von Lesern, besonders für Minister,  
Cameralisten etc. 8. 1 Thlr.
- Weber; Dr. Fr. und Dr. D. M. H. Mobr's Archiv für die  
systematische Naturgeschichte. 1r Bd. 1s St. mit Kupf.  
gr. 8. brochirt 1 Thlr.
- Wenkii, F. A. W., orat. secul. de vir. erud., qui inde a  
secul. solema. 1709. Lips. acad. doctrina scriptisque ornav.  
atque illustrav. 4. 18 Gr. Charta script. 1 Thlr. 8 Gr.
- Charta membr. 1 Thlr. 12 Gr.
- Wichmann, über die natürlichst. Mittel, dem Landmanne  
die Stallfüst. zu erleichtern. 8. 16 Gr.
- William's Cooper, Geschichte des Krieges in Westindien  
im Jahre 1794. A. dem Engl. v. Chr. Aug. Fischer. 8.  
18 Gr.
- Wulfen, Xav., cryptogama aquetica. Cum tab. aen. 4. 16 Gr.
- plantarum rarior. descriptiones. 4. 1 Thlr.
- Zimmermann's, E. A. W., statist. histor. Archiv. Bd. 1.  
8. 16 Gr.
- — erste Hinsicht auf Deutschland. 8. 16 Gr.











